

RIBBED BRYOZOAN

(Juxtacribrilina mutabilis)

ORIGIN AND DISTRIBUTION


This East Asian marine invertebrate, which is a bryozoan, was first reported in the southern Gulf of Maine in 2018. It was discovered in the Gulf of St. Lawrence (Prince Edward Island) in 2018 and in Nova Scotia (Cape Breton) in 2020. It may be established throughout the Canadian Maritimes.



T. Trott


CHARACTERISTICS

- Live colonies are whitish pink and roughly circular (5-7mm across)
- Colonies are composed of a single sheet of many connected, oval-shaped "cells" (tiny filter feeding individuals called "zooids")
- Zooids vary in appearance (*mutabilis* = changeable), from having many ribs, the more common form, to looking like a sieve with many pores. Colonies can have a mix of types



Zooids appearing ribbed, also known as R- and I-type zooids.

Zooids appearing sieve-like, also known as S-type zooids.




T. Trott

HABITAT

This species can be found in shallow waters, most commonly encrusting eelgrass but occasionally kelp and other brown seaweeds like knotted wrack. Grows best in sheltered areas protected from strong currents and waves.

SIMILAR SPECIES

The ribbed bryozoan can be confused with one of three related native bryozoans: *Cribilina annulata*, *Cribilina cryptoecium*, and *Cribilina macropunctata*. The similarity between these native species and the ribbed bryozoan is owed to the oval shape and sieve-like appearance of their zooids, but that is where their likeness ends. None of the native species have zooids with ribs. Also, colonies of the native species are not round, encrusting as irregularly shaped patches. Importantly, none of the native species are known to grow on eelgrass; they are most frequently found on shells and rocks, and can occasionally grow on algae.



T. Trott

ECOLOGICAL AND ECONOMIC IMPACTS

- The ribbed bryozoan increases the total load of fouling of organisms on eelgrass, a plant which provides shelter and reproductive and feeding habitat for fish, molluscs and crustaceans. This buildup raises the chances of blade breakage and damage to eelgrass habitat
- Colonies encrusting eelgrass reduce light available for photosynthesis
- Compete for space normally occupied by native species



T. Trott

WHAT YOU CAN DO

- Report any sighting to Fisheries and Oceans Canada at the following link (also accessible via QR code):
dfo-mpo.gc.ca/contact/invasive-species-especes-envahissantes-eng.html
- If possible, please include photos and note the date and location (GPS coordinates are ideal)




BRYOZOAIRE CÔTELÉ

(*Juxtacribrilina mutabilis*)

ORIGINE ET DISTRIBUTION


Cet invertébré marin d'Asie de l'Est, qui est un bryzoaire, a été signalé pour la première fois dans le sud du Golfe du Maine en 2018. Il a été découvert dans le Golfe du Saint-Laurent (Île-du-Prince-Édouard) en 2018 et en Nouvelle-Écosse (Cap-Breton) en 2020. Il pourrait être établi tout au long des côtes Maritimes canadiennes.



T. Trott


CARACTÉRISTIQUES

- Les colonies vivantes sont roses blanchâtres et à peu près circulaires (5-7 mm de diamètre)
- Les colonies sont composées d'une seule feuille d'épaisseur formée de nombreuses "cellules" ovales connectées (de minuscules individus filtreurs appelés "zoïdes")
- Les zoïdes varient en apparence (*mutabilis* = variable), entre sa forme qui a de nombreuses côtes, la forme la plus courante, ou sa forme qui ressemble à un tamis avec de nombreux pores. Les colonies peuvent avoir un mélange des deux formes



Les zoïdes apparaissant côtelés, également connus sous le nom de zoïdes de type R ou I.

Les zoïdes apparaissant comme des tamis, aussi connus sous le nom de zoïdes de type S.



T. Trott

T. Trott

HABITAT


Cette espèce peut être retrouvée dans les eaux peu profondes, le plus souvent encroûtant la zostère, mais parfois dans la varech et d'autres algues brunes comme l'*Ascophyllum nodosum*. Elle pousse mieux dans les zones abritées, protégées des courants forts et des vagues.

ESPÈCES SEMBLABLES

Le bryzoaire côtelé peut être confondu avec l'un des trois bryzoaires indigènes apparentés :

Cribrilina annulata, *Cribrilina cryptoecium* et *Cribrilina macropunctata*. Les similitudes entre ces espèces indigènes et le bryzoaire côtelé sont dues à la forme ovale et l'apparence de tamis de leurs zoïdes, mais c'est là où la ressemblance s'arrête.

Aucune des espèces indigènes n'a de zoïdes avec des côtes. De plus, les colonies des espèces indigènes ne sont pas rondes et s'incrustent sous forme de taches irrégulières. Il est important de noter qu'aucune des espèces indigènes ne pousse sur la zostère; on les trouve le plus souvent sur des coquillages et des rochers et peuvent parfois pousser sur des algues.



Cribrilina macropunctata

T. Troit

IMPACTS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

- Le bryzoaire côtelé augmente la charge totale d'encrassement des organismes sur la zostère, une plante qui fournit un abri et un habitat de reproduction et d'alimentation aux poissons, mollusques et crustacés. Cette accumulation augmente le risque de bris de lame et de dommages à la zostère
- Les colonies qui encroûtent la zostère réduisent la lumière disponible pour la photosynthèse
- Cause de la compétition pour l'espace normalement occupé par les espèces indigènes



T. Troit

QUE POUVEZ VOUS FAIRE?

- Signalez toute observation à Pêches et Océans Canada au lien suivant (également accessible par code QR):

dfo-mpo.gc.ca/contact/invasive-species-especes-envahissantes-fra.html

- Si possible, veuillez inclure des photos et noter la date et l'emplacement (les coordonnées GPS sont idéales)

