# PHQ-9 · Cuestionario sobre la salud del paciente

Cribado y medida de gravedad de la sintomatología depresiva. Kroenke, Spitzer y Williams (2001).

Paciente _____ Fecha _____

**Durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido ha tenido molestias debido a los siguientes problemas?**

| Ítem | Ningún día (0) | Varios días (1) | Más de la mitad de los días (2) | Casi todos los días (3) |
|---|---|---|---|---|
| **1.** Poco interés o placer en hacer cosas | | | | |
| **2.** Se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o sin esperanzas | | | | |
| **3.** Ha tenido dificultad para quedarse o permanecer dormido(a), o ha dormido demasiado | | | | |
| **4.** Se ha sentido cansado(a) o con poca energía | | | | |
| **5.** Sin apetito o ha comido en exceso | | | | |
| **6.** Se ha sentido mal con usted mismo(a) – o que es un fracaso o que ha quedado mal con usted mismo(a) o con su familia | | | | |
| **7.** Ha tenido dificultad para concentrarse en ciertas actividades, tales como leer el periódico o ver la televisión | | | | |
| **8.** ¿Se ha movido o hablado tan lento que otras personas podrían haberlo notado? o lo contrario – muy inquieto(a) o agitado(a) que ha estado moviéndose mucho más de lo normal | | | | |
| **9.** Pensamientos de que estaría mejor muerto(a) o de lastimarse de alguna manera | | | | |

| | Puntuación |
|---|---|
| Suma por columnas | |
| **Puntuación total (0–27)** | |

**Si marcó cualquiera de los problemas, ¿qué tanta dificultad le han dado estos problemas para hacer su trabajo, encargarse de las tareas del hogar, o llevarse bien con otras personas?**

| No ha sido difícil | Un poco difícil | Muy difícil | Extremadamente difícil |
|---|---|---|---|
| | | | |

Uso profesional. Material de apoyo: no sustituye el juicio clínico ni la formación específica en cada técnica o instrumento.

## Corrección e interpretación

| Puntuación | Gravedad de la sintomatología depresiva |
|---|---|
| **0–4** | Mínima |
| **5–9** | Leve |
| **10–14** | Moderada |
| **15–19** | Moderadamente grave |
| **20–27** | Grave |

- Sume las puntuaciones de los nueve ítems. La pregunta de dificultad no puntúa; informa del impacto funcional.
- Una puntuación de 10 o más se usa habitualmente como punto de corte para sospechar depresión mayor; el diagnóstico requiere entrevista clínica.
- **Ítem 9**: cualquier respuesta distinta de «Ningún día» exige explorar el riesgo de suicidio en la misma sesión, con independencia de la puntuación total (ver recurso PRO-06).
- Útil para seguimiento: un cambio de 5 puntos o más se considera clínicamente relevante.

Elaborado por los doctores Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke y colegas, mediante una subvención educativa otorgada por Pfizer Inc. No se requiere permiso para reproducir, traducir, presentar o distribuir. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med. 2001;16(9):606-613.

Uso profesional. Material de apoyo: no sustituye el juicio clínico ni la formación específica en cada técnica o instrumento.