GAD-7 · Escala de ansiedad generalizada

Cribado y medida de gravedad de la sintomatología ansiosa. Spitzer, Kroenke, Williams y Löwe (2006).

Paciente _____ Fecha _____

Durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido ha tenido molestias debido a los siguientes problemas?

Ítem	Ningún día (0)	Varios días (1)	Más de la mitad de los días (2)	Casi todos los días (3)
1. Se ha sentido nervioso(a), ansioso(a) o con los nervios de punta				
2. No ha sido capaz de parar o controlar su preocupación				
3. Se ha preocupado demasiado por motivos diferentes				
4. Ha tenido dificultad para relajarse				
5. Se ha sentido tan inquieto(a) que no ha podido quedarse quieto(a)				
6. Se ha molestado o irritado fácilmente				
7. Ha tenido miedo de que algo terrible fuera a pasar				

	Puntuación
Suma por columnas	
Puntuación total (0–21)	

Si marcó cualquiera de los problemas, ¿qué tanta dificultad le han dado estos problemas para hacer su trabajo, encargarse de las tareas del hogar, o llevarse bien con otras personas?

No ha sido difícil	Un poco difícil	Muy difícil	Extremadamente difícil

Uso profesional. Material de apoyo: no sustituye el juicio clínico ni la formación específica en cada técnica o instrumento.

Corrección e interpretación

Puntuación	Gravedad de la sintomatología ansiosa
0–4	Mínima
5–9	Leve
10–14	Moderada
15–21	Grave

- Sume las puntuaciones de los siete ítems. La pregunta de dificultad no puntúa.
- Una puntuación de 10 o más justifica una evaluación más detallada. Aunque se diseñó para el trastorno de ansiedad generalizada, también es sensible a pánico, ansiedad social y TEPT.
- No es diagnóstica por sí sola: complemente con entrevista clínica.

Elaborado por los doctores Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke y colegas, mediante una subvención educativa otorgada por Pfizer Inc. No se requiere permiso para reproducir, traducir, presentar o distribuir. Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 2006;166(10):1092-1097.

Uso profesional. Material de apoyo: no sustituye el juicio clínico ni la formación específica en cada técnica o instrumento.