PCL-5 · Lista de verificación del TEPT

Autoinforme de síntomas de estrés postraumático según el DSM-5. Weathers et al. (2013).

Paciente _____ **Fecha** _____

Experiencia estresante de referencia (descripción breve):

_____

Instrucciones: Más abajo hay un listado de problemas que las personas tienen a veces debido a una experiencia muy estresante. Teniendo en cuenta la experiencia más estresante que ha vivido, por favor, lea cada problema detenidamente y rodee uno de los números de la derecha para indicar con cuánta intensidad le ha molestado ese problema durante el último mes.

En el último mes, ¿cuánto le ha molestado…

Ítem	Nada (0)	Un poco (1)	Moderadamente (2)	Bastante (3)	Muchísimo (4)
1. Tener recuerdos repetidos, perturbadores y no deseados de la experiencia estresante					
2. Tener sueños repetidos, perturbadores de la experiencia estresante					
3. Sentirse o actuar de repente como si la experiencia estresante volviera a suceder (como si realmente estuviera allí reviviéndolo)					
4. Sentirse muy disgustado cuando algo le recordaba la experiencia estresante					
5. Tener reacciones físicas intensas cuando algo le recordaba la experiencia estresante (p. ej. palpitaciones, dificultades para respirar, sudoración)					
6. Evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos relacionados con la experiencia estresante					
7. Evitar estímulos externos relacionados con la experiencia estresante (p. ej. personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos o situaciones)					
8. Tener dificultades para recordar partes importantes de la experiencia estresante					
9. Tener fuertes creencias negativas sobre uno mismo, otras personas, o el mundo (p. ej. tener pensamientos como: no soy una buena persona, hay algo que seriamente no está bien en mí, no se puede confiar en nadie, el mundo es muy peligroso)					
10. Culparse a sí mismo o a otra persona de la experiencia estresante o de lo que sucedió después					

Uso profesional. Material de apoyo: no sustituye el juicio clínico ni la formación específica en cada técnica o instrumento.

Ítem	Nada (0)	Un poco (1)	Moderadamente (2)	Bastante (3)	Muchísimo (4)
11. Tener fuertes sentimientos negativos tales como miedo, terror, ira, culpa o vergüenza					
12. Perder el interés en actividades que antes solía disfrutar					
13. Sentirse distante o apartado de los demás					
14. Dificultades para sentir emociones positivas (p. ej. ser incapaz de sentir alegría o tener sentimientos de amor hacia personas cercanas)					
15. Tener conductas irritables, ataques de ira o actuar de manera agresiva					
16. Tomar demasiados riesgos o hacer cosas que le pudieran dañar					
17. Estar muy en alerta o en guardia					
18. Sentirse asustadizo o sobresaltado					
19. Tener dificultades para concentrarse					
20. Tener problemas para dormir o mantener el sueño					

Corrección

Criterio DSM-5	Ítems	Puntuación
B · Intrusión	1–5	
C · Evitación	6–7	
D · Alteraciones negativas en cognición y estado de ánimo	8–14	
E · Alteraciones en la activación y reactividad	15–20	
Total (0–80)	1–20	

- Una puntuación total de **33 o más** sugiere un probable TEPT y justifica una evaluación diagnóstica completa (se han propuesto puntos de corte entre 31 y 33 según la población).
- Diagnóstico provisional por criterios: considerar presente un ítem puntuado con 2 o más y exigir al menos 1 ítem B, 1 ítem C, 2 ítems D y 2 ítems E.
- Para seguimiento, un cambio de 10 puntos o más se considera clínicamente significativo.
- No sustituye la entrevista clínica (p. ej. CAPS-5).

Weathers FW, Litz BT, Keane TM, Palmieri PA, Marx BP, Schnurr PP. The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). National Center for PTSD, 2013 (dominio público). Versión española: Frontiers in Psychology, 2024; doi:10.3389/fpsyg.2024.1216435.

Uso profesional. Material de apoyo: no sustituye el juicio clínico ni la formación específica en cada técnica o instrumento.