Señales de alerta de TCA y derivación

Qué observar en consulta de nutrición y cómo actuar ante un posible trastorno de la conducta alimentaria.

> Este recurso ayuda a detectar y derivar. No es un instrumento de diagnóstico ni sustituye a los cuestionarios de cribado validados (por ejemplo, la versión española del SCOFF) ni a la valoración por un equipo especializado.

Señales de alerta

Ámbito	Qué observar
Conducta alimentaria	Restricción intensa o reglas rígidas sobre la comida, saltarse comidas, atracones, comer a escondidas, rituales al comer.
Conductas compensatorias	Vómitos autoinducidos, uso de laxantes o diuréticos, ejercicio excesivo o compulsivo, ayunos tras comer.
Peso y cuerpo	Pérdida de peso rápida o importante, oscilaciones marcadas, preocupación intensa por el peso o la figura, comprobaciones frecuentes.
Físicas	Amenorrea o irregularidad menstrual, mareos, intolerancia al frío, erosión dental, callosidades en los nudillos, alteraciones analíticas.
Emocionales y sociales	Culpa intensa tras comer, evitar comer con otras personas, aislamiento, ánimo bajo, irritabilidad.

Preguntas para explorar

Formúlelas con naturalidad y sin juicio, dentro de la historia dietética:

- ¿Cómo te sientes después de comer?
- ¿Hay alimentos que te prohíbes o que te dan miedo?
- ¿Alguna vez sientes que no puedes parar de comer?
- ¿Has hecho algo para compensar lo que has comido (vomitar, ayunar, hacer más ejercicio, laxantes)?
- ¿Cuánto espacio ocupan en tu día los pensamientos sobre la comida, el peso o tu cuerpo?

Cómo actuar

Situación	Actuación
Señales aisladas, sin compensaciones ni riesgo físico	Evite pautas restrictivas y el foco en el peso. Trabaje regularidad y alimentación flexible. Reevalúe en cada visita.
Sospecha de TCA	Explique su preocupación al paciente con calma. Coordine con su médico de familia y con psicología o psiquiatría. El abordaje de un TCA debe ser multidisciplinar.
Riesgo físico o psicológico	**Derivación urgente** (urgencias o médico el mismo día) si hay desmayos, dolor torácico, palpitaciones, vómitos frecuentes, pérdida de peso muy rápida, rechazo a comer o beber, o ideas de hacerse daño.

Uso profesional. Material de apoyo: no sustituye el juicio clínico ni la valoración individual de cada paciente.

Registro

Fecha	Señales observadas	Actuación	Derivado a / fecha

Si el paciente expresa ideas de suicidio o de hacerse daño: en España, línea 024 (24 h) y emergencias 112.

Uso profesional. Material de apoyo: no sustituye el juicio clínico ni la valoración individual de cada paciente.