### 1. 指数法则:

- (1)  $b^0 = 1$
- (2)  $b^1 = b$
- $(3) \quad b^x b^y = b^{x+y}$
- $(4) \quad \frac{b^x}{b^y} = b^{x-y}$
- $(5) \quad (b^x)^y = b^{xy}$

## 2. 对数法则:

- (1)  $\log_b(1) = 0$
- $(2) \quad \log_b(b) = 1$
- (3)  $\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$

(4) 
$$\log_b(\frac{x}{y}) = \log_b(x) - \log_b(y)$$

- (5)  $\log_b(x^y) = y \log_b(x)$
- (6) 换底法则:

$$\log_b(x) = \frac{\log_c(x)}{\log_c(b)}$$

# 3. 自然数 e 相关

$$(1) \quad \lim_{n \to \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$$

$$(2) \quad \lim_{n \to \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$$

\*\*  $\log_e(x)/\ln(x)/\log(x)$  具有相同意义

## 4. 对数函数求导

$$(1) \quad \frac{d}{dx}\ln(x) = \frac{1}{x}$$

(2) 
$$\frac{d}{dx}\log_b(x) = \frac{1}{x\ln(b)}$$

### 5. 指数函数求导

$$(1) \quad \frac{d}{dx}(b^x) = b^x \ln(b)$$

$$(2) \quad \frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

6. 指数函数在 0 附近的行为

$$\lim_{h \to 0} \frac{e^h - 1}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{e^{0+h} - e^0}{h} = \{(e^x)' | x = 0\} = 1$$

7. 对数函数在 1 附近的行为

$$\lim_{h \to 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\ln(1+h) - \ln(1)}{h} = \{\ln'(x) | x = 1\} = 1$$

- 8. 指数函数在  $\infty$  或  $-\infty$  附近的行为
- $(1) \quad \lim_{x \to \infty} e^x = \infty$
- $(2) \quad \lim_{x \to -\infty} e^x = 0$
- $(3) \quad \lim_{x \to \infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$
- $(4) \quad \lim_{x \to \infty} \frac{e^x}{x!} = 0$
- 9. 对数函数在  $\infty$  附近的行为
- $(1) \quad \lim_{x \to \infty} \ln(x) = \infty$

(2) 
$$\lim_{x \to \infty} \frac{\ln(x)}{x^a} = 0, 其中 a > 0$$

- 10. 对数函数在 0 附近的行为
- $(1) \quad \lim_{x \to 0^+} \ln(x) = -\infty$
- (2)  $\lim_{x \to 0^+} x^a \ln(x) = 0$