09.10.22 9 клас

Тема. Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

Мета. Ознайомитися з поняттями лінійної нерівності з однією змінною, її властивостей та рівносильних нерівностей, навчитися розв'язувати лінійні нерівності з однією змінною.

Пригадайте

- Що називають нерівністю з однією змінною?
- Що значить розв'язати нерівність?
- Що таке область допустимих значень?
- Що входить у множину розв'язків нерівності?
- Що таке числовий проміжок?
- Які дії з множинами ви знаєте?

Ознайомтеся з інформацією

Лінійною нерівністю з однією змінною називається нерівність виду $a \cdot x > b$, $a \cdot x < b$, $a \cdot x \ge b$, $a \cdot x \le b$,

Дві нерівності називаються **рівносильними**, якщо вони мають однакові розв'язки. Зокрема, нерівності рівносильні, якщо вони не мають розв'язків.

Властивості рівносильних нерівностей

- 1. Якщо з однієї частини нерівності перенести до іншої доданок із протилежним знаком, то дістанемо нерівність, рівносильну початковій.
- 2. Якщо до обох частин нерівності додати або відняти будь-яке число, то дістанемо нерівність, рівносильну початковій.
- 3. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на додатнє число, то дістанемо нерівність, рівносильну початковій.
- 4. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на від'ємне число, то рівносильною початковій буде нерівність протилежного змісту.

Нерівності виду 0x > b, $0x \ge b$, $0x \le b$, $0x \le b$ або не мають розв'язків, або їх розв'язком є будь-яке число.

Завдання

Усні вправи

Задача 1

Чи рівносильні нерівності:

1)
$$(x+5)^2 < 0$$
 Ta $|x| < 0$;
2) $(x-3)^4 \ge 0$ Ta $|x-2| \ge 0$?

Розв'язання

1) $(x+5)^2 < 0$ — немає розв'язків;

|x| < 0 — немає розв'язків.

Отже, ці дві нерівності рівносильні.

2) $(x-3)^4 \ge 0$ — розв'язками є всі дійсні числа.

 $\left|x-2\right| \, \geq \, 0$ — розв'язками ε всі дійсні числа.

Отже, ці дві нерівності рівносильні.


Письмові вправи

Задача 2

Розв'язати нерівність 3x > 15

Розв'язання

Поділимо обидві частини заданої нерівності на 3:



Відповідь: (5;∞)

Задача 3

Розв'язати нерівність $-7x \le 21$

Розв'язання

Поділимо обидві частини заданої нерівності на -7, змінивши знак на протилежний:

$$x \geq 21: (-7)$$

$$x \ge -3$$



Відповідь: [-3;∞)

Задача 4

Розв'язати нерівність $6x + 1 \ge 10x + 3$

Розв'язання

Перенесемо доданки, які містять змінну, в ліву частину нерівності, а доданки, які не містять змінної – у праву та зведемо подібні доданки:

$$6x - 10x \ge 3 - 1$$

$$-4x \ge 2$$

$$x \le 2: (-4)$$

$$x \le -0.5$$

Відповідь: (-∞; -0,5]

Задача 5

Розв'язати нерівність $6x + 1 \ge 10x + 3$

Розв'язання

Перенесемо доданки, які містять змінну, в ліву частину нерівності, а доданки, які не містять змінної – у праву та зведемо подібні доданки:

$$6x - 10x \ge 3 - 1$$

$$-4x \ge 2$$

$$x \le 2: (-4)$$

$$x \le -0.5$$

Відповідь: (-∞; -0,5]

Пригадайте

- Що називають лінійною нерівністю з однією змінною?
- Як розв'язати лінійну нерівність з однією змінною?

Домашнє завдання

Домашнє завдання § 6 вивчити означення і властивості

Nº 179 (1 i 4), 181 (6 i 8), 183 (2 i 3), 191 (5 i 6), 195 (3), 207 (4)

Фото виконаних домашніх робіт надсилайте у HUMAN або на електронну пошту