Тема. Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей

<u>Мета.</u> Ознайомитись із поняттям числової нерівності та властивостями числових нерівностей, навчитись використовувати їх для порівняння чисел та виразів.

Пригадайте

- Що називають виразом?
- Що називають рівнянням?
- Як порівняти два додатних числа?
- Як порівняти два від'ємних числа?

Ознайомтеся з інформацією

Число a вважають більшим за число b, якщо різниця a-b є додатним числом. Число a вважають меншим від числа b, якщо різниця a-b є від'ємним числом. Числа a і b вважають рівними, якщо різниця a-b дорівнює нулю.

<i>a</i> > <i>b</i>	a < b	a = b
a-b>0	a-b < 0	a - b = 0

Перегляньте навчальне відео за посиланням:

https://youtu.be/laWT_ETcfZs

Ознайомтеся з інформацією

Властивості числових нерівностей

Властивість 1. Якщо **a>b і b>c,** тоді **a>c.**



Наприклад: нехай a=6,b=0,c=-4, тоді, якщо 6>0 і 0>-4, тоді 6>-4.

Властивість 2. Якщо a>b, тоді a+c>b+c.

Якщо до обох частин нерівності додати одне й те саме число - знак нерівності не зміниться.

Наприклад: нехай a=6,b=0,c=-4, отже 6>4, якщо додати число -4 до обох частин нерівності, маємо: 6-4=2 і 0-4=-4, тоді 6>-4.

Властивість 3. Якщо a>b і k>0, тоді ak>bk.

Якщо обидві частини нерівності помножити на одне і те ж додатне число - знак нерівності не зміниться

Наприклад: Відомо, що 17,2<x<17,3. Оцінити 2х.

При множенні подвійної нерівності на додатне число 2, отримаємо нерівність того ж змісту (тобто знаки не зміняться). $17.2 \cdot 2 < x \cdot 2 < 17.3 \cdot 234.4 < 2x < 34.6$

Властивість 4. Якщо a > b і k < 0, тоді ak < bk.

Якщо обидві частини нерівності помножити на одне і те ж від'ємне число - знак нерівності зміниться (< на >, > на <)

Наприклад: Відомо, що 17,2<x<17,3. Оцінити –2х.

При множенні подвійної нерівності на від'ємне число -2, отримаємо нерівність протилежного змісту (тобто знаки зміняться). $17,2\cdot(-2)<x\cdot(-2)<17,3\cdot(-2)-34,4>-2x>-34,6-34,6<-2x<-34,4$

Властивість 5. Якщо a > b і a,b > 0, тоді $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

Ділення на число k можна замінити множенням на дріб 1/k

Запишіть у зошит

Задача 1

Доведіть, що за будь-якого значення змінної є правильною нерівність:

$$(a + 4)(a + 1) > a(a + 5)$$

Розв'язання:

$$(a + 4)(a + 1) > a(a + 5)$$

$$(a + 4)(a + 1) - a(a + 5) > 0$$

$$a^{2} + 4a + a + 4 - a^{2} - 5a > 0$$

$$4 > 0$$

Задача 2

Доведіть, що: $a^3 - 8a^2 \ge -a + 8$, для $a \ge 8$.

Розв'язання:

$$a^{3} - 8a^{2} \ge -a + 8$$

$$a^{3} - 8a^{2} + a - 8 \ge 0$$

$$a^{2}(a - 8) + (a - 8) \ge 0$$

$$(a - 8)(a^{2} + 1) \ge 0$$

$$a \ge 8$$
, TOMY $a - 8 \ge 0$

$$a^2 \ge 0$$
, TOMY $a^2 + 1 > 0$

Отже,

$$(a-8)(a^2+1) \ge 0$$

Задача 3

Порівняйте суму квадратів двох довільних чисел та їхній подвоєний добуток.

Розв'язання:

$$a^2 + b^2 - 2ab ? 0$$

$$a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2$$

$$\left(a-b\right)^2 \ge 0$$

$$a^2 + b^2 \ge 2ab$$

Задача 4

Запишіть нерівність, яку отримаємо, якщо до обох частин нерівності -3 < 4 додамо

- число 5
- число –2

Розв'язання:

- -3 + 5 < 4 + 5, a 60 $\times 2 < 9$
- -3-2 < 4-2, aбо ж -5 < 2

Задача 5

Запишіть нерівність, яку отримаємо, якщо обидві частини нерівності 5 > -3 помножимо на

- число 4
- число −2

Розв'язання:

- 5 · 4 > -3 · 4, або ж 20 > -12
- $5 \cdot (-2) < -3 \cdot (-2)$, aбо ж −10 < 6

Додатково

Задача 6

Як від нерівності 2 < 3 перейти до $1 - 3 \cdot 2 > 1 - 3^2$?

Розв'язання.

Помножимо обидві частини нерівності 2 < 3 на (-3). Оскільки (-3) від'ємне, то знак в нерівності зміниться на протилежний і ми отримаємо $(-3) \cdot 2 > (-3) \cdot 3 = -3^2$

Тепер додамо до обох частин 1 і отримаємо шукану нерівність $1-3\cdot 2>1-3^2$

Пригадайте

- Як порівняти два числа?
- Які властивості є у числових нерівностей?

Домашне завдання

- Опрацювати конспект
- Розв'язати письмово завдання:
 - 1. Яку нерівність ми отримаємо, якщо:
 - 1) до обох частин нерівності -2<10 додати -8?
 - 2) обидві частини нерівності 3>-2 помножити на -2?

2.

Дано: a > b. Порівняйте;

1)
$$-15a$$
 $\text{ Ta} - 15b$;

2)
$$\frac{a}{10}$$
 ta $\frac{b}{10}$;

3)
$$8 - 3a$$
 ta $8 - 3b$.

- 3. Нехай a>b, a≠0, b≠0. Чи справджується нерівність $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$?
- 4. Нехай a>b. Чи справджується нерівність $a^2 > b^2$?

Фото виконаних робіт надсилайте у HUMAN або на електронну пошту nataliartemiuk.55@gmail.com