Тема. Самостійна робота. Розв'язування систем лінійних рівнянь способом підстановки

<u>Мета.</u> Ознайомитися з поняттям методу підстановки для розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними, вчитися розв'язувати системи рівнянь методом підстановки

Повторюємо

- Що таке система лінійних рівнянь з двома змінними?
- Що є розв'язком системи рівнянь з двома змінними?
- Як можна розв'язати систему рівнянь з двома змінними?
- Які кроки треба зробити, щоб розв'язати систему рівнянь графічно?

Самостійна робота

Розв'язати графічно системи рівнянь:

$$\oint \begin{cases} 6x - y = 17, \\ -2y = 10. \end{cases}
 \begin{cases} x - y = 0, \\ 4x + y = 15. \end{cases}
 \begin{cases} 6p - 5q = -38, \\ 2p + 7q = 22. \end{cases}$$

Перегляньте відео

https://youtu.be/MfQk5pPe3Os

Щоб розв'язати систему двох лінійних рівнянь методом підстановки, потрібно:

- 1) виразити з будь-якого рівняння системи одну змінну через іншу;
- 2) підставити в інше рівняння системи замість цієї змінної отриманий вираз;
- 3) розв'язати отримане рівняння з однією змінною;
- 4) знайти відповідне значення другої змінної;
- 5) записати відповідь.

Запам'ятайте

Методом підстановки зручно користуватись тоді, коли хоча б один з коефіцієнтів при змінних х чи у дорівнює 1 або -1. Саме змінну з таким коефіцієнтом і слід виражати через іншу.

Приклад 1

Розв'яжіть систему рівнянь:

$$\begin{cases} x + 2y = 3, \\ 4x - 3y = -10. \end{cases}$$

Розв'язання:

Виразімо з першого рівняння змінну х через змінну у:

$$x = 3 - 2y$$
.

Підставмо в друге рівняння замість змінної x вираз 3-2y

$$\begin{cases} x = 3 - 2y, \\ 4(3 - 2y) - 3y = -10. \end{cases}$$

Розв'язування вправ

Друге рівняння системи містить лише одну змінну y. Розв'яжімо це рівняння:

$$12 - 8y - 3y = -10$$
,

$$-11y = -22$$
,

$$y = 2$$
.

Підставмо y = 2 y рівність <math>x = 3 - 2y.

$$x = 3 - 2 \cdot 2$$
, $x = -1$.

Відповідь: (-1; 2).

Приклад 2

Знайдіть розв'язок системи:

$$\int 5x - 3y = -19,$$

Розв'язання:

Виразімо з другого рівняння змінну y через змінну x:

$$y = -1 - 2x$$
.

Перше рівняння запишімо без змін.

$$\int 5x - 3y = -19$$
,

$$y = -1 - 2x$$
.

У перше рівняння замість у запишемо вираз –1 – 2х.

$$5x - 3(-1 - 2x) = -19,$$

$$y = -1 - 2x$$
.

Перше рівняння містить лише одну змінну х. Розв'яжімо це рівняння:

$$5x + 3 + 6x = -19$$
,

$$11x = -22$$
,

$$x = -2$$
.

Підставмо замість х число (-2) у рівність y = -1 - 2x.

$$y = -1 - 2 \cdot (-2) = 3.$$

Відповідь: (-2; 3).

Приклад 3

Розв'яжіть систему рівнянь:

$$\int 5x + 2y = 15,$$

Розв'язання:

Виразімо з першого рівняння змінну у через змінну х:

$$2y = 15 - 5x$$

$$y = (15 - 5x):2$$

$$y = 7.5 - 2.5x$$
.

Підставмо в друге рівняння замість змінної у вираз 7,5 – 2,5х.

$$y = 7.5 - 2.5x$$

$$8x + 3(7,5 - 2,5x) = 20.$$

Друге рівняння системи містить лише одну змінну х. Розв'яжімо це рівняння:

$$8x + 22,5 - 7,5x = 20,$$

$$0.5x = 20 - 22.5$$

$$0.5x = -2.5$$

$$x = -5$$
.

Підставмо x = -5 у рівність y = 7.5 - 2.5x.

$$y = 7.5 - 2.5 \cdot (-5), y = 20.$$

Відповідь: (-5; 20).

Приклад 4

Знайдіть розв'язок системи:

$$\int 8q - 5q = -11,$$

$$\sqrt{5q + 4p} = -13.$$

Розв'язання:

Виразімо з першого рівняння 5q:

$$5q = 8p + 11.$$

Виразімо з другого рівняння 5q:

$$5q = -4p - 13$$
,

$$\int 5q = 8p + 11,$$

$$5q = -4p - 13$$
.

Прирівняймо праві частини отриманих рівнянь системи.

Отримаємо рівняння 8p + 11 = -4p - 13,

$$8p + 4p = -13 - 11$$
,

$$12p = -24$$
,

$$p = -2$$
.

Підставмо р = -2 в перше рівняння системи:

$$5q = 8 \cdot (-2) + 11$$

$$5q = -5$$
,

$$q = -1$$
.

Відповідь: (-2; -1).

Домашне завдання

- Опрацювати конспект

• Розв'язати системи рівнянь:
$$\oint \begin{cases}
6x - y = 17, \\
-2y = 10.
\end{cases}$$
 $\begin{cases}
x - y = 0, \\
4x + y = 15.
\end{cases}$

Фото виконаного завдання надіслати на HUMAN або на електронну пошту nataliartemiuk.55@gmail.com

Джерело: Всеукраїнська школа онлайн