Вчитель: Артемюк Н.А.

Тема. Розв'язування задач

<u>Мета:</u> вдосконалювати уміння знаходити координати та довжину вектора, виконувати дії з векторами, визначати їх взаємне розташування

Повторюємо

- Що таке вектор, які він має характеристики?
- Які вектори називають колінеарними?
- Як визначити, чи є вектори перпендикулярними?
- Які дії з векторами ви вмієте виконувати?
- Як знайти кут між векторами?

Розв'язування задач

Задача 1

Дано вектори $\vec{a}(-3;8)$ і $\vec{b}(5;2)$. Укажіть координати вектора \vec{c} , якщо $\vec{c}=\vec{a}+\vec{b}$.

Розв'язання

$$\vec{c} = (-3 + 5; 8 + 2) = (2; 10)$$

Відповідь: (2; 10)

Задача 2

Дано вектори $\vec{m}(4;-3)$ і $\vec{n}(3;2)$. Укажіть координати вектора \vec{d} , якщо $\vec{d}=\vec{m}-\vec{n}$.

Розв'язання

$$\vec{d} = (4-3; -3-2) = (1; -5)$$

Відповідь: (1; -5)

Задача 3

Знайдіть скалярний добуток векторів $\vec{a}(-2;5)$ і $\vec{b}(2;7)$.

Розв'язання

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -2 \cdot 2 + 5 \cdot 7 = -4 + 35 = 31$$

Відповідь: 31

Задача 3

Знайдіть координати вектора \overrightarrow{CD} та модуль, якщо $\mathcal{C}(-8;2)$, $\mathcal{D}(-4;5)$

Розв'язання

$$\overrightarrow{CD} = (-4 - (-8); 5 - 2) = (4; 3)$$

$$|\overrightarrow{CD}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

Задача 4

Дано вектори $\vec{m}(-8;4)$ і $\vec{n}(3;5)$. Знайдіть координати вектора $\vec{p}=\frac{1}{2}\vec{m}-4\vec{n}$

Розв'язання

$$\frac{1}{2}\vec{m} = \left(\frac{1}{2}\cdot(-8); \frac{1}{2}\cdot 4\right) = (-4; 2)$$

$$4\vec{n} = (4 \cdot 3; 4 \cdot 5) = (12; 20)$$

$$\vec{p} = \frac{1}{2}\vec{m} - 4\vec{n} = (-4; 2) - (12; 20) = (-4 - 12; 2 - 20) = (-16; -18)$$

Відповідь: $\vec{p}(-16; -18)$

Задача 5

Дано вектори $\vec{a}(x;-3)$ і $\vec{b}(6;9)$. При якому значенні x вектори \vec{a} і \vec{b} :

- 1) колінеарні;
- 2) перпендикулярні.

Розв'язання

- 1) Умова колінеарності векторів: $\frac{6}{x}=\frac{9}{-3}$, звідки $x=\frac{6\cdot (-3)}{9}=-\frac{18}{9}=-2$. Отже при x=-2 вектори \vec{a} і \vec{b} колінеарні.
- 2) Знайдемо скалярний добуток векторів \vec{a} і \vec{b} : $\vec{a} \cdot \vec{b} = x \cdot 6 + (-3) \cdot 9 = 6x 27$. Вектори \vec{a} і \vec{b} будуть перпендикулярні, якщо їх скалярний добуток буде дорівнювати 0, отже прирівняємо 6x 27 = 0, звідки x = 27: 6 = 4,5.

Відповідь: 1) при x = -2; 2) при x = 4,5

Пригадайте

- Як можна помножити два вектори?
- Як визначити кут між двома векторами?

Домашне завдання

- Опрацювати конспект, повторити правила з §6-10 підручника
- Розв'язати (письмово) задачі:
- 1. Дано вектори \vec{m} і \vec{n} . Побудуйте вектори:
 - 1) $\vec{d} = \vec{m} + \vec{n}$;
 - 2) $\vec{c} = \vec{m} \vec{n}$.
- 2. Знайдіть кут між векторами $\vec{c}(-3;0)$ і $\vec{d}(-1;1)$.




Фото виконаних робіт надсилайте у HUMAN або на електронну пошту nataliartemiuk.55@gmail.com

Джерело

https://naurok.com.ua/9-klas-kr-2-vektori-na-ploschini-99594.html