# Тема. Розв'язування типових задач. Самостійна робота

<u>Мета.</u> Вдосконалювати вміння розв'язувати системи лінійних нерівностей з однією змінною. Перевірити рівень засвоєння знань з даної теми

## Пригадайте

- Що називають розв'язком системи лінійних нерівністей з однією змінною?
- Як розв'язати систему нерівностей?
- Які розв'язки може мати система нерівностей?
- Як позначити на координатній прямій числові проміжки?

Нерівність	Проміжок	Зображення
$a \leq x \leq b$	[a; b]	$a \rightarrow b$
a < x < b	(a; b)	
$a < x \leq b$	(a; b]	$a \rightarrow b$
$a \leq x < b$	[a; b)	$a \longrightarrow b$

# Розв'язування задач

### Задача 1


Знайдіть область визначення виразу:

1) 
$$\sqrt{6x-9} + \sqrt{2x-5}$$
 
$$\begin{cases} 6x-9 \geq 0 & 6x \geq 9 \\ 2x-5 \geq 0 & 2x \geq 5 \end{cases} \begin{cases} x \geq \frac{9}{6} & x \geq 1,5 \\ x \geq \frac{5}{2} & x \geq 2,5 \end{cases}$$
 Відповідь:  $x \in [2,5;+\infty)$ 

2) 
$$\sqrt{12-3x} - \frac{5}{x-4}$$
 
$$\begin{cases} 12-3x \ge 0 & \begin{cases} -3x \ge -12 & \begin{cases} x \le 4 \\ x-4 \ne 0 \end{cases} & x \ne 4 \end{cases}$$
 Відповідь:  $x \in (-\infty; 4)$ 

### Задача 2

Одна сторона трикутника дорівнює 5 см, а сума двох інших — 11 см. Знайдіть, яких значень можуть набувати невідомі сторони трикутника.



#### Розв'язання

Позначимо довжину однієї з невідомих сторін x, тоді друга невідома сторона має довжину 11-x.

Аби три числа могли відповідати довжинам сторін трикутника, потрібно, щоб справджувалась нерівність трикутника для всіх трьох сторін.

$$\begin{cases} 5+x > 11-x \\ 5+11-x > x \\ 11-x+x > 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x > 6\\ 16 > 2x\\ 11 > 5 \end{cases}$$

Третя нерівність у цій системі справджується для всіх значень змінної, а отже, ця нерівність не впливає на розв'язок системи.

$$\begin{cases} 2x > 6\\ 16 > 2x \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 3 \\ 8 > x \end{cases}$$

Тобто, розв'язком системи  $\epsilon$  проміжок (3; 8), який зображують так:



Відповідно, одна з невідомих сторін набуває значення від 3 до 8 (сторона, довжину якої ми позначила за x), а друга сторона також належить цьому проміжку, адже вираз 11-x набуває всіх значень від 3 до 8, якщо x пробігає всі значення від 3 до 8.

## Самостійна робота

Пройдіть тестування за посиланням у вашому кабінеті на HUMAN. Обов'язково надішліть письмові розв'язування на HUMAN або на електронну пошту nataliartemiuk.55@gmail.com

### Домашне завдання

Повторити правила виконання дій з числовими нерівностями

#### Джерело

Всеукраїнська школа онлайн