

Тема. Повторення. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

Мета. Повторити класичне означення випадкової події, поняття частоти та ймовірності випадкової події, способи обчислення частоти та ймовірності випадкової події

Повторюємо

- Що вивчає комбінаторика?
- Які основні правила комбінаторики ви знаєте?
- В яких випадках застосовується правило суми? Наведіть приклади.
- В яких випадках застосовується правило добутку? Наведіть приклади.

Перегляньте відео

<https://youtu.be/8IDITBysCo8>

Ознайомтеся з інформацією та зробіть конспект

Теорія ймовірностей – математична наука, що вивчає закономірності випадкових явищ

Випадковий дослід – це дослід (експеримент, спостереження, випробування), результат якого залежить від випадку і який можна повторити багато разів за одних і тих самих умов. Результатом випадкового дослідів є випадкова подія.

Випадкова подія – подія, яка за одних і тих самих умов може відбутися (вірогідна подія), а може й не відбутися (неможлива подія).

Ймовірністю події А називають відношення m рівноможливих результатів, що приводять до настання події А до всієї кількості рівноможливих

- Частота події $= \frac{\text{кількість появ події}}{\text{всього спостережень}}$;
- частота \neq ймовірність;
- частота \approx ймовірність за умови, що було зроблено **багато** спостережень;
- $0 \leq \text{частота} \leq 1$.

результатів випробувань:

Проведіть дослідження

З'ясуйте чому для позначення ймовірності обрали саме літеру P

Задача 1

У грі «Підземелля і дракони» використовують декілька гральних кісточок, одна із яких має форму правильного ікосаедра, тобто 20-ти гранника, грані якого пронумеровані від 1 до 20. Яка ймовірність того, що при підкиданні такого кубика випаде число менше 13?

Розв'язування задач

Розв'язання.

Нехай A — це подія, коли при підкиданні кубика випаде число менше 13. Тоді

$$P(A) = \frac{12}{20} = 0,6.$$

Адже з 20 рівноможливих результатів лише 12 задовольняють умову «щоб випало менше 13».


Задача 2 (задача д'Аламбера)

Кидають одночасно дві однакові монети. Яка ймовірність того, що хоча б один раз випаде герб?

Розв'язання.

Результатом випробування є символи на двох монетах. Відповідно, є 4 різних можливих результати і в трьох з них є хоча б один герб.

Тобто, для події A — випав хоча б один герб — ймовірність $P(A) = \frac{3}{4}$.





































Перша монета	Друга монета
	
	
	
	

Задача 3

Одночасно кидають два гральних кубика. Яка ймовірність того, що сума отриманих чисел дорівнює 12?

Розв'язання.

Результатом випробування є числа, що випали на двох кубиках. Відповідно, є 36 різних результатів, і тільки в одному з них сума буде 12 — коли на обох кубиках випаде 6.

		Кількість очок на жовтому кубіку					
		1	2	3	4	5	6
Кількість очок на синьому кубіку	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						

Тому, для події A — випала сума 12 — ймовірність $P(A) = \frac{1}{36}$.

Задача 4

Гральний кубик підкинули 9000 разів і отримали такий результат:

	1	2	3	4	5	6
Кількість випадіннь	1500	1000	2000	0	4000	500

Порахуйте частоту кожного з можливих результатів підкидання кубика та зробіть висновок, чи звичайний це кубик.

Розв'язання

Аби підрахувати частоту, потрібно кількість випадіння певного результату поділити на загальну кількість підкидань.

	1	2	3	4	5	6
Частота	$\frac{1500}{9000} = \frac{1}{6}$	$\frac{1000}{9000} = \frac{1}{9}$	$\frac{2000}{9000} = \frac{2}{9}$	$\frac{0}{9000} = 0$	$\frac{4000}{9000} = \frac{4}{9}$	$\frac{500}{9000} = \frac{1}{18}$

Якби це був звичайний кубик, то всі частоти мали б бути близькими до $\frac{1}{6}$, адже ймовірність отримати кожен з результатів була б $\frac{1}{6}$. Але, оскільки, наприклад, частота випадіння «4» дорівнює 0, що значно відрізняється від $\frac{1}{6}$, а підкидань було багато, то, **найімовірніше**, кубик незвичайний.

Поміркуйте

Монету підкинули 10000 разів і 6000 разів випав герб. Що можна сказати про ймовірність випадіння герба?

Домашнє завдання

Розв'язати задачі №1,2

1. Яка ймовірність того, що при підкиданні стандартного грального кубика випаде непарне число?
2. Яка ймовірність того, що при підкиданні двох гральних кубиків з 5 гранями, на яких зображені числа від 1 до 5, випаде сума 7?

Фото виконаного завдання надіслати на HUMAN або на електронну пошту nataliartemiuk.55@gmail.com

Джерела

- Істер О.С. Алгебра. 9 клас. – Київ: Генеза, 2017. – 264с.
- [Всеукраїнська школа онлайн](#)