



1 Continuité

Exercice 1 :

- Déterminer les limites suivantes lorsqu'elles existent.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt{x}-1} \qquad \lim_{x \rightarrow 0} xE\left(x - \frac{1}{x}\right) \qquad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-\cos x}}{\tan 2x} \qquad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$$

- Étudier les limites à droite en 0 des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto E\left(\frac{1}{x}\right) \qquad ; \quad g : x \mapsto xE\left(\frac{1}{x}\right) \qquad h : x \mapsto x^2 E\left(\frac{1}{x}\right)$$

- La fonction définie par $f(x) = \frac{x^3+8}{|x+2|}$ admet-elle un prolongement par continuité en -2 ?

Exercice 2 : Soit f une application définie et continue de \mathbb{R} vers \mathbb{R} vérifiant $\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x+y) = f(x) + f(y)$.

- Calculer $f(0)$, puis montrer que $f(-x) = -f(x)$ pour tout réel x .
- Montrer que $f(nx) = nf(x)$ pour tout entier n et tout réel x .
- Montrer que $f(qx) = qf(x)$ pour tout rationnel q et pour tout réel x .
- Montrer que $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ pour tous réels α et x .
- En déduire la nature de f .

Exercice 3 : Étudier la continuité des fonctions suivantes

$$1. f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$2. g(x) = x + \sqrt{x - E(x)}.$$

Exercice 4 : Soit $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par :

$$f_n(x) = \ln(1 + x^n) + x - 1$$

- Montrer qu'il existe $c_n \in [0, 1]$ tel que $f_n(c_n) = 0$.
- Montrer que f_n est strictement croissante sur \mathbb{R}^* , en déduire que c_n est unique. contenu...

2 Dérivabilité

Exercice 1 :

1. Etudier la dérivabilité des fonctions suivantes :

$$a) f(x) = \sqrt{|x|} \quad b) f(x) = \begin{cases} x \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x \in [0, 1] \\ x \ln x - x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

2. Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \arccos\left(\frac{1-x}{\sqrt{2}}\right) \quad f_2(x) = \arcsin(2x-1) + 2 \arctan\left(\sqrt{\frac{1-x}{x}}\right) \\ f_3(x) = \arcsin\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right) \quad f_4(x) = \arctan\left(\frac{x}{x-1}\right) - \arctan\left(\frac{x-1}{x}\right)$$

Exercice 2 : Soient a et b deux réels et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ e^{bx} - x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1. À l'aide de la règle de L'Hospital déterminer la limite suivante

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)x - \sin(x)}{x^2}$$

2. Déterminer a et b pour que f soit continue sur \mathbb{R} .
3. Déterminer a et b pour que f soit dérivable sur \mathbb{R} .

Exercice 3 :

1. Montrer que l'équation $e^x = 1 + x$ admet au plus une racine réelle.
2. Peut-on appliquer le théorème de Rolle à la fonction f définie par $f(x) = |x(x+2)|$ sur $[-2, 0]$.
3. Soient a et b deux réels tels que $a < b$. Soit f une fonction deux fois dérivable sur $[a, b]$ telle que $f(a) = f(b) = 0$ et pour tout $x \in]a, b[$, $f''(x) \leq 0$. Montrer que f conserve un signe constant sur $[a, b]$.
4. Montrer que pour tout $x > 1$ on a : $x - 1 < x \ln x < x(x - 1)$.
5. Montrer que pour tout réels x et y on a : $|\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y|$.
6. Montrer que pour tout $x > 0$, $\frac{x}{x+1} < \ln(1+x) < x$.

Exercice 4 : Soit f la fonction définie pour tout x dans $]0, +\infty[$ par $f(x) = x \ln x$.

1. Etudier les variations de f .
2. En déduire que f réalise une bijection de $[\frac{1}{e}, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on explicitera.
3. En quels points f^{-1} est-elle dérivable ? 4. Calculer $f^{-1}(0)$. Calculer $f(e)$, $f(e^2)$. En déduire $(f^{-1})'(2)$ et $(f^{-1})'(2e^2)$.
4. Tracer dans un même repère orthonormé le graphe de f et celui de f^{-1} .

Exercice 5 : Calculer la dérivée n^{ime} des fonctions suivantes :

1. $f(x) = (x^4 - 5x + 10)e^x$
2. $g(x) = \frac{\sin x}{1+x}$