

**GV: TRẦN QUỐC NGHĨA**

**☎: 098 373 4349**

*Trường THPT.....*

*Họ và tên học sinh: .....*

*Lớp:..... STT: .....*

**Tài liệu tự học**

# **TOÁN**

## **LỚP 12 - NH 17-18**

### **Chủ đề 2**

### **HÀM SỐ LŨY THỪA**

### **HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT**

- *Tóm tắt lý thuyết*
- *Các dạng toán thường gặp*
- *Phương pháp giải toán*
- *Toán mẫu*
- *Bài tập cơ bản*
- *Bài tập nâng cao*
- *Bài tập tổng ôn*

**Năm học 2017 - 2018**

**Lưu hành nội bộ**

### Vấn đề 1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỈ - SỐ MŨ THỰC

#### 1. Lũy thừa với số mũ nguyên

Cho  $n$  là một số nguyên dương. Với  $a$  là số thực tùy ý, lũy thừa bậc  $n$  của  $a$  là tích của  $n$  thừa số  $a$ .

$$\textcircled{1} \quad a^n = \underbrace{a.a. \dots a}_{n \text{ thừa số}} \text{ với } a : \text{cơ số}; n : \text{số mũ}$$

**Quy ước:** Với  $a \neq 0$  thì:  $\textcircled{2} \quad a^0 = 1$ ;  $\textcircled{3} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ . **Chú ý:**  $0^0$  và  $0^{-n}$  không có nghĩa.

#### 2. Căn bậc $n$

##### a. Khái niệm:

- Cho số thực  $b$  và số nguyên dương  $n \geq 2$ . Số  $a$  được gọi là căn bậc  $n$  của số  $b$  nếu  $a^n = b$
- Với  $n$  lẻ,  $b \in \mathbb{R}$  thì phương trình có duy nhất một căn bậc  $n$  của  $b$ , kí hiệu:  $\sqrt[n]{b}$ .
- Với  $n$  chẵn:
  - $b < 0$ : Không tồn tại căn bậc  $n$  của  $b$ .
  - $b = 0$ : Có một căn bậc  $n$  của  $b$  là số  $0$ .
  - $b > 0$ : Có hai căn trái dấu là  $\sqrt[n]{b}$  và  $-\sqrt[n]{b}$ .

##### b. Tính chất của căn bậc $n$ :

$$\begin{array}{llll} \textcircled{4} \quad \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab} & \textcircled{5} \quad \left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m} & \textcircled{6} \quad \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a} & \textcircled{7} \quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \\ \textcircled{8} \quad \sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a & \text{khi } n \text{ lẻ} \\ |a| & \text{khi } n \text{ chẵn} \end{cases} & \textcircled{9} \quad \sqrt[n]{a^p} \cdot \sqrt[n]{a^q} = \sqrt[n]{a^{p+q}} & \textcircled{10} \quad \frac{\sqrt[n]{a^p}}{\sqrt[n]{a^q}} = \sqrt[n]{a^{p-q}} \end{array}$$

#### 3. Lũy thừa với số hữu tỉ

Cho số thực  $a$  dương và số hữu tỉ  $r = \frac{m}{n}$  trong đó  $m \in \mathbb{Z}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Lũy thừa của  $a$  với số mũ  $r$  là  $a^r$  xác định bởi:  $a^r = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$   $\textcircled{11}$

#### 4. Lũy thừa với số vô tỉ

Cho  $a$  là một số dương,  $\alpha$  là một số vô tỉ. Ta thừa nhận rằng luôn có một dãy số hữu tỉ  $(r_n)$  có giới hạn là  $\alpha$  và dãy số tương ứng  $(a^{r_n})$  có giới hạn không phụ thuộc vào việc chọn dãy số  $(r_n)$ .

Ta gọi giới hạn của dãy số  $(a^{r_n})$  là lũy thừa của  $a$  với số mũ  $\alpha$ . Kí hiệu là  $a^\alpha$ .

$$a^\alpha = \lim_{x \rightarrow +\infty} a^{r_n} \text{ với } \alpha = \lim_{x \rightarrow +\infty} r_n$$



**Ví dụ 2:** Đơn giản các biểu thức sau:

a)  $A = \frac{a^{\frac{1}{3}} - a^{\frac{7}{3}}}{a^{\frac{1}{3}} - a^{\frac{4}{3}}} - \frac{a^{-\frac{1}{3}} - a^{\frac{5}{3}}}{a^{\frac{2}{3}} + a^{-\frac{1}{3}}}$

b)  $B = \frac{a^{\frac{4}{3}} \left( a^{-\frac{1}{3}} + a^{\frac{2}{3}} \right)}{a^{\frac{1}{4}} \left( a^{\frac{3}{4}} + a^{-\frac{1}{4}} \right)}$

c)  $C = \frac{a^{\frac{1}{3}} \sqrt{b} + b^{\frac{1}{3}} \sqrt{a}}{\sqrt[6]{a} + \sqrt[6]{b}}$

d)  $D = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt[4]{a} - \sqrt[4]{b}} - \frac{\sqrt{a} + \sqrt[4]{ab}}{\sqrt[4]{a} + \sqrt[4]{b}}$

e)  $E = \left( \frac{a^{\sqrt{5}}}{b^{\sqrt{5}-2}} \right)^{\sqrt{5}+2} \cdot \frac{a^{-2-\sqrt{5}}}{b^{-1}}$

f)  $F = \sqrt{(x^\pi + y^\pi)^2 - \left( 4^{\frac{1}{\pi}} \cdot x \cdot y \right)^\pi}$

g)  $I = \left( \frac{a^{\frac{1}{4}} - a^{\frac{9}{4}}}{a^{\frac{1}{4}} - a^{\frac{5}{4}}} : \frac{b^{-\frac{1}{2}} - b^{\frac{3}{2}}}{b^{\frac{1}{2}} + b^{-\frac{1}{2}}} \right) \sqrt[3]{\frac{a}{b^4}} \cdot \sqrt[6]{\frac{b^{14}}{a^2}}$

h)  $H = \frac{a^{\sqrt{5}} - b^{\sqrt{7}}}{a^{\frac{2\sqrt{5}}{3}} + a^{\frac{\sqrt{5}}{3}} b^{\frac{\sqrt{7}}{3}} + b^{\frac{2\sqrt{7}}{3}}}$


i)  $G = \frac{(a^{2\sqrt{3}} - 1)(a^{2\sqrt{3}} + a^{\sqrt{3}} + a^{3\sqrt{3}})}{a^{4\sqrt{3}} - a^{\sqrt{3}}}$



## Dạng 2. So sánh các lũy thừa hay căn số


## A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- ✓ So sánh hai lũy thừa cùng cơ số  $a$  ta áp dụng kết quả sau:

 Với  $a > 1$  thì  $a^{x_1} > a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 > x_2$

✚ Với  $0 < a < 1$  thì  $a^{x_1} > a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 < x_2$

- ✓ So sánh hai lũy thừa có cùng số mũ  $x$ , ta áp dụng kết quả sau:

 Với  $a, b \neq 1$  và  $0 < b^x < a^x \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \Leftrightarrow b^x < a^x \\ x < 0 \Leftrightarrow b^x > a^x \end{cases}$

- ✓ Với hai biểu thức chứa căn, ta cần đưa về các căn cùng bậc.

## B. BÀI TẬP MẪU

**Ví dụ 3:** So sánh các số sau (*không dùng máy tính bỏ túi*):

a)  $a = 3^{600}$  và  $b = 5^{400}$

b)  $x = \sqrt[3]{7} + \sqrt{15}$  và  $y = \sqrt{10} + \sqrt[3]{28}$

c)  $p = (\sqrt{3} - 1)^{\frac{1}{4}}$  và  $q = (\sqrt{3} - 1)^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$

d)  $u = \left(\frac{\sqrt{3}}{5}\right)^{-\sqrt{2}}$     và     $v = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{-\sqrt{2}}$

e)  $m = \left(\frac{\pi}{2}\right)^{\sqrt{2}}$  và  $n = \left(\frac{\pi}{5}\right)^{-\sqrt{3}}$

f)  $h = \left(\frac{\sqrt{3}}{5}\right)^{-\sqrt{2}}$     và     $k = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\sqrt{5}}$

[illegible]



**Ví dụ 6:** Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi quý số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho quý tiếp theo. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được 1 năm sau khi gửi tiền (cả vốn lẫn lãi) gần nhất với kết quả nào sau đây?

**Ví dụ 7:** Bác An đem gửi tổng số tiền 320 triệu đồng ở hai loại kỳ hạn khác nhau. Bác gửi 140 triệu đồng theo kỳ hạn ba tháng với lãi suất 2,1% một quý. Số tiền còn lại bác An gửi theo kỳ hạn một tháng với lãi suất 0,73% một tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi kỳ hạn số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho kỳ hạn tiếp theo. Sau 15 tháng kể từ ngày gửi bác An đi rút tiền. Tính gần đúng đến hàng đơn vị tổng số tiền lãi thu được của bác An.

BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 1

**Bài 1.** Cho:  $\sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x^4 y^2}} + \sqrt{y^2 + \sqrt[3]{y^4 x^2}} = a$ . Chứng minh  $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ .

**Bài 2.** Đơn giản các biểu thức sau:

Ⓐ  $A = \frac{ab^{-2} \cdot (a^{-1}b^2)^4 \cdot (ab^{-1})^2}{a^{-2}b \cdot (a^{-2}b^{-1})^3 \cdot a^{-1}b}$

Ⓑ  $B = \frac{1}{a^2} \sqrt{(a^6 + 3a^4b^2 + 3a^2b^4 + b^6)^{\frac{2}{3}}} + \left[ \frac{\left(b^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{2}{3}}\right)^3 - 2a^2 - b^2}{a^2 + \left(b^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{2}{3}}\right)^3 + 2b^2} \right]^{-3}$

Ⓒ  $C = \frac{\left(\sqrt[4]{a^3 b^2}\right)^8}{\sqrt[3]{\sqrt{a^{18} b^{12}}}} - \frac{\sqrt{\sqrt{\sqrt{a^{11}}}}}{a^{\frac{11}{16}}} \quad (a > 0)$       Ⓓ  $D = \frac{a^{2\sqrt{3}} - b^{2\sqrt{5}}}{a^{\sqrt{3}} - b^{\sqrt{5}}} + a^{-4\sqrt{5}} \left(\frac{1}{a^{-\sqrt{5}-2}}\right)^{\sqrt{5}+2} - b^{\sqrt{5}}$

Đáp số:  $A = a^8 b^5$ ;  $B = 1$ ;  $C = a^{\sqrt{3}} + a^9$ ;  $D = a^3 b^2 - 1$



**Bài 3.** Tính giá trị của các biểu thức sau:

$$\textcircled{a} A = 64^{-\frac{1}{4}} + \left(\frac{1}{255}\right)^{-2} - \left(-\frac{1}{81}\right)^{-0,75} + \left(9\frac{1}{2}\right)^0$$

$$\textcircled{b} B = (0,25)^{-\frac{1}{2}} + \left(\frac{1}{32}\right)^{-\frac{1}{5}} - \left(2\frac{1}{9}\right)^{-2} + (-5)^{-3}$$

$$\textcircled{c} C = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{3}}{9^{\frac{5}{12}}} \cdot \left(\pi^{-\frac{13}{4}}\right)^0 + \frac{\sqrt[3]{5}}{\left(e^{-\frac{3}{4}}\right)^0 \cdot \sqrt{5}} \cdot 16^{\frac{7}{12}}$$

$$\textcircled{d} D = \left\{ \left[ 3^{\frac{3}{2}} \cdot 5^{\frac{5}{3}} : 2^{\frac{-7}{4}} \right] : 16 : \left( 5^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} \right) \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$\textcircled{e} E = 256^{-0,75} - \left(\frac{1}{125}\right)^{-\frac{1}{3}} - (9^0)^{-5}$$

$$\textcircled{f} F = \sqrt[3]{7+5\sqrt{2}} + \sqrt[3]{7-5\sqrt{2}}$$

**Bài 4.** Tính giá trị của các biểu thức sau:

$$\textcircled{a} A = \sqrt[3]{7+5\sqrt{2}} + \sqrt[3]{7-5\sqrt{2}}$$

$$\textcircled{b} B = \frac{81^{\sqrt{3}}}{9^{3\sqrt{3}}} + \left(4^{\frac{1}{2}\sqrt{27}}\right)^{\sqrt{3}} - 9^{2-\sqrt{3}} \cdot 3^{2+\sqrt{5}}$$

**Bài 5.** Đơn giản các biểu thức sau:

$$\textcircled{a} A = \frac{x^{-1} + (y+z)^{-1}}{x^{-1} - (y+z)^{-1}} \cdot \left(1 + \frac{z^2 + y^2 - x^2}{2yz}\right) \cdot (x+y+z)^{-2}$$

$$\textcircled{b} B = \frac{\sqrt[3]{a+\sqrt{2-a^2}} \cdot \sqrt[6]{1-a\sqrt{2-a^2}}}{\sqrt[3]{1-a^2}}$$

**Bài 6.** Chứng minh nếu  $1 \leq x \leq 2$  thì  $\sqrt{x+2\sqrt{x+1}} + \sqrt{x-2\sqrt{x-1}} = 2$ .

**Bài 7.** So sánh các số sau:

$$\textcircled{a} a = \left(\frac{7}{9}\right)^{-\frac{\sqrt{7}}{3}} \text{ và } b = \left(2\frac{4}{13}\right)^0$$

$$\textcircled{b} x = \sqrt[3]{126} + \sqrt{26} \text{ và } y = \sqrt{170} - \sqrt[3]{82}$$

**Bài 8.** So sánh các số sau:

$$\textcircled{a} a = (\sqrt{5})^{-\frac{5}{6}} \text{ và } b = \left(5^{-1} \sqrt[4]{\frac{1}{5}}\right)^{-\frac{1}{3}}$$

$$\textcircled{b} x = \left(\frac{\pi}{3}\right)^{\frac{\sqrt{5}}{2}} \text{ và } y = \left(\frac{\pi}{3}\right)^{\frac{\sqrt{10}}{3}}$$

$$\textcircled{c} p = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{\sqrt{5}} \text{ và } q = \left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right)^{-\sqrt{3}}$$

$$\textcircled{d} u = \left(\frac{\pi}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \text{ và } v = \left(\frac{3}{\pi}\right)^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$\textcircled{e} m = (\sqrt{5}-2)^{\frac{1}{4}} \text{ và } n = (\sqrt{5}+2)^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$\textcircled{f} h = \sqrt[6]{65} + \sqrt{37} \text{ và } k = \sqrt{97} - \sqrt[3]{10}$$

**Bài 9.** Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

$$\textcircled{a} y = 5^{-x^2+x+1}$$

$$\textcircled{b} y = \left(\frac{e}{\pi}\right)^{1-\cos 2x}$$

$$\textcircled{c} y = \left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^{\cos^6 x + \sin^6 x}$$

**Bài 10.** Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được 1 năm sau khi gửi tiền là bao nhiêu?

## Vấn đề 2. LÔGARIT

### 1. Định nghĩa

Cho hai số dương  $a, b$  với  $a \neq 1$ . Số  $\alpha$  thỏa mãn đẳng thức  $a^\alpha = b$  được gọi là **lôgarit cơ số  $a$  của  $b$**  và kí hiệu là  $\log_a b$ .

$$\textcircled{1} \quad \alpha = \log_a b \Leftrightarrow a^\alpha = b \quad (\text{với } a, b > 0; a \neq 1)$$

☞ **Chú ý:** ☞ Không có lôgarit của số âm và số 0.

☞ Cơ số của lôgarit phải dương và khác 1.

☞ Cho hai số dương  $a \neq 1$  và  $b$ , ta có các tính chất sau:

$$\textcircled{2} \quad \log_a 1 = 0 \quad \textcircled{3} \quad \log_a a = 1 \quad \textcircled{4} \quad a^{\log_a b} = b; e^{\ln b} = b; 10^{\lg b} = b \quad \textcircled{5} \quad \log_a (a^\alpha) = \alpha$$

### 2. Tính chất

a. So sánh hai lôgarit có cùng cơ số: Cho các số dương  $b$  và  $c$ :

♦ Khi  $a > 1$  thì  $\log_a b > \log_a c \Leftrightarrow b > c$  ♦ Với  $0 < a \neq 1$  và các số  $b, c$  dương:

Khi  $0 < a < 1$  thì  $\log_a b > \log_a c \Leftrightarrow b < c$

♣ Khi  $a > 1$  thì  $\log_a b > 0 \Leftrightarrow b > 1$

♣ Khi  $0 < a < 1$  thì  $\log_a b > 0 \Leftrightarrow b < 1$

♣  $\log_a b = \log_a c \Leftrightarrow b = c$

b. Các quy tắc tính lôgarit: Cho ba số dương  $a \neq 1, b, c$ :

$$\textcircled{6} \quad \log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c \quad \textcircled{7} \quad \log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c \quad \textcircled{8} \quad \log_a b^\alpha = \alpha \log_a b$$

Các hệ quả:

$$\textcircled{9} \quad \log_a (b_1 b_2 \dots b_n) = \log_a b_1 + \log_a b_2 + \dots + \log_a b_n \quad (0 < a \neq 1, b_1, b_2, \dots, b_n > 0, n \in \mathbb{Z}^+)$$

$$\textcircled{10} \quad \log_a \frac{1}{b} = -\log_a b, \quad 0 < a \neq 1, b > 0 \quad \textcircled{11} \quad \log_a \sqrt[n]{b} = \frac{1}{n} \log_a b, \quad 0 < a \neq 1, b > 0, n \in \mathbb{Z}^+.$$

☞ **Chú ý:** Nếu  $0 < a \neq 1, bc > 0$  thì:

$$\textcircled{12} \quad \log_a (b \cdot c) = \log_a |b| + \log_a |c| \quad \textcircled{13} \quad \log_a \frac{b}{c} = \log_a |b| - \log_a |c|$$

$$\textcircled{14} \quad \log_a b^{2k} = 2k \log_a |b|, \quad b \neq 0, k \in \mathbb{Z}^+.$$

### 3. Đổi cơ số của lôgarit

a. Cho ba số dương  $a, b, c \neq 1$ , ta có:

$$\textcircled{15} \quad \log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b} \Leftrightarrow \textcircled{16} \quad \log_a b \cdot \log_b c = \log_a c \quad \textcircled{17} \quad a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$$

b. Hệ quả: cho  $(0 < a \cdot b \neq 1, b > 0, \alpha, m, n \neq 0)$

$$\textcircled{18} \quad \log_a b = \frac{1}{\log_b a} \Leftrightarrow \log_a b \cdot \log_b a = 1 \quad \textcircled{19} \quad \log_{a^\alpha} b = \frac{1}{\alpha} \log_a b \quad \textcircled{20} \quad \log_{a^n} b^m = \frac{m}{n} \log_a b$$

### 4. Lôgarit thập phân, lôgarit tự nhiên

a. **Lôgarit thập phân:** là lôgarit cơ số 10:  $\log_{10} b$  thường được viết là  $\log b$  hay  $\lg b$ .

b. **Lôgarit tự nhiên:**

✓ Người ta chứng minh được dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  có giới hạn là một số vô tỉ và

$$\text{gọi giới hạn đó là } e: e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Một giá trị gần đúng của  $e$  là:  $e \approx 2,718281828459045\dots$

✓ **Lôgarit tự nhiên:** là lôgarit cơ số  $e$ :  $\log_e b$  hay  $\ln b$ .

c. **Chú ý công thức đổi cơ số:**  $\log_a b = \frac{\lg b}{\lg a} = \frac{\ln b}{\ln a} \quad (0 < a \neq 1, b > 0)$

***Dạng 1. Tính toán - Rút gọn biểu thức có chứa lôgarit***

**A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI**

Áp dụng định nghĩa, các tính chất và các công thức đổi cơ số để rút gọn, tính toán các biểu thức lôgarit...

**B. BÀI TẬP MẪU**

**Ví dụ 8:** Tính giá trị của các biểu thức sau:

- Ⓐ  $A = \frac{1}{2}\log_7 36 - \log_7 14 - 3\log_7 \sqrt[3]{21}$

Ⓒ  $C = 36^{\log_6 5} + 10^{1-\lg 2} - e^{\ln 27}$

Ⓔ  $E = 3\lg(\sqrt{2} - 1) + \lg(5\sqrt{2} + 7)$

Ⓙ  $G = \log_2\left(2\sin\frac{\pi}{8}\right) + \log_2\left(\cos\frac{\pi}{8}\right)$
- Ⓑ  $B = \frac{\log_5 36 - \log_5 12}{\log_5 9}$

Ⓓ  $D = 81^{\log_3 5} + 27^{\log_9 36} - 4^{2-\log_2 3}$

Ⓛ  $F = \ln(\sqrt{3} + 2)^{2017} + \ln(2 - \sqrt{3})^{2017}$

Ⓚ  $H = \log_4(\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{3}) + \log_4(\sqrt[3]{25} - \sqrt[3]{15} + \sqrt[3]{9})$

**Ví dụ 9:** Tìm  $\log_a x$  biết  $\log_a b = 5$ ,  $\log_a c = -4$  và Ⓐ  $x = a^5 b^5 \sqrt[3]{c}$  Ⓑ  $x = \frac{a^5 \sqrt[4]{b^3}}{c^6}$

ⓕ  $m = \log_{0,3} 0,8$  và  $n = \log_{0,2} 0,3$



***Dạng 4. Chứng minh đẳng thức chứa lôgarit***

**A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI**

Áp dụng các công thức biến đổi lôgarit, công thức đổi cơ số để biến đổi vế này thành vế kia hoặc hai vế cùng bằng một đại lượng thứ ba, ...

**B. BÀI TẬP MẪU**

- Ví dụ 12:** ① Cho  $a, b, c$  là ba số dương và  $c \neq 1$ . Chứng minh:  $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$
- ② Cho  $a, b, c$  là ba số dương khác 1. Chứng minh:  $\frac{\log_a c}{\log_{ab} c} = 1 + \log_a b$
- ③ Cho  $0 < a, b \neq 1$ . Chứng minh:  $\frac{1}{\log_a b} + \frac{1}{\log_{a^2} b} + \frac{1}{\log_{a^3} b} + \dots + \frac{1}{\log_{a^n} b} = \frac{n(n+1)}{2\log_a b}$

- Ví dụ 13:** Trong điều kiện có nghĩa, chứng minh rằng:
- ① Nếu  $a^2 + b^2 = 7ab$  thì  $\log_7 \frac{a+b}{3} = \frac{1}{2}(\log_7 a + \log_7 b)$
- ② Nếu  $a^2 + c^2 = b^2$  thì  $\log_{b+c} a + \log_{b-c} a = 2\log_{b+c} a . \log_{b-c} a$

Dạng 5. Bài toán lãi kép

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- a. **Định nghĩa:** Lãi kép là phần lãi của kì sau được tính trên số tiền gốc kì trước cộng với phần lãi của kì trước.

b. **Công thức:** Giả sử số tiền gốc là  $A$  ; lãi suất  $r\%$  /kì hạn gửi (có thể là tháng, quý hay năm).

  - Số tiền nhận được **cả gốc và lãi** sau  $n$  kì hạn gửi là  $A(1+r)^n$
  - Số **tiền lãi** nhận được sau  $n$  kì hạn gửi là  $A(1+r)^n - A = A[(1+r)^n - 1]$

B. BÀI TẬP MẪU

**Ví dụ 14:** [ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017] Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi? Giả sử trong suốt thời gian gửi lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.

**Ví dụ 15:** [ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017] Đầu năm 2016, ông A thành lập một công ty. Tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong năm 2016 là 1 tỷ đồng. Biết rằng cứ sau mỗi năm thì tổng số tiền dùng để trả lương cho nhân viên trong cả năm đó tăng thêm 15% so với năm trước. Hỏi năm nào dưới đây là năm đầu tiên mà tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong cả năm lớn hơn 2 tỷ đồng?

## BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 2

**Bài 11.** So sánh các số sau:

Ⓐ  $a = \log_2 10$  và  $b = \log_4 63$

Ⓑ  $x = \log_{0,5} 3$  và  $y = \log_7 2$

Ⓒ  $m = 3\log_6 2 + \log_6 3$  và  $n = 2\log_6 5$

Ⓓ  $u = 5^{\log_6 1,05}$  và  $v = 7^{\log_6 0,995}$

Ⓔ  $x = \log_7 36$  và  $y = \log_8 25$

Ⓕ  $u = \log_{0,4} \sqrt[3]{2}$  và  $v = \log_{0,2} 0,34$

**Bài 12.** Ⓐ Biết  $\log_a b = \sqrt{5}$ . Tìm  $\log_{\frac{a}{\sqrt{b}}} \sqrt[5]{a^3 b^6}$  ĐS:  $-6(12 + 2\sqrt{5})/5$

Ⓑ Biết  $\log_a x = m; \log_b x = n; \log_c x = p$  ( $abc \neq 1$ ). Tìm  $\log_{abc} x$  ĐS:  $\frac{mnp}{np + pm + mn}$

Ⓒ Biết  $\log_6 15 = m; \log_{12} 18 = n$ . Tìm  $\log_{25} 24$ . ĐS:  $\frac{5-n}{2m(n+1)-4n+2}$

**Bài 13.** Tính giá trị của các biểu thức sau:

Ⓐ  $A = \log_{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{27}{\sqrt[5]{9}}$

Ⓑ  $B = 9^{\frac{1}{\log_6 3}} + 4^{\frac{1}{\log_6 2}}$

Ⓒ  $C = \log_3 2 \cdot \log_4 3 \cdot \log_5 4 \cdot \log_2 5$

Ⓓ  $E = \sqrt{25^{\frac{1}{\log_6 5}} + 49^{\frac{1}{\log_8 7}}}$

Ⓔ  $D = a^{\sqrt{\log_a b}} - b^{\sqrt{\log_b a}}$

Ⓕ  $F = \log_{\pi} (6 + \sqrt{35})^4 + \log_{\pi} (6 - \sqrt{35})^4$

**Bài 14.** Đơn giản các biểu thức sau:

Ⓐ  $A = (\ln a + \log_a e)^2 + \ln^2 a - \left(\frac{\lg e}{\lg a}\right)^2$

Ⓑ  $B = \log_5 (\tan 6) + \log_5 (\cot 6)$ .

Ⓒ  $C = 2\lg a + 3\log_a 10 - \frac{3}{\lg a} - \frac{2}{\log_a 10}$

Ⓓ  $D = \frac{1 - \log_a^3 b}{(\log_a b + \log_b a + 1) \cdot \log_a \frac{a}{b}}$

**Bài 15.** Ⓐ Biết  $\log_2 3 = m; \log_2 5 = n$ . Tìm  $\log_2 \sqrt{0,3}; \log_2 \sqrt[5]{135}$

Ⓑ Biết  $\log_{27} 5 = a; \log_8 7 = b; \log_2 3 = c$ . Tìm  $\log_6 35$ .

Ⓒ Biết  $\log_7 12 = a; \log_{12} 24 = b$ . Tìm  $\log_{54} 168$ .

Ⓓ Biết  $\log_{12} 18 = a; \log_{24} 54 = b$ . Chứng minh:  $ab + 5(a - b) = 1$ .

**Bài 16.** Chứng minh các đẳng thức sau:

Ⓐ  $\log_{ax} (bx) = \frac{\log_a b + \log_a x}{1 + \log_a x}$  với  $0 < a, b, x, ax \neq 1$ .

Ⓑ  $\log_a d \cdot \log_b d + \log_b d \cdot \log_c d + \log_c d \cdot \log_a d = \frac{\log_a d \cdot \log_b d \cdot \log_c d}{\log_{abc} d}$ , với  $0 < a, b, c, d, abc \neq 1$

**Bài 17.** Cho  $x^2 + 9y^2 = 10xy$  ( $x, y > 0; 0 < a \neq 1$ ). CM:  $\log_a (x + 3y) - 2\log_a 2 = \frac{1}{2}(\log_a x + \log_a y)$

**Bài 18.** Cho  $y = 10^{\frac{1}{1-\lg x}}; z = 10^{\frac{1}{1-\lg y}}$  ( $x, y, z > 0$ ). Chứng minh:  $x = 10^{\frac{1}{1-\lg z}}$ .

**Bài 19.** Chứng minh: Ⓐ  $\log_{\frac{1}{3}} 5 + \log_5 \frac{1}{3} < -2$

Ⓑ  $\log_5 6561 + \log_9 5 > 4$



**Bài 20.** Tìm  $x$  biết:

$$\textcircled{a} \lg x = \frac{1}{3} \lg 5a - 4 \lg b + 7 \lg c.$$

$$\textcircled{b} \ln x = \frac{7}{16} \ln(3 + 2\sqrt{2}) - 4 \ln(\sqrt{2} + 1) - \frac{25}{8} \ln(\sqrt{2} - 1).$$

$$\textcircled{c} \ln x = 5 \ln a - 2 \ln b + 6 \ln c.$$

$$\textcircled{d} \log_{\frac{1}{3}} x = \frac{1}{3} \log_3 125 - \log_3 4 + \frac{1}{2} \log_{\sqrt{3}} 2.$$

**Bài 21.** Anh Nam mong muốn rằng sau 6 năm sẽ có 2 tỷ để mua nhà. Hỏi anh Nam phải gửi vào ngân hàng một khoản tiền tiền tiết kiệm như nhau hàng năm gần nhất với giá trị nào sau đây, biết rằng lãi suất của ngân hàng là 8% /năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn.

**Bài 22.** Ông A muốn sau 5 năm có 1.000.000.000 đồng để mua ô tô **Camry**. Hỏi rằng ông A phải gửi ngân hàng mỗi tháng (số tiền như nhau) là bao nhiêu? Biết lãi suất hằng tháng là 0.5% và tiền lãi sinh ra hằng tháng được nhập vào tiền vốn.

**Bài 23.** [ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017] Ông Việt vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12% /năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số tiền  $m$  mà ông Việt sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông Việt hoàn nợ.

**Bài 24.** Một người đàn ông vay vốn ngân hàng với số tiền 100000000 đồng. Người đó dự định sau đúng 5 năm thì trả hết nợ; Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau. Hỏi, theo cách đó, số tiền  $a$  mà ông sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết lãi suất hàng tháng là 1,2% và không thay đổi trong thời gian ông hoàn nợ.

**Bài 25.** Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là 78685800 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1,7% . Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức  $S = A.e^{N.r}$  (trong đó  $A$  : là dân số của năm lấy làm mốc tính,  $S$  là dân số sau  $N$  năm,  $r$  là tỉ lệ tăng dân số hàng năm). Cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 120 triệu người?

**Bài 26.** Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm trái đất nóng lên. Theo OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế thế giới), khi nhiệt độ trái đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng khi nhiệt độ trái đất tăng thêm  $2^\circ\text{C}$  thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%, còn khi nhiệt độ trái đất tăng thêm  $5^\circ\text{C}$  thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 10% . Biết rằng nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm  $t^\circ\text{C}$  , tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm  $f(t)\%$  thì  $f(t) = k.a^t$  (trong đó  $a, k$  là các hằng số dương). Nhiệt độ trái đất tăng thêm bao nhiêu độ  $C$  thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 20% ?

**Bài 27.** Một người đã thả một lượng bèo hoa dâu chiếm 4% diện tích mặt hồ. Biết rằng cứ sau đúng một tuần bèo phát triển thành 3 lần lượng đã có và tốc độ phát triển của bèo ở mọi thời điểm như nhau. Sau bao nhiêu ngày, lượng bèo sẽ vừa phủ kín mặt hồ?

Vấn đề 3. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT

1. Định nghĩa

- ① **Hàm số mũ:** Cho  $a$  là số thực dương, khác 1.  
Hàm số  $y = a^x$  được gọi là hàm số mũ cơ số  $a$ .
- ② **Hàm số lôgarit:** Cho  $a$  là số thực dương, khác 1.  
Hàm số  $y = \log_a x$  được gọi là hàm số lôgarit cơ số  $a$ .
- ③ **Hàm số lũy thừa:** Hàm số  $y = x^\alpha$  với  $\alpha \in \mathbb{R}$  được gọi là hàm số lũy thừa.

2. Tập xác định

- ① Hàm số mũ  $y = a^x$  ( $0 < a \neq 1$ ) có tập xác định  $D = \mathbb{R}$
- ② Hàm số lôgarit  $y = \log_a x$  ( $0 < a \neq 1$ ) có txd  $D = (0; +\infty)$
- ③ Hàm số lũy thừa  $y = x^\alpha$  với  $\alpha \in \mathbb{R}$  có tập xác định tùy thuộc  $\alpha$  :  
    👉 Với  $\alpha$  nguyên dương:  $D = \mathbb{R}$   
    👉 Với  $\alpha$  nguyên âm hoặc bằng 0:  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$   
    👉 Với  $\alpha$  không nguyên:  $D = (0; +\infty)$

3. Một số giới hạn có liên quan

- ①  $\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0}$       ②  $\lim_{x \rightarrow x_0} (\log_a x) = \log_a x_0$  ( $x_0 \in \mathbb{R}$ )      ③  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
- ④  $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x\right)^{\frac{1}{x}} = e$  ⑤  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$  ⑥  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$  ⑦  $\lim_{x \rightarrow x_0} x^\alpha = x_0^\alpha$  ( $0 < x_0 \in \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{R}$ )
- ⑧ Khi  $\alpha > 0$ :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$       ⑨ Khi  $\alpha < 0$ :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0$

4. Đạo hàm

Hàm sơ cấp	Hàm hợp ( $u = u(x)$ )
$(e^x)' = e^x$	$(e^u)' = u' \cdot e^u$
$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$	$(a^u)' = u' \cdot a^u \cdot \ln a$
$(\ln x )' = \frac{1}{x}$	$(\ln u )' = \frac{u'}{u}$
$(\log_a x )' = \frac{1}{x \ln a}$	$(\log_a u )' = \frac{u'}{u \ln a}$
$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$	$(u^\alpha)' = \alpha u^{\alpha-1} \cdot u'$
$(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n \sqrt[n]{x^{n-1}}}$	$(\sqrt[n]{u})' = \frac{u'}{n \sqrt[n]{u^{n-1}}}$

5. Sự biến thiên và đồ thị

a. Hàm số mũ  $y = a^x$  :

$a > 1$	$0 < a < 1$
① Tập xác định: $D = \mathbb{R}$	① Tập xác định: $D = \mathbb{R}$


② Sự biến thiên:  $y' = a^x \cdot \ln a > 0$

Giới hạn đặc biệt:


$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0; \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$

Tiệm cận: Trục  $Ox$  là TCN.

③ Bảng biến thiên:



④ Đồ thị:




② Sự biến thiên:  $y' = a^x \cdot \ln a < 0$

Giới hạn đặc biệt:


$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$

Tiệm cận: Trục  $Ox$  là TCN.

③ Bảng biến thiên:



④ Đồ thị:



b. Hàm số lôgarit  $y = \log_a x$ .

$a > 1$	$0 < a < 1$
<p>① Tập xác định: <math>D = (0; +\infty)</math></p> <p>② Sự biến thiên: <math>y' = \frac{1}{x \cdot \ln a} &gt; 0</math></p> <p>Giới hạn đặc biệt: <math>\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty</math></p> <p>Tiệm cận: Trục <math>Oy</math> là TCD.</p> <p>③ Bảng biến thiên:</p>	<p>① Tập xác định: <math>D = (0; +\infty)</math></p> <p>② Sự biến thiên: <math>y' = \frac{1}{x \cdot \ln a} &lt; 0</math></p> <p>Giới hạn đặc biệt: <math>\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty</math></p> <p>Tiệm cận: Trục <math>Oy</math> là TCD.</p> <p>③ Bảng biến thiên:</p>
<p>④ Đồ thị:</p>	<p>④ Đồ thị:</p>

c. Hàm số lũy thừa  $y = x^\alpha$ .

$\alpha > 1$	$\alpha < 0$
<p>① Tập khảo sát: <math>D = (0; +\infty)</math></p> <p>② Sự biến thiên: <math>y' = \alpha x^{\alpha-1} &gt; 0</math></p> <p>Giới hạn đặc biệt:</p>	<p>① Tập khảo sát: <math>D = (0; +\infty)</math></p> <p>② Sự biến thiên: <math>y' = \alpha x^{\alpha-1} &lt; 0</math></p> <p>Giới hạn đặc biệt:</p>

<div><math display="block">\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0; \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty</math><p>Tiệm cận: Không có.</p><p>③ Bảng biến thiên:</p><div><div><div><div><div><math>x</math></div><div><math>0</math></div><div><math>+\infty</math></div></div><div><div><math>y</math></div><div><math>0</math></div><div><math>+\infty</math></div></div></div><div><div><div><math>\nearrow</math></div></div></div></div></div></div>	<div><math display="block">\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0</math><p>Tiệm cận: Ox: TCN; Oy: TCD.</p><p>③ Bảng biến thiên:</p><div><div><div><div><div><math>x</math></div><div><math>0</math></div><div><math>+\infty</math></div></div><div><div><math>y</math></div><div><math>+\infty</math></div><div><math>0</math></div></div></div><div><div><div><math>\searrow</math></div></div></div></div></div></div>
<p>④ Đồ thị:</p> <div></div>	

***Đạng 1. Tìm tập xác định của hàm số***

**A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI**

1.

$y = b \ (b \in \mathbb{R})$  (hàm hằng).

Hàm số xác định với mọi  $x \in \mathbb{R}$ .

$D = \mathbb{R}$
2.

$y = P(x)$  ( $P(x)$  đa thức)

Hàm số xác định với mọi  $x \in \mathbb{R}$ .

$D = \mathbb{R}$
3.

$y = \sqrt{A(x)}$

Hàm số xác định  $\Leftrightarrow A(x) \geq 0$ .

Mở rộng:  $y = \sqrt[k]{A(x)}$  ( $k \in \mathbb{N}^*$ ) xác định  $\Leftrightarrow A(x) \geq 0$ .
4.

$y = \sqrt[3]{A(x)}$

Hàm số xác định  $\Leftrightarrow A(x)$  xác định.

Mở rộng  $y = \sqrt[2k+1]{A(x)}$  ( $k \in \mathbb{N}^*$ ) xác định  $\Leftrightarrow A(x)$  xác định.
5.

$y = \frac{A(x)}{B(x)}$

Hàm số xác định  $\Leftrightarrow B(x) \neq 0$ .
6.

$y = \frac{\sqrt{A(x)}}{B(x)}$

Hàm số xác định  $\Leftrightarrow \begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) \neq 0 \end{cases}$
7.

$y = \frac{A(x)}{\sqrt{B(x)}}$

Hàm số xác định  $\Leftrightarrow B(x) > 0$ .
8.

$y = \frac{\sqrt{A(x)}}{\sqrt{B(x)}}$

Hàm số xác định  $\Leftrightarrow \begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) > 0 \end{cases}$
9.

$y = \frac{k(x)}{\sqrt{A(x)} \pm \sqrt{B(x)}}$

Hàm số xác định  $\Leftrightarrow \begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) \geq 0 \\ \sqrt{A(x)} \pm \sqrt{B(x)} \neq 0 \end{cases}$
10.

$y = \tan f(x)$

Hàm số xác định  $\Leftrightarrow f(x) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
11.

$y = \cot f(x)$

Hàm số xác định  $\Leftrightarrow f(x) \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$



### C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

**Bài 28.** Tìm tập xác định của hàm số:

Ⓐ  $y = \frac{\sqrt{\log_2(x+1)}}{2^{2x-3}-1}$       Ⓑ  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x^2-2x}{2x+3}}$       Ⓒ  $y = \left(\sqrt[3]{x}\right)^{\sqrt{2}}$       Ⓓ  $y = \log_{2x-1}(x^2-1)$

## Dạng 2. Đạo hàm của hàm số mũ và logarit

## A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Sử dụng các công thức:

<i>Hàm sơ cấp</i>	<i>Hàm hợp ( <math>u = u(x)</math> )</i>
$(e^x)' = e^x$	$(e^u)' = u' \cdot e^u$
$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$	$(a^u)' = u' \cdot a^u \cdot \ln a$
$(\ln  x )' = \frac{1}{x}$	$(\ln  u )' = \frac{u'}{u}$
$(\log_a  x )' = \frac{1}{x \ln a}$	$(\log_a  u )' = \frac{u'}{u \ln a}$
$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$	$(u^\alpha)' = \alpha u^{\alpha-1} \cdot u'$
$(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n \sqrt[n]{x^{n-1}}}$	$(\sqrt[n]{u})' = \frac{u'}{n \sqrt[n]{u^{n-1}}}$



- Bài 33.** Cho hàm số:  $y = x.e^x$   
Ⓐ Tính đạo hàm cấp một  $y'$ , đạo hàm cấp hai  $y''$  của hàm số rồi suy ra đạo hàm cấp  $n$  của hàm số.  
Ⓑ Chứng minh rằng:  $y'' - 2y' + y = 0$
- Bài 34.** Tìm  $a$  để hàm số sau đây có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$ :  $y = f(x) = \begin{cases} e^x & \text{khi } x \geq 0 \\ x^2 + ax + 1 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$
- Bài 35.** Tìm  $a$  để hàm số sau đây có đạo hàm tại  $x = 0$ :  $y = f(x) = \begin{cases} (x+1)e^{-x} & \text{khi } x > 0 \\ -x^2 - ax + 1 & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$
- Bài 36.** Tính đạo hàm cấp  $n$  của hàm số  $y = \ln(2x+1)$ .

Dạng 3. GTLN và GTNN của hàm số mũ và logarit

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Tính  $y'$ .
  - Giải phương trình  $y' = 0$  và chỉ nhận những nghiệm  $x_0$  thuộc  $[a; b]$ .
  - Tính  $f(a), f(b)$  và  $f(x_0)$ .
  - Khi đó:  $\min_{[a;b]} f(x) = \min \{f(a), f(b), f(x_0)\}$ ;  $\max_{[a;b]} f(x) = \max \{f(a), f(b), f(x_0)\}$
- 🔍 **Chú ý:**
- ✓ Nếu hàm số  $y = f(x)$  tăng trên  $[a; b]$  thì:  $\min_{x \in [a;b]} f(x) = f(a)$  và  $\max_{x \in [a;b]} f(x) = f(b)$
  - ✓ Nếu hàm số  $y = f(x)$  giảm trên  $[a; b]$  thì:  
$$\min_{x \in [a;b]} f(x) = f(b) \text{ và } \max_{x \in [a;b]} f(x) = f(a)$$
  - ✓ Nếu bài toán phải đặt ẩn phụ thì phải có điều kiện cho ẩn phụ đó.

B. BÀI TẬP MẪU

**Ví dụ 18:** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \frac{\ln^2 x}{x} - 1$  trên đoạn  $[1; e^2]$ .

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

- Bài 37.** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
- Ⓐ  $y = x^2 e^x + 1$  trên  $[-3; 2]$

Ⓑ  $y = \ln^2 x - \ln x$  trên  $[1; e^2]$

Ⓒ  $y = (x^2 - 3x + 1)e^x$  trên  $[-3; 0]$

Ⓓ  $y = x \ln x - 1$  trên  $[1; e^2]$

Ⓔ  $y = x^2 - \ln(1 - 2x)$  trên  $[-2; 0]$

Ⓕ





C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

- Bài 38.** Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

Ⓐ  $y = \log_3 x$ ;  $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ ;  $y = |\log_3 x|$ .

Ⓑ Chứng minh các hàm số  $y = a^x$ ;  $y = \log_a x$  có đồ thị đối xứng qua  $y = x$ .
- Bài 39.** Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

Ⓐ  $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{|x|}$       Ⓑ  $y = \lg(x^2 - 1)$       Ⓒ  $y = \frac{1}{\sqrt[4]{x}}$       Ⓓ  $y = \log_3(x^2 - 2x)$
- Bài 40.** Xét sự biến thiên của các hàm số sau:

Ⓐ  $y = \left(\frac{e}{\pi}\right)^x$       Ⓑ  $y = 3^{-x} \left(\frac{1}{\sqrt{6} - \sqrt{5}}\right)^x$       Ⓒ  $y = \log_{\frac{\pi}{e^2}} x$       Ⓓ  $y = \ln^2(3x)$

Ⓔ  $y = x^{\frac{1}{2}(\sqrt[3]{3}-1)(\sqrt[3]{9}+\sqrt[3]{3}+1)}$       Ⓕ  $y = \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}$       Ⓖ  $y = (5 - 2\sqrt{6})^{\frac{x^2-2}{2}}$       Ⓗ  $y = \log_{\frac{2}{3(2-\sqrt{3})}} x$

Dạng 5. Tìm giới hạn của các hàm số mũ và lôgarit

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- ① Biến đổi đưa về các giới hạn cơ bản.
- ② Một số công thức mở rộng:
- $$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \ (a > 0); \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a} \ (0 < a \neq 1)$$
- ③ Đặc biệt ta có thể áp dụng quy tắc L’hopitan: Nếu  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$  có dạng vô định  $\frac{0}{0}$  hay  $\frac{\infty}{\infty}$  và  $f(x)$ ,  $g(x)$  có đạo hàm tại một lân cận của điểm  $x_0$ , trừ điểm  $x_0$  thì:
- $$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \dots$$
- ④ Các công thức tính giới hạn lượng giác:
- $$\blacklozenge \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1 \qquad \blacklozenge \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1$$

B. BÀI TẬP MẪU

**Ví dụ 20:** Tìm các giới hạn sau

- Ⓐ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{2x+1}{x+1}}$       Ⓑ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{e^x} - 1}{2x}$       Ⓒ  $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{\frac{1}{x^2}}$
- Ⓓ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+3}{x+1}\right)^{4x+3}$       Ⓔ  $\lim_{x \rightarrow 8} \log_2 x$       Ⓕ  $\lim_{x \rightarrow 0} \log \left| \frac{\sin 10x}{x} \right|$
- Ⓖ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin 2x)}{x}$       Ⓗ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{x}$       Ⓘ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(3x+1) - \ln(2x+1)}{x}$

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

**Bài 41.** Tìm các giới hạn sau:

Ⓐ

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^3 - e^{4x+3}}{x}$

Ⓔ

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin x}}{\sin x}$

Ⓘ

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x^2} - \sqrt[3]{1+x^2}}{\ln(1+x^2)}$

Ⓜ

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2^x + 2^{3-x} - 6}{\sqrt{2^{-x}} - 2^{1-x}}$

Ⓑ

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( x.e^{\frac{3}{x}} - x \right)$

Ⓕ

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - \cos x}{x^2}$

Ⓝ

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{2 \tan^2 x}$

Ⓒ

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{3x} - e^{5x}).\sin x}{x^2}$

Ⓖ

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x)}{x}$

Ⓚ

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x+2}{x+1} \right)^{2x+1}$

Ⓞ

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{1-2x}}$

Ⓓ

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{\sqrt{\frac{1}{x}} + 1 - 1}$

Ⓗ

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{3x}$

Ⓛ

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_2(1+3x)}{\sin 3x}$

Ⓟ

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(1+x^5)}{3x^3}$

Đáp số:

Ⓐ  $-4e^3$ ;

Ⓑ  $3$ ;

Ⓒ  $-2$ ;

Ⓓ  $2$ ;

Ⓔ  $1$ ;

Ⓕ  $\ln 3 + 1/2$

Ⓘ  $4$

Ⓗ  $0$

Ⓛ  $-7/3$

Ⓝ  $4/3$

Ⓚ  $e^2$

Ⓛ  $1/\ln 2$

Ⓜ  $8$

Ⓝ  $1/2$

Ⓞ  $2$

***Đạng 6. Dùng tính đơn điệu để chứng minh bất đẳng thức chữ mũ logarit***

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Chứng minh bất đẳng thức:  $f(x) \geq g(x)$  hoặc  $(\leq, >, <)$

① Chuyển bất đẳng thức đã cho về dạng:  $h(x) \geq 0$  hoặc  $(\leq, >, <)$ .

② Tìm tập xác định của hàm số  $y = h(x)$ .

③ Tính đạo hàm  $y' = h'(x)$  giải phương trình  $h'(x) = 0 \Rightarrow$  nghiệm

④ Lập bảng biến thiên. Dựa vào bảng biến thiên suy ra chiều biến thiên của  $h(x)$ . Từ đó suy ra được bất đẳng thức cần chứng minh.

**Ví dụ 21:** Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Ⓐ  $e^x + \cos x \geq 2 + x - \frac{x^2}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$

⑥  $\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}, \forall x > 0$

### Bài 42. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Ⓐ  $e^x \geq 1+x, \forall x \in \mathbb{R}$

⑥  $e^x > \frac{x^2}{2} + x + 1, \forall x > 0$

©  $x-1 > \ln x > 1-\frac{1}{x}, \forall x > 1$

Ⓓ  $(x+1)\ln x > 2(x-1), \quad \forall x > 1$

**Bài 43.** Chứng minh rằng:  $a^2 \ln b - b^2 \ln a > \ln a - \ln b$ , ( $0 < a < b < 1$ ). Cao Đăng Khối A, B, D - 2009

**Bài 44.** Tìm tập xác định của hàm số:

③  $y = \frac{\sqrt{\log_2(x+1)}}{2^{2x-3} - 1}$

$$\textcircled{b} \quad y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x^2-2x}{2x+3}}$$

©  $y = \left(\sqrt[3]{x}\right)^{\sqrt{2}}$

④  $y = \log_{2x-1}(x^2 - 1)$

**Bài 45.** Xét sự biến thiên của các hàm số sau:

Ⓐ  $y = \frac{x}{\ln x}$

$$\textcircled{b} \quad y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x^2-2x}{2}}$$

©  $y = \frac{\ln(x^2 + 1)}{\ln 3}$

Ⓓ  $y = x.e^x$

**Bài 46.** Cho hàm số  $y = \ln \frac{x}{x+m}$  (1) ( $m$  là tham số). Tìm  $m$  để hàm số (1):

- Ⓐ Nghịch biến trên từng khoảng xác định.      Ⓑ Nghịch biến trên khoảng  $(2; +\infty)$ .

**Bài 47.** Cho hàm số  $y = \frac{m}{x} + \ln x$ . Tìm  $m$  để hàm số đồng biến trên  $(1; +\infty)$ .

**Bài 48.** Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

- Ⓐ  $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{|x|}$       Ⓑ  $y = \lg(x^2 - 1)$

**Bài 49.** Tìm các giới hạn sau:

- Ⓐ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+5}{3x-1}\right)^{2x}$       Ⓑ  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan^2 x)^{\frac{1}{\sin x}}$       Ⓒ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - \sqrt[3]{x^2 + 1}}{\sin 3x}$
- Ⓓ  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin 3x)^{\frac{1}{x}}$       Ⓔ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lg(1+x^2)}{1 - \cos 2x}$       Ⓕ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{\sqrt{x^2+5} - \sqrt{5}}$

**Bài 50.** Tính đạo hàm của các hàm số sau:

- Ⓐ  $y = \frac{x^2 + e^x}{e^{2x}}$       Ⓑ  $y = (x^2 + 2) \cdot e^{3x+1}$       Ⓒ  $y = \ln(3 + 2x^2)$       Ⓓ  $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 2})$

**Bài 51.** Cho hàm số:  $y = e^x \cdot \sin x$ . Chứng minh:  $y'' - 2y' + 2y = 0$ .

**Bài 52.** Cho hàm số:  $y = x \cdot \ln x$ . Chứng minh:  $x^2 y'' - xy' + y = 0$ .

**Bài 53.** Tính đạo hàm của hàm số sau tại  $x = 0$ :  $y = f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(\cos x)}{x} & \text{khi } x \neq 0 \\ 0 & \text{khi } x = 0 \end{cases}$

**Bài 54.** Tính đạo hàm của hàm số sau tại  $\forall x \in \mathbb{R}$ :  $y = f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt[3]{4x^2+8} - \sqrt{8x^2+4}}{\sin 2x} & \text{khi } x \neq 0 \\ 0 & \text{khi } x = 0 \end{cases}$

**Bài 55.** Tính đạo hàm của hàm số sau:  $y = f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} & \text{khi } x \neq 0 \\ 0 & \text{khi } x = 0 \end{cases}$

**Bài 56.** Chứng minh các bất đẳng thức sau:

- Ⓐ  $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}$       Ⓑ  $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x, (x > 0)$
- Ⓒ  $2^{2\sin x} + 2^{\tan x} > 2^{\frac{3x}{2}+1}$       Ⓓ  $e^{2x} > 2(x^2 + x), (x > 0)$

## Vấn đề 4. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

### 1. *Dạng cơ bản.*

Phương trình mũ cơ bản có dạng:  $a^x = b$  ( $0 < a \neq 1$ )

**Cách giải:** \* Khi  $b > 0$  thì  $a^x = b \Leftrightarrow x = \log_a b$

\* Khi  $b < 0$  thì  $a^x = b$  vô nghiệm.

## 2. Các phương pháp giải

- Phương pháp đưa về cùng cơ số.
- Phương pháp đặt ẩn phụ.
- Phương pháp lôgarit hóa.
- Đưa về phương trình tích
- Phương pháp sử dụng bất đẳng thức, tính đơn điệu của hàm số.

*Dạng 1. Phương pháp đưa về cùng cơ số*

## A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Sử dụng quy tắc biến đổi lũy thừa để đưa phương trình đã cho về phương trình mà hai vế là hai lũy thừa có cùng cơ số. Áp dụng kết quả:

$$0 < a \neq 1 \text{ thì } a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$$

*ta sẽ đưa phương trình đã cho về phương trình không còn ẩn ở mũ.*

## B. BÀI TẬP MẪU

**Ví dụ 22:** Giải các phương trình sau:

Ⓐ  $2^{2x-1} + 4^{x+1} = 72$

ⓑ  $9^{x^2+3} = 27^{2x+2}$

©  $5^{2^{\frac{1}{x}}} = 625$

Ⓓ  $4^{-2x^2} = 64^{x-9}$

[illegible]

**Ví dụ 23:** Giải các phương trình sau:

- Ⓐ  $3^x - 3^{x-1} + 3^{x-2} = 2^x + 2^{x-1} + 2^{x-2}$

Ⓒ  $5^{2x} - 7^x - 5^{2x}.17 + 7^x.17 = 0$
- Ⓑ  $3^{x+1} + 3^{x+2} + 3^{x+3} = 9.5^x + 5^{x+1} + 5^{x+2}$

Ⓓ  $2.3^{x+1} - 6.3^{x-1} - 3^x = 9$

**Ví dụ 24:** Giải các phương trình sau:

- Ⓐ  $(7 + 4\sqrt{3})^{x^2-x-5} = (7 - 4\sqrt{3})^{2x+3}$
- Ⓑ  $(3 - 2\sqrt{2})^{x^2-4x} = (3 + 2\sqrt{2})^{6-x}$







**Ví dụ 27:** Giải các phương trình sau:

$$\textcircled{a} \left(\sqrt{2+\sqrt{3}}\right)^x + \left(\sqrt{2-\sqrt{3}}\right)^x = 4$$

$$\textcircled{b} \left(\sqrt{2}-1\right)^x + \left(\sqrt{2}+1\right)^x = 2\sqrt{2}$$

**Ví dụ 28:** Giải các phương trình sau:

$$\textcircled{a} 5^{x+1} + 5^{1-x} = 26$$

$$\textcircled{b} 2^{x^2-x} - 2^{2+x-x^2} = 3$$

$$\textcircled{c} 2^{\sin^2 x} + 4.2^{\cos^2 x} = 6$$

$$\textcircled{d} 3^{x+1} + 18.3^{-x} = 29$$

**Ví dụ 29:** Giải các phương trình sau:

- Ⓐ

$4^{\frac{1}{x}} + 6^{\frac{1}{x}} = 9^{\frac{1}{x}}$

Ⓒ

$7^{\frac{2}{x^2}+2} - 74.35^{\frac{1}{x}} - 25^{\frac{1}{x}+1} = 0$
- Ⓑ

$49^{\frac{1}{x}} - 35^{\frac{1}{x}} = 25^{\frac{1}{x}}$

Ⓓ

$3^{2x^2+6x-9} + 4.15^{x^2+3x-5} = 3^{2x^2+6x-9}$

**Ví dụ 30:** Giải các phương trình sau:

- Ⓐ

$3.8^x + 4.12^x = 18^x + 2.27^x$

Ⓒ

$8^x - 2.4^x - 2^x + 2 = 0$
- Ⓑ

$2^{x^2+x} - 4.2^{x^2-x} - 2^{2x} + 4 = 0$

Ⓓ

$3.8^x + 4.12^x - 18^x - 2.27^x = 0$

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

**Bài 61.** Giải các phương trình sau:

Ⓐ  $2^{2x} - 3.2^{x+2} + 32 = 0 \quad (x = 2 \vee x = 3)$

Ⓑ  $-8^x + 2.4^x + 2^x - 2 = 0 \quad (x = 0 \vee x = 1)$

Ⓒ  $2^{3x+1} - 7.2^{2x} + 7.2^x - 2 = 0 \quad (x = \pm 1 \vee x = 0)$

Ⓓ  $9^{x^2+x+1} - 10.3^{x^2+x-2} + 1 = 0$   
 $(x = \pm 1 \vee x = 0 \vee x = 2)$

**Bài 62.** Giải các phương trình sau:

Ⓐ  $4^{x+1} - 6.2^{x+1} + 8 = 0 \quad (x = 0 \vee x = 1)$

Ⓑ  $3^{4x+8} - 4.3^{2x+5} + 27 = 0 \quad (x = -3/2 \vee x = -1)$

Ⓒ  $4^x + 3.2^x - 10 = 0 \quad (x = 1)$

Ⓓ  $9^{x^2+1} - 3^{x^2+1} - 6 = 0 \quad (x = 7)$

**Bài 63.** Giải các phương trình sau:

Ⓐ  $10^{x^2+1} - 10^{1-x^2} = 99 \quad (x = 1 \vee x = -1)$

Ⓑ  $2^{3x} - 6.2^x - \frac{1}{2^{3(x-1)}} + \frac{12}{2^x} = 1 \quad (x = 1)$

Ⓒ  $2^{\sqrt{x}} - 2^{1-\sqrt{x}} = 1 \quad (x = 1)$

Ⓓ  $2^{2x^2+1} - 9.2^{x^2+x} + 2^{2x+2} = 0 \quad (x = 2 \vee x = -1)$

**Bài 64.** Giải các phương trình sau:

Ⓐ  $6.4^x - 13.6^x + 6.9^x = 0 \quad (x = 1 \vee x = -1)$

Ⓑ  $27^x + 12^x = 2.8^x \quad (x = 0)$

Ⓒ  $4.9^x + 12^x - 3.16^x = 0 \quad (x = 1)$

Ⓓ  $3.25^x + 2.49^x = 5.35^x \left( x = \log_{\frac{5}{7}} \frac{2}{3} \vee x = 0 \right)$

**Bài 65.** Giải các phương trình sau:

Ⓐ  $9^{\sin^2 x} + 9^{\cos^2 x} = 10$

Ⓑ  $2^{\sin^2 x} + 4.2^{\cos^2 x} = 6$

Ⓒ  $4^{3+2\cos 2x} - 7.4^{1+\cos 2x} = 4^{\frac{1}{2}}$

Ⓓ  $3^{2\sin x+2\cos x+1} - \left(\frac{1}{15}\right)^{-\cos x-\sin x-\log_{15} 8} + 5^{2\sin x+2\cos x+1} = 0$

ĐS: Ⓒ  $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi$  Ⓐ  $x = k\frac{\pi}{2}$ ; Ⓑ  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ; Ⓓ  $x = \frac{3\pi}{4} + k\pi \vee x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \vee x = \pi + k2\pi$

**Bài 66.** Giải các phương trình sau:

Ⓐ  $(2-\sqrt{3})^x + (2+\sqrt{3})^x = 14$  ĐS:  $x = 2 \vee x = -2$

Ⓑ  $(\sqrt{6+\sqrt{35}})^x + (\sqrt{6-\sqrt{35}})^x = 12$  ĐS:  $x = 2 \vee x = -2$

Ⓒ  $(5-\sqrt{21})^x + 7(5+\sqrt{21})^x = 2^{x+3}$  ĐS:  $x = 0 \vee x = \log_{\frac{5-\sqrt{21}}{2}} 7$

Ⓓ  $(\sqrt{7+4\sqrt{3}})^{\cos x} + (\sqrt{7-4\sqrt{3}})^{\cos x} = 4$  ĐS:  $x = k\pi$

Ⓔ  $(8+3\sqrt{7})^{\tan x} + (8-3\sqrt{7})^{\tan x} = 16$  ĐS:  $x = \pm \pi/4 + k\pi$



## A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

## B. BÀI TẬP MẪU

©  $12^x - 16 \cdot 3^x + 32 - 2^{2x+1} = 0$

## C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Ⓜ  $3^{4x-3} + 3^{x-2} = 9 + 3^{5x-7}$ .

Ⓣ  $4^{2x+\sqrt{x+2}} + 2^{x^3} = 4^{2+\sqrt{x+2}} + 2^{x^3+4x-4}$

⑤  $x = \pm 1 \vee x = 2 \vee x = 5$  ⑥  $x = 0 \vee x = 1 \vee x = 3$



DS: ㉑  $x=1$  ㉒  $x=\log_{\frac{1+\sqrt{2}}{2}} \frac{7}{5}$ ; ㉓  $x=0$ ; ㉔  $x=0 \vee x=2 \vee x=1+\sqrt{3} \vee x=1-\sqrt{3}$







C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

**Bài 76.** Giải các bất phương trình sau:

$$\textcircled{a} \left(\frac{2}{5}\right)^{\sqrt{2-x}} > \left(\frac{2}{5}\right)^x$$

$$\textcircled{b} \left(\frac{7}{9}\right)^{2x^2-3x} \geq \frac{9}{7}$$

$$\textcircled{c} 3^{|x-2|} < 9$$

$$\textcircled{d} 4^{|x+1|} > 16$$

$$\textcircled{e} 2^{-x^2+3x} < 4$$

$$\textcircled{f} 2^{3-6x} > 1$$

$$\textcircled{g} 11^{\sqrt{x+6}} \geq 11^x$$

$$\textcircled{h} 16^x \geq 0,125$$

$$\textcircled{i} (8,4)^{\frac{x-3}{x^2+1}} < 1$$

$$\textcircled{j} 2^{|x-2|} > 4^{|x+1|}$$

$$\textcircled{k} (0,5)^{x^2-5x+4} > 4$$

$$\textcircled{l} 3^{2x+5} > 1$$

ĐS:       $\textcircled{a} 1 < x \leq 2$     $\textcircled{b} 1/2 \leq x \leq 1$     $\textcircled{c} 0 < x < 4$     $\textcircled{d} x < -3 \vee x > 1$     $\textcircled{e} x < 1 \vee x > 2$     $\textcircled{f} x < 1/2$

$\textcircled{g} -6 \leq x \leq 3$     $\textcircled{h} x > -3/4$     $\textcircled{i} x < 3$     $\textcircled{j} -4 < x < 0$     $\textcircled{k} 2 < x < 3$     $\textcircled{l} x > -5/2$

**Bài 77.** Giải các bất phương trình sau:

$$\textcircled{a} 15^{2x+3} > 5^{3x+1} \cdot 3^{x+5} \quad (x < 2)$$

$$\textcircled{b} 6^{2x+3} < 5^{x+7} \cdot 3^{3x-1} \quad (x > 4)$$

$$\textcircled{c} 5^x \cdot 2^{\frac{2x-1}{x+1}} < 50 \quad (x < -\log_5 10 \vee -1 < x < 2)$$

$$\textcircled{d} 2^{x^2-3x-2} \cdot 3^{x^2-3x-3} \cdot 5^{x^2-3x-4} \geq 12 \quad (x \leq -1 \vee x \geq 4)$$

**Bài 78.** Giải các bất phương trình sau:

$$\textcircled{a} 7^x - 2^{x+2} \leq 5 \cdot 7^{x-1} - 2^{x-1} \quad (x \leq 2)$$

$$\textcircled{b} 2^{x+3} - 5^x < 7 \cdot 2^{x-2} - 3 \cdot 5^{x-1} \quad (x > 3)$$

$$\textcircled{c} 3^{x+2} + 7^x \leq 4 \cdot 7^{x-1} + 34 \cdot 3^{x-1} \quad (x \leq 2)$$

$$\textcircled{d} 7^x - 5^{x+2} < 2 \cdot 7^{x-1} - 118 \cdot 5^{x-1} \quad (x < 2)$$

**Bài 79.** Giải các bất phương trình sau:

$$\textcircled{a} (x^2 + 2x + 3)^{\frac{x-1}{x+1}} \geq 1$$

$$\textcircled{b} (x^2 + x + 1)^x < 1$$

$$\textcircled{c} (x-2)^{2x^2-7x} > 1$$

$$\textcircled{d} (x^2 + 2x + 1)^{\frac{x-1}{x+1}} \leq 1$$

ĐS:  $\textcircled{a} x < -1 \vee x \geq 1$     $\textcircled{b} x < -1$     $\textcircled{c} 2 < x < 3 \vee x > 7/2$     $\textcircled{d} -2 \leq x < -1 \vee 0 \leq x \leq 1$

## Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ

## A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

*Tìm một lũy thừa chung, đặt làm ẩn phụ  $t$  để đưa bất phương trình về bất phương trình đơn giản hơn.*

*Khi đặt ٱn phụ cần lưu ý:*

**1. Nếu đặt  $t = a^x$ , điều kiện là  $t > 0$  thì:**

$$a^{2x} = (a^2)^x = (a^x)^2 = t^2; \quad a^{3x} = t^3; \quad a^{-x} = \frac{1}{t}, \dots$$

**2. Lưu ý khác:**

$$\sqrt{2}-1=(\sqrt{2}+1)^{-1}; 2-\sqrt{3}=(2+\sqrt{3})^{-1}; \sqrt{7}-\sqrt{48}=(\sqrt{7}+\sqrt{48})^{-1}; \dots$$

3. *Gặp bất phương trình dạng  $m.a^{2f(x)} + n.a^{f(x)+g(x)} + p.a^{2g(x)} > 0$  ta chia 2 vế cho  $a^{2g(x)}$  và đặt  $t = a^{f(x)-g(x)}$*

4. Giải phương trình dạng  $m.a^{2f(x)} + n.(ab)^{f(x)} + p.b^{2f(x)} > 0$  ta chia 2 vế cho  $a^{2f(x)}$  và đặt  $t = \left(\frac{a}{b}\right)^{f(x)}$  ( $a > b$ )

## B. BÀI TẬP MẪU

**Ví dụ 36:** Giải các bất phương trình sau:

Ⓐ  $4^x - 2.5^x < 10^x$  ( $x > -\log_{5/2} 2$ )

**Ⓐ**  $4^x - 2.5^x < 10^x$  ( $x > -\log_{5/2} 2$ )     
**Ⓑ**  $(\sqrt{5} + 1)^{x-x^2} + 2^{-x^2+x+1} < 3 \cdot (\sqrt{5} - 1)^{x-x^2}$  ( $x < 0 \vee x > 1$ )

©  $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 > 0 \ (x < 0 \vee x > 1)$

©  $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 > 0$  ( $x < 0 \vee x > 1$ )      Ⓓ  $\left(\frac{1}{3}\right)^x + \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}} > 12$  ( $-1 < x < 0$ )

[illegible]



### C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

**Bài 80.** Giải các bất phương trình sau:

Ⓐ  $9^x < 3^{x+1} + 4$

Ⓑ  $16^x - 4^x - 6 \leq 0$

Ⓒ  $49^x - 6 \cdot 7^x - 7 < 0$

Ⓓ  $9^{x^2-2x} - 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-x^2} \leq 3$

Ⓔ  $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{x}} + 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}+1} > 12$

Ⓕ  $5^{2x-1} > 5^x + 4$

Ⓖ  $4^x - 10 \cdot 2^x + 16 < 0$

Ⓗ  $4^x - 2^x - 2 < 0$

Ⓖ  $5^{2x+1} - 26 \cdot 5^x + 5 > 0$

Ⓙ  $9^x - 2 \cdot 3^x < 3$

Ⓚ  $4^{x-1} - 2^{x-2} < 3$

Ⓛ  $9^{\sqrt{x^2-3}} + 3 > 28 \cdot 3^{\sqrt{x^2-3}-1}$

ĐS: Ⓐ  $x < \log_3 4$  Ⓑ  $x < \log_4 3$  Ⓒ  $x < 1$  Ⓓ  $1 - \sqrt{2} \leq x \leq 1 + \sqrt{2}$  Ⓔ  $-1 < x < 3$  Ⓕ  $x > 0$

Ⓖ  $1 < x < 3$  Ⓗ  $x < 1$  Ⓙ  $x < -1 \vee x > 1$  Ⓛ  $x < 1$  Ⓚ  $x < 2$  Ⓛ  $-\sqrt{7} < x \leq -\sqrt{3} \vee \sqrt{3} \leq x < \sqrt{7}$

**Bài 81.** Giải các bất phương trình sau:

Ⓐ  $3^{x+1} - 2^{2x+1} - 12^{\frac{x}{2}} < 0$

Ⓑ  $6 \cdot 9^{\frac{1}{x}} - 13 \cdot 6^{\frac{1}{x}} + 6 \cdot 4^{\frac{1}{x}} \leq 0$

Ⓒ  $3^{2x} - 8 \cdot 3^{x+\sqrt{x+4}} - 9 \cdot 9^{\sqrt{x+4}} > 0$

Ⓓ  $(\sqrt{5}+1)^{-x^2+x} + 2^{-x^2+x+1} < 3 \cdot (\sqrt{5}-1)^{-x^2+x}$

Ⓔ  $5 \cdot 36^x - 2 \cdot 81^x - 3 \cdot 16^x \leq 0$

Ⓕ  $25^{2x-x^2+1} + 9^{2x-x^2+1} \geq 34 \cdot 15^{2x-x^2}$

ĐS: Ⓐ  $x > 0$  Ⓑ  $x \leq -1 \vee x \geq 1$  Ⓒ  $x > 5$  Ⓓ  $x < 0 \vee x > 1$

Ⓔ  $x \leq 0 \vee x \geq 1/2$  Ⓕ  $x \leq 1 - \sqrt{3} \vee 0 \leq x \leq 2 \vee x \leq 1 + \sqrt{3}$

**Bài 82.** Giải các bất phương trình sau:

Ⓐ  $\frac{4^x - 2^{x+1} + 8}{2^{1-x}} < 8^x$

Ⓑ  $\frac{1}{3^x+5} < \frac{1}{3^{x+1}-1}$

Ⓒ  $\frac{2 \cdot 3^x - 2^{x+2}}{3^x - 2^x} \leq 1$

Ⓓ  $\frac{11 \cdot 3^{x-1} - 31}{4 \cdot 9^x - 11 \cdot 3^{x-1} - 5} \geq 5$

ĐS Ⓐ  $x > 1$  Ⓑ  $-1 < x \leq 1$  Ⓒ  $0 < x \leq \log_{3/2} 3$  Ⓓ  $x \leq \log_3(1/2) \vee \log_3(3/5) \leq x < \log_3(5/3)$

**Bài 83.** Giải các bất phương trình sau:

Ⓐ  $3^x - 3^{-x+2} + 8 > 0$

Ⓑ  $(0,4)^x - (2,5)^{x+1} > 1,5$

Ⓒ  $2^x + 2^{-x+1} - 3 < 0$

Ⓓ  $5^{1+x} - 5^{1-x} > 24$

Ⓔ  $7^{-x} - 3 \cdot 7^{1+x} > 4$

Ⓕ  $5^x - 5^{3-x} > 20$

Ⓖ  $3^{4-3x} + 35 \left(\frac{1}{3}\right)^{2-3x} + 6 \geq 0$

Ⓗ  $2^{2x+1} - 21 \left(\frac{1}{2}\right)^{2x+3} + 2 \geq 0$

ĐS: Ⓐ  $x > 0$  Ⓑ  $x < -1$  Ⓒ  $0 < x < 1$  Ⓓ  $x > 1$  Ⓔ  $x < -1$

Ⓕ  $x > 2$  Ⓖ  $x < \log_3 \frac{3}{\sqrt[3]{5}}$  Ⓗ  $x \geq \frac{1}{2} \log_2 3 - 1$



## C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

**Bài 84.** Giải các bất phương trình sau:

Ⓐ  $4^x \cdot 27^{\frac{x-1}{x}} > 576$  Ⓑ  $125^{\frac{x}{x+2}} \leq 225 \cdot 3^{2-x}$  Ⓒ  $3^{5^x} < 5^{3^x}$  Ⓓ  $2^{x^2-4} \geq 3^{x-2}$

⑤  $x^{6.5^{-\log_x 5}} > 5^{-5}$     ⑥  $5x^{\log_5 x} \geq x^2$     ⑦  $x^4 \cdot 6^3 < 6^{\log_x 6}$     ⑧  $2^x \cdot 5^x \leq 0,2 \cdot (10^{x-1})^5$

$$DS: \quad \textcircled{a} \ x < -1/2 \vee x > 3 \quad \textcircled{b} \ x < -2 \vee \log_3 45 \leq x \leq 4 \quad \textcircled{c} \ x < \log_{5/3} (\log_3 5)$$

Ⓓ  $x < \log_2(3/4) \vee x > 2$  Ⓔ  $0 < x < 1/5 \vee x > \sqrt[6]{5}$  Ⓕ  $x > 0$

Ⓐ  $1/6 < x < 1 \vee 1 < x < \sqrt[4]{6}$  Ⓑ  $x \geq 3/2 - (\lg 2)/4$



## BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 5

**Bài 85.** Giải các bất phương trình sau:

$$\textcircled{a} \left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-2x} < \left(\frac{1}{9}\right)^{16-x} \quad DS: x < -8 \vee x > 4$$

$$\textcircled{b} 2^{x+1} > \left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{1}{x+2}} \quad DS: 0 < x < 2$$

$$\textcircled{c} 3^{\sqrt{x^2-2x}} > \left(\frac{1}{3}\right)^{x-|x-1|} \quad DS: x \geq 2$$

$$\textcircled{d} (\sqrt{5}+2)^{x-1} > (\sqrt{5}-2)^{\frac{x-1}{x+1}} \quad DS: -2 < x < -1 \vee x > 1$$

$$\textcircled{e} (\sqrt{10}+3)^{\frac{x-3}{x-1}} < (\sqrt{10}+3)^{\frac{x+1}{x+3}} \quad DS: -3 < x < -\sqrt{5} \vee 1 < x < \sqrt{5}$$

$$\textcircled{f} 3^{x^2-x} + 3^{x^2+2x} > 3^{2x^2+x} + 1 \quad DS: -2 < x < 0 \vee 0 < x < 1$$

**Bài 86.** Giải các bất phương trình sau:

$$\textcircled{a} |x-1|^{\lg^2 x - \lg x^2} \geq |x-1|^3 \quad DS: \frac{1}{10} \leq x < 2 \vee x \geq 1000$$

$$\textcircled{b} |x|^{x^2-2x} \geq 1 \quad DS: x < -1 \vee 0 < x < 1 \vee x \geq 2$$

**Bài 87.** Giải các bất phương trình sau:

$$\textcircled{a} 2 \cdot 2^x + 3 \cdot 3^x > 6^x - 1 \quad DS: x < 2$$

$$\textcircled{b} \frac{3^{2-x} + 3 - 2x}{4^x - 2} \leq 0 \quad DS: \frac{1}{2} < x \leq 2$$







Ví dụ 42: Giải các phương trình sau:

Ⓐ  $\log_3(2x+1) - 2\log_{2x+1} 3 - 1 = 0 \quad (x = -1/3; x = 4)$

Ⓑ  $\log_{x-1} 4 = 1 + \log_2(x-1) \quad (x = 3; x = 5/4)$

Ví dụ 43: Giải các phương trình sau:

Ⓐ  $\log_2^2 x^2 - 4\log_2 x^3 + 8 = 0 \quad (x = 2; x = 4)$

Ⓑ  $\frac{6}{\log_2 16x} + \frac{4}{\log_2 x^2} = 2 \quad (x = 4; x = 1/4)$

Ⓒ  $\log_3^2 x + \sqrt{\log_3^2 + 1} - 5 = 0 \quad (x = 3^{\sqrt{3}}; x = 3^{-\sqrt{3}})$

Ⓓ  $\sqrt{\log_2(-x)} = \log_2 \sqrt{x^2} \quad (x = -2; x = -2^{25})$

©  $\log_2(3 \cdot 2^x - 1) - 2x - 1 = 0 \quad (x = 0; x = -1)$     Ⓓ  $\log_2(9 - 2^x) = 5^{\log_5(3-x)} \quad (x = 0)$

DS:      Ⓐ  $x=4$ ; Ⓑ  $x=0 \vee x=-1$ ; Ⓒ  $x=3$ ; Ⓓ  $x=0 \vee x=3$  Ⓔ  $x=9/4$ ; Ⓕ  $x=7/2$

#### *Dạng 4. Phương pháp đưa về phương trình tích*

## A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Biến đổi phương trình đã cho về dạng phương trình tích:  $A.B = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A=0 \\ B=0 \end{cases}$

## B. BÀI TẬP MẪU

**Ví dụ 45:** Giải phương trình:  $2\log_9^2 x = \log_3 x \cdot \log_3 (\sqrt{2x+1}-1)$

$$\text{DS: } x=1 \vee x=4+2\sqrt{5}$$

## C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

**Bài 95.** Giải các phương trình sau:

Ⓐ  $\log_2 x + 2\log_7 x = 2 + \log_2 x \cdot \log_7 x$

$$\textcircled{b} \quad 2x + \log_2(x^2 - 4x + 4) = 2 - (x+1)\log_{\frac{1}{2}}(2-x)$$

$$\textcircled{c} \frac{1}{x-1} \log_2^2 x + \log_2 x + 2 = \frac{4}{x-1}$$

Ⓓ  $2\log_2 x \cdot \log_5 x + \log_2 x - 10\log_5 x = 5$

DS: ㉑  $x=4 \vee x=7$  ㉒  $x=1 \vee x=-2$  ㉓  $x=1/4 \vee x=2$  ㉔  $x=32 \vee x=1/\sqrt{5}$





C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

**Bài 96.** Giải các phương trình sau:

Ⓐ  $\log_2^2 x + (x-1)\log_2 x = 6 - 2x$

Ⓒ  $\log_3 (x^2 + x + 1) - \log_3 x = 2x - x^2$

Ⓔ  $3x^2 - 2x^3 = \log_2 (x^2 + 1) - \log_2 x$

Ⓑ  $\log_3 \frac{x^2 + x + 3}{2x^2 + 4x + 5} = x^2 + 3x + 2$

Ⓓ  $\lg (x^2 - x - 6) + x = \lg (x + 2) + 4$

ĐS: Ⓐ  $x = 1/4 \vee x = 2$  Ⓑ  $x = -1 \vee x = -2$  Ⓒ  $x = 1$  Ⓓ  $x = 4$  Ⓔ  $x = 1$

**Bài 97.** Giải các phương trình sau:

Ⓐ  $\log_5 x = \log_7 (x + 2)$

Ⓒ  $2\log_6 (\sqrt[4]{x} + \sqrt[8]{x}) = \log_4 \sqrt{x}$

Ⓑ  $\log_2 (1 + \sqrt{x}) = \log_3 x$

Ⓓ  $\log_2 (x^2 + 2x + 3) = \log_5 (4 + 2|x| - x^2)$

ĐS: Ⓐ  $x = 5$  Ⓑ  $x = 9$  Ⓒ  $x = 256$  Ⓓ  $x = -1$

BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 6

**Bài 98.** Giải các phương trình sau:

Ⓐ  $\log_2 (x^2 + 2x + 3) - \log_3 (4 + 2|x| - x^2) = 0$

Ⓑ  $\log_x (2x^2 - 7x + 12) = 2$

Ⓒ  $\log_2 (9 - 2^x) = 3 - x$

Ⓓ  $\log_x 2 - \log_4 x + \frac{7}{6} = 0$

Ⓔ  $\frac{1}{3}\log_2 (5 - x) + 2\log_8 \sqrt{3 - x} = 1$

Ⓕ  $\lg 5 + \lg (x + 10) = 1 - \lg (2x - 1) + \lg (21x - 20)$

Ⓖ  $\log_2 (x^2 + 3x + 2) + \log_2 (x^2 + 7x + 12) = 3 + \log_2 3$

Ⓗ  $(\sqrt{1 - x} + \sqrt{1 + x} - 2) \cdot \log_2 (x^2 - x) = 0$

ĐS:  $x = -1$

ĐS:  $x = 3 \vee x = 4$

ĐS:  $x = 3 \vee x = 0$

ĐS:  $x = 8 \vee x = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$

ĐS:  $x = 1$

ĐS:  $x = 10 \vee x = \frac{3}{2}$

ĐS:  $x = 0 \vee x = 5$

ĐS:  $x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$

Vấn đề 7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

1. *Dạng cơ bản*
  - *Dạng:*  $\log_a x > b$  ( $0 < a \neq 1$ ) (hoặc  $\log_a x \geq b, \log_a x < b, \log_a x \leq b$ )
  - *Cách giải:* Xét bất phương trình:  $\log_a x > b$ 
    - 👉 Nếu  $a > 1$ :  $\log_a x > b \Leftrightarrow x > a^b$
    - 👉 Nếu  $0 < a < 1$ :  $\log_a x > b \Leftrightarrow 0 < x < a^b$
2. *Các phương pháp giải*
  - Phương pháp đưa về cùng cơ số.
  - Phương pháp đặt ẩn phụ.

Dạng 1. Phương pháp đưa về cùng cơ số

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Xét dạng:  $\log_a f(x) \geq \log_a g(x)$ :
- Nếu  $a > 1$ :  $\log_a f(x) \geq \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 0 \\ f(x) \geq g(x) \end{cases}$
  - Nếu  $0 < a < 1$ :  $\log_a f(x) \geq \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 0 \\ f(x) \leq g(x) \end{cases}$
- ❖ Tổng quát:  $\log_a f(x) \geq \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < a \neq 1 \\ f(x) > 0, g(x) > 0 \\ (a-1)[f(x)-g(x)] \geq 0 \end{cases}$

B. BÀI TẬP MẪU

**Ví dụ 47:** Giải các bất phương trình sau:

Ⓐ  $\log_2(x^2 - 2x) > 3 \quad (x < -2 \vee x > 4)$

Ⓔ  $\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 6x) > -3 \quad (-3 < x < 0 \vee 6 < x < 9)$

Ⓑ  $\log_3 \frac{x^2 + 4x}{2x - 3} < 1 \quad (-4 < x < 0)$

Ⓕ  $\log_8(4 - 2x) \geq 2 \quad (x \leq -30)$

Ⓒ  $\log_2(2 - x - \sqrt{x^2 - 1}) < 1 \quad (1 \leq x < 5/4)$

Ⓖ  $\log_{\frac{2}{3}} \log_3 |x - 3| \geq 0 \quad (4 < x \leq 6 \vee 0 \leq x < 2)$

Ⓓ  $\log_{\sqrt{5}}(6^{x+1} - 36^x) \leq 2 \quad (x \leq 0 \vee \log_6 5 \leq x < 1)$

Ⓗ  $\log_{0,7} \left[ \log_6 \frac{x^2 + x}{x + 4} \right] < 0 \quad (-4 < x < -3 \vee x > 8)$

Ⓘ  $\log_{\frac{1}{2}} \frac{x^2 - 3x + 2}{x} \geq 0 \quad (2 - \sqrt{2} \leq x < 1 \vee 2 < x \leq 2 + \sqrt{2})$

.....

.....

.....

.....

[illegible]



### C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

**Bài 99.** Giải các bất phương trình sau:

$$\textcircled{a} \log_{\frac{1}{2}}(x^2 + 2x - 8) \geq -4 \quad \textcircled{b} \log_{\frac{1}{3}}(x - 1) \geq -2 \quad \textcircled{c} \log_{\frac{1}{2}}(5x + 1) < -5$$

$$\textcircled{d} \log_{\frac{1}{3}}(5x - 1) > 0 \quad \textcircled{e} \log_{0,5}(x^2 - 5x + 6) \geq -1 \quad \textcircled{f} \log_5(3x - 1) < 1$$

$$\textcircled{g} \log_4 \frac{2x-1}{x+1} < -\frac{1}{2} \quad \textcircled{h} \log_{0,5} \frac{x^2-3x+2}{x} \geq 0 \quad \textcircled{i} \log_3 \frac{1-2x}{x} \leq 0 \quad \textcircled{j} \log_4 \frac{1+3x}{x-1} \geq 0$$

$$\text{ĐS: } \textcircled{a} -6 \leq x < -4 \vee 2 < x \leq 4 \quad \textcircled{b} 1 < x \leq 10 \quad \textcircled{c} x > 31/5 \quad \textcircled{d} 1/5 < x < 2/5 \quad \textcircled{e} 1 \leq x < 2 \vee 3 < x \leq 4$$

$$\textcircled{f} 1/3 < x < 2 \quad \textcircled{g} 1/2 < x < 1 \quad \textcircled{h} 2 - \sqrt{2} < x < 1 \vee 2 < x < 2 + \sqrt{2} \quad \textcircled{i} 1/3 \leq x < 1/2 \quad \textcircled{j} x \leq -1 \vee x > 1$$

**Bài 100.** Giải các bất phương trình sau:

$$\textcircled{a} \log_{\frac{1}{3}} \sqrt{x+6} \leq \log_{\frac{1}{3}}(x+4) \quad \textcircled{b} \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{5}}(x+8) \geq \log_{\frac{1}{5}}(x-4)$$

$$\textcircled{c} \log_3(x^2 - 2) < \log_3\left(\frac{3}{2}|x| - 1\right) \quad \textcircled{d} \log_{\frac{1}{2}}(4-x)^2 > \log_{\frac{1}{2}}(6|x| - 3)$$

$$\textcircled{e} \log_4(x^2 - 5) < \log_4\left(\frac{7}{3}|x| - 3\right) \quad \textcircled{f} \log_{\frac{1}{3}}(3-x^2) > \log_{\frac{1}{3}}(4|x| - 2)$$

$$\textcircled{g} \log_{0,6}(4x+11) < \log_{0,6}(x^2+6x+8) \quad \textcircled{h} \log_{0,8}(x^2+x+1) < \log_{0,8}(2x+5)$$

$$\textcircled{i} \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{5-x} < \log_{\frac{1}{2}}(3-x) \quad \textcircled{j} \log_{0,1}(x^2+x-2) > \log_{0,1}(x+3)$$

$$\textcircled{k} \frac{1}{\log_3(x^2-7x+12)} < \frac{1}{\log_3 20}$$

$$\text{ĐS: } \textcircled{a} -4 < x \leq 2 \quad \textcircled{b} x \geq 8 \quad \textcircled{c} -2 < x < -\sqrt{2} \vee \sqrt{2} < x < 2 \quad \textcircled{d} (7-\sqrt{30})/2 < x < (7+\sqrt{30})/2$$

$$\textcircled{e} -3 < x < -\sqrt{5} \vee \sqrt{5} < x < 3 \quad \textcircled{f} -\sqrt{3} < x < -1 \vee 1 < x < \sqrt{3} \quad \textcircled{g} -2 < x < 1$$

$$\textcircled{h} x > (1+\sqrt{17})/2 \vee -5/2 < x < (1-\sqrt{17})/2 \quad \textcircled{i} 1 < x < 3 \quad \textcircled{j} -\sqrt{5} < x < -2 \vee 1 < x < \sqrt{5}$$

$$\textcircled{k} x < -1 \vee (7-\sqrt{5})/2 < x < 3 \vee 4 < x < (7+\sqrt{5})/2 \vee x > 8$$

**Bài 101.** Giải các bất phương trình sau:

$$\textcircled{a} \log_{0,1}(x^2 + x - 2) > \log_{0,1}(x + 3) \quad \textcircled{b} \log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 6x + 5) + 2\log_3(2 - x) \geq 0$$

$$\textcircled{c} \log_{\frac{1}{5}}(x^2 - 6x + 18) + 2\log_5(x - 4) < 0 \quad \textcircled{d} \log_2 x + \log_2 \frac{3x-1}{x^2+1} > 0$$

$$\textcircled{e} \lg(x^2 - x - 2) < 2\lg(3 - x) \quad \textcircled{f} \ln|x-2| + \ln|x+4| \leq 3\ln 2$$

$$\textcircled{g} \log_3 \sqrt{x^2 - 5x + 6} + \log_{\frac{1}{3}} \sqrt{x-2} > \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{3}}(x+3) \quad \textcircled{h} \log_{\frac{1}{2}}(4-x) \geq \log_{\frac{1}{2}} 2 - \log_{\frac{1}{2}}(x-1)$$

$$\textcircled{i} \log_{\frac{1}{2}}\left(x - \frac{1}{2}\right) + \log_{\frac{1}{2}}(x-1) \leq 1 \quad \textcircled{j} \log_{\frac{1}{2}}\left(x + \frac{1}{2}\right) + \log_{\frac{1}{2}} x \geq 1$$

$$DS: \textcircled{a} -\sqrt{5} < x < -2 \vee 1 < x < \sqrt{5} \quad \textcircled{b} 1/2 \leq x < 1 \quad \textcircled{c} x > 4 \quad \textcircled{d} x > 1 \quad \textcircled{e} x < -1 \vee 2 < x < 11/5 \\ \textcircled{f} -1 - \sqrt{17} \leq x \leq -2 \vee 0 \leq x \leq -1 + \sqrt{17} \quad \textcircled{g} x > \sqrt{10} \quad \textcircled{h} 1 < x \leq 2 \vee 3 \leq x < 4 \quad \textcircled{i} 1 < x \leq 3/2 \quad \textcircled{j} 0 < x < 1/2$$

**Bài 102.** Giải các bất phương trình sau:

$$\textcircled{a} \log_{\frac{1}{3}}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^x - 1\right] < \log_{\frac{1}{3}}\left[\left(\frac{1}{4}\right)^x - 3\right] \quad \textcircled{b} \log_{\frac{1}{\sqrt{5}}}(6^{x+1} - 36^x) \geq -2$$

$$\textcircled{c} \log_5(26 - 3^x) > 2 \quad \textcircled{d} \log_3(13 - 4^x) > 2 \quad \textcircled{e} \log_{\frac{1}{\sqrt{6}}}(5^{x+1} - 25^x) \geq -2$$

$$DS: \textcircled{a} x > -1 \quad \textcircled{b} x \leq 0 \vee \log_6 5 \leq x < 1 \quad \textcircled{c} x < 0 \quad \textcircled{d} x < 1 \quad \textcircled{e} x \leq \log_5 2 \vee \log_5 3 \leq x < 1$$

**Bài 103.** Giải các bất phương trình sau:

$$\textcircled{a} \log_{x+1}(x^2 + x - 6)^2 \geq 4 \quad \textcircled{b} \log_{9x^2}(6 + 2x - x^2) \leq \frac{1}{2} \quad \textcircled{c} \log_{|x|}\left(x^2 - \frac{1}{2}x\right) > 1$$

$$\textcircled{d} \log_{x^2} \frac{2x}{|x-3|} \leq \frac{1}{2} \quad \textcircled{e} \log_{x^2}(3 - 2x) > 1 \quad \textcircled{f} \log_x \frac{3}{8-2x} > -2$$

$$DS: \textcircled{a} 0 < x \leq 1 \quad \textcircled{b} 1 - \sqrt{7} < x \leq -1 \vee -1/3 < x < 0 \vee 0 < x < 1/3 \vee 2 \leq x < 2 + \sqrt{7} \\ \textcircled{c} x < 1 \vee -1/2 < x < 0 \vee 1/2 < x < 1 \vee x > 3/2 \quad \textcircled{d} x \geq 5 \quad \textcircled{e} -3 < x < -1 \quad \textcircled{f} 0 < x < 1 \vee 4/3 < x < 4$$

**Bài 104.** Giải các bất phương trình sau:

$$\textcircled{a} \log_{\frac{1}{3}}\left(\log_2 \frac{1+2x}{1+x}\right) > 0 \quad \textcircled{b} \log_{\frac{3}{e}}(\log_3 |x-3|) \geq 0 \quad \textcircled{c} \log_3 \log_{\frac{9}{16}}(x^2 - 4x + 3) \leq 0$$

$$\textcircled{d} \log_{\frac{\pi}{4}} \log_2(x + \sqrt{2x^2 - x}) < 0 \quad \textcircled{e} \log_{\frac{8}{3}} \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - x - 6) \geq 0 \quad \textcircled{f} \log_3 \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 1) < 1$$

$$DS: \textcircled{a} x > 0 \quad \textcircled{b} 0 \leq x < 2 \vee 4 < x \leq 6 \quad \textcircled{c} 2 - \sqrt{2} < x \leq 3/4 \vee 13/4 \leq x < 2 + \sqrt{2} \quad \textcircled{d} x < -4 \vee x > 1 \\ \textcircled{e} (1 - 3\sqrt{3})/2 \leq x < -2 \vee 3 < x \leq (1 + 3\sqrt{3})/2 \quad \textcircled{f} -\sqrt{2} < x < -3/2\sqrt{2} \vee 3/2\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$$

**Bài 105.** Tìm tập xác định của các hàm số sau:

$$\textcircled{a} y = \sqrt{\log_{0,8} \frac{2x+5}{x+5} - 2} \quad \textcircled{b} y = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2) + 1}$$

$$\textcircled{c} y = \sqrt{\log_{0,3} \frac{3x-1}{x+2} - 3} \quad \textcircled{d} y = \sqrt{\log_2(x^2 + 2) \cdot \log_{2-x} 2 - 2}$$

$$\textcircled{e} y = \sqrt{\log_{x+1}(6 + 5x - x^2) - 2} \quad \textcircled{f} y = \sqrt{\log_{0,5}(-x^2 + x + 6)} + \frac{1}{x^2 + 2x}$$

$$DS: \textcircled{a} D = \left[-\frac{1}{2}; \frac{55}{34}\right] \quad \textcircled{b} D = (2; 4] \quad \textcircled{c} D = \left(\frac{1}{3}; \frac{10}{23}\right] \quad \textcircled{d} D = \left[\frac{1}{2}; 1\right) \quad \textcircled{e} D = \left(0; \frac{5}{2}\right] \quad \textcircled{f} D = \left(-2; \frac{1-\sqrt{21}}{2}\right] \cup \left[\frac{1+\sqrt{21}}{2}; 3\right)$$





### C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

**Bài 106.** Giải các bất phương trình sau:

Ⓐ  $\log_2^2 x + \log_2 4x - 4 \geq 0$

Ⓑ  $\log_{0,2}^2 x - 5\log_{0,2} x < -6$

Ⓒ  $\log_{0,5}^2 x - \log_{0,5} x - 6 \leq 0$

Ⓓ  $\log_{0,2}^2 x + \log_{0,2} x - 3 \leq 0$

Ⓔ  $2\log_2^3 x + 5\log_2^2 x + \log_2 x - 2 \geq 0$

Ⓕ  $\log_2^4 x - \log_2^2 \left( \frac{x^3}{8} \right) + 9\log_2 \left( \frac{32}{x^2} \right) < 4\log_2^2 x$

Ⓖ  $\log_2^2 (2-x) - 8\log_{\frac{1}{4}} (2-x) \geq 5$

Ⓗ  $\log_2^2 (2+x-x^2) + 3\log_{\frac{1}{2}} (2+x-x^2) + 2 \leq 0$

Ⓙ  $\log_5^2 (6-x) + 2\log_{\frac{1}{\sqrt{5}}} (6-x) + \log_3 27 \geq 0$     ①  $\sqrt{\log_2^2 x + \log_{\frac{1}{2}} x^2 - 3} > \sqrt{5} (\log_4 x^2 - 3)$

ĐS: Ⓐ  $x \leq 1/4 \vee x \geq 2$  Ⓑ  $-6 \leq x < -4 \vee 2 < x \leq 4$  Ⓒ  $(0, 2)^3 \leq x \leq 25$  Ⓓ  $1/2 \leq x \leq 4$

Ⓔ  $1/4 \leq x \leq 1/2 \vee x \geq \sqrt{2}$  Ⓕ  $1/8 < x < 1/4 \vee 4 < x < 8$  Ⓖ  $x \leq 0 \vee 63/32 \leq x < 2$

Ⓗ  $0 \leq x \leq 1$  Ⓙ  $x \leq -119 \vee 1 \leq x < 6$  ①  $0 < x \leq 1/2 \vee 8 < x < 16$

**Bài 107.** Giải các bất phương trình sau:

Ⓐ  $\log_2 (x+1) - \log_{x+1} 64 < 1$

Ⓑ  $\log_x 2 + \log_{2x} 8 \leq 4$

Ⓒ  $\log_{\frac{x}{3}} (3x) + \log_3^2 x < 11$

ĐS: Ⓐ  $-1 < x < -3/4 \vee 0 < x < 7$  Ⓑ  $0 < x < 1/2 \vee 2^{\frac{3-\sqrt{13}}{2}} \leq x \leq 2^{\frac{3+\sqrt{13}}{2}}$  Ⓒ  $3^{-1-\sqrt{5}} < x < 3 \vee 3^{-1+\sqrt{5}} < x < 27$

**Bài 108.** Giải các bất phương trình sau:

Ⓐ  $\log_x 3 - \log_{\frac{x}{3}} 3 < 0$

Ⓑ  $3\log_x 4 + 2\log_{4x} 4 + 3\log_{16x} 4 \leq 0$

Ⓒ  $\log_{2x} 64 + \log_{x^2} 16 \geq 3$

Ⓓ  $\log_x 2 \cdot \log_{2x} 2 > \log_{4x} 2$

ĐS: Ⓐ  $0 < x < 1 \vee x > 3$  Ⓑ  $x < \frac{1}{16} \vee \frac{1}{8} < x \leq \frac{1}{4} \vee \frac{1}{2} \leq x < 1$

Ⓒ  $\frac{1}{2} < x \leq \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \vee 1 < x \leq 4$  Ⓓ  $0 < x < \frac{1}{4} \vee \frac{1}{2^{\sqrt{2}}} < x < \frac{1}{2} \vee 1 < x < 2^{\sqrt{2}}$

**Bài 109.** Giải các bất phương trình sau:

Ⓐ  $\log_4 \log_3 \frac{x-1}{x+1} < \log_{\frac{1}{4}} \log_{\frac{1}{3}} \frac{x+1}{x-1}$

ĐS:  $x < -2 \vee 1 < x < 2$

Ⓑ  $\log_3 \log_4 \frac{3x-1}{x+1} < \log_{\frac{1}{3}} \log_{\frac{1}{4}} \frac{x+1}{3x-1}$

ĐS:  $x \leq -5 \vee x > 1$

**BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 7****Bài 110.** Giải các bất phương trình sau:

a)  $5^{\log_3\left(\frac{x-2}{x}\right)} < 1$

ĐS:  $x > 2$

b)  $2^{\log_2 x} \cdot 3^{\log_2 x - 1} \cdot 5^{\log_2 x - 2} \geq 12$

ĐS:  $x \geq 4$

c)  $\log_2 \log_{0,5} \left( 2^x - \frac{31}{16} \right) \leq 2$

ĐS:  $1 \leq x \leq \log_2 \frac{47}{16}$

d)  $\log_2 \left( \frac{x^2 + 8x - 1}{x + 1} \right) \leq 2$

ĐS:  $-4 - \sqrt{17} < x \leq -5 \vee -4 + \sqrt{17} < x \leq 1$

e)  $\log_2 x + \log_3 x < 1 + \log_2 x \cdot \log_3 x$

ĐS:  $0 < x < 2 \vee x > 3$

f)  $(4x^2 - 16x + 7) \cdot \log_3(x - 3) > 0$

ĐS:  $3 < x < \frac{7}{2} \vee x > 4$

g)  $\log_4 (x^2 - 7x + 12)^2 < \frac{1}{2} \log_{\sqrt{2}}(x - 2) + \log_2 |x - 4| - 1$

ĐS:  $\frac{8}{3} < x < 3 \vee 3 < x < 4$

h)  $2x + \log_2(x^2 - 4x + 4) > 2 - (x + 1) \log_{0,5}(2 - x)$

ĐS:  $x < -2 \vee 1 < x < 2$

**Bài 111.** Giải các bất phương trình sau:

a)  $\log_{\sin \frac{\pi}{3}}(x^2 - 3x + 2) \geq 2$

ĐS:  $\frac{1}{2} \leq x < 1 \vee 2 < x \leq \frac{5}{2}$

b)  $\log_{\sin \frac{\pi}{6}}(x^2 - 4x + 3) \geq -3$

ĐS:  $-1 \leq x < 1 \vee 3 < x \leq 5$

c)  $\log_{\sin \frac{\pi}{12}} \left( \frac{1}{6}x^2 - x + \frac{35}{24} \right) \geq 0$

ĐS:  $3 - \frac{\sqrt{2}}{2} \leq x < \frac{5}{2} \vee \frac{7}{2} < x \leq 3 + \frac{\sqrt{2}}{2}$

d)  $\log_{\frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{4}}(4x^2 - 16x + 15) \geq -2$

ĐS:  $\frac{1}{2} \leq x < \frac{3}{2} \vee \frac{5}{2} < x \leq \frac{7}{2}$

**Bài 112.** Giải các bất phương trình sau:

a)  $\log_3(5x^2 + 6x + 1) \leq 0$

ĐS:  $-\frac{6}{5} \leq x < -1 \vee -\frac{1}{5} < x \leq 0$

b)  $\log_{12}(6x^2 - 48x + 54) \leq 2$

ĐS:  $4 + \sqrt{7} < x \leq 4 + \sqrt{31} \vee 4 - \sqrt{31} \leq x < 4 - \sqrt{7}$

c)  $\log_{21}(x^2 + 2x - 3) \leq 1$

ĐS:  $-6 \leq x < -3 \vee 1 < x \leq 4$

d)  $\log_4(x^2 - 4x - 5) \leq 4$

ĐS:  $-3 \leq x < -1 \vee 5 < x \leq 7$

**Bài 113.** Giải các bất phương trình sau:

a)  $\log_x \left( x - \frac{1}{4} \right) \geq 2$

ĐS:  $\frac{1}{4} < x < 1$

b)  $\log_{x\sqrt{3}}(5x^2 - 18x + 16) > 2$

ĐS:  $\frac{\sqrt{3}}{3} < x < 1 \vee x > 8$

c)  $\log_{x^2+x+1}(\sqrt{2x^2-2x-1}) < \frac{1}{2}$

ĐS:  $-1 < x < \frac{1-\sqrt{3}}{2} \vee \frac{1+\sqrt{3}}{2} < x < 2$

$$\textcircled{d} \frac{\log_2(x^2 - 9x + 8)}{\log_2(3 - x)} < 2 \quad DS: -\frac{1}{3} < x < 1$$

$$\textcircled{e} \frac{\log_a(35 - x^3)}{\log_a(5 - x)} > 3 \quad (0 < a \neq 1) \quad DS: 2 < x < 3$$

$$\textcircled{f} \frac{\log_3(x-1)^4 - \log_4(x-1)^2}{x^2 - 2x + 3} < 0 \quad DS: -1 < x < 0 \vee 2 < x < 3$$

$$\textcircled{g} \frac{\log_5(x^2 - 4x - 11)^2 - \log_{11}(x^2 - 4x - 11)^3}{2 - 5x - 3x^2} \geq 0 \quad DS: x < -2 \vee -2 < x < 2 - \sqrt{15} \vee x \geq 6$$

$$\textcircled{h} \frac{\log_2(x+1)^2 - \log_3(x+1)^3}{x^2 - 3x - 4} > 0 \quad DS: -1 < x < 0 \vee x > 4$$

$$\textcircled{i} \frac{1}{\log_{\frac{1}{2}}(2x-1)} + \frac{1}{\log_2 \sqrt{x^2 - 3x + 2}} > 0 \quad DS: \frac{3+\sqrt{13}}{6} < x < 1 \vee x > \frac{3+\sqrt{15}}{2}$$

$$\textcircled{j} 3^{\frac{\log_3 \log_{\frac{1}{3}} \left( \frac{x^2}{2} + 2^{\log_2 x - 1} + 3 \right)}{2}} \geq 1 \quad DS: \frac{-1+\sqrt{73}}{2} \leq x < \frac{-1+\sqrt{217}}{2}$$

$$\textcircled{k} \frac{\log_3(3^x - 1)}{x - 1} \geq 1 \quad DS: 0 < x \leq 1 - \log_3 2 \vee x > 1$$

## Vấn đề 8. HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LÔGARIT

1. Hệ phương trình mũ – lôgarit là hệ phương trình trong đó có chứa các phương trình mũ – lôgarit.

### 2. Phương pháp giải

Để giải hệ phương trình mũ và lôgarit, ta cũng dùng các phương pháp giải hệ phương trình quen thuộc như: phương pháp thế, phương pháp cộng đại số, phương pháp đặt ẩn phụ, ... Cần chú ý ta rất hay dùng phương pháp đặt ẩn phụ đưa hệ đã cho về hệ đại số đã biết cách giải, từ đó suy ra các phương trình mũ và lôgarit cơ bản, đặc biệt có một số bài phức tạp ta cần sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải.

**Bài 114.** Giải các hệ phương trình sau:

$$\textcircled{a} \begin{cases} x + y = 20 \\ \log_4 x + \log_4 y = 1 + \log_4 9 \end{cases}$$

$$\textcircled{b} \begin{cases} x + y = 1 \\ 4^{-2x} + 4^{-2y} = 0,5 \end{cases}$$

$$\textcircled{c} \begin{cases} 3^{-x} \cdot 2^y = 1152 \\ \log_{\sqrt{5}}(x + y) = 2 \end{cases}$$

$$\textcircled{d} \begin{cases} x^2 - y^2 = 2 \\ \log_2(x + y) - \log_3(x - y) = 1 \end{cases}$$

$$\textcircled{e} \begin{cases} 3 \cdot 2^x + 2 \cdot 3^y = 2,75 \\ 2^x - 3^y = -0,75 \end{cases}$$

$$\textcircled{f} \begin{cases} \log_2(x - y) = 5 - \log_2(x + y) \\ \frac{\lg x - \lg 4}{\lg y - \lg 3} = -1 \end{cases}$$

$$\textcircled{g} \begin{cases} \log_5 x + \log_5 7 \cdot \log_7 y = 1 + \log_5 2 \\ 3 + \log_2 y = \log_2 5(1 + 3\log_5 x) \end{cases}$$

$$\textcircled{h} \begin{cases} 2\log_2 x - 3^y = 15 \\ 3^y \cdot \log_2 x = 2\log_2 x + 3^{y+1} \end{cases}$$

ĐS:  $\textcircled{a} (2;18), (18;2); \textcircled{b} (1/2;1/2); \textcircled{c} (-2;7); \textcircled{d} (3/2;1/2); \textcircled{e} (-2;0); \textcircled{f} (2;5); \textcircled{g} (6;2); \textcircled{h} (512;1)$

**Bài 115.** Giải các hệ phương trình sau:

$$\textcircled{a} \begin{cases} x + y = 11 \\ \log_2 x + \log_2 y = 1 + \log_2 15 \end{cases}$$

$$\textcircled{b} \begin{cases} \lg(x^2 + y^2) = 1 + \lg 8 \\ \lg(x + y) - \lg(x - y) = \lg 3 \end{cases}$$

$$\textcircled{c} \begin{cases} 3^x \cdot 2^y = 972 \\ \log_{\sqrt{3}}(x - y) = 2 \end{cases}$$

$$\textcircled{d} \begin{cases} x + y = 25 \\ \log_2 x - \log_2 y = 2 \end{cases}$$

$$\textcircled{e} \begin{cases} 3^x + 3^y = 4 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

$$\textcircled{f} \begin{cases} 3^{-x} + 3^{-y} = \frac{4}{9} \\ x + y = 3 \end{cases}$$

$$\textcircled{g} \begin{cases} 2^x + 5^{x+y} = 7 \\ 2^{x-1} \cdot 5^{y^{x+y}} = 5 \end{cases}$$

$$\textcircled{h} \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ \log_3(x + y) - \log_5(x - y) = 1 \end{cases}$$

ĐS:  $\textcircled{a} (5;6), (6;5) \textcircled{b} (8;4) \textcircled{c} (5;2) \textcircled{d} (20;5) \textcircled{e} (0;1), (1;0)$

$\textcircled{f} (1;2), (2;1) \textcircled{g} (\log_2 5; \log_5 2 - \log_2 5), (1;0) \textcircled{h} (2;1)$

**Bài 116.** Giải các hệ phương trình sau:

$$\textcircled{a} \begin{cases} \lg^2 x = \lg^2 y + \lg^2 xy \\ \lg^2(x - y) + \lg x \cdot \lg y = 0 \end{cases}$$

$$\textcircled{b} \begin{cases} 3^{\lg x} = 4^{\lg y} \\ (4x)^{\lg 4} = (3y)^{\lg 3} \end{cases}$$

$$\textcircled{c} \begin{cases} 4^{\log_3 xy} = 2 + (xy)^{\log_3 2} \\ x^2 + y^2 - 3x - 3y = 12 \end{cases}$$

$$\textcircled{d} \begin{cases} y = 1 + \log_2 x \\ x^y = 64 \end{cases}$$

$$\textcircled{e} \begin{cases} 5^{\ln x} = 6^{\ln y} \\ (6x)^{\ln 6} = (5y)^{\ln 5} \end{cases}$$

$$\textcircled{f} \begin{cases} 9x^2 - 4y^2 = 5 \\ \log_5 (3x + 2y) - \log_3 (3x - 2y) = 1 \end{cases}$$

$$\textcircled{g} \begin{cases} 5^x \cdot 2^y = 500 \\ \log_{\sqrt{2}} (2x - y) = 4 \end{cases}$$

$$\textcircled{h} \begin{cases} \log_{27} xy = 3 \log_{27} x \cdot \log_{27} y \\ \log_3 \frac{x}{y} = \frac{3 \log_3 x}{4 \log_3 y} \end{cases}$$

$$DS: \textcircled{a} (2;1), (\sqrt{2}; 1/\sqrt{2}) \textcircled{b} (1/4; 1/3) \textcircled{c} (3 - \sqrt{6}; 3 + \sqrt{6}), (3 + \sqrt{6}; 3 - \sqrt{6})$$

$$\textcircled{d} (4;3), (1/8; -2) \textcircled{e} (1/6; 1/5) \textcircled{f} (1;1) \textcircled{g} (3;2) \textcircled{h} (1/3; \sqrt{3}), (27; 3\sqrt{3})$$

**Bài 117.** Giải các hệ phương trình sau:

$$\textcircled{a} \begin{cases} \ln(1+x) - \ln(1+y) = x - y \\ x^2 - 12xy + 20y^2 = 0 \end{cases}$$

$$\textcircled{b} \begin{cases} x - y = (\log_2 y - \log_2 x)(2 + xy) \\ x^3 + y^3 = 16 \end{cases}$$

$$\textcircled{c} \begin{cases} 2^x - 2^y = (y - x)(xy + 2) \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$$

$$DS: \textcircled{a} (0;0) \textcircled{b} (2;2) \textcircled{c} (1;1), (-1;-1)$$

**Bài 118.** Giải các hệ phương trình sau:

$$\textcircled{a} \begin{cases} 4^{x+y-1} + 3 \cdot 4^{2y-1} \leq 2 \\ x + 3y \geq 2 - \log_4 3 \end{cases}$$

$$\textcircled{b} \begin{cases} \log_x (x+2) > 2 \\ \log_2 2^{x-1} + \log_2 (2^{x+1} + 1) < \log_2 (7 \cdot 2^x + 12) \end{cases}$$

$$\textcircled{c} \begin{cases} 3^{|x^2-2x-3| - \log_3 5} = 5^{-(y+4)} \\ 4|y| - |y-1| + (y+3)^2 \leq 8 \end{cases}$$

$$\textcircled{d} \begin{cases} \log_{x-1} (y+5) < 0 \\ \log_{y+2} (4-x) < 0 \end{cases}$$

$$DS: \textcircled{a} \left( \log_4 2\sqrt{3}; \log_4 \frac{2}{\sqrt{3}} \right) \textcircled{b} 1 < x < 2 \textcircled{c} (-1; -3), (3; -3) \textcircled{d} \begin{cases} 1 < x < 2 \\ -2 < y < -1 \end{cases}$$

## BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 8

**Bài 119.** Giải các hệ phương trình sau:

$$\textcircled{a} \begin{cases} 6^x - 2 \cdot 3^y = 2 \\ 6^x \cdot 3^y = 12 \end{cases}$$

$$\textcircled{b} \begin{cases} 2^{\frac{2x}{y}} = 2^5 \cdot 2^{\frac{3y}{x}} \\ \frac{y}{3^x} = 3 \cdot 3^{\frac{2(1-y)}{y}} \end{cases}$$

$$\textcircled{c} \begin{cases} 4^{-2x} + 4^{-2y} = \frac{1}{2} \\ x + y = 1 \end{cases}$$

$$\textcircled{d} \begin{cases} 3^x - 2^{y^2} = 77 \\ \frac{x}{3^2} - 2^{\frac{y^2}{2}} = 7 \end{cases}$$

$$\textcircled{e} \begin{cases} 64^{2x} + 64^{2y} = 12 \\ 64^{x+y} = 4\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{f} \begin{cases} 2^{3x} = 5y^2 - 4y \\ \frac{4^x + 2^{x+1}}{2^x + 2} = y \end{cases}$$

$$DS: \textcircled{a} (1; \log_3 2) \textcircled{b} \left( \frac{3}{2}; \frac{1}{2} \right), (-2; 4) \textcircled{c} \left( \frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right)$$

$$\textcircled{d} (4; \sqrt{2}), (4; -\sqrt{2}) \textcircled{e} \left( \frac{1}{6}; \frac{1}{4} \right), \left( \frac{1}{4}; \frac{1}{6} \right) \textcircled{f} (0;1), (2;4)$$

**Bài 120.** Giải các hệ phương trình sau:

$$\textcircled{a} \begin{cases} xy = 1 \\ \lg^2 x + \lg^2 y = 2 \end{cases}$$

$$\textcircled{b} \begin{cases} \log_{\frac{1}{4}}(y-x) - \log_4 \frac{1}{y} = 1 \\ x^2 + y^5 = 25 \end{cases}$$

$$\textcircled{c} \begin{cases} x - 4|y| + 3 = 0 \\ \sqrt{\log_4 x} - \sqrt{\log_2 y} = 0 \end{cases}$$

$$\textcircled{d} \begin{cases} \log_3 x + \log_3 y = 1 + \log_3 2 \\ x - y = 10 \end{cases}$$

**Bài 121.** Giải các hệ phương trình sau:

$$\textcircled{a} \begin{cases} \log_x(11x + 14y) = 3 \\ \log_y(11y + 14x) = 3 \end{cases} \quad DS: (5;5)$$

$$\textcircled{b} \begin{cases} \log_x(x^3 + 2x^2 - 3x - 5y) = 3 \\ \log_y(y^3 + 2y^2 - 3y - 5x) = 3 \end{cases} \quad DS: (4;4)$$

$$\textcircled{c} \begin{cases} \log_x(3x + 5y) + \log_y(3y + 5x) = 4 \\ \log_x(3x + 5y) \cdot \log_y(3y + 5x) = 4 \end{cases} \quad DS: (8;8)$$

$$\textcircled{d} \begin{cases} \log_4(x^2 + y^2) - \log_4(2x) + 1 = \log_4(x + 3y) \\ \log_4(xy + 1) - \log_4(4y^2 + 2y - 2x + 4) + 1 = \log_4\left(\frac{x}{y}\right) - 1 \end{cases} \quad DS: (2;1);(t;t) \text{ với } t > 0$$

$$\textcircled{e} \begin{cases} 9^{\log_2(xy)} - 3 + 2(xy)^{\log_2 3} \\ x^2 + y^2 = 3x + 3y + 6 \end{cases} \quad DS: \left(\frac{5-\sqrt{17}}{2}; \frac{5+\sqrt{17}}{2}\right), \left(\frac{5+\sqrt{17}}{2}; \frac{5-\sqrt{17}}{2}\right)$$

**Bài 122.** Giải các hệ bất phương trình sau:

$$\textcircled{a} \begin{cases} 2^{x^2-2x+3-\log_2 3} = 3^{-y-4} \\ 4|y| - |y-1| + (y+3)^2 \leq 8 \end{cases} \quad DS: \begin{cases} x = -1 \\ y = -3 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 3 \\ y = -3 \end{cases}$$

$$\textcircled{b} \begin{cases} \log_2^2 x - \log_2 x^2 < 0 \\ \frac{x^3}{3} - 3x^2 + 5x + 9 > 0 \end{cases} \quad DS: 1 < x < 4$$

$$\textcircled{c} \begin{cases} (x-1)\lg 2 + \lg(2^{x+1} + 1) < \lg(7 \cdot 2^x + 12) \\ \log_x(x+2) > 2 \end{cases} \quad DS: 1 < x < 2$$

**Bài 123.** Tìm  $a$  để hệ bất phương trình sau có nghiệm  $\begin{cases} 3^x - 4 \geq 5^{\frac{x}{2}} \\ 1 + \log_2(a-x) \geq \log_2(x^4 + 1) \end{cases} \quad DS: a \geq \frac{21}{2}$

# Vấn đề 9. PHƯƠNG TRÌNH ✖ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LÔGARIT CÓ THAM SỐ

## Phương pháp giải

- ✓ Đặt ẩn phụ.
- ✓ Dựa vào điều kiện của biến suy ra miền giá trị của ẩn phụ.

**Bài 124.** Tìm điều kiện của  $m$  để mỗi hàm số sau xác định với mọi  $x$ :

Ⓐ  $y = \log_5(x^2 - mx + m + 2)$

Ⓑ  $y = \frac{1}{\sqrt{\log_3(x^2 - 2x + 3m)}}$

ĐS: Ⓐ  $2 - 2\sqrt{3} < m < 2 + 2\sqrt{3}$  Ⓑ  $m > 2/3$

**Bài 125.** Cho phương trình:  $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 2m = 0$

Ⓐ Giải phương trình khi  $m = 2$ .

ĐS: Ⓐ  $x = 1$ ; Ⓑ  $m = 4$

Ⓑ Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để phương trình có hai nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$  sao cho  $x_1 + x_2 = 3$ .

**Bài 126.** Tìm  $m$  để phương trình sau có nghiệm:  $(m-2)4^{x^2+1} - (m+1)2^{x^2+1} + 2m - 6 = 0$  ĐS:  $2 < m \leq 4$

**Bài 127.** Tìm  $m$  để phương trình:  $9^x - m \cdot 3^x + 2m + 1 = 0$  có nghiệm. ĐS:  $m < -1/2 \vee m \geq 4 + 2\sqrt{5}$

**Bài 128.** Tìm  $m$  để phương trình:  $4(\log_2 \sqrt{x})^2 - \log_{\frac{1}{2}} x + m = 0$  có nghiệm thuộc  $(0;1)$ . ĐS:  $m \leq 1/4$

**Bài 129.** Cho phương trình:  $(2 + \sqrt{3})^x + (2 - \sqrt{3})^x = m$

Ⓐ Giải phương trình khi  $m = 4$ .

Ⓑ Tìm  $m$  để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

ĐS: Ⓐ  $x = 1$ ; Ⓑ  $m = 4$

**Bài 130.** Cho phương trình:  $m \cdot 16^x + 2 \cdot 81^x = 5 \cdot 36^x$

Ⓐ Giải phương trình khi  $m = 3$ .

ĐS: Ⓐ  $x = 0 \vee x = 1/2$ ; Ⓑ  $m \leq 0 \vee m = 25/28$

Ⓑ Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để phương trình có nghiệm duy nhất.

**Bài 131.** Cho phương trình:  $4^x - 4m(2^x - 1) = 0$

Ⓐ Giải phương trình khi  $m = 1$ .

Ⓑ Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để phương trình có nghiệm.

ĐS: Ⓐ  $\forall n$ ; Ⓑ  $m < 0 \vee m > 1$

**Bài 132.** Tìm  $m$  để phương trình:  $4^x + 2^{x+1} + m = 0$  có nghiệm. ĐS:  $m \leq 1$

**Bài 133.** Cho hệ phương trình: 
$$\begin{cases} \frac{1}{2} \log_3 x^2 - \log_3 y = 0 \\ |x|^3 + y^2 - my = 0 \end{cases}$$

Ⓐ Giải hệ khi  $m = 2$ .

Ⓑ Định  $m$  để hệ phương trình có nghiệm.

ĐS: a.  $(1;1), (-1;1)$ ; b.  $m > 0$

**Bài 134.** Cho hệ phương trình:

$$\begin{cases} 9x^2 - 4y^2 = 5 \\ \log_m(3x + 2y) - \log_3(3x - 2y) = 1 \end{cases}$$

*ĐS: a. (1;1); b. m = 5*

Ⓐ Giải hệ khi  $m = 5$ .

Ⓑ Tìm giá trị lớn nhất của  $m$  sao cho hệ phương trình trên có nghiệm  $(x; y)$  thỏa mãn:  
 $3x + 2y \leq 5$ .

**Bài 135.** Tìm  $m$  để hệ bất phương trình sau có nghiệm:

$$\begin{cases} 7^{2x+\sqrt{x+1}} - 7^{2+\sqrt{x+1}} + 2009x \leq 2009 \\ x^2 - (m+2)x + 2m + 3 \geq 0 \end{cases}$$

*ĐS:  $m \geq -2$*

BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 9

**Bài 136.** Cho phương trình:  $4^x - 4m(2^x - 1) = 0$

Ⓐ Giải phương trình khi  $m = 1$ .

Ⓑ Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để phương trình có nghiệm. *ĐS: Ⓐ  $\forall n$ ; Ⓑ  $m < 0 \vee m > 1$*

**Bài 137.** Tìm  $m$  để phương trình:  $4^x + 2^{x+1} + m = 0$  có nghiệm.

*ĐS:  $m \leq 1$*

**Bài 138.** Cho phương trình:  $25^{1+2x-x^2} + m.9^{2x-x^2} = (3m+7).15^{2x-x^2}$

Ⓐ Giải phương trình khi  $m = 9$ .

Ⓑ Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để phương trình có nghiệm  $x \in [0; 2]$ .

*ĐS: Ⓐ  $x = 0 \vee x = 2 \vee x = 1 \pm \sqrt{3}$ ; Ⓑ  $9 \leq m \leq \frac{130}{9}$*

**Bài 139.** Cho phương trình:  $(\sqrt{5} + 1)^x + a(\sqrt{5} - 1)^x = 2^x$

*ĐS: Ⓐ  $x = -\log_{\frac{\sqrt{5}+1}{2}} 2$ ; Ⓑ  $a \leq 0 \vee a = \frac{1}{4}$*

Ⓐ Giải phương trình khi  $a = \frac{1}{4}$ .

Ⓑ Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để phương trình có nghiệm duy nhất.

**Bài 140.** Cho phương trình:  $(3 + 2\sqrt{2})^{\tan x} + (3 - 2\sqrt{2})^{\tan x} = m$

*ĐS: Ⓐ  $x = \pm \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ; Ⓑ  $m > 2$*

Ⓐ Giải phương trình khi  $m = 6$ .

Ⓑ Tìm  $m$  để phương trình có đúng 2 nghiệm trong khoảng  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ .

**Bài 141.** Với giá trị nào của  $m$  thì các phương trình sau có nghiệm duy nhất:

Ⓐ  $\log_{2+\sqrt{3}}[x^2 - 2(m+1)x] + \log_{2-\sqrt{3}}(2x + m - 2) = 0$  *ĐS:  $-\frac{2}{5} \leq x \leq 2 \vee m = \frac{\sqrt{17}-5}{2}$*

Ⓑ  $\frac{\lg(mx)}{\lg(x+1)} = 2$  *ĐS:  $m < 0 \vee m = 4$*



$$\textcircled{c} \log_3(x^2 + 4mx) + \log_{\frac{1}{3}}(2x - 2m - 1) = 0$$

$$ĐS: -\frac{1}{2} \leq m \leq -\frac{1}{10} \vee m = 0$$

$$\textcircled{d} \lg(x^2 + 2mx) - \lg(8x - 6m - 3) = 0$$

$$ĐS: -\frac{1}{2} \leq m \leq \frac{3}{22} \vee m = 1$$

**Bài 142.** Tìm  $m$  để bất phương trình sau đây có nghiệm:  $3^{2x+1} - (m+3)3^x - 2(m+3) < 0$   $ĐS: m > -3$

**Bài 143.** Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để bất phương trình thỏa với mọi  $x$ .

$$\textcircled{a} 9^x - 2(m+1)3^x - 2m - 3 > 0$$

$$ĐS: m \leq -\frac{3}{2}$$

$$\textcircled{b} m.4^x + (m-1)2^{x+2} + m - 1 > 0$$

$$ĐS: m \geq 1$$

$$\textcircled{c} m.25^x + 4(m-1)5^x + m - 1 > 0$$

$$ĐS: m \geq 1$$

$$\textcircled{d} (m-1)4^x + 2^{x+1} + m + 1 > 0$$

$$ĐS: m \geq 1$$

$$\textcircled{e} (m+2)4^{|x-1|} - 2m.2^{|x-1|} + 3m + 1 > 0$$

$$ĐS: m > -\frac{3}{2}$$

$$\textcircled{f} 4^x - 2(m+2).2^x + m^2 + 2m + 2 > 0$$

$$ĐS: m < -1$$

**Bài 144.** Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để bất phương trình:

$$\textcircled{a} (3m+1).12^x + (2-m).6^x + 3^x < 0 \text{ thỏa } \forall x > 0$$

$$ĐS: m \leq -2$$

$$\textcircled{b} m.9^x - (2m+1).6^x + m.4^x \leq 0 \text{ thỏa } \forall x \in [0; 1]$$

$$ĐS: m \leq 6$$

$$\textcircled{c} m.9^{2x^2-x} - (2m+1).6^{2x^2-x} + m.4^{2x^2-x} \leq 0 \forall x \notin \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$$

$$ĐS: m \leq 0$$

**Bài 145.** Cho bất phương trình:  $a.9^x + 4(a-1)3^{x+1} + a > 1$

$$\textcircled{a} \text{ Giải bất phương trình khi } a = 2.$$

$$\textcircled{b} \text{ Tìm tất cả các giá trị của } a \text{ để bất phương trình thỏa với mọi } x.$$

$$ĐS: a. x \in \mathbb{R}; b. a \geq 1$$

**Bài 146.** Tìm  $m$  để mọi nghiệm của bất phương trình  $2^{2x+1} - 9.2^x + 4 \leq 0$  cũng là nghiệm của bất phương trình  $(m^2 + m + 1)x + 3x + 1 > 0$   $ĐS: 0 < m < 2$

**Bài 147.** Tìm  $m$  để mọi nghiệm của bất phương trình  $2^{\frac{2}{x}} - 2^{1+\frac{1}{x}} > 8$  cũng là nghiệm của bất phương trình  $4x^2 - 2mx + (m+1)^2 < 0$   $ĐS: m \leq 0 \vee m \geq 1$

**Bài 148.** Tìm  $m$  để mọi nghiệm của bất phương trình  $\log_{\frac{2}{2}} x + \log_{\frac{1}{4}} x^2 < 0$  cũng là nghiệm của bất

$$\text{phương trình } x^2 + mx + m^2 + 6m < 0$$

$$ĐS: \frac{-7-3\sqrt{5}}{2} < m < -4+2\sqrt{3}$$

**Bài 149.** Tìm  $m$  để mọi nghiệm của bất phương trình  $\log_5 \sqrt{3x+4} \cdot \log_x 5 > 1$  cũng là nghiệm của bất phương trình  $1 + \log_5(x^2 + 1) + \log_{\frac{1}{5}}(x^2 + 4x + 2m) > 0$   $ĐS: -\frac{5}{2} \leq m \leq \frac{5}{2}$

**Bài 150.** Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để bất phương trình thỏa với mọi  $x$ .

$$\textcircled{a} \log_2(7x^2 + 7) \geq \log_2(mx^2 + 4x + m)$$

$$ĐS: 2 < m \leq 5$$

$$\textcircled{b} \log_m(x^2 - 2x + m + 1) > 0$$

$$ĐS: m > 1$$

**Bài 151.** Tìm các giá trị của  $m$  để bất phương trình thỏa với mọi  $x \in (2; 3)$ .

$$\log_5(x^2 + 4x + m) - \log_5(x^2 + 1) < 1$$

$$ĐS: -12 \leq m \leq 13$$

# BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

(trích từ bộ BTN – 387 câu + 7 đề của BGD – 68 câu)

## Vấn đề 1. LŨY THỪA

**Câu 1.** Khẳng định nào sau đây đúng :

- A.  $a^{-n}$  xác định với mọi  $\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}; \forall n \in \mathbb{N}$ . B.  $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}; \forall a \in \mathbb{R}$ .  
 C.  $a^0 = 1; \forall a \in \mathbb{R}$ . D.  $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}; \forall a \in \mathbb{R}; \forall m, n \in \mathbb{Z}$ .

**Câu 2.** Tìm  $x$  để biểu thức  $(2x-1)^{-2}$  có nghĩa.

- A.  $\forall x \neq \frac{1}{2}$ . B.  $\forall x > \frac{1}{2}$ . C.  $\forall x \in \left(\frac{1}{2}; 2\right)$ . D.  $\forall x \geq \frac{1}{2}$ .

**Câu 3.** Tìm  $x$  để biểu thức  $(x^2-1)^{\frac{1}{3}}$  có nghĩa.

- A.  $\forall x \in (-\infty; 1] \cup [1; +\infty)$ . B.  $\forall x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ .  
 C.  $\forall x \in (-1; 1)$ . D.  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ .

**Câu 4.** Tìm  $x$  để biểu thức  $(x^2+x+1)^{\frac{2}{3}}$  có nghĩa.

- A.  $\forall x \in \mathbb{R}$ . B. Không tồn tại  $x$ . C.  $\forall x > 1$ . D.  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

**Câu 5.** Các căn bậc hai của 4 là

- A. -2. B. 2. C.  $\pm 2$ . D. 16

**Câu 6.** Cho  $a \in \mathbb{R}$  và  $n = 2k (k \in \mathbb{N}^*)$ ,  $a^n$  có căn bậc  $n$  là

- A.  $a$ . B.  $|a|$ . C.  $-a$ . D.  $a^{\frac{n}{2}}$ .

**Câu 7.** Cho  $a \in \mathbb{R}$  và  $n = 2k+1 (k \in \mathbb{N}^*)$ ,  $a^n$  có căn bậc  $n$  là

- A.  $a^{\frac{n}{2n+1}}$ . B.  $|a|$ . C.  $-a$ . D.  $a$ .

**Câu 8.** Phương trình  $x^{2016} = 2017$  có tập nghiệm trong  $\mathbb{R}$  là

- A.  $T = \{\pm \sqrt[2016]{2016}\}$  B.  $T = \{\pm \sqrt[2016]{2017}\}$  C.  $T = \{\sqrt[2016]{2017}\}$  D.  $T = \{-\sqrt[2016]{2017}\}$

**Câu 9.** Các căn bậc bốn của 81 là

- A. 3. B.  $\pm 3$ . C. -3. D.  $\pm 9$

**Câu 10.** Khẳng định nào sau đây sai?

- A. Có một căn bậc  $n$  của số 0 là 0. B.  $-\frac{1}{3}$  là căn bậc 5 của  $-\frac{1}{243}$ .  
 C. 4 có một căn bậc hai. D. Các căn bậc 8 của 2 được viết là  $\pm \sqrt[8]{2}$ .

**Câu 11.** Tính giá trị biểu thức  $\left(\frac{1}{16}\right)^{-0,75} + \left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{4}{3}}$ , ta được :

- A. 12. B. 16. C. 18. D. 24

**Câu 12.** Viết biểu thức  $\sqrt{a}\sqrt{a}$  ( $a > 0$ ) về dạng lũy thừa của  $a$ , ta được:

- A.  $a^{\frac{5}{4}}$ . B.  $a^{\frac{1}{4}}$ . C.  $a^{\frac{3}{4}}$ . D.  $a^{\frac{1}{2}}$

- Câu 13.** Viết biểu thức  $\frac{\sqrt{2\sqrt[3]{4}}}{16^{0,75}}$  về dạng lũy thừa  $2^m$  với giá trị của  $m$  là
- A.  $-\frac{13}{6}$ .      B.  $\frac{13}{6}$ .      C.  $\frac{5}{6}$ .      D.  $-\frac{5}{6}$ .
- Câu 14.** Các căn bậc bảy của 128 là
- A.  $-2$ .      B.  $\pm 2$ .      C.  $2$ .      D.  $8$ .
- Câu 15.** Viết biểu thức  $\sqrt[5]{\frac{b}{a}\sqrt[3]{\frac{a}{b}}}$ ,  $(a, b > 0)$  về dạng lũy thừa  $\left(\frac{a}{b}\right)^m$ , với giá trị của  $m$  là
- A.  $\frac{2}{15}$ .      B.  $\frac{4}{15}$ .      C.  $\frac{2}{5}$ .      D.  $\frac{-2}{15}$ .
- Câu 16.** Cho  $a > 0$ ;  $b > 0$ . Viết biểu thức  $a^{\frac{2}{3}}\sqrt{a}$  về dạng  $a^m$  và biểu thức  $b^{\frac{2}{3}}:\sqrt{b}$  về dạng  $b^n$ . Ta có  $m+n=?$
- A.  $\frac{1}{3}$ .      B.  $-1$ .      C.  $1$ .      D.  $\frac{1}{2}$ .
- Câu 17.** Cho  $x > 0$ ;  $y > 0$ . Viết biểu thức  $x^{\frac{4}{5}}\sqrt[6]{x^5}\sqrt{x}$  về dạng  $x^m$  và biểu thức  $y^{\frac{4}{5}}:\sqrt[6]{y^5}\sqrt{y}$  về dạng  $y^n$ . Giá trị của biểu thức  $m-n$  là
- A.  $-\frac{11}{6}$ .      B.  $\frac{11}{6}$ .      C.  $\frac{8}{5}$ .      D.  $-\frac{8}{5}$ .
- Câu 18.** Viết biểu thức  $\sqrt{\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt[4]{8}}}$  về dạng  $2^x$  và biểu thức  $\frac{2\sqrt{8}}{\sqrt[3]{4}}$  về dạng  $2^y$ . Ta có  $x^2+y^2=?$
- A.  $\frac{2017}{567}$ .      B.  $\frac{11}{6}$ .      C.  $\frac{53}{24}$ .      D.  $\frac{2017}{576}$ .
- Câu 19.** Cho  $f(x)=\sqrt[3]{x}\sqrt[6]{x}$  khi đó  $f(0,09)$  bằng :
- A.  $0,09$ .      B.  $0,9$ .      C.  $0,03$ .      D.  $0,3$ .
- Câu 20.** Cho  $f(x)=\frac{\sqrt{x}\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[6]{x}}$  khi đó  $f(1,3)$  bằng:
- A.  $0,13$ .      B.  $1,3$ .      C.  $0,013$ .      D.  $13$ .
- Câu 21.** Cho  $f(x)=\sqrt[3]{x}\sqrt[4]{x}\sqrt[12]{x^5}$ . Khi đó  $f(2,7)$  bằng
- A.  $0,027$ .      B.  $0,27$ .      C.  $2,7$ .      D.  $27$ .
- Câu 22.** Đơn giản biểu thức  $\sqrt{81a^4b^2}$ , ta được:
- A.  $-9a^2|b|$ .      B.  $9a^2|b|$ .      C.  $9a^2b$ .      D.  $3a^2|b|$ .
- Câu 23.** Đơn giản biểu thức  $\sqrt[4]{x^8(x+1)^4}$ , ta được:
- A.  $x^2(x+1)$ .      B.  $-x^2(x+1)$ .      C.  $x^2(x-1)$ .      D.  $x^2|x+1|$ .
- Câu 24.** Đơn giản biểu thức  $\sqrt[3]{x^3(x+1)^9}$ , ta được:
- A.  $-x(x+1)^3$ .      B.  $x(x+1)^3$ .      C.  $|x(x+1)^3|$ .      D.  $x|(x+1)^3|$ .
- Câu 25.** Khẳng định nào sau đây đúng?
- A.  $a^0=1, \forall a$ .      B.  $a^2>1 \Leftrightarrow a>1$ .      C.  $2\sqrt{3}<3\sqrt{2}$ .      D.  $\left(\frac{1}{4}\right)^{-1}<\left(\frac{1}{4}\right)^2$ .

**Câu 26.** Nếu  $(2\sqrt{3}-1)^{a+2} < 2\sqrt{3}-1$  thì

- A.  $a < -1$ . B.  $a < 1$ . C.  $a > -1$ . D.  $a \geq -1$ .

**Câu 27.** Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào **sai**?

- A.  $(0,01)^{-\sqrt{2}} > (10)^{-\sqrt{2}}$ . B.  $(0,01)^{-\sqrt{2}} < (10)^{-\sqrt{2}}$ .  
C.  $(0,01)^{-\sqrt{2}} = (10)^{-\sqrt{2}}$ . D.  $a^0 = 1, \forall a \neq 0$ .

**Câu 28.** Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào **đúng**?

- A.  $(2-\sqrt{2})^3 < (2-\sqrt{2})^4$ . B.  $(\sqrt{11}-\sqrt{2})^6 > (\sqrt{11}-\sqrt{2})^7$ .  
C.  $(4-\sqrt{2})^3 < (4-\sqrt{2})^4$ . D.  $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^4 < (\sqrt{3}-\sqrt{2})^5$ .

**Câu 29.** Nếu  $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{2m-2} < \sqrt{3}+\sqrt{2}$  thì

- A.  $m > \frac{3}{2}$ . B.  $m < \frac{1}{2}$ . C.  $m > \frac{1}{2}$ . D.  $m \neq \frac{3}{2}$ .

**Câu 30.** Cho  $n$  nguyên dương thỏa mãn  $n \geq 2$ , khẳng định nào sau đây là khẳng định **đúng**?

- A.  $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \forall a > 0$ . B.  $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \forall a \neq 0$ . C.  $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \forall a \geq 0$ . D.  $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \forall a \in \mathbb{R}$ .

**Câu 31.** Khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

- A.  $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b} \forall a, b$ . B.  $\sqrt[n]{a^{2n}} \geq 0 \forall a, n$  nguyên dương ( $n \geq 1$ ).  
C.  $\sqrt[n]{a^{2n}} = |a| \forall a, n$  nguyên dương ( $n \geq 1$ ). D.  $\sqrt[4]{a^2} = \sqrt{a} \forall a \geq 0$ .

**Câu 32.** Cho  $a > 0, b < 0$ , khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

- A.  $\sqrt[4]{a^4 b^4} = ab$ . B.  $\sqrt[3]{a^3 b^3} = ab$ . C.  $\sqrt{a^2 b^2} = |ab|$ . D.  $\sqrt{a^4 b^2} = -a^2 b$ .

**Câu 33.** Tìm điều kiện của  $a$  để khẳng định  $\sqrt{(3-a)^2} = a-3$  là khẳng định **đúng**?

- A.  $\forall a \in \mathbb{R}$ . B.  $a \leq 3$ . C.  $a > 3$ . D.  $a \geq 3$ .

**Câu 34.** Cho  $a$  là số thực dương,  $m, n$  tùy ý. Phát biểu nào sau đây là phát biểu **sai**?

- A.  $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ . B.  $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ . C.  $(a^m)^n = a^{m+n}$ . D.  $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ .

**Câu 35.** Bạn An trong quá trình biến đổi đã làm như sau:  $\sqrt[3]{-27} \stackrel{(1)}{=} (-27)^{\frac{1}{3}} \stackrel{(2)}{=} (-27)^{\frac{2}{6}} \stackrel{(3)}{=} \sqrt[6]{(-27)^2} \stackrel{(4)}{=} 3$  bạn đã **sai** ở bước nào?

- A. (4). B. (2). C. (3). D. (1).

**Câu 36.** Nếu  $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^x > \sqrt{3}+\sqrt{2}$  thì

- A.  $\forall x \in \mathbb{R}$ . B.  $x < 1$ . C.  $x > -1$ . D.  $x < -1$ .

**Câu 37.** Với giá trị nào của  $a$  thì phương trình  $2^{ax^2-4x-2a} = \frac{1}{(\sqrt{2})^{-4}}$  có hai nghiệm thực phân biệt.

- A.  $a \neq 0$ . B.  $\forall a \in \mathbb{R}$ . C.  $a \geq 0$ . D.  $a > 0$

**Câu 38.** Tìm biểu thức không có nghĩa trong các biểu thức sau:

- A.  $(-3)^{-4}$ . B.  $(-3)^{-\frac{1}{3}}$ . C.  $0^4$ . D.  $\left(\frac{1}{2^{-3}}\right)^0$ .

- Câu 39.** Đơn giản biểu thức  $P = a^{\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{1}{a}\right)^{\sqrt{2}-1}$  được kết quả là
- A.  $a^{\sqrt{2}}$ .                      B.  $a^{2\sqrt{2}-1}$ .                      C.  $a^{1-\sqrt{2}}$ .                      D.  $a$ .
- Câu 40.** Biểu thức  $(a+2)^\pi$  có nghĩa với :
- A.  $a > -2$ .                      B.  $\forall a \in \mathbb{R}$ .                      C.  $a > 0$ .                      D.  $a < -2$
- Câu 41.** Ch  $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, \forall ab \geq 0, b \neq 0$  khẳng định nào sau đây **đúng**?
- A.  $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}, \forall a \neq 0$ .      B.  $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}, \forall a > 0$ .      C.  $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}, \forall a \geq 0$ .      D.  $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}, \forall a \in \mathbb{R}$ .
- Câu 42.** Nếu  $a^{\frac{1}{2}} > a^{\frac{1}{6}}$  và  $b^{\sqrt{2}} > b^{\sqrt{3}}$  thì
- A.  $a > 1; 0 < b < 1$ .                      B.  $a > 1; b < 1$ .                      C.  $0 < a < 1; b < 1$ .                      D.  $a < 1; 0 < b < 1$
- Câu 43.** Cho  $a, b$  là các số dương. Rút gọn biểu thức  $P = \frac{\left(\sqrt[4]{a^3 \cdot b^2}\right)^4}{\sqrt[3]{\sqrt{a^{12} \cdot b^6}}}$  được kết quả là
- A.  $ab^2$ .                      B.  $a^2b$ .                      C.  $ab$ .                      D.  $a^2b^2$ .
- Câu 44.** Cho  $3^{|\alpha|} < 27$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
- A.  $\begin{cases} \alpha < -3 \\ \alpha > 3 \end{cases}$ .                      B.  $\alpha > 3$ .                      C.  $\alpha < 3$ .                      D.  $-3 < \alpha < 3$ .
- Câu 45.** Giá trị của biểu thức  $A = (a+1)^{-1} + (b+1)^{-1}$  với  $a = (2+\sqrt{3})^{-1}$  và  $b = (2-\sqrt{3})^{-1}$
- A. 3.                      B. 2.                      C. 1.                      D. 4.
- Câu 46.** Với giá trị nào của  $x$  thì đẳng thức  $\sqrt[2016]{x^{2016}} = -x$  đúng
- A. Không có giá trị  $x$  nào.                      B.  $x \geq 0$ .  
C.  $x = 0$ .                      D.  $x \leq 0$ .
- Câu 47.** Với giá trị nào của  $x$  thì đẳng thức  $\sqrt[2017]{x^{2017}} = x$  đúng
- A.  $x \geq 0$ .                      B.  $\forall x \in \mathbb{R}$ .  
C.  $x = 0$ .                      D. Không có giá trị  $x$  nào.
- Câu 48.** Với giá trị nào của  $x$  thì đẳng thức  $\sqrt[4]{x^4} = \frac{1}{|x|}$  đúng
- A.  $x \neq 0$ .                      B.  $x \geq 0$ .  
C.  $x \neq \pm 1$ .                      D. Không có giá trị  $x$  nào.
- Câu 49.** Căn bậc 4 của 3 là
- A.  $\sqrt[3]{4}$ .                      B.  $\sqrt[4]{3}$ .                      C.  $-\sqrt[4]{3}$ .                      D.  $\pm\sqrt[4]{3}$ .
- Câu 50.** Căn bậc 3 của  $-4$  là
- A.  $\pm\sqrt[3]{-4}$ .                      B.  $\sqrt[3]{-4}$ .                      C.  $-\sqrt[3]{-4}$ .                      D. Không có.
- Câu 51.** Căn bậc 2017 của  $-2017$  là
- A.  $-\sqrt[2016]{2016}$ .                      B. Không có.                      C.  $\sqrt[2016]{-2016}$ .                      D.  $\sqrt[2016]{2016}$ .
- Câu 52.** Trong các biểu thức sau biểu thức nào không có nghĩa
- A.  $(-2016)^0$ .                      B.  $(-2016)^{2016}$ .                      C.  $0^{-2016}$ .                      D.  $(-2016)^{-2016}$ .



**Câu 65.** Cho hai số thực dương  $a$  và  $b$ . Biểu thức  $\sqrt[5]{\frac{a}{b}}\sqrt[3]{\frac{b}{a}}\sqrt{\frac{a}{b}}$  được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

- A.  $x^{\frac{7}{30}}$ .      B.  $\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{31}{30}}$ .      C.  $\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{30}{31}}$ .      D.  $\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{6}}$ .

**Câu 66.** Cho các số thực dương  $a$  và  $b$ . Rút gọn biểu thức  $P = \left(a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{2}{3}}\right) \cdot \left(a^{\frac{2}{3}} + a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{4}{3}}\right)$  được kết quả là

- A.  $a - b$ .      B.  $a - b^2$ .      C.  $b - a$ .      D.  $a^3 - b^3$ .

**Câu 67.** Cho các số thực dương  $a$  và  $b$ . Rút gọn biểu thức  $P = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt[4]{a} - \sqrt[4]{b}} - \frac{\sqrt{a} + \sqrt[4]{ab}}{\sqrt[4]{a} + \sqrt[4]{b}}$  được kết quả là

- A.  $\sqrt[4]{b}$ .      B.  $\sqrt[4]{a} - \sqrt[4]{b}$ .      C.  $b - a$ .      D.  $\sqrt[4]{a}$ .

**Câu 68.** Cho các số thực dương  $a$  và  $b$ . Rút gọn biểu thức  $P = \left(\frac{a+b}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} - \sqrt[3]{ab}\right) : (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})^2$  được kết quả là

- A.  $-1$ .      B.  $1$ .      C.  $2$ .      D.  $-2$ .

**Câu 69.** Cho các số thực dương  $a$  và  $b$ . Biểu thức thu gọn của biểu thức  $P = \frac{a^{\frac{1}{3}}\sqrt[3]{b} + b^{\frac{1}{3}}\sqrt[3]{a}}{\sqrt[6]{a} + \sqrt[6]{b}} - \sqrt[3]{ab}$  là

- A.  $0$ .      B.  $-1$ .      C.  $1$ .      D.  $-2$ .

**Câu 70.** Cho số thực dương  $a$ . Biểu thức thu gọn của biểu thức  $P = \frac{a^{\frac{4}{3}}\left(a^{-\frac{1}{3}} + a^{\frac{2}{3}}\right)}{a^{\frac{1}{4}}\left(a^{\frac{3}{4}} + a^{-\frac{1}{4}}\right)}$  là

- A.  $1$ .      B.  $a + 1$ .      C.  $2a$ .      D.  $a$ .

**Câu 71.** Cho  $a > 0, b > 0$ . Biểu thức thu gọn của biểu thức  $P = \left(a^{\frac{1}{4}} - b^{\frac{1}{4}}\right) \cdot \left(a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{1}{4}}\right) \cdot \left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}\right)$  là

- A.  $\sqrt[10]{a} - \sqrt[10]{b}$ .      B.  $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ .      C.  $a - b$ .      D.  $\sqrt[8]{a} - \sqrt[8]{b}$ .

**Câu 72.** Cho  $a > 0, b > 0$ . Biểu thức thu gọn của biểu thức  $P = \left(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}\right) : \left(2 + \sqrt[3]{\frac{a}{b}} + \sqrt[3]{\frac{b}{a}}\right)$  là

- A.  $\sqrt[3]{ab}$ .      B.  $\frac{\sqrt[3]{ab}}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}}$ .      C.  $\frac{\sqrt[3]{ab}}{(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})^3}$ .      D.  $\sqrt[3]{ab}(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})$ .

**Câu 73.** Cho  $a > 0, b > 0$  và  $a \neq b$ . Biểu thức thu gọn của biểu thức  $P = \frac{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}}{\sqrt[6]{a} - \sqrt[6]{b}}$  là

- A.  $\sqrt[6]{a} + \sqrt[6]{b}$ .      B.  $\sqrt[6]{a} - \sqrt[6]{b}$ .      C.  $\sqrt[3]{b} - \sqrt[3]{a}$ .      D.  $\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}$ .

**Câu 74.** So sánh hai số  $m$  và  $n$  nếu  $3, 2^m < 3, 2^n$  thì:

- A.  $m > n$ .      B.  $m = n$ .  
C.  $m < n$ .      D. Không so sánh được.

**Câu 75.** So sánh hai số  $m$  và  $n$  nếu  $(\sqrt{2})^m < (\sqrt{2})^n$

**A.**  $m > n$ .

**B.**  $m = n$ .

**C.**  $m < n$ .

**D.** Không so sánh được.

**Câu 76.** So sánh hai số  $m$  và  $n$  nếu  $\left(\frac{1}{9}\right)^m > \left(\frac{1}{9}\right)^n$ .

**A.** Không so sánh được.

**B.**  $m = n$ .

**C.**  $m > n$ .

**D.**  $m < n$ .

**Câu 77.** So sánh hai số  $m$  và  $n$  nếu  $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^m > \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n$ .

**A.**  $m < n$ .

**B.**  $m = n$ .

**C.**  $m > n$ .

**D.** Không so sánh được.

**Câu 78.** So sánh hai số  $m$  và  $n$  nếu  $(\sqrt{5}-1)^m < (\sqrt{5}-1)^n$ .

**A.**  $m = n$ .

**B.**  $m < n$ .

**C.**  $m > n$ .

**D.** Không so sánh được.

**Câu 79.** So sánh hai số  $m$  và  $n$  nếu  $(\sqrt{2}-1)^m < (\sqrt{2}-1)^n$ .

**A.**  $m > n$ .

**B.**  $m = n$ .

**C.**  $m < n$ .

**D.** Không so sánh được.

**Câu 80.** Kết luận nào đúng về số thực  $a$  nếu  $(a-1)^{\frac{2}{3}} < (a-1)^{\frac{1}{3}}$ ?

**A.**  $a > 2$ .

**B.**  $a > 0$ .

**C.**  $a > 1$ .

**D.**  $1 < a < 2$ .

**Câu 81.** Kết luận nào đúng về số thực  $a$  nếu  $(2a+1)^{-3} > (2a+1)^{-1}$ ?

**A.**  $\begin{cases} -\frac{1}{2} < a < 0 \\ a < -1 \end{cases}$ .

**B.**  $-\frac{1}{2} < a < 0$ .

**C.**  $\begin{cases} 0 < a < 1 \\ a < -1 \end{cases}$ .

**D.**  $a < -1$ .

**Câu 82.** Kết luận nào đúng về số thực  $a$  nếu  $\left(\frac{1}{a}\right)^{-0,2} < a^2$ ?

**A.**  $0 < a < 1$ .

**B.**  $a > 0$ .

**C.**  $a > 1$ .

**D.**  $a < 0$ .

**Câu 83.** Kết luận nào đúng về số thực  $a$  nếu  $(1-a)^{\frac{1}{3}} > (1-a)^{\frac{1}{2}}$ ?

**A.**  $a < 1$ .

**B.**  $a > 0$ .

**C.**  $0 < a < 1$ .

**D.**  $a > 1$ .

**Câu 84.** Kết luận nào đúng về số thực  $a$  nếu  $(2-a)^{\frac{3}{4}} > (2-a)^2$ ?

**A.**  $a > 1$ .

**B.**  $0 < a < 1$ .

**C.**  $1 < a < 2$ .

**D.**  $a < 1$ .

**Câu 85.** Kết luận nào đúng về số thực  $a$  nếu  $\left(\frac{1}{a}\right)^{\frac{1}{2}} > \left(\frac{1}{a}\right)^{-\frac{1}{2}}$ ?

**A.**  $1 < a < 2$ .

**B.**  $a < 1$ .

**C.**  $a > 1$ .

**D.**  $0 < a < 1$ .

**Câu 86.** Kết luận nào đúng về số thực  $a$  nếu  $a^{\sqrt{3}} > a^{\sqrt{7}}$ ?

**A.**  $a < 1$ .

**B.**  $0 < a < 1$ .

**C.**  $a > 1$ .

**D.**  $1 < a < 2$ .

**Câu 87.** Kết luận nào đúng về số thực  $a$  nếu  $a^{\frac{1}{17}} > a^{\frac{1}{8}}$ ?

**A.**  $a > 1$ .

**B.**  $a < 1$ .

**C.**  $0 < a < 1$ .

**D.**  $1 < a < 2$ .



**Câu 88.** Kết luận nào đúng về số thực  $a$  nếu  $a^{-0,25} > a^{-\sqrt{3}}$  ?  
**A.**  $1 < a < 2$ . **B.**  $a < 1$ . **C.**  $0 < a < 1$ . **D.**  $a > 1$ .

**Câu 89.** Rút gọn biểu thức  $\frac{a^{1,5} + b^{1,5}}{a^{0,5} + b^{0,5}} - a^{0,5}b^{0,5}$  ta được:  
**A.**  $a + b$ . **B.**  $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ . **C.**  $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ . **D.**  $a - b$ .

**Câu 90.** Rút gọn biểu thức  $\left( \frac{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2}}{\frac{1}{xy^2} + \frac{1}{x^2y}} + \frac{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}}{\frac{1}{xy^2} - \frac{1}{x^2y}} \right) \cdot \frac{x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{1}{2}}}{x+y} - \frac{2y}{x-y}$  được kết quả là  
**A.**  $x - y$ . **B.**  $x + y$ . **C.**  $2$ . **D.**  $\frac{2}{\sqrt{xy}}$ .

**Câu 91.** Biểu thức  $f(x) = (x^2 - 3x + 2)^{-3} - 2\sqrt{x}$  xác định với :  
**A.**  $\forall x \in (0; +\infty) \setminus \{1; 2\}$ . **B.**  $\forall x \in [0; +\infty)$ .  
**C.**  $\forall x \in [0; +\infty) \setminus \{1; 2\}$ . **D.**  $\forall x \in [0; +\infty) \setminus \{1\}$ .

**Câu 92.** Biểu thức  $f(x) = \left( \frac{4x - 3x^2}{2x^2 + 3x + 1} \right)^{\frac{-2}{3}}$  xác định khi:  
**A.**  $x \in \left[-1; -\frac{1}{2}\right] \cup \left[0; \frac{4}{3}\right]$ . **B.**  $x \in (-\infty; -1) \cup \left(-\frac{1}{2}; 0\right) \cup \left(\frac{4}{3}; +\infty\right)$ .  
**C.**  $x \in \left(-1; -\frac{1}{2}\right) \cup \left(0; \frac{4}{3}\right)$ . **D.**  $x \in \left(-1; \frac{4}{3}\right)$ .

**Câu 93.** Biểu thức  $f(x) = (x^3 - 3x^2 + 2)^{\frac{1}{4}}$  chỉ xác định với :  
**A.**  $x \in (1 + \sqrt{3}; +\infty)$ . **B.**  $x \in (-\infty; 1 - \sqrt{3}) \cup (1; 1 + \sqrt{3})$ .  
**C.**  $x \in (1 - \sqrt{3}; 1)$ . **D.**  $x \in (1 - \sqrt{3}; 1) \cup (1 + \sqrt{3}; +\infty)$ .

**Câu 94.** Tìm giá trị  $x$  thỏa mãn  $(x^2 - 3x + 2)^{x^2 - 5x + 6} = 1$ .  
**A.**  $x = 2$ . **B.**  $x = 3$ . **C.**  $x = 2; x = 3$ . **D.** Không tồn tại  $x$ .

**Câu 95.** Với giá trị nào của  $x$  thì  $(x^2 + 4)^{x-5} > (x^2 + 4)^{5x-3}$  ?  
**A.**  $x > -\frac{1}{2}$ . **B.**  $x < \frac{1}{2}$ . **C.**  $x < -\frac{1}{2}$ . **D.**  $x > \frac{1}{2}$ .

**Câu 96.** Cho  $(a-1)^{-\frac{2}{3}} < (a-1)^{-\frac{1}{3}}$  khi đó  
**A.**  $a > 2$ . **B.**  $a < 1$ . **C.**  $a > 1$ . **D.**  $a < 2$ .

**Câu 97.** Cho  $a = 1 + 2^{-x}$ ,  $b = 1 + 2^x$ . Biểu thức biểu diễn  $b$  theo  $a$  là  
**A.**  $\frac{a-2}{a-1}$ . **B.**  $\frac{a-1}{a}$ . **C.**  $\frac{a+2}{a-1}$ . **D.**  $\frac{a}{a-1}$ .

**Câu 98.** Cho số thực dương  $a$ . Biểu thức thu gọn của biểu thức  $P = \frac{a^{\frac{4}{3}} \left( a^{-\frac{1}{3}} + a^{\frac{2}{3}} \right)}{a^{\frac{1}{4}} \left( a^{\frac{3}{4}} + a^{-\frac{1}{4}} \right)}$  là  
**A.**  $a$ . **B.**  $a + 1$ . **C.**  $2a$ . **D.**  $1$ .

**Câu 99.** Cho các số thực dương  $a$  và  $b$ . Biểu thức thu gọn của biểu thức

$$P = \left(2a^{\frac{1}{4}} - 3b^{\frac{1}{4}}\right) \cdot \left(2a^{\frac{1}{4}} + 3b^{\frac{1}{4}}\right) \cdot \left(4a^{\frac{1}{2}} + 9b^{\frac{1}{2}}\right) \text{ có dạng là } P = xa + yb. \text{ Tính } x + y.$$

- A.  $x + y = 97$ . B.  $x + y = -65$ . C.  $x - y = 56$ . D.  $y - x = -97$ .

**Câu 100.** Cho các số thực dương  $a$  và  $b$ . Biểu thức thu gọn của biểu thức  $P = \frac{a^{\frac{1}{3}}\sqrt{b} + b^{\frac{1}{3}}\sqrt{a}}{\sqrt[6]{a} + \sqrt[6]{b}} - \sqrt[3]{ab}$  là

- A.  $-2$ . B.  $-1$ . C.  $1$ . D.  $0$ .

**Câu 101.** Cho các số thực dương  $a$  và  $b$ . Biểu thức thu gọn của biểu thức

$$P = \left(\frac{a+b}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} - \sqrt[3]{ab}\right) : (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})^2$$

- A.  $-1$ . B.  $1$ . C.  $2$ . D.  $-2$ .

**Câu 102.** Cho các số thực dương phân biệt  $a$  và  $b$ . Biểu thức thu gọn của biểu thức

$$P = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt[4]{a} - \sqrt[4]{b}} - \frac{\sqrt{4a} + \sqrt[4]{16ab}}{\sqrt[4]{a} + \sqrt[4]{b}} \text{ có dạng } P = m\sqrt[4]{a} + n\sqrt[4]{b}. \text{ Khi đó biểu thức liên hệ giữa } m \text{ và } n \text{ là}$$

- A.  $2m - n = -3$ . B.  $m + n = -2$ . C.  $m - n = 0$ . D.  $m + 3n = -1$ .

**Câu 103.** Biểu thức thu gọn của biểu thức  $P = \left(\frac{a^{\frac{1}{2}} + 2}{a + 2a^{\frac{1}{2}} + 1} - \frac{a^{\frac{1}{2}} - 2}{a - 1}\right) \cdot \frac{(a^{\frac{1}{2}} + 1)}{a^{\frac{1}{2}}}, (a > 0, a \neq \pm 1)$ , có dạng

$$P = \frac{m}{a + n}. \text{ Khi đó biểu thức liên hệ giữa } m \text{ và } n \text{ là}$$

- A.  $m + 3n = 1$ . B.  $m + n = -2$ . C.  $m - n = 0$ . D.  $2m - n = 5$ .

**Câu 104.** Một người gửi số tiền 2 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất  $0,65\%$  / tháng. Biết rằng nếu người đó không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Số tiền người đó lãnh được sau hai năm, nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất không đổi là

- A.  $(2,0065)^{24}$  triệu đồng. B.  $(1,0065)^{24}$  triệu đồng.  
C.  $2 \cdot (1,0065)^{24}$  triệu đồng. D.  $2 \cdot (2,0065)^{24}$  triệu đồng.

**Câu 105.** Một người gửi số tiền  $M$  triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất  $0,7\%$  / tháng. Biết rằng nếu người đó không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Sau ba năm, người đó muốn lãnh được số tiền là 5 triệu đồng, nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất không đổi, thì người đó cần gửi số tiền  $M$  là

- A. 3 triệu 600 ngàn đồng. B. 3 triệu 800 ngàn đồng.  
C. 3 triệu 700 ngàn đồng. D. 3 triệu 900 ngàn đồng.

**Câu 106.** Lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng trong thời gian qua liên tục thay đổi. Bác An gửi vào một ngân hàng số tiền 5 triệu đồng với lãi suất  $0,7\%$  / tháng. Sau sáu tháng gửi tiền, lãi suất tăng lên  $0,9\%$  / tháng. Đến tháng thứ 10 sau khi gửi tiền, lãi suất giảm xuống  $0,6\%$  / tháng và giữ ổn định. Biết rằng nếu bác An không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Sau một năm gửi tiền, bác An rút được số tiền là (biết trong khoảng thời gian này bác An không rút tiền ra):

- A.  $\approx 5436521,164$  đồng. B.  $\approx 5468994,09$  đồng.  
C.  $\approx 5452733,453$  đồng. D.  $\approx 5452771,729$  đồng.

## Vấn đề 2. LOGARIT

- Câu 1.** Với giá trị nào của  $x$  thì biểu thức  $f(x) = \log_2(2x-1)$  xác định?
- A.  $x \in \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ .      B.  $x \in \left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$ .      C.  $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$ .      D.  $x \in (-1; +\infty)$ .
- Câu 2.** Với giá trị nào của  $x$  thì biểu thức  $f(x) = \ln(4-x^2)$  xác định?
- A.  $x \in (-2; 2)$ .      B.  $x \in [-2; 2]$ .      C.  $x \in \mathbb{R} \setminus [-2; 2]$ .      D.  $x \in \mathbb{R} \setminus (-2; 2)$ .
- Câu 3.** Với giá trị nào của  $x$  thì biểu thức  $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} \frac{x-1}{3+x}$  xác định?
- A.  $x \in [-3; 1]$ .      B.  $x \in \mathbb{R} \setminus [-3; 1]$ .      C.  $x \in \mathbb{R} \setminus (-3; 1)$ .      D.  $x \in (-3; 1)$ .
- Câu 4.** Với giá trị nào của  $x$  thì biểu thức:  $f(x) = \log_6(2x-x^2)$  xác định?
- A.  $0 < x < 2$ .      B.  $x > 2$ .      C.  $-1 < x < 1$ .      D.  $x < 3$ .
- Câu 5.** Với giá trị nào của  $x$  thì biểu thức:  $f(x) = \log_5(x^3 - x^2 - 2x)$  xác định?
- A.  $x \in (0; 1)$ .      B.  $x \in (1; +\infty)$ .  
C.  $x \in (-1; 0) \cup (2; +\infty)$ .      D.  $x \in (0; 2) \cup (4; +\infty)$ .
- Câu 6.** Cho  $a > 0, a \neq 1$ , giá trị của biểu thức  $A = a^{\log_{\sqrt{a}} 4}$  bằng bao nhiêu?
- A. 8.      B. 16.      C. 4.      D. 2.
- Câu 7.** Giá trị của biểu thức  $B = 2\log_2 12 + 3\log_2 5 - \log_2 15 - \log_2 150$  bằng bao nhiêu?
- A. 5.      B. 2.      C. 4.      D. 3.
- Câu 8.** Giá trị của biểu thức  $P = 22\log_2 12 + 3\log_2 5 - \log_2 15 - \log_2 150$  bằng bao nhiêu?
- A. 2.      B. 3.      C. 4.      D. 5.
- Câu 9.** Cho  $a > 0, a \neq 1$ , biểu thức  $D = \log_{a^3} a$  có giá trị bằng bao nhiêu?
- A. 3.      B.  $\frac{1}{3}$ .      C. -3.      D.  $-\frac{1}{3}$ .
- Câu 10.** Giá trị của biểu thức  $C = \frac{1}{2}\log_7 36 - \log_7 14 - 3\log_7 \sqrt[3]{21}$  bằng bao nhiêu ?
- A. -2.      B. 2.      C.  $-\frac{1}{2}$ .      D.  $\frac{1}{2}$ .
- Câu 11.** Cho  $a > 0, a \neq 1$ , biểu thức  $E = a^{4\log_{a^2} 5}$  có giá trị bằng bao nhiêu?
- A. 5.      B. 625.      C. 25.      D.  $5^8$ .
- Câu 12.** Trong các số sau, số nào lớn nhất?
- A.  $\log_{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{5}{6}}$ .      B.  $\log_3 \frac{5}{6}$ .      C.  $\log_{\frac{1}{3}} \frac{6}{5}$ .      D.  $\log_3 \frac{6}{5}$ .
- Câu 13.** Trong các số sau, số nào nhỏ nhất ?
- A.  $\log_5 \frac{1}{12}$ .      B.  $\log_{\frac{1}{5}} 9$ .      C.  $\log_{\frac{1}{5}} 17$ .      D.  $\log_5 \frac{1}{15}$ .
- Câu 14.** Cho  $a > 0, a \neq 1$ , biểu thức  $A = (\ln a + \log_a e)^2 + \ln^2 a - \log_a^2 e$  có giá trị bằng
- A.  $2\ln^2 a + 2$ .      B.  $4\ln a + 2$ .      C.  $2\ln^2 a - 2$ .      D.  $\ln^2 a + 2$ .

- Câu 15.** Cho  $a > 0, a \neq 1$ , biểu thức  $B = 2 \ln a + 3 \log_a e - \frac{3}{\ln a} - \frac{2}{\log_a e}$  có giá trị bằng
- A.  $4 \ln a + 6 \log_a 4$ .      B.  $4 \ln a$ .      C.  $3 \ln a - \frac{3}{\log_a e}$ .      D.  $6 \log_a e$ .
- Câu 16.** Cho  $a > 0, b > 0$ , nếu viết  $\log_3 \left( \sqrt[5]{a^3 b} \right)^{\frac{2}{3}} = \frac{x}{5} \log_3 a + \frac{y}{15} \log_3 b$  thì  $x + y$  bằng bao nhiêu?
- A. 3.      B. 5.      C. 2.      D. 4.
- Câu 17.** Cho  $a > 0, b > 0$ , nếu viết  $\log_5 \left( \frac{a^{10}}{\sqrt[6]{b^5}} \right)^{-0.2} = x \log_5 a + y \log_5 b$  thì  $xy$  bằng bao nhiêu ?
- A. 3.      B.  $\frac{1}{3}$ .      C.  $-\frac{1}{3}$ .      D. -3.
- Câu 18.** Cho  $\log_3 x = 3 \log_3 2 + \log_9 25 - \log_{\sqrt{3}} 3$ . Khi đó giá trị của  $x$  là :
- A.  $\frac{200}{3}$ .      B.  $\frac{40}{9}$ .      C.  $\frac{20}{3}$ .      D.  $\frac{25}{9}$ .
- Câu 19.** Cho  $\log_7 \frac{1}{x} = 2 \log_7 a - 6 \log_{49} b$ . Khi đó giá trị của  $x$  là :
- A.  $2a - 6b$ .      B.  $x = \frac{a^2}{b^3}$ .      C.  $x = a^2 b^3$ .      D.  $x = \frac{b^3}{a^2}$ .
- Câu 20.** Cho  $a, b, c > 0; a \neq 1$  và số  $\alpha \in \mathbb{R}$ , Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?
- A.  $\log_a a^c = c$ .      B.  $\log_a a = 1$ .  
C.  $\log_a b^\alpha = \alpha \log_a b$ .      D.  $\log_a (b - c) = \log_a b - \log_a c$ .
- Câu 21.** Cho  $a, b, c > 0; a \neq 1$ , Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?
- A.  $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ .      B.  $\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c$ .  
C.  $\log_{a^c} b = c \log_a b$ .      D.  $\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$ .
- Câu 22.** Cho  $a, b, c > 0$  và  $a, b \neq 1$ , Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?
- A.  $a^{\log_a b} = b$ .      B.  $\log_a b = \log_a c \Leftrightarrow b = c$ .  
C.  $\log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b}$ .      D.  $\log_a b > \log_a c \Leftrightarrow b > c$ .
- Câu 23.** Cho  $a, b, c > 0$  và  $a > 1$ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?
- A.  $\log_a b < \log_a c \Leftrightarrow b < c$ .      B.  $\log_a b > \log_a c \Leftrightarrow b > c$ .  
C.  $\log_a b > c \Leftrightarrow b > c$ .      D.  $a^b > a^c \Leftrightarrow b > c$ .
- Câu 24.** Cho  $a, b, c > 0$  và  $a < 1$ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?
- A.  $\log_a b > \log_a c \Leftrightarrow b < c$ .      B.  $a^{\sqrt{2}} < a^{\sqrt{3}}$ .  
C.  $\log_a b < \log_a c \Leftrightarrow b > c$ .      D.  $\log_a b > 0 \Leftrightarrow b < 1$ .
- Câu 25.** Số thực  $a$  thỏa điều kiện  $\log_3 (\log_2 a) = 0$  là
- A.  $\frac{1}{3}$ .      B. 3.      C.  $\frac{1}{2}$ .      D. 2.

- Câu 26.** Biết các logarit sau đều có nghĩa. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
- A.  $\log_a b = \log_a c \Leftrightarrow b = c$ . B.  $\log_a b > \log_a c \Leftrightarrow b > c$   
 C.  $\log_a b > \log_a c \Leftrightarrow b < c$ . D.  $\log_a b + \log_a c < 0 \Leftrightarrow b + c < 0$ .
- Câu 27.** Cho  $a, b, c > 0$  và  $a \neq 1$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?
- A.  $\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$ . B.  $\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$ .  
 C.  $\log_a b = c \Leftrightarrow b = a^c$ . D.  $\log_a(b+c) = \log_a b + \log_a c$ .
- Câu 28.** Số thực  $x$  thỏa mãn điều kiện  $\log_2 x + \log_4 x + \log_8 x = 11$  là :
- A. 64. B.  $2^{\frac{11}{6}}$ . C. 8. D. 4.
- Câu 29.** Số thực  $x$  thỏa mãn điều kiện  $\log_x 2\sqrt[3]{2} = 4$  là
- A.  $\sqrt[3]{2}$ . B.  $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ . C. 4. D. 2.
- Câu 30.** Cho  $a, b > 0$  và  $a, b \neq 1$ . Biểu thức  $P = \log_{\sqrt{a}} b^2 + \frac{2}{\log_{\frac{a}{b^2}} a}$  có giá trị bằng bao nhiêu?
- A. 6. B. 3. C. 4. D. 2.
- Câu 31.** Cho  $a, b > 0$  và  $a, b \neq 1$ , biểu thức  $P = \log_{\sqrt{a}} b^3 \cdot \log_b a^4$  có giá trị bằng bao nhiêu?
- A. 6. B. 24. C. 12. D. 18.
- Câu 32.** Giá trị của biểu thức  $4^{3\log_8 3 + 2\log_{16} 5}$  là
- A. 20. B. 40. C. 45. D. 25.
- Câu 33.** Giá trị của biểu thức  $P = \log_a \left( a^3 \sqrt{a} \sqrt[5]{a} \right)$  là
- A.  $\frac{53}{30}$ . B.  $\frac{37}{10}$ . C. 20. D.  $\frac{1}{15}$ .
- Câu 34.** Giá trị của biểu thức  $A = \log_3 2 \cdot \log_4 3 \cdot \log_5 4 \dots \log_{16} 15$  là
- A.  $\frac{1}{2}$ . B.  $\frac{3}{4}$ . C. 1. D.  $\frac{1}{4}$ .
- Câu 35.** Giá trị của biểu thức  $\log_{\frac{1}{a}} \left( \frac{a^3 \sqrt[3]{a^2} \sqrt[5]{a^3}}{\sqrt{a} \sqrt[4]{a}} \right)$  là.
- A.  $\frac{1}{5}$ . B.  $\frac{3}{4}$ . C.  $-\frac{211}{60}$ . D.  $\frac{91}{60}$ .
- Câu 36.** Trong 2 số  $\log_3 2$  và  $\log_2 3$ , số nào lớn hơn 1?
- A.  $\log_2 3$ . B.  $\log_3 2$ .  
 C. Cả hai số. D. Đáp án khác.
- Câu 37.** Cho 2 số  $\log_{1999} 2000$  và  $\log_{2000} 2001$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
- A.  $\log_{1999} 2000 > \log_{2000} 2001$ . B. Hai số trên nhỏ hơn 1.  
 C. Hai số trên lớn hơn 2. D.  $\log_{1999} 2000 \geq \log_{2000} 2001$ .
- Câu 38.** Các số  $\log_3 2$ ,  $\log_2 3$ ,  $\log_3 11$  được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là
- A.  $\log_3 2$ ,  $\log_3 11$ ,  $\log_2 3$ . B.  $\log_3 2$ ,  $\log_2 3$ ,  $\log_3 11$ .  
 C.  $\log_2 3$ ,  $\log_3 2$ ,  $\log_3 11$ . D.  $\log_3 11$ ,  $\log_3 2$ ,  $\log_2 3$ .

- Câu 39.** Số thực  $x$  thỏa mãn điều kiện  $\log_3(x+2)=3$  là  
**A.** 5. **B.** -25. **C.** 25. **D.** -3.
- Câu 40.** Số thực  $x$  thỏa mãn điều kiện  $\log_3 x + \log_9 x = \frac{3}{2}$  là :  
**A.** -3. **B.** 25. **C.** 3. **D.** 9.
- Câu 41.** Cho  $\log_3 x = 4\log_3 a + 7\log_3 b$  ( $a, b > 0$ ). Giá trị của  $x$  tính theo  $a, b$  là  
**A.**  $ab$ . **B.**  $a^4b$ . **C.**  $a^4b^7$ . **D.**  $b^7$ .
- Câu 42.** Cho  $\log_2(x^2 + y^2) = 1 + \log_2 xy$  ( $xy > 0$ ). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau ?  
**A.**  $x > y$ . **B.**  $x = y$ .  
**C.**  $x < y$ . **D.**  $x = y^2$ .
- Câu 43.** Cho  $\log_{\frac{1}{4}}(y-x) - \log_4 \frac{1}{y} = 1$  ( $y > 0, y > x$ ). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?  
**A.**  $3x = 4y$ . **B.**  $x = -\frac{3}{4}y$ . **C.**  $x = \frac{3}{4}y$ . **D.**  $3x = -4y$ .
- Câu 44.** Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?  
**A.**  $\log_a x^2 = 2\log_a x$  ( $x^2 > 0$ ). **B.**  $\log_a xy = \log_a |x| + \log_a |y|$ .  
**C.**  $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$  ( $xy > 0$ ). **D.**  $\log_a xy = \log_a |x| + \log_a |y|$  ( $xy > 0$ ).
- Câu 45.** Cho  $x, y > 0$  và  $x^2 + 4y^2 = 12xy$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?  
**A.**  $\log_2 \left( \frac{x+2y}{4} \right) = \log_2 x - \log_2 y$ . **B.**  $\log_2(x+2y) = 2 + \frac{1}{2}(\log_2 x + \log_2 y)$ .  
**C.**  $\log_2(x+2y) = \log_2 x + \log_2 y + 1$ . **D.**  $4\log_2(x+2y) = \log_2 x + \log_2 y$ .
- Câu 46.** Cho  $a, b > 0$  và  $a^2 + b^2 = 7ab$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?  
**A.**  $2\log(a+b) = \log a + \log b$ . **B.**  $4\log \left( \frac{a+b}{6} \right) = \log a + \log b$ .  
**C.**  $\log \left( \frac{a+b}{3} \right) = \frac{1}{2}(\log a + \log b)$ . **D.**  $\log \left( \frac{a+b}{3} \right) = 3(\log a + \log b)$ .
- Câu 47.** Cho  $\log_2 6 = a$ . Khi đó giá trị của  $\log_3 18$  được tính theo  $a$  là  
**A.**  $a$ . **B.**  $\frac{a}{a+1}$ . **C.**  $2a+3$ . **D.**  $\frac{2a-1}{a-1}$ .
- Câu 48.** Cho  $\log_2 5 = a$ . Khi đó giá trị của  $\log_4 1250$  được tính theo  $a$  là :  
**A.**  $\frac{1-4a}{2}$ . **B.**  $2(1+4a)$ . **C.**  $1+4a$ . **D.**  $\frac{1+4a}{2}$ .
- Câu 49.** Biết  $\log_7 2 = m$ , khi đó giá trị của  $\log_{49} 28$  được tính theo  $m$  là  
**A.**  $\frac{m+2}{4}$ . **B.**  $\frac{1+m}{2}$ . **C.**  $\frac{1+4m}{2}$ . **D.**  $\frac{1+2m}{2}$ .
- Câu 50.** Biết  $a = \log_2 5, b = \log_3 3$ ; khi đó giá trị của  $\log_{10} 15$  được tính theo  $a$  là  
**A.**  $\frac{a+b}{a+1}$ . **B.**  $\frac{ab+1}{a+1}$ . **C.**  $\frac{ab-1}{a+1}$ . **D.**  $\frac{a(b+1)}{a+1}$ .

- Câu 51.** Cho  $a = \log_3 15; b = \log_3 10$ . Khi đó giá trị của  $\log_{\sqrt{3}} 50$  được tính theo  $a, b$  là :
- A.  $2(a-b-1)$ .      B.  $2(a+b-1)$ .      C.  $2(a+b+1)$ .      D.  $2(a-b+1)$ .
- Câu 52.** Biết  $\log_5 3 = a$ , khi đó giá trị của  $\log_{15} 75$  được tính theo  $a$  là
- A.  $\frac{2+a}{1+a}$ .      B.  $\frac{1+2a}{a+1}$ .      C.  $\frac{1+a}{2+a}$ .      D.  $2$ .
- Câu 53.** Biết  $\log_4 7 = a$ , khi đó giá trị của  $\log_2 7$  được tính theo  $a$  là
- A.  $2a$ .      B.  $\frac{1}{2}a$ .      C.  $\frac{1}{4}a$ .      D.  $4a$ .
- Câu 54.** Biết  $\log_5 3 = a$ , khi đó giá trị của  $\log_3 \frac{27}{25}$  được tính theo  $a$  là
- A.  $\frac{3}{2a}$ .      B.  $\frac{3a}{2}$ .      C.  $\frac{3a-2}{a}$ .      D.  $\frac{a}{3a-2}$ .
- Câu 55.** Biết  $a = \log_2 5, b = \log_5 3$ . Khi đó giá trị của  $\log_{24} 15$  được tính theo  $a$  là :
- A.  $\frac{ab+1}{b}$ .      B.  $\frac{ab+1}{a+1}$ .      C.  $\frac{b+1}{a+1}$ .      D.  $\frac{a(b+1)}{3+ab}$ .
- Câu 56.** Cho  $\log_{12} 27 = a$ . Khi đó giá trị của  $\log_6 16$  được tính theo  $a$  là
- A.  $\frac{4(3+a)}{3-a}$ .      B.  $\frac{4(3-a)}{3+a}$ .      C.  $\frac{4a}{3-a}$ .      D.  $\frac{2a}{3+a}$ .
- Câu 57.** Cho  $\lg 3 = a, \lg 2 = b$ . Khi đó giá trị của  $\log_{125} 30$  được tính theo  $a$  là
- A.  $\frac{1+a}{3(1-b)}$ .      B.  $\frac{4(3-a)}{3-b}$ .      C.  $\frac{a}{3+b}$ .      D.  $\frac{a}{3+a}$ .
- Câu 58.** Cho  $\log_a b = \sqrt{3}$ . Giá trị của biểu thức  $A = \log_{\frac{\sqrt{b}}{a}} \frac{\sqrt[3]{b}}{\sqrt{a}}$  được tính theo  $a$  là
- A.  $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ .      B.  $\frac{\sqrt{3}}{4}$ .      C.  $\frac{1}{\sqrt{3}}$ .      D.  $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ .
- Câu 59.** Cho  $\log_{27} 5 = a, \log_8 7 = b, \log_2 3 = c$ . Giá trị của  $\log_6 35$  được tính theo  $a, b, c$  là
- A.  $\frac{ac}{1-c}$ .      B.  $\frac{ac}{1+b}$ .      C.  $\frac{3(ac+b)}{1+c}$ .      D.  $\frac{3ac+3b}{3+a}$ .
- Câu 60.** Cho  $x = 2000!$ . Giá trị của biểu thức  $A = \frac{1}{\log_2 x} + \frac{1}{\log_3 x} + \dots + \frac{1}{\log_{2000} x}$  là
- A.  $1$ .      B.  $-1$ .      C.  $\frac{1}{5}$ .      D.  $2000$ .
- Câu 61.** Biết  $a = \log_7 12, b = \log_{12} 24$ . Khi đó giá trị của  $\log_{54} 168$  được tính theo  $a$  là
- A.  $\frac{a(8-5b)}{1+ab-a}$ .      B.  $\frac{ab+1-a}{a(8-5b)}$ .      C.  $\frac{a(8-5b)}{1+ab}$ .      D.  $\frac{ab+1}{a(8-5b)}$ .
- Câu 62.** Biết  $\log_a b = 2, \log_a c = -3$ . Khi đó giá trị của biểu thức  $\log_a \frac{a^2 b^3}{c^4}$  bằng:
- A.  $20$ .      B.  $-\frac{2}{3}$ .      C.  $-1$ .      D.  $\frac{3}{2}$ .

**Câu 63.** Biết  $\log_a b = 3, \log_a c = -4$ . Khi đó giá trị của biểu thức  $\log_a (a^2 \sqrt[3]{bc^2})$  bằng:

- A.  $-\frac{16\sqrt{3}}{3}$ .      B.  $-5$ .      C.  $-16$ .      D.  $-48$ .

**Câu 64.** Rút gọn biểu thức  $A = \log_a a^3 \sqrt{a} \sqrt[5]{a}$ , ta được kết quả là

- A.  $\frac{37}{10}$ .      B.  $\frac{35}{10}$ .      C.  $\frac{3}{10}$ .      D.  $\frac{1}{10}$ .

**Câu 65.** Rút gọn biểu thức  $B = \log_{\frac{1}{a}} \frac{a^5 \sqrt{a^3} \sqrt[3]{a^2}}{\sqrt{a} \sqrt[4]{a}}$ , ta được kết quả là :

- A.  $-\frac{91}{60}$ .      B.  $\frac{60}{91}$ .      C.  $\frac{16}{5}$ .      D.  $-\frac{5}{16}$ .

**Câu 66.** Biết  $a = \log_2 5, b = \log_3 5$ . Khi đó giá trị của  $\log_6 5$  được tính theo  $a, b$  là :

- A.  $\frac{ab}{a+b}$ .      B.  $\frac{1}{a+b}$ .      C.  $a+b$ .      D.  $a^2 + b^2$ .

**Câu 67.** Cho  $a = \log_2 3; b = \log_3 5; c = \log_7 2$ . Khi đó giá trị của biểu thức  $\log_{140} 63$  được tính theo  $a, b, c$  là

- A.  $\frac{2ac-1}{abc+2c+1}$ .      B.  $\frac{abc+2c+1}{2ac+1}$ .      C.  $\frac{2ac+1}{abc+2c+1}$ .      D.  $\frac{ac+1}{abc+2c+1}$ .

**Câu 68.** Cho  $a = \log_5 2; b = \log_5 3$ . Khi đó giá trị của  $\log_5 72$  được tính theo  $a, b$  là :

- A.  $3a+2b$ .      B.  $a^3+b^2$ .      C.  $3a-2b$ .      D.  $6ab$ .

**Câu 69.** Biết  $a = \log_{12} 18, b = \log_{24} 54$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A.  $ab+5(a-b)=-1$ .      B.  $5ab+a+b=1$ .  
C.  $ab+5(a-b)=1$ .      D.  $5ab+a-b=0$ .

**Câu 70.** Biết  $\log_3 (\log_4 (\log_2 y)) = 0$ , khi đó giá trị của biểu thức  $A = 2y+1$  là

- A. 33.      B. 17.      C. 65.      D. 133.

**Câu 71.** Cho  $\log_5 x > 0$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A.  $\log_x 5 \leq \log_x 4$ .      B.  $\log_x 5 > \log_x 6$ .      C.  $\log_5 x = \log_x 5$ .      D.  $\log_5 x > \log_6 x$ .

**Câu 72.** Cho  $0 < x < 1$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A.  $\sqrt[3]{\log_x 5} + \sqrt[3]{\log_{\frac{1}{2}} 5} < 0$       B.  $\sqrt[3]{\log_x 5} > \sqrt{\log_x \frac{1}{2}}$   
C.  $\sqrt{\log_x \frac{1}{2}} < \log_5 \frac{1}{2}$ .      D.  $\sqrt{\log_x \frac{1}{2}} \cdot \sqrt[3]{\log_x 5} > 0$

**Câu 73.** Trong bốn số  $3^{\log_3 4}, 3^{2\log_3 2}, \left(\frac{1}{4}\right)^{\log_2 5}, \left(\frac{1}{16}\right)^{\log_{0.5} 2}$  số nào nhỏ hơn 1?

- A.  $\left(\frac{1}{16}\right)^{\log_{0.5} 2}$ .      B.  $3^{2\log_3 2}$ .      C.  $3^{\log_3 4}$ .      D.  $\left(\frac{1}{4}\right)^{\log_2 5}$ .

**Câu 74.** Gọi  $M = 3^{\log_{0.5} 4}$ ;  $N = 3^{\log_{0.5} 13}$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A.  $M < 1 < N$ .      B.  $N < M < 1$ .  
C.  $M < N < 1$ .      D.  $N < 1 < M$ .



- Câu 75.** Biểu thức  $\log_2 \left( 2 \sin \frac{\pi}{12} \right) + \log_2 \left( \cos \frac{\pi}{12} \right)$  có giá trị bằng:
- A.  $-2$ . B.  $-1$ . C.  $1$ . D.  $\log_2 \sqrt{3} - 1$ .
- Câu 76.** Với giá trị nào của  $m$  thì biểu thức  $f(x) = \log_{\sqrt{5}}(x-m)$  xác định với mọi  $x \in (-3; +\infty)$ ?
- A.  $m > -3$ . B.  $m < -3$ .  
C.  $m \leq -3$ . D.  $m \geq -3$ .
- Câu 77.** Với giá trị nào của  $m$  thì biểu thức  $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(3-x)(x+2m)$  xác định với mọi  $x \in [-4; 2]$ ?
- A.  $m \geq 2$ . B.  $m \geq \frac{3}{2}$ . C.  $m > 2$ . D.  $m \geq -1$ .
- Câu 78.** Với giá trị nào của  $m$  thì biểu thức  $f(x) = \log_3 \sqrt{(m-x)(x-3m)}$  xác định với mọi  $x \in (-5; 4]$ ?
- A.  $m \neq 0$ . B.  $m > \frac{4}{3}$ .  
C.  $m < -\frac{5}{3}$ . D.  $m \in \emptyset$ .
- Câu 79.** Với mọi số tự nhiên  $n$ , Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
- A.  $n = \log_2 \log_2 \underbrace{\sqrt{\sqrt{\dots \sqrt{2}}}}_{n \text{ căn bậc hai}}$ . B.  $n = -\log_2 \log_2 \underbrace{\sqrt{\sqrt{\dots \sqrt{2}}}}_{n \text{ căn bậc hai}}$ .  
C.  $n = 2 + \log_2 \log_2 \underbrace{\sqrt{\sqrt{\dots \sqrt{2}}}}_{n \text{ căn bậc hai}}$ . D.  $n = 2 - \log_2 \log_2 \underbrace{\sqrt{\sqrt{\dots \sqrt{2}}}}_{n \text{ căn bậc hai}}$ .
- Câu 80.** Cho các số thực  $a, b, c$  thỏa mãn:  $a^{\log_3 7} = 27, b^{\log_7 11} = 49, c^{\log_{11} 25} = \sqrt{11}$ . Giá trị của biểu thức  $A = a^{(\log_3 7)^2} + b^{(\log_7 11)^2} + c^{(\log_{11} 25)^2}$  là
- A. 519. B. 729. C. 469. D. 129.
- Câu 81.** Kết quả rút gọn của biểu thức  $C = \sqrt{\log_a b + \log_b a + 2} (\log_a b - \log_{ab} b) \sqrt{\log_a b}$  là
- A.  $\sqrt[3]{\log_a b}$ . B.  $\sqrt{\log_a b}$ .  
C.  $(\sqrt{\log_a b})^3$ . D.  $\log_a b$ .
- Câu 82.** Cho  $a, b, c > 0$  đôi một khác nhau và khác 1, Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
- A.  $\log^2 \frac{a}{b} \frac{c}{b}; \log^2 \frac{a}{c} \frac{b}{c}; \log^2 \frac{b}{a} \frac{c}{a} = 1$ . B.  $\log^2 \frac{a}{b} \frac{c}{b}; \log^2 \frac{a}{c} \frac{b}{c}; \log^2 \frac{b}{a} \frac{c}{a} > 1$ .  
C.  $\log^2 \frac{a}{b} \frac{c}{b}; \log^2 \frac{a}{c} \frac{b}{c}; \log^2 \frac{b}{a} \frac{c}{a} > -1$ . D.  $\log^2 \frac{a}{b} \frac{c}{b}; \log^2 \frac{a}{c} \frac{b}{c}; \log^2 \frac{b}{a} \frac{c}{a} < 1$ .
- Câu 83.** Gọi  $(x; y)$  là nghiệm nguyên của phương trình  $2x + y = 3$  sao cho  $P = x + y$  là số dương nhỏ nhất. Khẳng định nào sau đây đúng?
- A.  $\log_2 x + \log_3 y$  không xác định. B.  $\log_2(x + y) = 1$ .  
C.  $\log_2(x + y) > 1$ . D.  $\log_2(x + y) > 0$ .
- Câu 84.** Có tất cả bao nhiêu số dương  $a$  thỏa mãn đẳng thức  $\log_2 a + \log_3 a + \log_5 a = \log_2 a \cdot \log_3 a \cdot \log_5 a$
- A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.

**Vấn đề 3. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT – HÀM SỐ LŨY THỪA****Câu 1.** Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

- A.** Đồ thị hàm số  $y = a^x$  và đồ thị hàm số  $y = \log_a x$  đối xứng nhau qua đường thẳng  $y = x$ .  
**B.** Hàm số  $y = a^x$  với  $0 < a < 1$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ .  
**C.** Hàm số  $y = a^x$  với  $a > 1$  nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ .  
**D.** Đồ thị hàm số  $y = a^x$  với  $a > 0$  và  $a \neq 1$  luôn đi qua điểm  $M(a; 1)$ .

**Câu 2.** Tập giá trị của hàm số  $y = a^x$  ( $a > 0; a \neq 1$ ) là:

- A.**  $(0; +\infty)$ . **B.**  $[0; +\infty)$ . **C.**  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ . **D.**  $\mathbb{R}$ .

**Câu 3.** Với  $a > 0$  và  $a \neq 1$ . Phát biểu nào sau đây không đúng?

- A.** Hai hàm số  $y = a^x$  và  $y = \log_a x$  có cùng tính đơn điệu.  
**B.** Hai hàm số  $y = a^x$  và  $y = \log_a x$  có cùng tập giá trị.  
**C.** Đồ thị hai hàm số  $y = a^x$  và  $y = \log_a x$  đối xứng nhau qua đường thẳng  $y = x$ .  
**D.** Đồ thị hai hàm số  $y = a^x$  và  $y = \log_a x$  đều có đường tiệm cận.

**Câu 4.** Cho hàm số  $y = (\sqrt{2} - 1)^x$ . Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ .  
**B.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$   
**C.** Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là trục tung.  
**D.** Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là trục hoành.

**Câu 5.** Tập xác định của hàm số  $y = (2x - 1)^{2017}$  là:

- A.**  $D = \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$ . **B.**  $D = \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ . **C.**  $D = \mathbb{R}$ . **D.**  $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$ .

**Câu 6.** Tập xác định của hàm số  $y = (3x^2 - 1)^{-2}$  là:

- A.**  $D = \left\{\pm \frac{1}{\sqrt{3}}\right\}$ . **B.**  $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\pm \frac{1}{\sqrt{3}}\right\}$ .  
**C.**  $D = \left(-\infty; -\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \cup \left(\frac{1}{\sqrt{3}}; +\infty\right)$ . **D.**  $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ .

**Câu 7.** Tập xác định của hàm số  $y = (x^2 - 3x + 2)^{-e}$  là:

- A.**  $D = (1; 2)$ . **B.**  $D = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$ .  
**C.**  $D = (0; +\infty)$ . **D.**  $D = (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$ .

**Câu 8.** Tập xác định của hàm số  $y = \log_{0,5}(x + 1)$  là:

- A.**  $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ . **B.**  $D = (-1; +\infty)$ . **C.**  $D = (0; +\infty)$ . **D.**  $(-\infty; -1)$ .

**Câu 9.** Tìm  $x$  để hàm số  $y = \log \sqrt{x^2 + x - 12}$  có nghĩa.

- A.**  $x \in (-4; 3)$ . **B.**  $x \in (-\infty; -4) \cup (3; +\infty)$ .  
**C.**  $\begin{cases} x \neq -4 \\ x \neq 3 \end{cases}$ . **D.**  $x \in \mathbb{R}$ .

**Câu 10.** Tập xác định của hàm số  $y = \log_2 \frac{x+3}{2-x}$  là:

- A.**  $D = (-3; 2)$ . **B.**  $D = \mathbb{R} \setminus \{-3; 2\}$ . **C.**  $D = (-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$ . **D.**  $D = [-3; 2]$ .

**Câu 11.** Tập xác định của hàm số  $y = \frac{1}{\sqrt{2-x}} + \ln(x-1)$  là:

- A.  $D = (0; +\infty)$ .      B.  $D = (1; +\infty)$ .      C.  $D = (1; 2)$ .      D.  $D = [1; 2]$ .

**Câu 12.** Tập xác định của hàm số  $y = \frac{e^x}{e^x - 1}$  là:

- A.  $D = (e; +\infty)$ .      B.  $(0; +\infty)$ .      C.  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ .      D.  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

**Câu 13.** Tập xác định  $y = \sqrt{-2x^2 + 5x - 2} + \ln \frac{1}{x^2 - 1}$  là:

- A.  $D = (-1; 1)$ .      B.  $D = [1; 2]$ .      C.  $D = (1; 2]$ .      D.  $D = (-1; 2)$ .

**Câu 14.** Tập xác định của hàm số  $y = \ln(\ln x)$  là :

- A.  $D = (1; +\infty)$ .      B.  $D = (0; +\infty)$ .      C.  $D = (e; +\infty)$ .      D.  $D = [1; +\infty)$ .

**Câu 15.** Tập xác định của hàm số  $y = (3^x - 9)^{-2}$  là


- A.  $D = (2; +\infty)$ .      B.  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .      C.  $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ .      D.  $D = (0; +\infty)$ .

**Câu 16.** Hàm số  $y = \log_{x-1} x$  xác định khi và chỉ khi :

- A.  $x \neq 2$ .      B.  $x > 1$ .      C.  $x > 0$ .      D.  $\begin{cases} x > 1 \\ x \neq 2 \end{cases}$ .

**Câu 17.** Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

- A.  $y = 2^x$ .      B.  $y = x$ .  
C.  $y = (\sqrt{2})^x$ .      D.  $y = (\sqrt{2})^{-x}$ .



**Câu 18.** Hàm số  $y = (x-1)^{\frac{1}{3}}$  có đạo hàm là:

- A.  $y' = \frac{1}{3\sqrt{(x-1)^3}}$ .      B.  $y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}}$ .      C.  $y' = \frac{\sqrt[3]{(x-1)^2}}{3}$ .      D.  $y' = \frac{\sqrt{(x-1)^3}}{3}$ .

**Câu 19.** Đạo hàm của hàm số  $y = 4^{2x}$  là:

- A.  $y' = 2 \cdot 4^{2x} \ln 2$ .      B.  $y' = 4^{2x} \ln 2$ .      C.  $y' = 4^{2x} \ln 4$ .      D.  $y' = 2 \cdot 4^{2x} \ln 4$ .

**Câu 20.** Đạo hàm của hàm số  $y = \log_5 x, x > 0$  là:

- A.  $y' = \frac{1}{5^x \ln 5}$ .      B.  $y' = x \ln 5$ .      C.  $y' = 5^x \ln 5$ .      D.  $y' = \frac{1}{x \ln 5}$ .

**Câu 21.** Hàm số  $y = \log_{0,5} x^2 (x \neq 0)$  có công thức đạo hàm là:

- A.  $y' = \frac{2}{x^2 \ln 0,5}$ .      B.  $y' = \frac{1}{x^2 \ln 0,5}$ .      C.  $y' = \frac{2}{x \ln 0,5}$ .      D.  $\frac{1}{x \ln 0,5}$ .

**Câu 22.** Đạo hàm của hàm số  $y = \sin x + \log_3 x^3 (x > 0)$  là:

- A.  $y' = -\cos x + \frac{1}{x^3 \ln 3}$ .      B.  $y' = -\cos x + \frac{3}{x \ln 3}$ .  
C.  $y' = \cos x + \frac{1}{x^3 \ln 3}$ .      D.  $y' = \cos x + \frac{3}{x \ln 3}$ .

**Câu 23.** Cho hàm số  $f(x) = \ln(x^4 + 1)$ . Đạo hàm  $f'(0)$  bằng:

- A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.

**Câu 24.** Cho hàm số  $f(x) = e^{2017x^2}$ . Đạo hàm  $f'(0)$  bằng:


- A. 1. B. 0. C.  $e$ . D.  $e^{2017}$ .

**Câu 25.** Cho hàm số  $f(x) = xe^x$ . Gọi  $f''(x)$  là đạo hàm cấp hai của  $f(x)$ . Ta có  $f''(1)$  bằng:

- A.  $-5e^2$ . B.  $-3e^2$ . C.  $e^3$ . D.  $3e$ .

**Câu 26.** Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

- A.  $y = \log_2 x$ . B.  $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ .  
C.  $y = \log_{\sqrt{2}} x$ . D.  $y = \log_2(2x)$ .



**Câu 27.** Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?

- A. Đồ thị hàm số  $y = x^\alpha$  với  $\alpha < 0$  có hai tiệm cận.  
B. Đồ thị hàm số  $y = x^\alpha$  với  $\alpha > 0$  không có tiệm cận.  
C. Hàm số  $y = x^\alpha$  với  $\alpha < 0$  nghịch biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .  
D. Hàm số  $y = x^\alpha$  có tập xác định là  $D = \mathbb{R}$ .

**Câu 28.** Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?


- A. Đồ thị hàm số lôgarit nằm bên phải trục tung.  
B. Đồ thị hàm số lôgarit nằm bên trái trục tung.  
C. Đồ thị hàm số mũ nằm bên phải trục tung.  
D. Đồ thị hàm số mũ nằm bên trái trục tung.

**Câu 29.** Chọn phát biểu **sai** trong các phát biểu sau?

- A. Đồ thị hàm số lôgarit nằm bên trên trục hoành.  
B. Đồ thị hàm số mũ không nằm bên dưới trục hoành.  
C. Đồ thị hàm số lôgarit nằm bên phải trục tung.  
D. Đồ thị hàm số mũ với số mũ âm luôn có hai tiệm cận.


**Câu 30.** Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

- A.  $y = -3x + 1$ . B.  $y = \log_2 x$ . C.  $y = -\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$ . D.  $y = \log_{0,5} x$ .



**Câu 31.** Tìm  $a$  để hàm số  $y = \log_a x$  ( $0 < a \neq 1$ ) có đồ thị là hình bên dưới:

- A.  $a = 2$ . B.  $a = \sqrt{2}$ .  
C.  $a = \frac{1}{2}$ . D.  $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ .



**Câu 32.** Tìm tập xác định  $D$  của hàm số  $y = \log_3 \frac{10-x}{x^2-3x+2}$ .

- A.  $D = (-\infty; 10)$ . B.  $D = (1; +\infty)$ . C.  $D = (-\infty; 1) \cup (2; 10)$ . D.  $D = (2; 10)$ .

**Câu 33.** Tìm tập xác định  $D$  của hàm số  $y = \sqrt{\log_3(x-2)-3}$  ?

- A.  $D = (29; +\infty)$ .      B.  $D = [29; +\infty)$ .      C.  $D = (2; 29)$ .      D.  $D = (2; +\infty)$ .

**Câu 34.** Tính đạo hàm của hàm số  $y = (x^2 + 2x)e^{-x}$  ?

- A.  $y' = (2x-2)e^x$ .      B.  $y' = (x^2+2)e^{-x}$ .      C.  $y' = xe^{-x}$ .      D.  $y' = (-x^2+2)e^{-x}$ .

**Câu 35.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \ln(x^2 - 2mx + 4)$  có tập xác định  $D = \mathbb{R}$  ?

- A.  $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \end{cases}$ .      B.  $-2 < m < 2$ .      C.  $m > -2$ .      D.  $-2 \leq m \leq 2$ .



**Câu 36.** Cho tập  $D = (3; 4)$  và các hàm số  $f(x) = \frac{2017}{\sqrt{x^2 - 7x + 12}}$ ,  $g(x) = \log_{x-3}(4-x)$ ,  $h(x) = 3^{x^2 - 7x + 12}$

$D$  là tập xác định của hàm số nào?


- A.  $f(x)$  và  $f(x) + g(x)$ .      B.  $f(x)$  và  $h(x)$ .  
C.  $g(x)$  và  $h(x)$ .      D.  $f(x) + h(x)$  và  $h(x)$ .

**Câu 37.** Biết hàm số  $y = 2^x$  có đồ thị là hình bên.


Khi đó, hàm số  $y = 2^{|x|}$  có đồ thị là hình nào trong bốn hình được liệt kê ở bốn A, B, C, D dưới đây ?




Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. Hình 1.      B. Hình 2.  
C. Hình 3.      D. Hình 4.

**Câu 38.** Cho hàm số  $y = ex + e^{-x}$ . Nghiệm của phương trình  $y' = 0$  ?

- A.  $x = 1$ .      B.  $x = -1$ .      C.  $x = 0$ .      D.  $x = \ln 2$ .


**Câu 39.** Tìm tất cả các giá trị thực của  $a$  để hàm số  $y = \log_a x$  ( $0 < a \neq 1$ ) có đồ thị là hình bên ?

A.  $a = \frac{1}{2}$ .

B.  $a = \sqrt{2}$ .

C.  $a = \sqrt{2}$ .

D.  $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ .



**Câu 40.** Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = x^2 e^x$  trên đoạn  $[-1; 1]$  ?


A.  $2e$ .

B.  $\frac{1}{e}$ .


C.  $e$ .

D.  $0$ .


**Câu 41.** Cho hàm số  $y = \log_2(2x)$ . Khi đó, hàm số  $y = |\log_2(2x)|$  có đồ thị là hình nào trong bốn hình được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây:




Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.

**Câu 42.** Tìm điều kiện xác định của phương trình  $\log^4(x-1) + \log^2(x-1)^2 = 25$  ?

A.  $x \neq 1$ .

B.  $x > 1$ .

C.  $x \geq 1$ .

D.  $x \in \mathbb{R}$ .

**Câu 43.** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = 2^{|x|}$  trên  $[-2; 2]$  ?

A.  $\max y = 4; \min y = \frac{1}{4}$ .


B.  $\max y = 4; \min y = -\frac{1}{4}$ .

C.  $\max y = 1; \min y = \frac{1}{4}$ .

D.  $\max y = 4; \min y = 1$ .

**Câu 44.** Chọn khẳng định đúng khi nói về hàm số  $y = \frac{\ln x}{x}$

- A. Hàm số không có cực trị.
- B. Hàm số có một điểm cực đại.
- C. Hàm số có một điểm cực tiểu.
- D. Hàm số có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.



**Câu 45.** Hình bên là đồ thị của ba hàm số  $y = \log_a x$ ,  $y = \log_b x$ ,  $y = \log_c x$  ( $0 < a, b, c \neq 1$ ) được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A.  $a > b > c$ .
- B.  $b > a > c$ .
- C.  $b > c > a$ .
- D.  $a > c > b$ .

**Câu 46.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{1}{\sqrt{2m+1-x}} + \log_3 \sqrt{x-m}$  xác định trên  $(2; 3)$ .

- A.  $-1 < m < 2$ .
- B.  $1 < m \leq 2$ .
- C.  $1 \leq m \leq 2$ .
- D.  $-1 \leq m \leq 2$ .

**Câu 47.** Cho hàm số  $y = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. Hàm số có đạo hàm  $y' = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ .
- B. Hàm số tăng trên khoảng  $(0; +\infty)$ .
- C. Tập xác định của hàm số là  $D = \mathbb{R}$ .
- D. Hàm số giảm trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

**Câu 48.** Đối với hàm số  $y = \ln \frac{1}{x+1}$ , Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A.  $xy' - 1 = e^y$ .
- B.  $xy' - 1 = -e^y$ .
- C.  $xy' + 1 = -e^y$ .
- D.  $xy' + 1 = e^y$ .


**Câu 49.** Đạo hàm của hàm số  $y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$  là:

- A.  $y' = \frac{3e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}$ .
- B.  $y' = \frac{e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}$ .
- C.  $y' = \frac{2e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}$ .
- D.  $y' = \frac{4e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}$ .

**Câu 50.** Cho hàm số  $y = x \sin x$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A.  $xy'' + y' - xy = 2 \cos x + \sin x$ .
- B.  $xy' + yy'' - xy' = 2 \sin x$ .
- C.  $xy' + yy'' - xy' = 2 \sin x$ .
- D.  $xy'' - 2y' + xy = -2 \sin x$ .

**Câu 51.** Hình bên là đồ thị của ba hàm số  $y = a^x$ ,  $y = b^x$ ,  $y = c^x$  ( $0 < a, b, c \neq 1$ ) được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?



- A.  $a > b > c$ .
- B.  $b > a > c$ .
- C.  $a > c > b$ .
- D.  $c > b > a$ .

### Vấn đề 4. PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

- Câu 1.** Cho phương trình  $3^{x^2-4x+5} = 9$  tổng lập phương các nghiệm thực của phương trình là  
**A.** 26. **B.** 27. **C.** 28. **D.** 25.
- Câu 2.** Cho phương trình :  $3^{x^2-3x+8} = 9^{2x-1}$  , khi đó tập nghiệm của phương trình là  
**A.**  $S = \{2; 5\}$ . **B.**  $S = \{-2; -5\}$ .  
**C.**  $S = \left\{ \frac{5-\sqrt{61}}{2}; \frac{5+\sqrt{61}}{2} \right\}$ . **D.**  $S = \left\{ \frac{-5-\sqrt{61}}{2}; \frac{-5+\sqrt{61}}{2} \right\}$ .
- Câu 3.** Phương trình  $3^{1-x} = 2 + \left(\frac{1}{9}\right)^x$  có bao nhiêu nghiệm âm?  
**A.** 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 0.
- Câu 4.** Số nghiệm của phương trình  $9^{\frac{x}{2}} + 9 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{2x+2} - 4 = 0$  là  
**A.** 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 0.
- Câu 5.** Cho phương trình :  $2^{\left|\frac{28}{3}x+4\right|} = 16^{x^2-1}$  . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?  
**A.** Phương trình vô nghiệm.  
**B.** Tổng các nghiệm của phương trình là một số nguyên .  
**C.** Nghiệm của phương trình là các số vô tỉ.  
**D.** Tích các nghiệm của phương trình là một số âm.
- Câu 6.** Phương trình  $2^{8-x^2} \cdot 5^{8-x^2} = 0,001 \cdot (10^5)^{1-x}$  có tổng các nghiệm là  
**A.** 5. **B.** 7. **C.** -7 . **D.** -5 .
- Câu 7.** Phương trình  $9^x - 5 \cdot 3^x + 6 = 0$  có nghiệm là  
**A.**  $x = -1, x = \log_3 2$  . **B.**  $x = 1, x = \log_3 2$  .  
**C.**  $x = 1, x = \log_2 3$  . **D.**  $x = -1, x = -\log_3 2$  .
- Câu 8.** Cho phương trình  $4 \cdot 4^x - 9 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$  . Gọi  $x_1, x_2$  là hai nghiệm của phương trình trên. Khi đó, tích  $x_1 \cdot x_2$  bằng:  
**A.** -1. **B.** 2 . **C.** -2. **D.** 1.
- Câu 9.** Cho phương trình  $4^x - 4^{1-x} = 3$  . Khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?  
**A.** Phương trình có một nghiệm.  
**B.** Phương trình vô nghiệm.  
**C.** Nghiệm của phương trình là luôn lớn hơn 0.  
**D.** Phương trình đã cho tương đương với phương trình:  $4^{2x} - 3 \cdot 4^x - 4 = 0$  .
- Câu 10.** Cho phương trình  $9^{x^2+x-1} - 10 \cdot 3^{x^2+x-1} + 1 = 0$  . Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình.  
**A.** 0 . **B.** 2 . **C.** 1. **D.** -2 .
- Câu 11.** Nghiệm của phương trình  $2^x + 2^{x+1} = 3^x + 3^{x+1}$  là  
**A.**  $x = \log_{\frac{3}{2}} \frac{3}{4}$  . **B.**  $x = 1$  . **C.**  $x = 0$  . **D.**  $x = \log_{\frac{4}{3}} \frac{2}{3}$  .
- Câu 12.** Tập nghiệm của phương trình  $2^{2x} - 3 \cdot 2^{x+2} + 32 = 0$  là  
**A.**  $S = \{2; 3\}$  . **B.**  $S = \{4; 8\}$  . **C.**  $S = \{2; 8\}$  . **D.**  $S = \{3; 4\}$  .



- Câu 13.** Tập nghiệm của phương trình  $6.4^x - 13.6^x + 6.9^x = 0$  là  
**A.**  $S = \{-1; 0\}$ . **B.**  $S = \left\{\frac{2}{3}; \frac{3}{2}\right\}$ . **C.**  $S = \{1; -1\}$ . **D.**  $S = \{0; 1\}$ .
- Câu 14.** Nghiệm của phương trình  $12.3^x + 3.15^x - 5^{x+1} = 20$  là  
**A.**  $x = \log_3 5$ . **B.**  $x = \log_3 5 - 1$ . **C.**  $x = \log_3 5 + 1$ . **D.**  $x = \log_5 3 - 1$ .
- Câu 15.** Phương trình  $9^x - 5.3^x + 6 = 0$  có tổng các nghiệm là  
**A.**  $\log_3 6$ . **B.**  $\log_3 \frac{2}{3}$ . **C.**  $\log_3 \frac{3}{2}$ . **D.**  $-\log_3 6$ .
- Câu 16.** Cho phương trình  $2^{1+2x} + 15.2^x - 8 = 0$  (1), khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?  
**A.** (1) vô nghiệm. **B.** (1) có một nghiệm.  
**C.** (1) có hai nghiệm dương. **D.** (1) có hai nghiệm âm.
- Câu 17.** Phương trình  $5^x + 25^{1-x} = 6$  có tích các nghiệm là :  
**A.**  $\log_5 \left( \frac{1+\sqrt{21}}{2} \right)$ . **B.**  $\log_5 \left( \frac{1-\sqrt{21}}{2} \right)$ . **C.** 5. **D.**  $5 \log_5 \left( \frac{1+\sqrt{21}}{2} \right)$ .
- Câu 18.** Phương trình  $(7+4\sqrt{3})^x + (2+\sqrt{3})^x = 6$  có nghiệm là  
**A.**  $x = \log_2 3$ . **B.**  $x = \log_{(2+\sqrt{3})} 2$ . **C.**  $x = \log_2 (2+\sqrt{3})$ . **D.**  $x = 1$ .
- Câu 19.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 32$  là  
**A.**  $S = (5; +\infty)$ . **B.**  $S = (-\infty; 5)$ . **C.**  $S = (-5; +\infty)$ . **D.**  $S = (-\infty; -5)$ .
- Câu 20.** Cho hàm số  $f(x) = 2^{2x} \cdot 3^{\sin^2 x}$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?  
**A.**  $f(x) < 1 \Leftrightarrow x \log_3 2 + \sin^2 x < 0$ . **B.**  $f(x) < 1 \Leftrightarrow 2x + 2 \sin x \log_2 3 < 0$ .  
**C.**  $f(x) < 1 \Leftrightarrow x \ln 4 + \sin^2 x \ln 3 < 0$ . **D.**  $f(x) < 1 \Leftrightarrow 2 + x^2 \log_2 3 < 0$ .
- Câu 21.** Tập nghiệm của bất phương trình  $2^x + 2^{x+1} \leq 3^x + 3^{x-1}$   
**A.**  $S = [2; +\infty)$ . **B.**  $S = (2; +\infty)$ . **C.**  $S = (-\infty; 2)$ . **D.**  $S = (2; +\infty)$ .
- Câu 22.** nghiệm của bất phương trình  $\left(\frac{1}{9}\right)^x > 3^{\frac{2x}{x+1}}$  là  
**A.**  $-1 \leq x < 0$ . **B.**  $x < -2$ . **C.**  $-1 < x < 0$ . **D.**  $\begin{cases} x < -2 \\ -1 < x < 0 \end{cases}$ .
- Câu 23.** Nghiệm của bất phương trình  $16^x - 4^x - 6 \leq 0$  là  
**A.**  $x > \log_4 3$ . **B.**  $x \leq \log_4 3$ . **C.**  $x \geq 1$ . **D.**  $x \geq 3$ .
- Câu 24.** Nghiệm của bất phương trình  $\frac{3^x}{3^x - 2} < 3$  là  
**A.**  $\begin{cases} x > 1 \\ x < \log_3 2 \end{cases}$ . **B.**  $x > \log_3 2$ . **C.**  $x < 1$ . **D.**  $\log_3 2 < x < 1$ .
- Câu 25.** Nghiệm của bất phương trình  $11^{\sqrt{x+6}} \geq 11^x$  là  
**A.**  $x > 3$ . **B.**  $x < -6$ . **C.**  $-6 \leq x \leq 3$ . **D.**  $\emptyset$ .

- Câu 26.** Nghiệm của bất phương trình  $\frac{1}{3^x+5} \leq \frac{1}{3^{x+1}-1}$  là  
**A.**  $-1 < x \leq 1$ . **B.**  $x \leq -1$ . **C.**  $x > 1$ . **D.**  $1 < x < 2$ .
- Câu 27.** Cho bất phương trình  $\left(\frac{5}{7}\right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{5}{7}\right)^{2x-1}$ , tập nghiệm của bất phương trình có dạng  $S = (a; b)$ .  
 Giá trị của biểu thức  $A = b - a$  nhận giá trị nào sau đây?  
**A.** 1. **B.** -1. **C.** 2. **D.** -2.
- Câu 28.** Tập nghiệm của bất phương trình  $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 > 0$  là  
**A.**  $S = (1; 2)$ . **B.**  $S = (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$ .  
**C.**  $S = (0; 1)$ . **D.**  $S = (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$ .
- Câu 29.** Tập nghiệm của bất phương trình  $3^x \cdot 2^{x+1} \geq 72$  là  
**A.**  $S = [2; +\infty)$ . **B.**  $S = (2; +\infty)$ . **C.**  $S = (-\infty; 2)$ . **D.**  $S = (-\infty; 2]$ .
- Câu 30.** Tập nghiệm của bất phương trình  $3^{x+1} - 2^{2x+1} - 12^{\frac{x}{2}} < 0$  là  
**A.**  $S = (0; +\infty)$ . **B.**  $S = (1; +\infty)$ .  
**C.**  $S = (-\infty; 0)$ . **D.**  $S = (-\infty; 1)$ .
- Câu 31.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\frac{2 \cdot 3^x - 2^{x+2}}{3^x - 2^x} \leq 1$  là  
**A.**  $S = (1; 3]$ . **B.**  $S = (1; 3)$ . **C.**  $S = \left(0; \log_{\frac{3}{2}} 3\right]$ . **D.**  $S = \left[0; \log_{\frac{3}{2}} 3\right]$ .
- Câu 32.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^{\frac{1}{x}} \leq \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^3$  là  
**A.**  $\left(0; \frac{1}{3}\right]$ . **B.**  $\left(0; \frac{1}{3}\right)$ . **C.**  $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right]$ . **D.**  $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right] \cup (0; +\infty)$ .
- Câu 33.** Nghiệm của bất phương trình  $2^x + 4 \cdot 5^x - 4 < 10^x$  là  
**A.**  $x < 0$ . **B.**  $\begin{cases} x < 0 \\ x > 2 \end{cases}$ . **C.**  $x > 2$ . **D.**  $0 < x < 2$ .
- Câu 34.** Tập nghiệm của bất phương trình  $2^{\sqrt{x}} - 2^{1-\sqrt{x}} < 1$  là  
**A.**  $[-1; 1]$ . **B.**  $(-8; 0)$ . **C.**  $(1; 9)$ . **D.**  $(0; 1]$ .
- Câu 35.** Tìm tất cả các nghiệm của phương trình  $4^{x^2-3x+2} + 4^{x^2+6x+5} = 4^{2x^2+3x+7} + 1$ .  
**A.**  $x \in \{-5; -1; 1; 3\}$ . **B.**  $x \in \{-5; -1; 1; 2\}$ .  
**C.**  $x \in \{-5; -1; 1; -2\}$ . **D.**  $x \in \{5; -1; 1; 2\}$ .
- Câu 36.** Phương trình  $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^x + (\sqrt{3}+\sqrt{2})^x = (\sqrt{10})^x$  có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?  
**A.** 4. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.
- Câu 37.** Phương trình  $3^{2x} + 2x(3^x + 1) - 4 \cdot 3^x - 5 = 0$  có tất cả bao nhiêu nghiệm không âm?  
**A.** 3. **B.** 2. **C.** 0. **D.** 1.

- Câu 38.** Phương trình  $2^{x-3} = 3^{x^2-5x+6}$  có hai nghiệm  $x_1, x_2$  trong đó  $x_1 < x_2$ , hãy chọn phát biểu đúng?
- A.  $3x_1 - 2x_2 = \log_3 8$ . B.  $2x_1 - 3x_2 = \log_3 8$ .  
 C.  $2x_1 + 3x_2 = \log_3 54$ . D.  $3x_1 + 2x_2 = \log_3 54$ .
- Câu 39.** Cho phương trình  $(7+4\sqrt{3})^x + (2+\sqrt{3})^x = 6$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?
- A. Tích của hai nghiệm bằng  $-6$  B. Phương trình có một nghiệm hữu tỉ.  
 C. Phương trình có hai nghiệm trái dấu. D. Phương trình có một nghiệm vô tỉ.
- Câu 40.** Phương trình  $3^{3+3x} + 3^{3-3x} + 3^{4+x} + 3^{4-x} = 10^3$  có tổng các nghiệm là ?
- A. 2. B. 0. C. 3. D. 4.
- Câu 41.** Phương trình  $9^{\sin^2 x} + 9^{\cos^2 x} = 6$  có họ nghiệm là ?
- A.  $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, (k \in \mathbb{Z})$ . B.  $x = \frac{\pi}{2} + \frac{k\pi}{2}, (k \in \mathbb{Z})$ .  
 C.  $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, (k \in \mathbb{Z})$ . D.  $x = \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}, (k \in \mathbb{Z})$ .
- Câu 42.** Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  thì phương trình  $(2+\sqrt{3})^x + (2-\sqrt{3})^x = m$  vô nghiệm?
- A.  $m < 2$ . B.  $m > 2$ . C.  $m = 2$ . D.  $m \leq 2$ .
- Câu 43.** Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  thì phương trình  $(2+\sqrt{3})^x + (2-\sqrt{3})^x = m$  có hai nghiệm phân biệt?
- A.  $m = 2$ . B.  $m < 2$ . C.  $m > 2$ . D.  $m \leq 2$ .
- Câu 44.** Gọi  $x_1, x_2$  là hai nghiệm thực phân biệt của phương trình  $2^{x^2+4} = 2^{2(x^2+1)} + \sqrt{2^{2(x^2+2)} - 2^{x^2+3}} + 1$ . Khi đó, tổng hai nghiệm bằng?
- A. 1. B. 2. C.  $-2$ . D. 0.
- Câu 45.** Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  thì phương trình  $(m+1)16^x - 2(2m-3)4^x + 6m+5 = 0$  có hai nghiệm trái dấu?
- A. Không tồn tại  $m$ . B.  $-4 < m < -1$ . C.  $-1 < m < \frac{3}{2}$ . D.  $-1 < m < -\frac{5}{6}$ .
- Câu 46.** Cho bất phương trình:  $\frac{1}{5^{x+1}-1} \geq \frac{1}{5-5^x}$ . Tìm tập nghiệm của bất phương trình.
- A.  $S = (-1; 0] \cup (1; +\infty)$ . B.  $S = (-1; 0] \cap (1; +\infty)$ .  
 C.  $S = (-\infty; 0]$ . D.  $S = (-\infty; 0)$ .
- Câu 47.** Bất phương trình  $25^{-x^2+2x+1} + 9^{-x^2+2x+1} \geq 34 \cdot 15^{-x^2+2x}$  có tập nghiệm là
- A.  $S = (-\infty; 1-\sqrt{3}] \cup [0; 2] \cup [1+\sqrt{3}; +\infty)$ . B.  $S = (0; +\infty)$ .  
 C.  $S = (2; +\infty)$ . D.  $S = (1-\sqrt{3}; 0)$ .
- Câu 48.** Cho phương trình  $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 2m = 0$  có hai nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$  (trong đó  $m$  là tham số). Tìm tất cả các giá trị thực của  $m$  để  $x_1 + x_2 = 3$ .
- A.  $m = 4$ . B.  $m = 2$ . C.  $m = 1$ . D.  $m = 3$ .

**Câu 49.** Cho bất phương trình  $2^{\sin^2 x} + 3^{\cos^2 x} \geq m \cdot 3^{\sin^2 x}$  (1) (trong đó  $m$  là tham số). Tìm tất cả các giá trị thực của  $m$  để (1) có nghiệm.

- A.  $m \geq 4$ . B.  $m \leq 4$ . C.  $m \leq 1$ . D.  $m \geq 1$ .

**Câu 50.** phương trình (1) nghiệm đúng  $\forall x > 1$ .

- A.  $m > 3 + 2\sqrt{2}$ . B.  $m > -\frac{3}{2}$ . C.  $m \geq -\frac{3}{2}$ . D.  $m \geq 3 + 2\sqrt{2}$ .

### Vấn đề 5. PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

**Câu 1.** Điều kiện xác định của phương trình  $\log_{2x-3} 16 = 2$  là:

- A.  $x \in \mathbb{R} \setminus \left[\frac{3}{2}; 2\right]$ . B.  $x \neq 2$ . C.  $\frac{3}{2} < x \neq 2$ . D.  $x > \frac{3}{2}$ .

**Câu 2.** Điều kiện xác định của phương trình  $\log_x (2x^2 - 7x + 12) = 2$  là:

- A.  $x \in (0; 1) \cup (1; +\infty)$ . B.  $x \in (-\infty; 0)$ . C.  $x \in (0; 1)$ . D.  $x \in (0; +\infty)$ .

**Câu 3.** Điều kiện xác định của phương trình  $\log_5 (x-1) = \log_5 \frac{x}{x+1}$  là:

- A.  $x \in (1; +\infty)$ . B.  $x \in (-1; 0)$ . C.  $x \in \mathbb{R} \setminus [-1; 0]$ . D.  $x \in (-\infty; 1)$ .

**Câu 4.** Điều kiện xác định của phương trình  $\log_9 \frac{2x}{x+1} = \frac{1}{2}$  là:

- A.  $x \in (-1; +\infty)$ . B.  $x \in \mathbb{R} \setminus [-1; 0]$ . C.  $x \in (-1; 0)$ . D.  $x \in (-\infty; 1)$ .

**Câu 5.** Phương trình  $\log_2 (3x-2) = 2$  có nghiệm là:

- A.  $x = \frac{4}{3}$ . B.  $x = \frac{2}{3}$ . C.  $x = 1$ . D.  $x = 2$ .

**Câu 6.** Phương trình  $\log_2 (x+3) + \log_2 (x-1) = \log_2 5$  có nghiệm là:

- A.  $x = 2$ . B.  $x = 1$ . C.  $x = 3$ . D.  $x = 0$ .

**Câu 7.** Phương trình  $\log_3 (x^2 - 6) = \log_3 (x-2) + 1$  có tập nghiệm là:

- A.  $T = \{0; 3\}$ . B.  $T = \emptyset$ . C.  $T = \{3\}$ . D.  $T = \{1; 3\}$ .

**Câu 8.** Phương trình  $\log_2 x + \log_2 (x-1) = 1$  có tập nghiệm là:

- A.  $\{-1; 3\}$ . B.  $\{1; 3\}$ . C.  $\{2\}$ . D.  $\{1\}$ .

**Câu 9.** Phương trình  $\log_2^2 (x+1) - 6\log_2 \sqrt{x+1} + 2 = 0$  có tập nghiệm là:

- A.  $\{3; 15\}$ . B.  $\{1; 3\}$ . C.  $\{1; 2\}$ . D.  $\{1; 5\}$ .

**Câu 10.** Số nghiệm của phương trình  $\log_4 (\log_2 x) + \log_2 (\log_4 x) = 2$  là:

- A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.

**Câu 11.** Số nghiệm của phương trình  $\log_2 x \cdot \log_3 (2x-1) = 2\log_2 x$  là:

- A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.

**Câu 12.** Số nghiệm của phương trình  $\log_2 (x^3 + 1) - \log_2 (x^2 - x + 1) - 2\log_2 x = 0$  là:

- A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.

**Câu 13.** Số nghiệm của phương trình  $\log_5 (5x) - \log_{25} (5x) - 3 = 0$  là:

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

- Câu 14.** Phương trình  $\log_3(5x-3) + \log_{\frac{1}{3}}(x^2+1) = 0$  có 2 nghiệm  $x_1, x_2$  trong đó  $x_1 < x_2$ . Giá trị của  $P = 2x_1 + 3x_2$  là  
**A.** 5. **B.** 14. **C.** 3. **D.** 13.
- Câu 15.** Hai phương trình  $2\log_5(3x-1) + 1 = \log_{\sqrt[3]{5}}(2x+1)$  và  $\log_2(x^2 - 2x - 8) = 1 - \log_{\frac{1}{2}}(x+2)$  lần lượt có 2 nghiệm duy nhất là  $x_1, x_2$ . Tổng  $x_1 + x_2$  là?  
**A.** 8. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 10.
- Câu 16.** Gọi  $x_1, x_2$  là nghiệm của phương trình  $\log_x 2 - \log_{16} x = 0$ . Khi đó tích  $x_1 \cdot x_2$  bằng:  
**A.** -1. **B.** 1. **C.** 2. **D.** -2.
- Câu 17.** Nếu đặt  $t = \log_2 x$  thì phương trình  $\frac{1}{5 - \log_2 x} + \frac{2}{1 + \log_2 x} = 1$  trở thành phương trình nào?  
**A.**  $t^2 - 5t + 6 = 0$ . **B.**  $t^2 + 5t + 6 = 0$ .  
**C.**  $t^2 - 6t + 5 = 0$ . **D.**  $t^2 + 6t + 5 = 0$ .
- Câu 18.** Nếu đặt  $t = \lg x$  thì phương trình  $\frac{1}{4 - \lg x} + \frac{2}{2 + \lg x} = 1$  trở thành phương trình nào?  
**A.**  $t^2 + 2t + 3 = 0$ . **B.**  $t^2 - 3t + 2 = 0$ .  
**C.**  $t^2 - 2t + 3 = 0$ . **D.**  $t^2 + 3t + 2 = 0$ .
- Câu 19.** Nghiệm bé nhất của phương trình  $\log_2^3 x - 2\log_2^2 x = \log_2 x - 2$  là:  
**A.**  $x = 4$ . **B.**  $x = \frac{1}{4}$ . **C.**  $x = 2$ . **D.**  $x = \frac{1}{2}$ .
- Câu 20.** Điều kiện xác định của bất phương trình  $\log_{\frac{1}{2}}(4x+2) - \log_{\frac{1}{2}}(x-1) > \log_{\frac{1}{2}} x$  là:  
**A.**  $x > -\frac{1}{2}$ . **B.**  $x > 0$ . **C.**  $x > 1$ . **D.**  $x > -1$ .
- Câu 21.** Điều kiện xác định của bất phương trình  $\log_2(x+1) - 2\log_4(5-x) < 1 - \log_2(x-2)$  là:  
**A.**  $2 < x < 5$ . **B.**  $1 < x < 2$ . **C.**  $2 < x < 3$ . **D.**  $-4 < x < 3$ .
- Câu 22.** Điều kiện xác định của bất phương trình  $\log_{\frac{1}{2}}[\log_2(2-x^2)] > 0$  là:  
**A.**  $x \in [-1; 1]$ . **B.**  $x \in (-1; 0) \cup (0; 1)$ .  
**C.**  $x \in (-1; 1) \cup (2; +\infty)$ . **D.**  $x \in (-1; 1)$ .
- Câu 23.** Bất phương trình  $\log_2(2^x + 1) + \log_3(4^x + 2) \leq 2$  có tập nghiệm là:  
**A.**  $[0; +\infty)$ . **B.**  $(-\infty; 0)$ . **C.**  $(-\infty; 0]$ . **D.**  $(0; +\infty)$ .
- Câu 24.** Bất phương trình  $\log_2(x^2 - x - 2) \geq \log_{0,5}(x-1) + 1$  có tập nghiệm là:  
**A.**  $[1 + \sqrt{2}; +\infty)$ . **B.**  $[1 - \sqrt{2}; +\infty)$ .  
**C.**  $(-\infty; 1 + \sqrt{2}]$ . **D.**  $(-\infty; 1 - \sqrt{2}]$ .
- Câu 25.** Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình  $\log_2(\log_4 x) \geq \log_4(\log_2 x)$  là:  
**A.** 16. **B.** 10. **C.** 8. **D.** 9.
- Câu 26.** Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình  $\log_3(1-x^2) \leq \log_{\frac{1}{3}}(1-x)$  là:  
**A.**  $x = 0$ . **B.**  $x = 1$ . **C.**  $x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ . **D.**  $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ .

**Câu 27.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_2(x^2 - 3x + 1) \leq 0$  là:

**A.**  $S = \left[0; \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}; 3\right]$ .

**B.**  $S = \left(0; \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}; 3\right)$ .

**C.**  $S = \left[\frac{3-\sqrt{5}}{2}; \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right]$ .

**D.**  $S = \emptyset$ .

**Câu 28.** Điều kiện xác định của phương trình  $\log_2(x-5) + \log_3(x+2) = 3$  là:

**A.**  $x \geq 5$ .

**B.**  $x > -2$ .

**C.**  $-2 < x < 5$ .

**D.**  $x > 5$ .

**Câu 29.** Điều kiện xác định của phương trình  $\log(x^2 - 6x + 7) + x - 5 = \log(x-3)$  là:

**A.**  $x > 3 + \sqrt{2}$ .

**B.**  $x > 3$ .

**C.**  $\begin{cases} x > 3 + \sqrt{2} \\ x < 3 - \sqrt{2} \end{cases}$ .

**D.**  $x < 3 - \sqrt{2}$ .

**Câu 30.** Phương trình  $\log_3 x + \log_{\sqrt{3}} x + \log_{\frac{1}{3}} x = 6$  có nghiệm là:

**A.**  $x = 27$ .

**B.**  $x = 9$ .

**C.**  $x = 3^{12}$ .

**D.**  $x = \log_3 6$ .

**Câu 31.** Phương trình  $\ln \frac{x+8}{x-1} = \ln x$  có nghiệm là:

**A.**  $x = -2$ .

**B.**  $\begin{cases} x = 4 \\ x = -2 \end{cases}$ .

**C.**  $x = 4$ .

**D.**  $x = 1$ .

**Câu 32.** Phương trình  $\log_2^2 x - 4\log_2 x + 3 = 0$  có tập nghiệm là:

**A.**  $\{8; 2\}$ .

**B.**  $\{1; 3\}$ .

**C.**  $\{6; 2\}$ .

**D.**  $\{6; 8\}$ .

**Câu 33.** Tập nghiệm của phương trình  $\frac{1}{2}\log_2(x+2)^2 - 1 = 0$  là:

**A.**  $\{0\}$ .

**B.**  $\{0; -4\}$ .

**C.**  $\{-4\}$ .

**D.**  $\{-1; 0\}$ .

**Câu 34.** Tập nghiệm của phương trình  $\log_2 \frac{1}{x} = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - x - 1)$  là:

**A.**  $\{1 + \sqrt{2}\}$ .

**B.**  $\{1 + \sqrt{2}; 1 - \sqrt{2}\}$ .

**C.**  $\left\{\frac{1+\sqrt{5}}{2}; \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right\}$ .

**D.**  $\{1 - \sqrt{2}\}$ .

**Câu 35.** Phương trình  $\log_2(3 \cdot 2^x - 1) = 2x + 1$  có bao nhiêu nghiệm?

**A.** 1.

**B.** 2.

**C.** 3.

**D.** 0.

**Câu 36.** Số nghiệm của phương trình  $\ln(x^2 - 6x + 7) = \ln(x - 3)$  là:

**A.** 0.

**B.** 2.

**C.** 3.

**D.** 1.

**Câu 37.** Nghiệm nhỏ nhất của phương trình  $-\log_{\sqrt{3}}(x-2) \cdot \log_5 x = 2\log_3(x-2)$  là:

**A.**  $\frac{1}{5}$ .

**B.** 3.

**C.** 2.

**D.** 1.

**Câu 38.** Nghiệm lớn nhất của phương trình  $-\log^3 x + 2\log^2 x = 2 - \log x$  là:

**A.** 100.

**B.** 2.

**C.** 10.

**D.** 1000.

**Câu 39.** Gọi  $x_1, x_2$  là 2 nghiệm của phương trình  $\log_3(x^2 - x - 5) = \log_3(2x + 5)$ .

Khi đó  $|x_1 - x_2|$  bằng:

**A.** 5.

**B.** 3.

**C.** -2.

**D.** 7.

- Câu 40.** Gọi  $x_1, x_2$  là 2 nghiệm của phương trình  $\frac{1}{4 + \log_2 x} + \frac{2}{2 - \log_2 x} = 1$ . Khi đó  $x_1 \cdot x_2$  bằng:
- A.  $\frac{1}{2}$ .                      B.  $\frac{1}{8}$ .                      C.  $\frac{1}{4}$ .                      D.  $\frac{3}{4}$ .
- Câu 41.** Gọi  $x_1, x_2$  là 2 nghiệm của phương trình  $\log_2 [x(x+3)] = 1$ . Khi đó  $x_1 + x_2$  bằng:
- A.  $-3$ .                      B.  $-2$ .                      C.  $\sqrt{17}$ .                      D.  $\frac{-3 + \sqrt{17}}{2}$ .
- Câu 42.** Nếu đặt  $t = \log_2 x$  thì phương trình  $\log_2 (4x) - \log_x 2 = 3$  trở thành phương trình nào?
- A.  $t^2 - t - 1 = 0$ .                      B.  $4t^2 - 3t - 1 = 0$ .                      C.  $t + \frac{1}{t} = 1$ .                      D.  $2t - \frac{1}{t} = 3$ .
- Câu 43.** Nếu đặt  $t = \log x$  thì phương trình  $\log^2 x^3 - 20 \log \sqrt{x} + 1 = 0$  trở thành phương trình nào?
- A.  $9t^2 - 20\sqrt{t} + 1 = 0$ .                      B.  $3t^2 - 20t + 1 = 0$ .                      C.  $9t^2 - 10t + 1 = 0$ .                      D.  $3t^2 - 10t + 1 = 0$ .
- Câu 44.** Cho bất phương trình  $\frac{1 - \log_9 x}{1 + \log_3 x} \leq \frac{1}{2}$ . Nếu đặt  $t = \log_3 x$  thì bất phương trình trở thành:
- A.  $2(1 - 2t) \leq 1 + t$ .                      B.  $\frac{1 - 2t}{1 + t} \leq \frac{1}{2}$ .                      C.  $1 - \frac{1}{2}t \leq \frac{1}{2}(1 + t)$ .                      D.  $\frac{2t - 1}{1 + t} \geq 0$ .
- Câu 45.** Điều kiện xác định của bất phương trình  $\log_5(x - 2) + \log_{\frac{1}{5}}(x + 2) > \log_5 x - 3$  là:
- A.  $x > 3$ .                      B.  $x > 2$ .                      C.  $x > -2$ .                      D.  $x > 0$ .
- Câu 46.** Điều kiện xác định của bất phương trình  $\log_{0,5}(5x + 15) \leq \log_{0,5}(x^2 + 6x + 8)$  là:
- A.  $x > -2$ .                      B.  $\begin{cases} x < -4 \\ x > -2 \end{cases}$ .                      C.  $x > -3$ .                      D.  $-4 < x < -2$ .
- Câu 47.** Điều kiện xác định của bất phương trình  $\ln \frac{x^2 - 1}{x} < 0$  là:
- A.  $\begin{cases} -1 < x < 0 \\ x > 1 \end{cases}$ .                      B.  $x > -1$ .                      C.  $x > 0$ .                      D.  $\begin{cases} x < -1 \\ x > 1 \end{cases}$ .
- Câu 48.** Bất phương trình  $\log_{0,2}^2 x - 5 \log_{0,2} x < -6$  có tập nghiệm là:
- A.  $S = \left(\frac{1}{125}; \frac{1}{25}\right)$ .                      B.  $S = (2; 3)$ .                      C.  $S = \left(0; \frac{1}{25}\right)$ .                      D.  $S = (0; 3)$ .
- Câu 49.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 6x + 5) + \log_3(x - 1) \geq 0$  là:
- A.  $S = [1; 6]$ .                      B.  $S = (5; 6]$ .                      C.  $S = (5; +\infty)$ .                      D.  $S = (1; +\infty)$ .
- Câu 50.** Bất phương trình  $\log_{\frac{2}{3}}(2x^2 - x + 1) < 0$  có tập nghiệm là:
- A.  $S = \left(0; \frac{3}{2}\right)$ .                      B.  $S = \left(-1; \frac{3}{2}\right)$ .                      C.  $S = (-\infty; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ .                      D.  $S = (-\infty; 1) \cup \left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$ .
- Câu 51.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_3 \frac{4x + 6}{x} \leq 0$  là:
- A.  $S = \left[-2; -\frac{3}{2}\right)$ .                      B.  $S = [-2; 0)$ .                      C.  $S = (-\infty; 2]$ .                      D.  $S = \mathbb{R} \setminus \left[-\frac{3}{2}; 0\right]$ .

- Câu 52.** Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình  $\log_{0,2} x - \log_5 (x-2) < \log_{0,2} 3$  là:  
**A.**  $x = 6$ . **B.**  $x = 3$ . **C.**  $x = 5$ . **D.**  $x = 4$ .
- Câu 53.** Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình  $\log_3 (4 \cdot 3^{x-1}) > 2x-1$  là:  
**A.**  $x = 3$ . **B.**  $x = 2$ . **C.**  $x = 1$ . **D.**  $x = -1$ .
- Câu 54.** Điều kiện xác định của phương trình  $\log_2 [3 \log_2 (3x-1) - 1] = x$  là:  
**A.**  $x > \frac{\sqrt[3]{2}+1}{3}$ . **B.**  $x \geq \frac{1}{3}$ . **C.**  $x > 0$ . **D.**  $x \in (0; +\infty) \setminus \{1\}$ .
- Câu 55.** Điều kiện xác định của phương trình  $\log_2 (x - \sqrt{x^2 - 1}) \cdot \log_3 (x + \sqrt{x^2 - 1}) = \log_6 |x - \sqrt{x^2 - 1}|$  là:  
**A.**  $x \leq -1$ . **B.**  $x \geq 1$ . **C.**  $x > 0, x \neq 1$ . **D.**  $x \leq -1$  hoặc  $x \geq 1$ .
- Câu 56.** Nghiệm nguyên của phương trình  $\log_2 (x - \sqrt{x^2 - 1}) \cdot \log_3 (x + \sqrt{x^2 - 1}) = \log_6 |x - \sqrt{x^2 - 1}|$  là:  
**A.**  $x = 1$ . **B.**  $x = -1$ . **C.**  $x = 2$ . **D.**  $x = 3$ .
- Câu 57.** Nếu đặt  $t = \log_2 x$  thì bất phương trình  $\log_2^4 x - \log_2^2 \left( \frac{x^3}{8} \right) + 9 \log_2 \left( \frac{32}{x^2} \right) < 4 \log_{2^{-1}}^2 (x)$  trở thành bất phương trình nào?  
**A.**  $t^4 + 13t^2 + 36 < 0$ . **B.**  $t^4 - 5t^2 + 9 < 0$ .  
**C.**  $t^4 - 13t^2 + 36 < 0$ . **D.**  $t^4 - 13t^2 - 36 < 0$ .
- Câu 58.** Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình  $\log_2^4 x - \log_2^2 \left( \frac{x^3}{8} \right) + 9 \log_2 \left( \frac{32}{x^2} \right) < 4 \log_{2^{-1}}^2 (x)$  là:  
**A.**  $x = 7$ . **B.**  $x = 8$ . **C.**  $x = 4$ . **D.**  $x = 1$ .
- Câu 59.** Bất phương trình  $\log_x (\log_3 (9^x - 72)) \leq 1$  có tập nghiệm là:  
**A.**  $S = [\log_3 \sqrt{73}; 2]$ . **B.**  $S = (\log_3 \sqrt{72}; 2]$ .  
**C.**  $S = (\log_3 \sqrt{73}; 2]$ . **D.**  $S = (-\infty; 2]$ .
- Câu 60.** Gọi  $x_1, x_2$  là nghiệm của phương trình  $\log_2 [x(x-1)] = 1$ . Khi đó tích  $x_1 \cdot x_2$  bằng:  
**A.**  $-2$ . **B.**  $1$ . **C.**  $-1$ . **D.**  $2$ .
- Câu 61.** Nếu đặt  $t = \log_2 (5^x - 1)$  thì phương trình  $\log_2 (5^x - 1) \cdot \log_4 (2 \cdot 5^x - 2) = 1$  trở thành phương trình nào?  
**A.**  $t^2 + t - 2 = 0$ . **B.**  $2t^2 = 1$ . **C.**  $t^2 - t - 2 = 0$ . **D.**  $t^2 = 1$ .
- Câu 62.** Số nghiệm của phương trình  $\log_4 (x+12) \cdot \log_x 2 = 1$  là:  
**A.**  $0$ . **B.**  $2$ . **C.**  $3$ . **D.**  $1$ .
- Câu 63.** Phương trình  $\log_5^2 (2x-1) - 8 \log_5 \sqrt{2x-1} + 3 = 0$  có tập nghiệm là:  
**A.**  $\{-1; -3\}$ . **B.**  $\{1; 3\}$ . **C.**  $\{3; 63\}$ . **D.**  $\{1; 2\}$ .
- Câu 64.** Nếu đặt  $t = \log_3 \frac{x-1}{x+1}$  thì bất phương trình  $\log_4 \log_3 \frac{x-1}{x+1} < \log_{\frac{1}{4}} \log_{\frac{1}{3}} \frac{x+1}{x-1}$  trở thành bất phương trình nào?  
**A.**  $\frac{t^2-1}{t} < 0$ . **B.**  $t^2 - 1 < 0$ . **C.**  $\frac{t^2-1}{t} > 0$ . **D.**  $\frac{t^2+1}{t} < 0$ .



- Câu 65.** Phương trình  $\log_{2x-3}(3x^2 - 7x + 3) - 2 = 0$  có nghiệm là:  
**A.**  $x = 2; x = 3$ . **B.**  $x = 2$ . **C.**  $x = 3$ . **D.**  $x = 1; x = 5$ .
- Câu 66.** Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình  $\log_2(\log_4 x) > \log_4(\log_2 x)$  là:  
**A.** 18. **B.** 16. **C.** 15. **D.** 17.
- Câu 67.** Phương trình  $\frac{1}{4 - \ln x} + \frac{2}{2 + \ln x} = 1$  có tích các nghiệm là:  
**A.**  $e^3$ . **B.**  $\frac{1}{e}$ . **C.**  $e$ . **D.** 2.
- Câu 68.** Phương trình  $9x^{\log_9 x} = x^2$  có bao nhiêu nghiệm?  
**A.** 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.
- Câu 69.** Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình  $\log_x 3 - \log_{\frac{x}{3}} 3 < 0$  là:  
**A.**  $x = 3$ . **B.**  $x = 1$ . **C.**  $x = 2$ . **D.**  $x = 4$ .
- Câu 70.** Phương trình  $x^{\ln 7} + 7^{\ln x} = 98$  có nghiệm là:  
**A.**  $x = e$ . **B.**  $x = 2$ . **C.**  $x = e^2$ . **D.**  $x = \sqrt{e}$ .
- Câu 71.** Bất phương trình  $\log_2(x^2 - x - 2) \geq \log_{0,5}(x - 1) + 1$  có tập nghiệm là:  
**A.**  $S = [1 - \sqrt{2}; +\infty)$ . **B.**  $S = [1 + \sqrt{2}; +\infty)$ . **C.**  $S = (-\infty; 1 + \sqrt{2}]$ . **D.**  $S = (-\infty; 1 - \sqrt{2}]$ .
- Câu 72.** Biết phương trình  $\frac{1}{\log_2 x} - \frac{1}{2} \log_2 x + \frac{7}{6} = 0$  có hai nghiệm  $x_1, x_2$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?  
**A.**  $x_1^3 + x_2^3 = \frac{2049}{4}$ . **B.**  $x_1^3 + x_2^3 = -\frac{2047}{4}$ . **C.**  $x_1^3 + x_2^3 = -\frac{2049}{4}$ . **D.**  $x_1^3 + x_2^3 = \frac{2047}{4}$ .
- Câu 73.** Số nghiệm nguyên dương của phương trình  $\log_2(4^x + 4) = x - \log_{\frac{1}{2}}(2^{x+1} - 3)$  là:  
**A.** 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.
- Câu 74.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_{\frac{1}{2}}(\log_2(2x - 1)) > 0$  là:  
**A.**  $S = \left(1; \frac{3}{2}\right)$ . **B.**  $S = \left(0; \frac{3}{2}\right)$ . **C.**  $S = (0; 1)$ . **D.**  $S = \left(\frac{3}{2}; 2\right)$ .
- Câu 75.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_4(2x^2 + 3x + 1) > \log_2(2x + 1)$  là:  
**A.**  $S = \left(\frac{1}{2}; 1\right)$ . **B.**  $S = \left(0; \frac{1}{2}\right)$ . **C.**  $S = \left(-\frac{1}{2}; 1\right)$ . **D.**  $S = \left(-\frac{1}{2}; 0\right)$ .
- Câu 76.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_x(125x) \cdot \log_{25} x > \frac{3}{2} + \log_5^2 x$  là:  
**A.**  $S = (1; \sqrt{5})$ . **B.**  $S = (-1; \sqrt{5})$ . **C.**  $S = (-\sqrt{5}; 1)$ . **D.**  $S = (-\sqrt{5}; -1)$ .
- Câu 77.** Tích các nghiệm của phương trình  $\log_2 x \cdot \log_4 x \cdot \log_8 x \cdot \log_{16} x = \frac{81}{24}$  là:  
**A.**  $\frac{1}{2}$ . **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.
- Câu 78.** Phương trình  $\log_{\sqrt{3}}|x + 1| = 2$  có bao nhiêu nghiệm?  
**A.** 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

- Câu 79.** Biết phương trình  $4^{\log_9 x} - 6 \cdot 2^{\log_9 x} + 2^{\log_3 27} = 0$  có hai nghiệm  $x_1, x_2$ . Khi đó  $x_1^2 + x_2^2$  bằng :
- A. 6642.                      B.  $\frac{82}{6561}$ .                      C. 20.                      D. 90.
- Câu 80.** Tập nghiệm của bất phương trình  $2^{\log_2^2 x} - 10x^{\log_2 \frac{1}{x}} + 3 > 0$  là:
- A.  $S = \left(0; \frac{1}{2}\right) \cup (2; +\infty)$ .                      B.  $S = (-2; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ .
- C.  $S = (-\infty; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; 2\right)$ .                      D.  $S = \left(-\infty; \frac{1}{2}\right) \cup (2; +\infty)$ .
- Câu 81.** Tập nghiệm của phương trình  $4^{\log_2 2x} - x^{\log_2 6} = 2 \cdot 3^{\log_2 4x^2}$  là:
- A.  $S = \left\{\frac{4}{9}\right\}$ .                      B.  $S = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$ .                      C.  $S = \left\{\frac{1}{4}\right\}$ .                      D.  $S = \{-2\}$ .
- Câu 82.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $\log_3 x - \log_3 (x-2) = \log_{\sqrt{3}} m$  có nghiệm?
- A.  $m > 1$ .                      B.  $m \geq 1$ .                      C.  $m < 1$ .                      D.  $m \leq 1$ .
- Câu 83.** Tìm tất cả giá trị thực của tham số  $m$  để bất phương trình  $\log_3 (x^2 + 4x + m) \geq 1$  nghiệm đúng với mọi  $x \in \mathbb{R}$ ?
- A.  $m \geq 7$ .                      B.  $m > 7$ .                      C.  $m < 4$ .                      D.  $4 < m \leq 7$ .
- Câu 84.** Tìm tất cả giá trị thực của tham số  $m$  để bất phương trình  $\log_{\frac{1}{5}} (mx - x^2) \leq \log_{\frac{1}{5}} 4$  vô nghiệm?
- A.  $-4 \leq m \leq 4$ .                      B.  $\begin{cases} m > 4 \\ m < -4 \end{cases}$ .                      C.  $m < 4$ .                      D.  $-4 < m < 4$ .
- Câu 85.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $\log_2 (mx - x^2) = 2$  vô nghiệm?
- A.  $m < 4$ .                      B.  $-4 < m < 4$ .                      C.  $\begin{cases} m > 4 \\ m < -4 \end{cases}$ .                      D.  $m > -4$ .
- Câu 86.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $\log_4^2 x + 3\log_4 x + 2m - 1 = 0$  có 2 nghiệm phân biệt?
- A.  $m < \frac{13}{8}$ .                      B.  $m > \frac{13}{8}$ .                      C.  $m \leq \frac{13}{8}$ .                      D.  $0 < m < \frac{13}{8}$ .
- Câu 87.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để bất phương trình  $\log_2 (5^x - 1) \cdot \log_2 (2 \cdot 5^x - 2) \leq m$  có nghiệm  $x \geq 1$ ?
- A.  $m \geq 6$ .                      B.  $m > 6$ .                      C.  $m \leq 6$ .                      D.  $m < 6$ .
- Câu 88.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $\log_3^2 x + 2\log_3 x + m - 1 = 0$  có nghiệm?
- A.  $m < 2$ .                      B.  $m \leq 2$ .                      C.  $m \geq 2$ .                      D.  $m > 2$ .
- Câu 89.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để bất phương trình  $\log_2 (5^x - 1) \leq m$  có nghiệm  $x \geq 1$ ?
- A.  $m \geq 2$ .                      B.  $m > 2$ .                      C.  $m \leq 2$ .                      D.  $m < 2$ .
- Câu 90.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $\log_3^2 x + \sqrt{\log_3^2 x + 1} - 2m - 1 = 0$  có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn  $[1; 3^{\sqrt{3}}]$ ?
- A.  $m \in [0; 2]$ .                      B.  $m \in (0; 2)$ .                      C.  $m \in (0; 2]$ .                      D.  $m \in [0; 2)$ .

- Câu 91.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $\log_2(5^x - 1) \cdot \log_4(2 \cdot 5^x - 2) = m$  có nghiệm  $x \geq 1$ . ?  
**A.**  $m \in [2; +\infty)$ . **B.**  $m \in [3; +\infty)$ . **C.**  $m \in (-\infty; 2]$ . **D.**  $m \in (-\infty; 3]$ .
- Câu 92.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $\log_3^2 x - (m+2)\log_3 x + 3m - 1 = 0$  có hai nghiệm  $x_1, x_2$  thỏa mãn  $x_1 \cdot x_2 = 27$ . ?  
**A.**  $m = -2$ . **B.**  $m = -1$ . **C.**  $m = 1$ . **D.**  $m = 2$ .
- Câu 93.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $\sqrt{\log_2^2 x + \log_{\frac{1}{2}} x^2 - 3} = m(\log_4 x^2 - 3)$  có nghiệm thuộc  $[32; +\infty)$  ?  
**A.**  $m \in (1; \sqrt{3}]$ . **B.**  $m \in [1; \sqrt{3})$ . **C.**  $m \in [-1; \sqrt{3})$ . **D.**  $m \in (-\sqrt{3}; 1]$ .
- Câu 94.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  sao cho khoảng  $(2; 3)$  thuộc tập nghiệm của bất phương trình  $\log_5(x^2 + 1) > \log_5(x^2 + 4x + m) - 1$  (1).  
**A.**  $m \in [-12; 13]$ . **B.**  $m \in [12; 13]$ . **C.**  $m \in [-13; 12]$ . **D.**  $m \in [-13; -12]$ .
- Câu 95.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để bất phương trình  $\log_2(7x^2 + 7) \geq \log_2(mx^2 + 4x + m)$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ .  
**A.**  $m \in (2; 5]$ . **B.**  $m \in (-2; 5]$ . **C.**  $m \in [2; 5)$ . **D.**  $m \in [-2; 5)$ .
- Câu 96.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để bất phương trình  $1 + \log_5(x^2 + 1) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m)$  có nghiệm đúng  $\forall x$ .  
**A.**  $m \in (2; 3]$ . **B.**  $m \in (-2; 3]$ . **C.**  $m \in [2; 3)$ . **D.**  $m \in [-2; 3)$ .

### Vấn đề 6. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (trích từ 7 đề của BGD)

- Câu 1:** [2D2-1-MH1] Giải phương trình  $\log_4(x-1) = 3$ .  
**A.**  $x = 63$ . **B.**  $x = 65$ . **C.**  $x = 80$ . **D.**  $x = 82$ .
- Câu 2:** [2D2-1-MH1] Tính đạo hàm của hàm số  $y = 13^x$ .  
**A.**  $y' = x \cdot 13^{x-1}$ . **B.**  $y' = 13^x \ln 13$ . **C.**  $y' = 13^x$ . **D.**  $y' = \frac{13^x}{\ln 13}$ .
- Câu 3:** [2D2-1-MH2] Với các số thực dương  $a, b$  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?  
**A.**  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ . **B.**  $\ln(ab) = \ln a \cdot \ln b$ . **C.**  $\ln \frac{a}{b} = \frac{\ln a}{\ln b}$ . **D.**  $\ln \frac{a}{b} = \ln b - \ln a$ .
- Câu 4:** [2D2-1-MH2] Tìm nghiệm của phương trình  $3^{x-1} = 27$ .  
**A.**  $x = 9$ . **B.**  $x = 3$ . **C.**  $x = 4$ . **D.**  $x = 10$ .
- Câu 5:** [2D2-1-MH3] Tìm đạo hàm của hàm số  $y = \log x$ .  
**A.**  $y' = \frac{1}{x}$ . **B.**  $y' = \frac{\ln 10}{x}$ . **C.**  $y' = \frac{1}{x \ln 10}$ . **D.**  $y' = \frac{1}{10 \ln x}$ .
- Câu 6:** [2D2-1-MH3] Tìm tập nghiệm  $S$  của bất phương trình  $5^{x+1} - \frac{1}{5} > 0$ .  
**A.**  $S = (1; +\infty)$ . **B.**  $S = (-1; +\infty)$ . **C.**  $S = (-2; +\infty)$ . **D.**  $S = (-\infty; -2)$ .
- Câu 7:** [2D2-1-MH3] Tính giá trị của biểu thức  $P = (7 + 4\sqrt{3})^{2017} (4\sqrt{3} - 7)^{2016}$ .  
**A.**  $P = 1$ . **B.**  $P = 7 - 4\sqrt{3}$ . **C.**  $7 + 4\sqrt{3}$ . **D.**  $P = (7 + 4\sqrt{3})^{2016}$ .

**Câu 8:** [2D2-1-MH3] Cho  $a$  là số thực dương,  $a \neq 1$  và  $P = \log_{\sqrt[3]{a}} a^3$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $P = 3$ .                      B.  $P = 1$ .                      C.  $P = 9$ .                      D.  $P = \frac{1}{3}$ .

**Câu 9:** [2D2-1-101] Cho phương trình  $4^x + 2^{x+1} - 3 = 0$ . Khi đặt  $t = 2^x$ , ta được phương trình nào dưới đây?

- A.  $2t^2 - 3 = 0$                       B.  $t^2 + t - 3 = 0$ .                      C.  $4t - 3 = 0$ .                      D.  $t^2 + 2t - 3 = 0$ .

**Câu 10:** [2D2-1-101] Cho  $a$  là số thực dương khác 1. Tính  $I = \log_{\sqrt{a}} a$ .

- A.  $I = \frac{1}{2}$ .                      B.  $I = 0$ .                      C.  $I = -2$ .                      D.  $I = 2$ .

**Câu 11:** [2D2-1-101] Với  $a, b$  là các số thực dương tùy ý và  $a$  khác 1, đặt  $P = \log_a b^3 + \log_{a^2} b^6$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $P = 9 \log_a b$ .                      B.  $P = 27 \log_a b$ .                      C.  $P = 15 \log_a b$ .                      D.  $P = 6 \log_a b$ .

**Câu 12:** [2D2-1-102] Cho  $a$  là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dương  $x, y$ ?

- A.  $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$ .                      B.  $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x + \log_a y$ .  
C.  $\log_a \frac{x}{y} = \log_a (x - y)$ .                      D.  $\log_a \frac{x}{y} = \frac{\log_a x}{\log_a y}$ .

**Câu 13:** [2D2-1-102] Tìm nghiệm của phương trình  $\log_2 (1 - x) = 2$ .

- A.  $x = -4$ .                      B.  $x = -3$ .                      C.  $x = 3$ .                      D.  $x = 5$ .

**Câu 14:** [2D2-1-103] Tìm nghiệm của phương trình  $\log_{25} (x + 1) = \frac{1}{2}$ .

- A.  $x = -6$ .                      B.  $x = 6$ .                      C.  $x = 4$ .                      D.  $x = \frac{23}{2}$ .

**Câu 15:** [2D2-1-104] Tìm nghiệm của phương trình  $\log_2 (x - 5) = 4$ .

- A.  $x = 21$ .                      B.  $x = 3$ .                      C.  $x = 11$ .                      D.  $x = 13$ .

**Câu 16:** [2D2-1-104] Cho  $a$  là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $\log_2 a = \log_a 2$ .                      B.  $\log_2 a = \frac{1}{\log_2 a}$ .                      C.  $\log_2 a = \frac{1}{\log_a 2}$ .                      D.  $\log_2 a = -\log_a 2$ .

**Câu 17:** [2D2-2-MH1] Giải bất phương trình  $\log_2 (3x - 1) > 3$ .

- A.  $x > 3$ .                      B.  $\frac{1}{3} < x < 3$ .                      C.  $x < 3$ .                      D.  $x > \frac{10}{3}$ .

**Câu 18:** [2D2-2-MH1] Tìm tập xác định  $D$  của hàm số  $y = \log_2 (x^2 - 2x - 3)$ .

- A.  $D = (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$ .                      B.  $D = [-1; 3]$ .  
C.  $D = (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$ .                      D.  $D = (-1; 3)$ .

**Câu 19:** [2D2-2-MH1] Cho hàm số  $f(x) = 2^x \cdot 7^{x^2}$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- A.  $f(x) < 1 \Leftrightarrow x + x^2 \log_2 7 < 0$ .                      B.  $f(x) < 1 \Leftrightarrow x \ln 2 + x^2 \ln 7 < 0$ .  
C.  $f(x) < 1 \Leftrightarrow x \log_7 2 + x^2 < 0$ .                      D.  $f(x) < 1 \Leftrightarrow 1 + x \log_2 7 < 0$ .



**Câu 29:** [2D2-2-102] Cho  $\log_a b = 2$  và  $\log_a c = 3$ . Tính  $P = \log_a (b^2 c^3)$ .

- A.  $P = 31$ . B.  $P = 13$ . C.  $P = 30$ . D.  $P = 108$ .

**Câu 30:** [2D2-2-102] Tìm tập nghiệm  $S$  của phương trình  $\log_{\sqrt{2}}(x-1) + \log_{\frac{1}{2}}(x+1) = 1$ .

- A.  $S = \{2 + \sqrt{5}\}$ . B.  $S = \{2 - \sqrt{5}; 2 + \sqrt{5}\}$ .  
C.  $S = \{3\}$ . D.  $S = \left\{\frac{3 + \sqrt{13}}{2}\right\}$ .

**Câu 31:** [2D2-2-103] Cho  $a$  là số thực dương khác 2. Tính  $I = \log_{\frac{a}{2}}\left(\frac{a^2}{4}\right)$ .


- A.  $I = \frac{1}{2}$ . B.  $I = 2$ . C.  $I = -\frac{1}{2}$ . D.  $I = -2$ .

**Câu 32:** [2D2-2-103] Tìm tập nghiệm  $S$  của phương trình  $\log_3(2x+1) - \log_3(x-1) = 1$ .

- A.  $S = \{4\}$ . B.  $S = \{3\}$ .  
C.  $S = \{-2\}$ . D.  $S = \{1\}$ .

**Câu 33:** [2D3-2-103] Cho hai hàm số  $y = a^x$ ,  $y = b^x$  với  $a, b$  là 2 số thực dương khác 1, lần lượt có đồ thị là  $(C_1)$  và  $(C_2)$  như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $0 < a < b < 1$ .  
B.  $0 < b < 1 < a$ .  
C.  $0 < a < 1 < b$ .  
D.  $0 < b < a < 1$ .



**Câu 34:** [2D2-2-103] Cho  $\log_3 a = 2$  và  $\log_2 b = \frac{1}{2}$ . Tính  $I = 2\log_3[\log_3(3a)] + \log_{\frac{1}{4}} b^2$ .

- A.  $I = \frac{5}{4}$ . B.  $I = 4$ . C.  $I = 0$ . D.  $I = \frac{3}{2}$ .

**Câu 35:** [2D2-2-103] Rút gọn biểu thức  $Q = b^{\frac{5}{3}} : \sqrt[3]{b}$  với  $b > 0$

- A.  $Q = b^2$ . B.  $Q = b^9$ . C.  $Q = b^{\frac{4}{3}}$ . D.  $Q = b^{\frac{4}{9}}$ .

**Câu 36:** [2D2-2-103] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \log(x^2 - 2x - m + 1)$  có tập xác định là  $\mathbb{R}$ .

- A.  $m \geq 0$ . B.  $m < 0$ . C.  $m \leq 2$ . D.  $m > 2$ .

**Câu 37:** [2D2-2-104] Tìm tập xác định  $D$  của hàm số  $y = (x^2 - x - 2)^{-3}$ .

- A.  $D = \mathbb{R}$ . B.  $D = (0; +\infty)$ .  
C.  $D = (-\infty; -1) \cup (2; +\infty)$ . D.  $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 2\}$ .

**Câu 38:** [2D2-1-104] Tìm tất cả các giá trị thực của  $m$  để phương trình  $3^x = m$  có nghiệm thực.

- A.  $m \geq 1$ . B.  $m \geq 0$ . C.  $m > 0$ . D.  $m \neq 0$ .

**Câu 39:** [2D2-1-104] Tìm tập xác định  $D$  của hàm số  $y = \log_3(x^2 - 4x + 3)$

A.  $D = (2 - \sqrt{2}; 1) \cup (3; 2 + \sqrt{2})$ .

B.  $D = (1; 3)$ .

C.  $D = (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$ .

D.  $D = (-\infty; 2 - \sqrt{2}) \cup (2 + \sqrt{2}; +\infty)$ .

**Câu 40:** [2D2-2-104] Với mọi  $a, b, x$  là các số thực dương thỏa mãn  $\log_2 x = 5\log_2 a + 3\log_2 b$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.  $x = 3a + 5b$ .

B.  $x = 5a + 3b$ .

C.  $x = a^5 + b^3$ .

D.  $x = a^5 b^3$ .

**Câu 41:** [2D2-2-104] Tìm giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $9^x - 2 \cdot 3^{x+1} + m = 0$  có hai nghiệm thực  $x_1, x_2$  thỏa mãn  $x_1 + x_2 = 1$ .

A.  $m = 6$ .

B.  $m = -3$ .

C.  $m = 3$ .

D.  $m = 1$ .

**Câu 42:** [2D2-2-104] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \ln(x^2 - 2x + m + 1)$  có tập xác định là  $\mathbb{R}$ . 400000

A.  $m = 0$ .

B.  $0 < m < 3$ .

C.  $m < -1$  hoặc  $m > 0$ .

D.  $m > 0$ .

**Câu 43:** [2D2-2-104] Với các số thực dương  $x, y$  tùy ý, đặt  $\log_3 x = \alpha, \log_3 y = \beta$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.  $\log_{27} \left( \frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = 9 \left( \frac{\alpha}{2} - \beta \right)$ .

B.  $\log_{27} \left( \frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = \frac{\alpha}{2} + \beta$

C.  $\log_{27} \left( \frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = 9 \left( \frac{\alpha}{2} + \beta \right)$ .

D.  $\log_{27} \left( \frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = \frac{\alpha}{2} - \beta$ .

**Câu 44:** [2D2-2-MH2] Tính đạo hàm của hàm số  $y = \ln(1 + \sqrt{x+1})$ .

A.  $y' = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(1 + \sqrt{x+1})}$ .

B.  $y' = \frac{1}{1 + \sqrt{x+1}}$ .

C.  $y' = \frac{1}{\sqrt{x+1}(1 + \sqrt{x+1})}$ .

D.  $y' = \frac{2}{\sqrt{x+1}(1 + \sqrt{x+1})}$ .

**Câu 45:** [2D2-2-101] Tìm tập xác định  $D$  của hàm số  $y = (x-1)^{\frac{1}{3}}$ .

A.  $D = (-\infty; 1)$ .

B.  $D = (1; +\infty)$ .

C.  $D = \mathbb{R}$ .

D.  $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ .

**Câu 46:** [2D2-2-103] Với mọi số thực dương  $a$  và  $b$  thỏa mãn  $a^2 + b^2 = 8ab$ , mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.  $\log(a+b) = \frac{1}{2}(\log a + \log b)$ .

B.  $\log(a+b) = 1 + \log a + \log b$ .

C.  $\log(a+b) = \frac{1}{2}(1 + \log a + \log b)$ .

D.  $\log(a+b) = \frac{1}{2} + \log a + \log b$ .

**Câu 47:** [2D2-3-MH1] Cho các số thực dương  $a, b$  với  $a \neq 1$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A.  $\log_{a^2}(ab) = \frac{1}{2} \log_a b$ .

B.  $\log_{a^2}(ab) = 2 + \log_a b$ .

C.  $\log_{a^2}(ab) = \frac{1}{4} \log_a b$ .

D.  $\log_{a^2}(ab) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_a b$ .

**Câu 48:** [2D2-3-MH1] Tính đạo hàm của hàm số  $y = \frac{x+1}{4^x}$ .

A.  $y' = \frac{1-2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$ .

B.  $y' = \frac{1+2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$ .

C.  $y' = \frac{1-2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$ .

D.  $y' = \frac{1+2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$ .

**Câu 49:** [2D2-3-MH1] Đặt  $a = \log_2 3, b = \log_5 3$ . Hãy biểu diễn  $\log_6 45$  theo  $a$  và  $b$ .

A.  $\log_6 45 = \frac{a+2ab}{ab}$ .

B.  $\log_6 45 = \frac{2a^2-2ab}{ab}$ .

C.  $\log_6 45 = \frac{a+2ab}{ab+b}$ .

D.  $\log_6 45 = \frac{2a^2-2ab}{ab+b}$ .

**Câu 50:** [2D2-3-MH1] Cho hai số thực  $a$  và  $b$ , với  $1 < a < b$ . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

A.  $\log_a b < 1 < \log_b a$ .

B.  $1 < \log_a b < \log_b a$ .

C.  $\log_b a < \log_a b < 1$ .

D.  $\log_b a < 1 < \log_a b$ .

**Câu 51:** [2D2-3-MH2] Tìm tập nghiệm  $S$  của bất phương trình  $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$

A.  $S = (2; +\infty)$ .

B.  $S = (-\infty; 2)$ .

C.  $S = \left(\frac{1}{2}; 2\right)$ .

D.  $S = (-1; 2)$ .


**Câu 52:** [2D2-3-MH2] Cho ba số thực dương  $a, b, c$  khác 1. Đồ thị các hàm số  $y = a^x, y = b^x, y = c^x$  được cho trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.  $a < b < c$ .

B.  $a < c < b$ .

C.  $b < c < a$ .

D.  $c < a < b$ .



**Câu 53:** [2D2-3-MH3] Cho hàm số  $y = \frac{\ln x}{x}$ , mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.  $2y' + xy'' = -\frac{1}{x^2}$ .

B.  $y' + xy'' = \frac{1}{x^2}$ .

C.  $y' + xy'' = -\frac{1}{x^2}$ .

D.  $2y' + xy'' = \frac{1}{x^2}$ .

**Câu 54:** [2D2-3-101] Tìm tập nghiệm  $S$  của bất phương trình  $\log_2^2 x - 5 \log_2 x + 4 \geq 0$ .

A.  $S = (-\infty; 2] \cup [16; +\infty)$ .

B.  $S = [2; 16]$ .

C.  $S = (0; 2] \cup [16; +\infty)$ .

D.  $S = (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$ .

**Câu 55:** [2D2-3-101] Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó nhận được số tiền hơn 100 triệu đồng bao gồm gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.

A. 13 năm.

B. 14 năm.

C. 12 năm.

D. 11 năm.



- Câu 56:** [2D2-3-101] Tìm các giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $\log_3^2 x - m \log_3 x + 2m - 7 = 0$  có hai nghiệm thực  $x_1, x_2$  thỏa mãn  $x_1 x_2 = 81$ .
- A.  $m = -4$ .      B.  $m = 4$ .      C.  $m = 81$ .      D.  $m = 44$ .
- Câu 57:** [2D2-3-101] Cho  $\log_a x = 3$ ,  $\log_b x = 4$  với  $a, b$  là các số thực lớn hơn 1. Tính  $P = \log_{ab} x$ .
- A.  $P = \frac{7}{12}$ .      B.  $P = \frac{1}{12}$ .      C.  $P = 12$ .      D.  $P = \frac{12}{7}$ .
- Câu 58:** [2D2-3-102] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $4^x - 2^{x+1} + m = 0$  có hai nghiệm thực phân biệt.
- A.  $m \in (-\infty; 1)$ .      B.  $m \in (0; +\infty)$ .      C.  $m \in (0; 1]$ .      D.  $m \in (0; 1)$ .
- Câu 59:** [2D2-3-102] Cho  $x, y$  là các số thực lớn hơn 1 thỏa mãn  $x^2 + 9y^2 = 6xy$ . Tính  $M = \frac{1 + \log_{12} x + \log_{12} y}{2 \log_{12} (x + 3y)}$ .
- A.  $M = \frac{1}{4}$ .      B.  $M = 1$ .      C.  $M = \frac{1}{2}$ .      D.  $M = \frac{1}{3}$ .
- Câu 60:** [2D2-3-102] Đầu năm 2016, ông A thành lập một công ty. Tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong năm 2016 là 1 tỷ đồng. Biết rằng cứ sau mỗi năm thì tổng số tiền dùng để trả cho nhân viên trong cả năm đó tăng thêm 15% so với năm trước. Hỏi năm nào dưới đây là năm đầu tiên mà tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong cả 5 năm lớn hơn 2 tỷ đồng?
- A. Năm 2023.      B. Năm 2022.      C. Năm 2021.      D. Năm 2020.
- Câu 61:** [2D2-3-103] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để bất phương trình  $\log_2^2 x - 2 \log_2 x + 3m - 2 < 0$  có nghiệm thực.
- A.  $m < 1$ .      B.  $m < \frac{2}{3}$ .      C.  $m < 0$ .      D.  $m \leq 1$ .
- Câu 62:** [2D2-4-MH2] Tìm tập hợp các giá trị của tham số thực  $m$  để phương trình  $6^x + (3 - m)2^x - m = 0$  có nghiệm thuộc khoảng  $(0; 1)$ .
- A.  $[3; 4]$ .      B.  $[2; 4]$ .      C.  $(2; 4)$ .      D.  $(3; 4)$ .
- Câu 63:** [2D2-4-MH2] Xét các số thực  $a, b$  thỏa mãn  $a > b > 1$ . Tìm giá trị nhỏ nhất  $P_{\min}$  của biểu thức  $P = \log_{\frac{a}{b}}^2 (a^2) + 3 \log_b \left( \frac{a}{b} \right)$ .
- A.  $P_{\min} = 19$ .      B.  $P_{\min} = 13$ .      C.  $P_{\min} = 14$ .      D.  $P_{\min} = 15$ .
- Câu 64:** [2D2-4-MH3] Hỏi có bao nhiêu giá trị  $m$  nguyên trong  $[-2017; 2017]$  để phương trình  $\log(mx) = 2 \log(x + 1)$  có nghiệm duy nhất?
- A. 2017.      B. 4014.      C. 2018.      D. 4015.
- Câu 65:** [2D2-4-101] Xét các số thực dương  $x, y$  thỏa mãn  $\log_3 \frac{1 - xy}{x + 2y} = 3xy + x + 2y - 4$ . Tìm giá trị nhỏ nhất  $P_{\min}$  của  $P = x + y$ .
- A.  $P_{\min} = \frac{9\sqrt{11} - 19}{9}$ .      B.  $P_{\min} = \frac{9\sqrt{11} + 19}{9}$ .      C.  $P_{\min} = \frac{18\sqrt{11} - 29}{9}$ .      D.  $P_{\min} = \frac{2\sqrt{11} - 3}{3}$ .







MỤC LỤC

HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LÔGARIT	
Vấn đề 1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỈ - SỐ MŨ THỰC.....	1
Dạng 1. Tính toán – Rút gọn biểu thức lũy thừa.....	2
Dạng 2. So sánh các lũy thừa hay căn số.....	5
Dạng 3. Bài toán lãi kép.....	6
Vấn đề 2. LÔGARIT.....	9
Dạng 1. Tính toán – Rút gọn biểu thức có chứa lôgarit.....	10
Dạng 2. So sánh hai lôgarit.....	11
Dạng 3. Biểu diễn một lôgarit theo các lôgarit khác.....	12
Dạng 4. Chứng minh đẳng thức chứa lôgarit.....	13
Dạng 5. Bài toán lãi kép.....	14
Vấn đề 3. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT.....	17
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số.....	19
Dạng 2. Đạo hàm của hàm số mũ và logarit.....	21
Dạng 3. GTLN và GTNN của hàm số mũ và logarit.....	23
Dạng 4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.....	24
Dạng 5. Tìm giới hạn của các hàm số mũ và lôgarit.....	25
Dạng 6. Dùng tính đơn điệu để chứng minh bất đẳng thức chứa mũ logarit.....	26
Vấn đề 4. PHƯƠNG TRÌNH MŨ.....	29
Dạng 1. Phương pháp đưa về cùng cơ số.....	29
Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ.....	32
Dạng 3. Phương pháp lôgarit hóa.....	36
Dạng 4. Phương pháp đưa về phương trình tích.....	37
Dạng 5. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức, tính đơn điệu của hàm số.....	38
Vấn đề 5. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ.....	40
Dạng 1. Phương pháp đưa về cùng cơ số.....	40
Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ.....	43
Dạng 3. Phương pháp lôgarit hóa.....	46
Vấn đề 6. PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT.....	49
Dạng 1. Phương pháp đưa về cùng cơ số.....	49
Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ.....	51
Dạng 3. Phương pháp mũ hóa.....	53
Dạng 4. Phương pháp đưa về phương trình tích.....	55
Dạng 5. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức, tính đơn điệu của hàm số.....	56
Vấn đề 7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT.....	58
Dạng 1. Phương pháp đưa về cùng cơ số.....	58
Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ.....	63
Vấn đề 8. HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LÔGARIT.....	67
Vấn đề 9. PHƯƠNG TRÌNH ✖ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH CÓ THAM SỐ.....	70
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (trích từ bộ BTN – 387 câu + 7 đề của BGD – 68 câu).....	73
Vấn đề 1. LŨY THỪA.....	73
Vấn đề 2. LOGARIT.....	82
Vấn đề 3. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT – HÀM SỐ LŨY THỪA.....	89
Vấn đề 4. PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ.....	95
Vấn đề 5. PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT.....	99
Vấn đề 6. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (trích từ 7 đề của BGD).....	106
BẢNG ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.....	113
MỤC LỤC.....	115

**Gv: TRẦN QUỐC NGHĨA - 098 373 4349**

**Chuyên: TOÁN**

- LỚP 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- LUYỆN THI LỚP 10
- LUYỆN THI THPT QUỐC GIA

## **TRỌN BỘ TÀI LIỆU HỌC TẬP**

**Môn: TOÁN - Lớp: 12 và THPTQG**

**Năm học 2017-2018**

- 1. Tài liệu TOÁN 12 theo chủ đề (7 chủ đề)**
- 2. Bài tập trắc nghiệm TOÁN 12 quyển 1**
- 3. Bài tập trắc nghiệm TOÁN 12 quyển 2**
- 4. Bài tập trắc nghiệm TOÁN 12 quyển 3**
- 5. Bộ đề thi thử THPT năm 2017**
- 6. Bộ đề thi thử THPT năm 2018**
- 7. Bộ đề thi ĐH- CĐ - THPTQG từ 2002 → 2017**

**Năm học 2017 - 2018**

**Lưu hành nội bộ**