

Apunts sobre teoria de categories

Carlos Moreno, Eric Fernàndez, Guillermo Penyafort

7 d'octubre de 2026

Índex

1	Introducció, definició i primers exemples	3
1.1	Primeres definicions	4
1.2	Morfismes especials	6
2	Funtors	12
2.1	Definició. Funtors covariants.	12
A	Llistat de categories	15

Capítol 1

Introducció, definició i primers exemples

Als anys quaranta del segle passat va nèixer la topologia algebraica i amb ella una nova forma d'entendre i estudiar els objectes geomètrics. Per il·lustrar-ho, tornarem a l'assignatura de topologia de segon. Si recordem, per tal de definir el grup fonamental estudiàvem els llaços sobre un espai topològic partint d'un punt donat. Ara bé, un llaç no és més que una aplicació contínua de la circumferència en l'espai, pel que no estàvem fent altra cosa que estudiar com es relacionaven la circumferència i l'espai mitjançant aplicacions contínues. Així doncs, per tal d'obtenir informació sobre un objecte ja no ens centrem en el mateix sinó que posem l'èmfasi les **relacions** que estableix amb altres objectes. Açò és precisament el punt central de la teoria de categories, l'estudi dels objectes a través de les seues interaccions amb els demés.

Aquesta nova forma de fer matemàtiques necessitava d'un nou llenguatge en què expressar-se, i aquest va acabar conformant la teoria de categories. La cosa més sorprenent és que aquest llenguatge, tot i la seua aparent simplicitat, és capaç d'expressar gran part dels conceptes i teories matemàtiques que són rellevants hui en dia, i en particular molts dels que hem vist a les assignatures del grau. Però això ho vorem en les properes classes.

Una categoria és, intuïtivament, una plantilla que segueixen les teories matemàtiques. La plantilla ens diu que les teories haurien de tindre substantius –objectes– i verbs –morfismes o les relacions entre ells–, i també una gramàtica que permeta compondre els verbs. Aquesta plantilla ens permetrà, com vorem més avant, definir relacions entre les diferents teories matemàtiques. D'entre altres, introduïrem els conceptes de funtorialitat, naturalitat, i d'equivalència de categories. Aquest últim concepte capta, intuïtivament, la noció de quan dos teories matemàtiques són "idèntiques" en tant que tenen la mateixa estructura. Per exemple, comprovarem que la categoria dels espais vectorials finits és equivalent a la categoria de les matrius. Pel camí il·lustrarem cada concepte amb una bona quantitat d'exemples i reescriurem alguns dels teoremes i definicions que hem vist al grau en el llenguatge de

la teoria de categories. Finalment, si tot va bé, introduïrem la noció de representabilitat i presentarem el Lema de Yoneda, considerat un dels resultats fonamentals de la teoria. Aquest implica, entre altres coses, que cada objecte està totalment caracteritzat per la xarxa de morfismes que el relacionen amb els altres objectes de la categoria.

1.1 Primeres definicions

Definició 1.1. Una categoria $\mathcal{C}$ consisteix en:

- una col·lecció d'objectes, $Ob(\mathcal{C})$.
- per a cada $X, Y \in Ob(\mathcal{C})$, una col·lecció de morfismes o fletxes $\mathcal{C}(X, Y)$. Sovint escriurem $f: X \rightarrow Y$.
- per a cada parell de morfismes $f: X \rightarrow Y$ i $g: Y \rightarrow Z$, on $X, Y, Z \in Ob(\mathcal{C})$, una llei de composició que assigna un morfisme $g \circ f: X \rightarrow Z$ al parell (g, f) .

A més, s'ha de satisfer que:

- Per a cada objecte $X \in Ob(\mathcal{C})$, existeix un morfisme *identitat* $1_X \in \mathcal{C}(X, X)$ tal que per a tot $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ i per a tot $g \in \mathcal{C}(Z, X)$, es té que $f \circ 1_X = f$ i $1_X \circ g = g$.
- La llei de composició és associativa, és a dir, donats objectes X, Y, Z, W i morfismes $f \in \mathcal{C}(X, Y), g \in \mathcal{C}(Y, Z), h \in \mathcal{C}(Z, W)$, es té que

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

Notació 1.2. A partir d'ara, a l'hora d'indicar que un objecte X pertany $\mathcal{C}$ a una categoria, utilitzarem la notació $X \in \mathcal{C}$.


Per a indicar que f és un morfisme entre X i Y , utilitzarem $f: X \rightarrow Y$ o $X \xrightarrow{f} Y$ indistintament. En aquests casos, diguem que X i Y són el domini i el codomini de f , respectivament. També escriurem $f: X \rightarrow Z \in \mathcal{C}$ quan vullgam indicar que estem en la categoria $\mathcal{C}$.

Quan no es puga confondre amb altres nocions, denotarem la composició de morfismes com a gf en lloc de $g \circ f$.

En llibres i apunts és habitual denotar la col·lecció de morfismes entre dos objectes com a $Hom(X, Y)$ en lloc de $\mathcal{C}(X, Y)$

El següent exemple mostra una de les categories no trivials més bàsiques que podem

Exemple 1.3. En el següent dibuix podem veure il·lustrada una categoria en 3 elements.



A continuació vorem alguns exemples de categories que ja hem conegut al llarg del grau per tal de familiaritzar-nos amb la definició.

Exemple 1.4. Algunes categories familiars.

1. **Set**, que té per objectes els conjunts i per morfismes les aplicacions entre conjunts.
2. **Top**, que té per objectes els espais topològics i per morfismes les aplicacions contínues entre espais.
3. **Group**, que té per objectes els grups i per morfismes els homomorfismes de grups.
4. **Rng**, que té per objectes els anells i per morfismes els homomorfismes d'anells.
5. **Vect_k**, que té per objectes els k -espais vectorials, i per morfismes les aplicacions lineals entre k -espais vectorials.

Fixem-nos que en totes aquestes categories els objectes consisteixen en conjunts amb certa estructura adicional, i els morfismes són les aplicacions entre conjunts que preservan aquesta estructura. Ara bé, podem considerar categories amb objectes i morfismes diferents dels que estem acostumats.

Exemple 1.5. Els nombres naturals com a categoria

Els nombres naturals donen lloc a una categoria, que denotarem per $\mathcal{N}$, en la qual $Ob(\mathcal{N}) = \mathbb{N}$, i existeix un morfisme entre objectes n, m si i només si $n \leq m$, és a dir:

$$\mathcal{N}(n, m) = \begin{cases} \{n \rightarrow m\}, & \text{if } n \leq m \\ \emptyset, & \text{if } n > m \end{cases}$$

Exercici 1.6. Proveu que donat un conjunt parcialment ordenat $(P, \leq)$, podem considerar-ho com una categoria.

Exemple 1.7. Grups com a categoria

Siga G un grup, podem considerar una categoria amb un únic objecte, que denotem $*$. En aquesta categoria, només tenim morfismes $* \rightarrow *$, que seran els elements del grup. La llei de composició estarà donada per l'operació del grup G . D'aquesta manera, si tenim dos elements $g, h \in G$, i la seua composició $g \cdot h$, tindrem dos morfismes $* \xrightarrow{g} * \xrightarrow{h} *$, i la seua composició serà $* \xrightarrow{g \cdot h} *$. És fàcil comprovar que l'element neutre del grup fa d'identitat. D'ara endavant, denotarem aquesta categoria per BG .

Exemple 1.8. La categoria de les matrius

Donat un cos k , la categoria $\mathbf{Mat}_k$ és una categoria els objectes de la qual són nombres naturals, incloent el 0, on els morfismes d'un natural n a un natural m són matrius de tamany $m \times n$ sobre el cos k . La composició de morfismes està donada mitjaçant la multiplicació de matrius. En el cas especial del 0, per a cada nombre natural n definim dues fletxes $n \rightarrow 0$ i $0 \rightarrow n$.

Definició 1.9. Una categoria $\mathcal{C}$ és localment menuda si $\mathcal{C}(X, Y)$ és un conjunt per a tot $X, Y \in \mathcal{C}$. Si, a més, $Ob(\mathcal{C})$ és també un conjunt, direm que $\mathcal{C}$ és una categoria menuda.

Notem que les categories a les quals estem acostumats (**Set**, **Group**, **Rng**,...) no són categories menudes, ja que els objectes no formen un conjunt, però sí que són localment menudes, ja que els morfismes entre objectes sí que formen conjunts.

De la mateixa forma que en la majoria de les estructures matemàtiques que estudiem, al treballar en teoria de categories existeix la noció de subcategoria.

Definició 1.10. Una subcategoria $\mathcal{D}$ de $\mathcal{C}$ és una subcol·lecció d'objectes i una subcol·lecció de morfismes de $\mathcal{C}$ tals que verifiquen la definició de categoria. Això és, tals que:

- Per a cada morfisme en $\mathcal{D}$, el seu domini i codomini són objectes de $\mathcal{D}$.
- Per a cada objecte de $\mathcal{D}$, la respectiva identitat està continguda.
- Totes les composicions possibles de morfismes en $\mathcal{D}$ estan contingudes, i la llei de composició de morfismes en $\mathcal{D}$ és la mateixa que en $\mathcal{C}$.

Exemple 1.11. Algunes subcategories

1. Totes les categories de l'exemple 2.1 són subcategories de **Set**
2. **Ring** que té per objectes els anells unitaris i té per morfismes els homomorfismes d'anells que preserven la identitat és una subcategoria de **Rng**.
3. **Ab**, que té per objectes els grups abelians i per morfismes els homomorfismes de grups abelians, és una subcategoria de **Group**.
4. Donada la categoria **BG** per algun grup G i un subconjunt $H \subseteq G$, aleshores H serà un subgrup de G si i només si els morfismes d' H formen una subcategoria de G .
5. **Set**_{iso} que té per objectes conjunts, i per morfismes aplicacions bijectives entre conjunts.

1.2 Morfismes especials

En aquesta secció definirem diversos tipus de morfismes, alguns dels quals ens resultaran molt familiars, i que seran especialment interessants al llarg del curs.

Definició 1.12. Isomorfisme

Un isomorfisme en una categoria és un morfisme $f : X \rightarrow Y$ per al que existix un altre morfisme $g : Y \rightarrow X$ tal que $gf = 1_X$ i $fg = 1_Y$.

Vejam quins són els isomorfismes en les categories que hem estudiat:

- Exemple 1.13.**
1. Els isomorfismes en **Set** són les aplicacions bijectives.
 2. Els isomorfismes en **Group**, **Ring** i **Vect_k** són els respectius homomorfismes bijectius.
 3. Els isomorfismes en **Top** són els homeomorfismes entre espais topològics, és a dir, les funcions contínues bijectives amb inversa contínua. És una condició una mica més forta que al cas anterior.

Exercici 1.14. Esbrineu quins són els isomorfismes en **Mat_k**.

Exercici 1.15. Definició de grup

Un grup és una categoria que té un únic objecte i en la que tots els morfismes són isomorfismes. Comproveu que aquesta definició és equivalent a la que es dona en estructures algebraiques.

Exercici 1.16. Demostreu que si $f : X \rightarrow Y$ és un isomorfisme, aleshores el morfisme $g : Y \rightarrow X$ que l'inverteix és únic.

A continuació introduïrem una definició que necessitarem més endavant conforme avanci el curs. De moment, ens servirà per entendre la relació entre dos tipus de morfismes que definirem després.

Definició 1.17. Categoria oposada

Donada una categoria $\mathcal{C}$, definim la seua categoria oposada $\mathcal{C}^{\text{op}}$ com la categoria que té:

- Els mateixos objectes que $\mathcal{C}$, o siga

$$Ob(\mathcal{C}^{\text{op}}) = Ob(\mathcal{C}).$$

- Donats dos objectes X, Y , un morfisme $f^{\text{op}} : Y \rightarrow X$ per a cada morfisme $f : X \rightarrow Y \in \mathcal{C}$. O siga,

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X).$$

- La composició de $f^{\text{op}}, g^{\text{op}} \in \mathcal{C}^{\text{op}}$ ve donada a partir de la composició en $\mathcal{C}$ com segueix:


$$g^{\text{op}} f^{\text{op}} := (fg)^{\text{op}}.$$

Noteu que un parell $f^{\text{op}}, g^{\text{op}} \in \mathcal{C}^{\text{op}}$ és composable en $\mathcal{C}^{\text{op}}$ si i només si g, f és composable en $\mathcal{C}$.

És a dir, la categoria oposada té els mateixos objectes que $\mathcal{C}$ i té els mateixos morfismes però "al revés". No és molt difícil comprovar que, efectivament, $\mathcal{C}^{\text{op}}$ és una categoria si i només si $\mathcal{C}$ ho és. Ho deixem com a exercici.

Exercici 1.18. Comprovar que la categoria oposada verifica la definició de categoria si i només si $\mathcal{C}$ la verifica.

Exemple 1.19. Ací tenim un exemple mínim d'una categoria i la seua oposada.



Exemple 1.20. Donada la categoria induïda per un conjunt preordenat $(P, \leq)$ la seua oposada és la categoria induïda per la relació d'ordre invertida, és a dir, la induïda per $(P, \geq)$.

Exercici 1.21. Esbrineu com és la categoria oposada de la categoria induïda per un grup BG .

La cosa més interessant de la categoria oposada és que sovint, moltes de les propietats que podem enunciar sobre una categoria es poden "traduir" en un enunciat anàleg sobre la seua oposada. Per això es diu que hi ha una dualitat entre una categoria i la seua oposada. A continuació definirem dos conceptes que ens resultaran molt familiars i que guarden una relació de dualitat entre ells, com vorem.


Definició 1.22. Un morfisme $f : X \rightarrow Y$ és un:

1. **Monomorfisme** si per a qualsevol parell de morfismes $g, h : C \rightarrow X$ en $\mathcal{C}$ es té que $fh = fg$ implica que $h = g$.
2. **Epimorfisme** si per a qualsevol parell de morfismes $g, h : Y \rightarrow C$ en $\mathcal{C}$ es té que $hf = gf$ implica que $h = g$.

També direm que un morfisme és mònic o éplic, respectivament. Notem que el que un morfisme siga éplic o mònic depèn de la categoria en què el considerem, pel que, llevat que siga evident, hem d'especificar on l'estem considerant.

Exemple 1.23. Exemple minimal

Aquest és l'exemple mínim que podem donar per entendre què li estem demanant a un morfisme f per tal que siga un monomorfisme. El que implica la condició és que podem distingir per qui composem f per la dreta cada volta que el composem, és a dir, que si tenim dos morfismes distints g, h aleshores tenim un morfisme $f \circ g$ distint del morfisme $f \circ h$. Amb els epimorfismes passa exactament el mateix, però composant per l'esquerra.



Exemple 1.24. Els mono i epimorfismes en **Set** són, respectivament, les aplicacions injectives i sobrejectives.

A classe vorem que una aplicació és un monomorfisme si i només si és injectiva. La demostració corresponent a la sobrejectivitat, la deixem com a exercici.

Observació 1.25. Relació amb els conceptes anteriors

1. L'oposat d'un monomorfisme és un epimorfisme en la categoria oposada. L'oposat d'un epimorfisme és un monomorfisme. De fet, tot el que direm al llarg de la secció referent a monomorfismes es pot fer "per dualitat" per a epimorfismes, i viceversa.
2. Un monomorfisme en una categoria donada també és un monomorfisme en qualsevol subcategoria que el continga. Per tant, les aplicacions injectives són monomorfismes en qualsevol subcategoria de **Set**. El mateix enunciat també és cert per als epimorfismes. No obstant, el recíproc no és cert, com vorem prompte.

Pel que acabem de vore, en **Set** un morfisme monic i èpic és un isomorfisme. No obstant, això no és cert en general.

Exemple 1.26. 1. En la categoria dels nombres naturals $\mathcal{N}$ tots els morfismes són mònicos i èpics, però els únics isomorfismes que hi han són les identitats.

2. En **Top** un morfisme és mònic si i sols si és injectiu i és èpic si i sols si és sobrejectiu. No obstant, una bijecció no té perquè ser un isomorfisme: ja vam vore que cal que, a més, la seua inversa siga contínua.

Vejam ara un exemple una miqueta més interessant que desafia la nostra intuïció.

Exemple 1.27. La inclusió $i : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ és un epimorfisme en **Ring** tot i no ser sobrejectiva. Farem la prova a classe.

A més és fàcil comprovar que i també és un monomorfisme ja que és injectiva, pel que és un monomorfisme en **Set** i per tant ho és en qualsevol subcategoria. No obstant, i no és un isomorfisme perquè $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Q}$ no són isomorfs com a anells.

Nota 1.28. Es pot trobar un exemple paregut a l'anterior en **Haus**, la categoria d'espais topològics de Hausdorff amb els morfismes heretats de **Top**. Ací es pot provar que un morfisme és èpic si i només si la seua imatge és densa en el codomini. No obstant, aquesta prova és massa complexa com per a incloure-la en la nostra sessió del seminari.

Podríem preguntar-nos, doncs, quines condicions hem d'afegir perquè un morfisme mònic i èpic siga un isomorfisme. La resposta la trobem definint un altre tipus de morfismes.

Definició 1.29. Morfismes escindits

Direm que un morfisme $f.X \rightarrow Y$ és un monomorfisme escindit si té inversa per l'esquerra, és a dir, si existeix un morfisme $r.Y \rightarrow X$ tal que $rf = 1_X$.

Direm que un morfisme $f.X \rightarrow Y$ és un epimorfisme escindit si té inversa per la dreta, és a dir, si existeix un morfisme $s.Y \rightarrow X$ tal que $fs = 1_Y$.

Observació 1.30. Un monomorfisme escindit és un monomorfisme. Si tenim que $fg = fh$ per a tot parell de morfismes $g, h : Y \rightarrow C$, aleshores podem compondre r als dos costats i obtindre que $(rf)g = (rf)h \implies 1_X g = 1_X h \implies g = h$. El mateix passa amb els epimorfismes escindits.

Així doncs, estem donant una condició una mica més forta que la que teníem. Ara bé, és molt senzill comprovar que si un morfisme és un monomorfisme escindit i un epimorfisme escindit aleshores tenim un isomorfisme. En efecte, la demostració d'açò és el propi exercici 2.16.

Exercici 1.31. Acabem de veure que un morfisme que és monomorfisme induït i un epimorfisme escindit és un isomorfisme. Trobeu la manera de relaxar esta condició una mica.

Per acabar la classe, anem a enunciar l'axioma d'elecció gastant les definicions que hem vist hui.

Proposició 1.32. *El següent enunciat és equivalent a l'axioma d'elecció: Tots els epimorfismes en **Set** són epimorfismes escindits (1).*

Demostració. Recordem que l'axioma d'elecció afirma que, donada una família de conjunts $\{A_i\}_{i \in I}$ podem triar un element de cadascun d'ells. El conjunt I és el conjunt dels índexs (2). Trauim-ho al llenguatge de categories.

(1 $\implies$ 2) Siga A la unió disjunta de tots els A_i . Com que $\{A_i\}_{i \in I}$ és una família de conjunts indexada sobre I podem considerar un epimorfisme $p : A \rightarrow I$ de forma que $p^{-1}(i) = A_i$. Ara, com hem assumit (1), tenim que p és un epimorfisme escindit, pel que

té inversa per la dreta, $s : I \rightarrow A$ tal que $ps = id_I$. Açò el que ens assegura és que per a cada i r el que fa és exactament triar un element $s(i) \in A_i$. Per tant es verifica l'axioma d'elecció.

(2 $\implies$ 1) Si tenim un epimorfisme $p : X \rightarrow Y$ aleshores tenim una aplicació sobrejectiva. Per l'axioma d'elecció podem triar un element de cada conjunt $x_y \in p^{-1}(\{y\})$ per a cada $y \in Y$. Així doncs, podem definir una aplicació $s : Y \rightarrow X$ de forma que $s(y) = x_y$, i llavors $p(s(y)) = p(x_y) = y$. Per tant p és un epimorfisme escindit $\square$

Capítol 2

Funtors

Una de les idees claus en teoria de categories és que, al definir objectes matemàtics, hem de considerar sempre certs morfismes entre aquests objectes. Una categoria és, en si mateixa, un objecte matemàtic, i per tant, resulta natural preguntar-se com podrien ser els "morfismes" entre categories. Aquests morfismes són els functors, els quals presentarem en aquest capítol, estudiant alguns exemples i resultats molt fonamentals sobre ells.

2.1 Definició. Funtors covariants.

Definició 2.1. Funtor

Un *functor* $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ entre dues categories $\mathcal{C}$ i $\mathcal{D}$ consisteix en:

- Per a cada objecte $C \in \mathcal{C}$, un objecte $FC \in \mathcal{D}$.
- Per a cada morfisme $f : C \rightarrow C'$, un morfisme $Ff : FC \rightarrow FC'$.

A més, les assignacions han de satisfer els següents axiomes de funtorialitat:

- Per a qualsevol parell composable de morfismes f, g en $\mathcal{C}$, $F(gf) = (Fg)(Ff)$.
- Per a cada objecte $C \in \mathcal{C}$, $F(1_C) = 1_{FC}$.

Els següents són exemples de functors, molts d'ells conceptes familiars que hem trobat al llarg de la carrera.

Exemple 2.2. Podem considerar un functor $\mathcal{P} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ que envia un conjunt A al seu conjunt potència $\mathcal{P}(A) = \{A' \mid A' \subset A\}$, i una aplicació $f : A \rightarrow B$ a l'aplicació imatge, definida com

$$\begin{aligned} f_* : \mathcal{P}(A) &\longrightarrow \mathcal{P}(B), \\ A' &\longmapsto f(A'). \end{aligned}$$

Exemple 2.3. Funtor d'obliu.

Sobre qualsevol categoria els objectes de la qual consisteixen en conjunts amb una certa estructura adicional es pot considerar un funtor d'obliu, el codomini del qual és la categoria dels conjunts, que "s'oblida" de l'estructura adicional dels objectes de la categoria. Per exemple, $U : \mathbf{Group} \rightarrow \mathbf{Set}$ envia un grup G al seu conjunt subjacent, i envia un homomorfisme de grups $f : G \rightarrow H$ a la mateixa aplicació considerada com una aplicació entre els conjunts subjacents.

Abans de donar el següent exemple, hem de definir un parell de categories noves. Ja hem vist que podem considerar una categoria que té per objectes espais topològics i per morfismes aplicacions continues. Ara, podem considerar una categoria $\mathbf{Top}_*$ d'espais topològics puntejats, és a dir, espais amb un punt base especificat (X, p) , amb $p \in X$. Donats dos espais puntejats (X, p) i (Y, q) , un morfisme entre ells és una aplicació continua $f : X \rightarrow Y$ tal que $f(p) = q$.

Una altra categoria que ens ajudarà en el següent exemple és la categoria d'homotopia, denotada per $\mathbf{Htpy}$, els objectes de la qual són espais topològics i els morfismes de la qual són classes d'equivalència d'homotopia de funcions continues entre espais. Notem que de la mateixa manera que hem definit $\mathbf{Top}_*$, podem definir $\mathbf{Htpy}_*$.

Exemple 2.4. Grup fonamental

Podem definir un funtor $\pi_1 : \mathbf{Top}_* \rightarrow \mathbf{Group}$. Aquest funtor envia un espai topològic X amb un punt base $p \in X$ al seu grup fonamental $\pi_1(X, p)$, i envia una aplicació continua $f : X \rightarrow Y$ a l'aplicació induïda $f^* : \pi_1(X, p) \rightarrow \pi_1(Y, f(p))$. Si ens remontem a l'assignatura de topologia, una bona part del tema que ens parlava del grup fonamental consistia en provar que aquest, en efecte, satisfà els axiomes de funtorialitat, és a dir, que preserva la composició de morfismes i les identitats. No només això, si recordem bé, una de les proposicions més importants que varem provar és que aplicacions homotòpiques indueixen el mateix homomorfisme de grups per al grup fonamental, és a dir, que si dues aplicacions $f, g : X \rightarrow Y$ són homotòpiques, $f^* = g^*$. Aleshores, si considerem un funtor $\mathcal{Q} : \mathbf{Top}_* \rightarrow \mathbf{Htpy}_*$, en certa manera, podem factoritzar el funtor del grup fonamental sobre espais topològics per a obtenir el mateix funtor, però esta volta amb el seu domini en la categoria $\mathbf{Htpy}_*$, és a dir, $\pi_1 : \mathbf{Htpy}_* \rightarrow \mathbf{Group}$.

Nota 2.5. Notem que, en qualsevol categoria els objectes de la qual siguin conjunts i les aplicacions siguin aplicacions entre conjunts, podem considerar una categoria puntejada, que es defineix de la mateixa forma que hem definit anteriorment $\mathbf{Top}_*$ i $\mathbf{Htpy}_*$. La que més val la pena recalcar és $\mathbf{Set}_*$, de conjunts puntejats amb aplicacions que preserven el punt base.

Exemple 2.6. La derivada com a funtor

Anem a definir una nova categoria, $\mathbf{Euclid}_*$, en la qual els objectes són conjunts oberts d'espais euclidians $X \subset \mathbb{R}^n$, amb un punt base $x \in X$, i els morfismes són aplicacions

diferenciables que preserven el punt base. Ara, podem definir un funtor $D : \mathbf{Euclid}_* \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$, de manera que un obert $X \subset \mathbb{R}^n$ és enviat a l'espai vectorial $\mathbb{R}^n$, i una aplicació diferenciable $f : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow Y \subset \mathbb{R}^m$ a la seua diferencial avaluada en el punt base x , $Df_x : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. La regla de la cadena ens assegura que aquesta assignació és funtorial, ja que donades aplicacions diferenciables $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, aleshores $D(g \circ f)_x = Dg_{f(x)} \cdot Df_x$, i a més, $D(\text{id}_X) = \text{Id}_{\mathbb{R}^n}$ per a qualsevol $X \subset \mathbb{R}^n$ obert.

Aquest exemple es pot generalitzar més enllà d'espais euclidians. Si considerem $\mathbf{Man}_*$ la categoria de varietats diferenciables puntejades amb aplicacions diferenciables que preserven el punt base, aleshores podem considerar un funtor $T_{(-)}(-) : \mathbf{Man}_* \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$ que envia una varietat M amb punt base $p \in M$ a l'espai tangent $T_p M$, i una aplicació diferenciable entre varietat $f : M \rightarrow N$ a la seua diferencial $Df : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$.

Proposició 2.7. *Siga $\mathcal{C}$ una categoria, i $f : C \rightarrow C'$ un isomorfisme en $\mathcal{C}$. Si $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ és un funtor, aleshores $Ff : FC \rightarrow FC'$ és un isomorfisme en $\mathcal{D}$.*

Exercici 2.8. Proveu la proposició anterior.

Aquest resultat és molt important quan busquem classificar els objectes en una categoria tret d'isomorfisme. Anem a vore'l amb el següent teorema:

Teorema 2.9. *Siguen $X \subset \mathbb{R}^n$ i $Y \subset \mathbb{R}^m$ oberts, si X i Y son difeomorfs (és a dir, existeix $f : X \rightarrow Y$ bijectiva, diferenciable i amb inversa diferenciable), aleshores $n = m$.*

Demostració. Suposem que X i Y són oberts en $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{R}^m$ respectivament, i $f : X \rightarrow Y$ és un difeomorfisme entre ells, que envia un punt base qualsevol $x \in X$ a $f(x) \in Y$. Ara, considerem el funtor derivada que hem definit abans, $D : \mathbf{Euclid}_* \rightarrow \mathbf{Vect}_*$, i obtenim $DX = \mathbb{R}^n$, $DY = \mathbb{R}^m$ i $Df : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. A més, Df és un isomorfisme entre els espais vectorials $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{R}^m$, lo qual implica que $n = m$. □

Apèndix A

Llistat de categories

- **Ab**, de grups abelians i homomorfismes de grups.
- **BG**, el grup G considerat com a categoria, amb un únic objecte i els elements del grup com morfismes.
- $\mathcal{C}^{\text{op}}$, la categoria oposada d'una categoria $\mathcal{C}$.
- **Euclid** $_*$, d'oberts en espais euclidians puntejats i aplicacions diferenciables que preserven el punt base.
- **Group**, de grups i homomorfismes de grups.
- **Haus**, d'espais topològics Hausdorff i aplicacions continues.
- **Htpy**, d'espais topològics i classes d'homotopia d'aplicacions continues.
- **Htpy** $_*$, d'espais topològics puntejats i classes d'homotopia d'aplicacions continues que preserven el punt base.
- **Man** $_*$, de varietats diferenciables puntejades i aplicacions diferenciables que preserven el punt base.
- **Mat** $_{\mathbb{K}}$, de nombres naturals, incloent el 0, amb matrius de tamany $m \times n$ com a morfismes entre n i m .
- $\mathcal{N}$, els naturals considerats com a categoria, amb elements de $\mathbb{N}$ per objectes i un morfisme $n \rightarrow m$ si i només si $n \leq m$.
- La categoria induïda per un conjunt preordent $(P, \leq)$ té per objectes els elements del conjunt. Per a cada parell x, y existix un morfisme $x \rightarrow y$ si i només si $x \leq y$.
- **Ring**, d'anells unitaris i homomorfismes que preserven l'unitat.
- **Rng**, d'anells i homomorfismes d'anells.
- **Set**, de conjunts amb aplicacions entre conjunts.
- **Set** $_*$, de conjunts puntejats amb aplicacions que preserven el punt base.
- **Set** $_{\text{iso}}$, de conjunts amb aplicacions bijectives entre conjunts.

- **Top**, d'espais topològics i aplicacions contínues.
- **Top_{*}**, d'espais topològics puntejats i aplicacions contínues que preserven el punt base.
- **Vect _{$\mathbb{k}$}** , de $\mathbb{k}$ -espais vectorials i aplicacions lineals.