

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 678—2020

# 婴幼儿辅食添加营养指南

Nutrition guidelines of complementary feeding for infants and toddlers

2020 - 05 - 06 发布

2020 - 11 - 01 实施

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准起草单位:首都儿科研究所、中国疾病控制中心营养与健康所、南京医科大学公共卫生学院、 重庆医科大学附属儿童医院、深圳市慢性病防治中心。

本标准主要起草人: 张霆、殷妍、吴建新、黄建、霍军生、汪之顼、李廷玉、关宏岩、张淑一、王琳、王晓燕、卢晓琳、王芳、程茜、于微、周继昌、武洁姝、丁叶。

## 婴幼儿辅食添加营养指南

#### 1 范围

本标准规定了健康足月出生的满6月至24月龄的婴幼儿进行辅食添加基本原则和分年龄段辅食添加 指导及辅食制作要求。

本标准适用于满6月至24月龄内婴幼儿辅食添加的营养指导。

#### 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2. 1

#### 婴儿 infant

年龄在0~12月龄以内的儿童。

2. 2

#### 幼儿 toddler

年龄在12~36月龄的儿童。

2. 3

#### 辅食 complementary foods

#### 辅助食品

婴幼儿在满6月龄后,继续母乳喂养的同时,为了满足营养需要而添加的其他各种性状的食物,包括家庭配制的和工厂生产的。

#### 3 婴幼儿辅食添加基本原则

#### 3.1 辅食添加时间

纯母乳喂养到6月龄,且在孩子健康时添加辅食。婴幼儿进餐时间应逐渐与家人一日三餐时间一致。 同时,继续母乳,建议母乳喂养到2岁及以上。

#### 3.2 辅食种类

种类由单一到多样,每次只添加一种新的食物,添加量由少到多。每引入一种新的食物应适应3d~5d,观察是否出现呕吐、腹泻、皮疹等不良反应,适应一种食物后再添加其他新的食物。逐渐增加辅食种类,最终达到每天摄入七类常见食物中的四类及以上,参见附录A。

#### 3.3 辅食添加的数量与营养要求

辅食添加量由少到多,关注婴幼儿的饥饿和饱足反应,主要依据孩子的需要而定。满足母乳及辅食提供的能量及主要营养素摄入量的需求,参见附录B。

#### 3.4 辅食性状与质地

随着婴幼儿口腔及胃肠等器官结构和功能的发育,辅食性状和质地应由稀到稠、由细到粗,从肉泥、菜泥等泥糊状食物开始,逐步增加食物硬度和颗粒大小,过渡到肉末、碎菜等半固体或固体食物。

#### 3.5 顺应喂养

随着婴幼儿生长发育,喂养者应根据婴幼儿营养需求的变化,提供多样化且与其发育水平相适应的食物,保证婴幼儿健康发育。喂养过程中,应及时感知婴幼儿发出的饥饿和饱足反应,并做出恰当地回应,应耐心鼓励和协助婴幼儿进食,培养儿童合理进食行为,帮助婴幼儿学会自主进食,遵守必要的进餐礼仪,逐步形成健康的进餐模式。

#### 3.6 监测与评估

定期监测和评估婴幼儿体格生长发育指标,评估营养状况。当辅食营养摄入无法满足需求时,应及时调整,可合理进行营养素补充。

#### 3.7 辅食添加的安全与卫生

应使用清洁安全卫生的食材和餐用具进行辅食制作。有些食物或进食行为容易导致进食意外,为保证安全,婴幼儿进食时须有成年人看护。

#### 3.8 患病期间的喂养

暂停添加新的辅食。除特殊情况外,鼓励进食易消化且营养丰富的辅食。病愈后,及时恢复正常饮食。

#### 4 分年龄段辅食添加指导

#### 4.1 满6~8月龄

- 4.1.1 辅食种类: 首先补充含铁丰富、易消化且不易引起过敏的食物,如稠粥、蔬菜泥、水果泥、蛋黄、肉泥、肝泥等,逐渐达到每天能均衡摄入蛋类、肉类和蔬果类。
- 4.1.2 辅食频次:由尝试逐渐增加到每日1~2餐,以母乳喂养为主。
- 4.1.3 辅食数量:每餐从  $10 \text{ mL} \sim 20 \text{ mL}$ (约  $1\sim 2$  勺),逐渐增加到约 125 mL(约 1/2 碗)。各类食物推荐摄入量参见附录 C。因考虑到辅食摄入量有较大的个体差异,以不影响总奶量为限。
- 4.1.4 辅食性状: 从泥糊状逐渐到碎末状。
- 4.1.5 辅食质地:可用舌头压碎的程度,如同软豆腐状。

#### 4.2 9~12月龄

- **4.2.1** 辅食种类:在8月龄基础上引入禽肉(鸡肉、鸭肉等)、畜肉(猪肉、牛肉、羊肉等)、鱼、动物肝脏和动物血等,逐渐达到每天能均衡摄入蛋类、肉类和蔬果类。
- 4.2.2 辅食频次:规律进食,每日2~3餐,1~2次加餐,并继续母乳喂养。
- 4.2.3 辅食数量: 每餐逐渐增加到约 180 mL(约 3/4 碗), 各类食物推荐摄入量参见附录 C。
- 4.2.4 辅食性状:碎块状及婴儿能用手抓的指状食物。

4.2.5 辅食质地:可用牙床压碎的程度,如同香蕉状。

#### 4.3 1~2岁

- 4.3.1 辅食种类:食物种类基本同成人。逐渐增加辅食种类,最终达到每天摄入七类常见食物中的四类及以上,参见附录 A。
- 4.3.2 辅食频次:每日3餐,2次加餐,继续母乳喂养。
- **4.3.3** 辅食数量: 每餐从约  $180 \, \text{mL}$  (约  $3/4 \, \text{碗}$ ) 逐渐增加至约  $250 \, \text{mL}$  (约  $1 \, \text{碗}$ )。各类食物推荐摄入量参见附录 C。
- 4.3.4 辅食性状:块状、指状食物及其他小儿能用手抓的食物,必要时切碎或捣碎。
- 4.3.5 辅食质地:可用牙床咀嚼的程度,如同肉丸子状。

注: 文中所用单位, 勺容量为10 mL; 碗容量为250 mL。

#### 5 辅食制作要求

#### 5.1 原料要求

婴幼儿辅食添加所使用的食品和原料应符合相应的食品安全标准和/或相关规定,应新鲜、优质和 无污染,应保证婴幼儿安全、满足营养需要。

#### 5.2 卫生要求

制作辅食的餐用具应保持清洁;制作过程应始终保持清洁卫生和生熟分开;辅食应煮熟、煮透;水果等生吃的食物要清洗干净;辅食应现做现吃,制作好的辅食应及时食用,如未及时食用应妥善保存,尽早食用。

#### 5.3 调味品要求

辅食应保持原味,12月龄内不宜添加盐、糖及刺激性调味品。1岁后逐渐尝试淡口味的膳食。

#### 5.4 烹调要求

蔬菜应先洗后切。烹调以蒸煮为主,尽量减少煎、炸的烹调方法。

## 附 录 A (资料性附录) 婴幼儿辅食添加常见食物及注意事项

#### A. 1 婴幼儿辅食添加常见种类

谷物类因其容易消化和不易引起过敏反应,是婴幼儿进行辅食添加时的首选。婴幼儿辅食一般包括 七类常见食物,辅食添加应逐渐达到每天摄入以下七类食物中的四类及以上。

- 1) 谷物、根茎类和薯类:面粉、大米、小米、红薯、土豆等。
- 2) 肉类: 畜肉、禽类、鱼类及其动物内脏等。
- 3) 奶类:牛奶、酸奶、奶酪等。
- 4) 蛋类:鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋等。
- 5) 维生素 A 丰富的蔬果(不包括果汁): 胡萝卜、羽衣甘蓝、南瓜、小白菜、芒果、蜜橘等。
- 6) 其他蔬果(不包括果汁): 小油菜、娃娃菜、花椰菜、西兰花、苹果、梨等。
- 7) 豆类及其制品/坚果类:豆类及其制品包括黄豆、豆腐等;坚果包括花生仁、核桃仁、腰果等。

#### A. 2 注意事项

当婴幼儿开始尝试家庭食物时,应避免大块食物哽噎而导致的意外,同时禁止食用整粒的花生、腰 果等坚果。

## 附 录 B (资料性附录) 膳食主要营养素参考摄入量

婴幼儿每人每天能量和主要营养素供给量应符合表B.1的规定。

表B.1 婴幼儿膳食主要营养素参考摄入量

能量及营养素 (单位)	0.5岁~		1~2 岁	
能量/ (MJ/d)	男	女	男	女
	0.33 (MJ/kg • d)	0.33 (MJ/kg•d)	3.77 (MJ/d)	3.35 (MJ/d)
蛋白质/ (g/d)	20 (RNI)	20 (RNI)	25 (RNI)	25 (RNI)
脂肪供能比/(%/d)	40 (AI)		35 (AI)	
碳水化合物/(g/d)	85 (AI)		120 (RNI)	
钙/ (mg/d)	250 (AI)		600 (RNI)	
铁/ (mg/d)	10 (RNI)		9 (RNI)	
锌/ (mg/d)	3.5 (RNI)		4 (RNI)	
维生素 A ( RAE) / (μg/d)	350 (AI)		310 (RNI)	
维生素 D/ (μg/d)	10 (AI)		10 (RNI)	
维生素 B <sub>1</sub> / (mg/d)	0.3 (AI)		0.6 (RNI)	
维生素 B <sub>2</sub> / (mg/d)	0.5 (AI)		0.6 (RNI)	
叶酸 (DFE) / (μg/d)	100 (AI)		160 (RNI)	
维生素 B <sub>12</sub> / (μg/d)	0.6 (AI)		1.0 (RNI)	
维生素 C/ (mg/d)	40 (AI)		40 (RNI)	

注1: RNI为推荐摄入量

注2: AI为适宜摄入量

注3: 脂肪供能比: 脂肪供能占总能量百分比

注4: RAE为视黄醇活性当量; DFE为膳食叶酸当量。

## 附 录 C (资料性附录) 婴幼儿常见食物种类推荐量

不同年龄段婴幼儿各类食物推荐摄入量见表C.1。

### 表C.1 婴幼儿常见食物种类推荐量

年龄	母乳喂养	米粉及米面类	蔬菜、水果类	畜禽类	
6~8 月龄	坚持母乳喂养, 随着	从满 6 月龄开始添	从开始尝试菜泥到水果泥,	开始逐步添加蛋黄、	
	固体食物添加,喂养	加稠粥或面条,每	逐步从泥状食物到碎末状	及猪肉、牛肉等动物	
	频率逐步减少至每	餐 30 g~50 g	的碎菜和水果	性食物	
	天 4~6 次				
9~12月龄	坚持母乳喂养, 喂养	从稠粥过渡到软	每天碎菜 50 g~100 g, 水	蛋黄可逐渐增至每天	
	频率减少至每天4次	饭,每天约 100 g	果 50g, 水果可以是片块状	1个,每天以红肉类为	
			或手指可以拿起的指状食	主的动物性食物 25	
			物	g∼50 g	
1~2岁	喂养频率减少至每	逐渐过渡到与成人	每天蔬菜 200 g~250 g,	每天动物性食物 50	
	天 2~3 次	食物质地相同的	水果 100 g~150 g	g~80 g,鸡蛋 1 个	
		饭、面等主食,每			
		天约 100 g~150 g			
注: 建议非母乳喂养儿摄入适量奶制品。					

6