Test – Oversigt og beskrivelser

Bevidst motorisk output (Cortex)	
Foroverbøjning	
Beskrivelse: Strakte knæ Samlede fødder Håndflader glider ned langs forside lår og skinneben Rul ned inklusive nakken (afslappet hoved) Lad tyngdekraften bøje dig forover Strakte arme	**Optimalt:** Fingerspids på 3. finger rører gulv **Observer:** Holdes knæene og armene strakte? Holdes armene strakte? Holdes hovedet afslappet? Er hastigheden af testbevægelsen nogenlunde den samme?
Kropsrotation	
Beskrivelse: Strakte knæ Samlede fødder Hænder samlet og arme strakte Drej hele kroppen inkl. hovedet Fodsåler forbliver i fuld kontakt med gulvet	**Optimalt:** 90 grader I forhold til startposition Startposition = hænderne peger fremad **Observer:** Forbliver fodsåler i gulvet? Holdes håndfladerne samlet? Er hastigheden af testbevægelsen nogenlunde den samme?
Skulderindadrotation	
Beskrivelse Overarm løftet udad til 80 grader i skulderbladets plan Albuen bøjet 90 grader Underarm vandret Skulderbladet i neutral stilling Hoved og øjne rettet mod hånden Slip underarm så hånden søger gulvet = skulderen indadroterer	**Optimalt:** 70 grader under vandret **Observer:** Holdes skulderbladet i neutral? Overarmen placeret i rigtige stilling?
Præcision og koordination (Cerebellum)	
Hånd-Taps	
Beskrivelse: Albue ind til kroppen 90 gr i albue Samlede fingre Tap skal ramme håndflade/forside fingre (pronation/supination) Løft hånden fri imellem hver drejning	**Optimalt:** Tag tid og tæl antal. Tæl hver gang håndryg ”tapper”. Så hurtigt som muligt Optimalt: 25 taps på 5 sekunder 75 taps på 15 sekunder **Observer:** Holdes albuen ind til kroppen? Holdes fingrene samlet? Løftes hånden fri imellem drejninger Balance mellem spænding og afspænding

Fod-Taps	
Beskrivelse: Hoftebredde mellem fødder Testfods hæl er på niveau med bagerste fods tå Let bøjet knæ 10-15 gr Vægt på bagerste ben Kun bevægelse i ankelled – hold resten af kroppen i ro	**Optimalt:** Tag tid og tæl antal. Tæl hver gang forfod ”tapper” i gulvet. Så hurtigt som muligt Optimalt: 25 taps på 5 sekunder 75 taps på 15 sekunder **Observer:** Kan bevægelsen isoleres til ankelled? Fastholdes rytmen Balance mellem spænding og afspænding
Balance og Kropsholdning (Cerebellum)	
Gangtest (Cerebellum)	
Beskrivelse: Som første prioritet testes gang, gerne med samtidig kognitiv udfordring (Dual Task) Rygsøjle, nakke/hoved, skuldre og hofter er i fokus	**Optimalt:** <u>Arm/skulder:</u> Spidsen af albue peger bagud Håndfladen vender ind mod hofte/yderside af lår <u>Hofte:</u> Knæskal og fod peger 15 grader ud ved fremsving og isæt af fod. <u>Ryg:</u> Normalt svaj i lænd og normal runding i midtryg (35 grader) <u>Hoved:</u> Stabilt i ligeud acceleration <u>Gangbredde:</u> Går smallere end 30 cm <u>Vendinger:</u> Er sikker og stabil **Observer:** Er der forøget indadrotation af skulderen? (spids af albue peger udad) Er der forøget indadrotation af hoften? (knæskal og fod peger indad) Er der formindsket svaj i lænden og er der forøget krumning i midtryggen? Er der ustabilt hoved? (”Wobble”) Kan der gås uden at træde udenfor 30 cm bred ”løber”? (A4-papir på bredden) Er der for stort svaj / usikker gang lige efter vendinger?
Romberg	
Beskrivelse: Samlede fødder Arme ned langs siden Lukkede øjne Stå bagved hvis du har spejl (ellers foran) Lad klienten stå i 15 sekunder	**Optimalt:** Lette posturale svaj i skiftende og varierende retning. Klienten virker afslappet. **Observer:** Er posturale svaj større end normalt?

Observer posturale svaj: Er de større end normalt? Er der en eller flere retninger der svajes mere ud i? Reagerer klienten med startle/sympaticus reaktion når øjnene lukkes?	Er der en eller flere retninger der svajes mere ud i? Reagerer klienten med startle/sympaticus reaktion når øjnene lukkes?
Romberg med puf	
Beskrivelse: Udgangsstilling som i Romberg Forbered klienten på hvad der skal ske Puf klienten lidt ud af balance med et resolut puf på siden af skulder/overarm med flad hånd Puf på begge sider i uforudsigeligt mønster – vi ønsker at klienten overraskes af puffet	**Optimalt:** Klienten svajer få centimeter ud, og genvinder hurtigt balance og neutralstilling igen **Observer:** Hvor langt falder klienten ud? Hvor hurtigt findes balancen igen? Sammenlign højre/venstre
Et bens balance	
Beskrivelse: Stå i Romberg stilling med åbne øjne Løft det ene ben ved en knæbøjning Udføres efterfølgende med lukkede øjne	**Optimalt:** Med åbne øjne 30 sekunder Med lukkede øjne 15 sekunder Standfoden forbliver det samme sted Den frie fod rører ikke gulvet Det frie ben rører ikke standben Arme og krop korrigerer minimalt Øjne forbliver lukkede **Observer:** Berører den frie fod gulvet eller standbenet? Flyttes eller løftes dele af standfoden? Udføres der meget store arm- eller kropsbevægelser? Forbliver øjnene lukkede hele tiden? Reagerer klienten med startle/sympaticus-reaktion når øjnene lukkes? Test begge sider og registrer hvor mange sekunder Udføres derefter med lukkede øjne