



Funktionel NeuroTerapeut - Tests

Navn / Cpr:

Dato:

Område	Test	Normalt resultat	Rehab ved positiv test (fejler test)	Praktiske eksempler
Parietal Cortex mv.	Foroverbøjning	Fingre til gulv	Husk: Er en meget uspecifik test. Centralt / på samme side som fejlet test: BKØ	BKØ -Ledområde med problemer -Ledområder tæt på -Modsatte led -Smæk for skillingen: fødder, hænder, hofter, brystryg
	Helkropsrotation	90°		
	Skulder indadrotation	70° under vandret		
Midterste Cerebellum (Cb)	Gang – Dual task 1. Øget fodafstand 2. Indadroteret skulder og hofte? 3. Wobble head? 4. Sammensunken?	Ingen af de nævnte	På samme side som fejlet test: - Balanceøvelser stående - Balanceøvelser i bevægelse - BKØ rygsøjlen - Vestibulære øvelser	Balanceøvelser stående: -Romberg -Stå på linje -Stå på ét ben -Hold el. bevæg hoved i "kompass positioner" Balanceøvelser bevægelse: -Ex. luges i "kompass" BKØ rygsøjlen -Alle dur Vestibulære øvelser: -aVOR (kanaler) -IVOR (utriculus + sacculus)
	Romberg	30 sek. let sway		
	Romberg med skub	Let sway og hurtigt tilbage i balance		
	1-bens balance +/- syn	30 sek. + syn 15 sek. – syn		
Yderste Cb	Hånd-tap skiftesvis	5 sek. rytmisk og hurtigt. Kan teste længere (15 sek. +)	På samme side som fejlet test: - Komplekse, præcise øvelser - Koordinationskrævende - Interaktive - Evt. til ekstern rytme	BKØ: -Cirkel / 8-taller -Retningsskift -Forstyrrelse i ydre modstand Boldøvelser: -Kaste, gribe, dribble, sparke
	Fod-tap	5 sek. rytmisk og hurtigt. Kan teste længere (15 sek. +)		



Funktionel NeuroTerapeut - Tests

Navn / Cpr:

Dato:

Område	Test	Normalt resultat	Rehab ved positiv test (fejler test)	Praktiske eksempler
PMRF/ Hjernestamme	Gang – Dual task 1.Lav, indad- roteret skulder? 2.Bøjede fingre? 3.Udadroteret hofte? 4.Øgede kurver i ryg?	Ingen af de nævnte	På samme side som fejlet test: - Aktiver cortex via sensorisk input - Aktiver cortex via BKØ for fingre el. tær / motorisk output - Aktiver cortex via øjenbevægelser	Samme sides cortex = modsatte side af kroppen: -Sensorisk input: ex. berøring, tryk, Z-vibe, temperatur mv.) -BKØ: særligt finmotorik i finger- og tå bevægelser (bølger, cirkler mv.) -Motorisk output ex. enkeltsidige styrkeøvelser -Øjne: følgebevægelser ud mod den sides cortex, man vi aktivere. Saccade tilbage til start, ex. OptoSense APP
Hele hjernestammen, men mest Mesencephalon	Køkkenrulle – håndflader på i 2 sek.	Køkkenrulle slipper af sig selv		
Hele hjerne- stammen, men mest Pons	KN 5 – Trigeminus 3 x hud følesans	Normal sensibilitet	På samme side som fejlet test: Aktiver hjernestamme via kranienerver	Kranienerve 5 + 7: -Tyggegummi, -Z-vibe-tyg -Ansigts-grimasser
Mest Medulla oblongata	KN12-Hypoglossus Tryk tunge mod kind udfor mundvig	Jævn, hård modstand i 5 sek. Ex: Tryk i ve. sides kind = hø. sides tungemuskler	På samme side som fejlet test: Aktiver hjernestamme via kranienerver	Kranienerve 12: -Tungepres til den svage side Ex: Tryk i ve. sides kind = hø. sides tungemuskler



Funktionel NeuroTerapeut - Tests

Navn / Cpr:

Dato:

Område	Test	Normalt resultat	Rehab ved positiv test (fejler test)	Praktiske eksempler
Vestibulært – Angulært / Hjernestamme	aVOR – horisontal -Rotere næse	Stabilt syn ved hovedryst 2 x pr. sek.	På samme side som fejlet test: Angulære (cirkulære) bevægelser: drej mod fejlet side	Semi-cirkulære kanaler: -BKØ isoleret nakke i ”kompas” med lukkede øjne -BKØ isoleret nakke i ”kompas” med åbne øjne, der følger hoved eller med syn fixeret (VOR) Position: sidde, stå, ét-bens osv. -BKØ integreret ex. lændecirkler -Marsden/tennis-bold aflevering 2&2 mv.
	aVOR – forreste kanaler -Næse skråt ned	Stabilt syn ved hovedryst 2 x pr. sek.		
	aVOR – bagerste kanaler -Næse skråt op	Stabilt syn ved hovedryst 2 x pr. sek.		
Vestibulært – Lineært / Hjernestamme	IVOR - Utriculus – -Hold nakke sidebøjning i 10 sek.	Stabilt syn ved fokus i 10 sek.	På samme side som fejlet test: Lineære bevægelser: frem/tilbage, side/side	Evt. med nakke sidebøjet mod samme side som fejlet test (+/- syn): -BKØ nakke frem/tilbage -Gang/løb -Lunges i ”kompas”
	IVOR - Sacculus – - Op/ned i knæ	Stabilt syn ved op/ned 2 x pr. sek.	På samme side som fejlet test: Lineære bevægelser: op/ned	Evt. med nakke sidebøjet mod samme side som fejlet test (+/- syn): -Bounce op/ned (siddende på bold, stående, hop) -Squat