yields the decomposition

$$\begin{tikzcd}
V_1 \arrow[r, hook] & V \arrow[d, hook] & V_3 \arrow[l, hook'] \\
 & V_2 &
\end{tikzcd}
\;=\;
\begin{tikzcd}
V_1' \arrow[r, hook] & V' \arrow[d, hook] & V_3 \arrow[l, hook'] \\
 & V_2' &
\end{tikzcd}
\;\oplus\;
\begin{tikzcd}
Y \arrow[r, "\sim"] & Y \arrow[d, squiggly] & 0 \arrow[l] \\
 & Y &
\end{tikzcd}.$$

The second summand is a multiple of the indecomposable object

$$\begin{tikzcd}
1 \arrow[r, "\sim"] & 1 \arrow[d, squiggly] & 0 \arrow[l] \\
 & 1 &
\end{tikzcd}.$$

In the resulting situation we have $V_1 \cap V_2 = 0$. Similarly we can split away multiples of

$$\begin{tikzcd}
1 \arrow[r, "\sim"] & 1 \arrow[d] & 1 \arrow[l, "\sim"'] \\
 & 0 &
\end{tikzcd}
\quad \text{and} \quad
\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & 1 \arrow[d, squiggly] & 1 \arrow[l, "\sim"'] \\
 & 1 &
\end{tikzcd}$$

to reach a situation where the spaces V_1, V_2, V_3 do not intersect pairwise:

$$V_1 \cap V_2 \;=\; V_1 \cap V_3 \;=\; V_2 \cap V_3 \;=\; 0.$$

If $V_1 \not\subseteq V_2 \oplus V_3$, we let $Y = V_1 \cap (V_2 \oplus V_3)$. We let V_1' be a complement of Y in V_1. Since then $V_1' \cap (V_2 \oplus V_3) = 0$, we can select a complement