# 평면분해와 매뉴얼 그래프

형식 교재 초판 (학부 3학년 대상). 증명이 완결된 내용만 싣는다. 증명하지 않고 인용하는 고전 결과는 [인용]으로 표시하고 출처를 적는다.

## 머리말: 이 책의 원칙

1. 모든 정의는 대상의 집합을 명시한다. 예: "$v \in V$", "$k \in K$", "$P_k = (V_k, E_k)$, $V_k \subseteq V$".
2. 모든 명제는 증명을 갖는다. 증명은 정의만으로 한 단계씩 진행한다.
3. 인용한 고전 결과는 [인용]으로 표시한다. 이 책에서 인용하는 결과는 다음 두 개이다.
   (I) 오일러 부등식: $G = (V, E)$가 평면 그래프이고 $|V| \geq 3$이면 $|E| \leq 3|V| - 6$이다. $G$가 길이 3인 사이클을 갖지 않으면 $|E| \leq 2|V| - 4$이다.
   (II) 평면 그래프의 부분그래프와 간선 수축 (마이너 연산으로 얻은 그래프)은 평면 그래프이다.
4. "평면 그래프", "마이너" 등 표준 용어는 정의 없이 쓴다.
5. 이 책은 아직 증명되지 않은 추측을 싣지 않는다. 다루지 않는 것은 마지막 장에 목록으로 적는다.

## 기호

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.
- 유한 집합 $X$에 대해 $\binom{X}{2} := \{\{x, y\} : x, y \in X,\ x \neq y\}$. 즉 $X$의 원소 두 개로 이루어진 비순서쌍 전체의 집합이다.
- 집합 $X$의 원소 개수는 $|X|$로 쓴다.
- $\varnothing$은 공집합이다.

## 제1장 평면분해

### 정의 1.1 (평면분해)

그래프 $G = (V, E)$가 주어졌다고 하자. $G$의 평면분해란 다음 조건을 만족하는 순서쌍 $\mathcal{D} = \{P_k\}_{k \in K}$이다. 여기서 $K$는 유한 집합이고, 각 $k \in K$에 대해 $P_k = (V_k, E_k)$는 그래프이다.

- (D0) 각 $k \in K$에 대해 $V_k \subseteq V$.
- (D1) 각 $k \in K$에 대해 $P_k$는 평면 그래프이다.
- (D2) $V = \bigcup_{k \in K} V_k$.
- (D3) $E = \bigcup_{k \in K} E_k$.

$P_k$를 $\mathcal{D}$의 조각이라 한다. 조각은 서로 겹칠 수 있다. 즉 $k \neq l$에 대해 $V_k \cap V_l \neq \varnothing$이거나 $E_k \cap E_l \neq \varnothing$일 수 있다.

### 예 1.2 (자명 분해)

$G$가 평면 그래프이면 $K=\{1\}$, $P_1=G$로 두면 $\{P_1\}$은 $G$의 평면분해이다. 역으로 $K=\{1\}$인 평면분해가 존재하면 $P_1=(V_1,E_1)$은 평면이고 $V_1=V$, $E_1=E$이므로 $G$는 평면이다. 즉 $G$가 평면인 것과 $G$의 평면분해 중 조각이 하나인 것이 존재하는 것은 동치이다.

### 예 1.3 (정사각형 두 장으로 만든 $K_4$)

$V=\{0,1,2,3\}$, $E=\binom{V}{2}$를 $K_4$라 하자. $K=\{1,2\}$로 두고 다음 두 조각을 정의한다.

- $P_1=(V,E_1)$, $E_1=\{\{0,1\},\{1,3\},\{3,2\},\{2,0\}\}$. 이것은 사이클 0-1-3-2-0이다.
- $P_2=(V,E_2)$, $E_2=\{\{0,3\},\{3,1\},\{1,2\},\{2,0\}\}$. 이것은 사이클 0-3-1-2-0이다.

$E_1\cup E_2=\{\{0,1\},\{1,3\},\{2,3\},\{0,2\},\{0,3\},\{1,2\}\}=\binom{V}{2}$이므로 (D3)이 성립한다. $V_1=V_2=V$이므로 (D0), (D2)가 성립한다. 두 조각은 길이 4인 사이클이므로 평면 그래프이다. 따라서 $\mathcal{D}$는 $K_4$의 평면분해이다. 여기서 $E_1\cap E_2=\{\{1,3\},\{0,2\}\}$이다.

### 예 1.4 (두 오각형으로 만든 $K_5$)

$V=\{0,1,2,3,4\}$, $E=\binom{V}{2}$를 $K_5$라 하자. $K=\{1,2\}$로 두고 다음 두 조각을 정의한다.

- $P_1=(V,E_1)$, $E_1=\{\{0,1\},\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{0,4\}\}$. 사이클 0-1-2-3-4-0이다.
- $P_2=(V,E_2)$, $E_2=\{\{0,2\},\{2,4\},\{4,1\},\{1,3\},\{0,3\}\}$. 사이클 0-2-4-1-3-0이다.

$E_1\cup E_2=\binom{V}{2}$이고 $E_1\cap E_2=\varnothing$이다. 두 조각은 길이 5인 사이클이므로 평면 그래프이다. 따라서 $\mathcal{D}$는 $K_5$의 평면분해이다.

## 제2장 복사점과 매뉴얼 그래프

이 장에서는 $G=(V,E)$와 $G$의 평면분해 $\mathcal{D}=\{P_k\}_{k\in K}$를 고정한다.

### 정의 2.1 (복사점)

다음 집합과 사상을 정의한다.

- $V_0:=\{(v,k)\in V\times K:\ v\in V_k\}$.
- $E_{00}:=\big\{\{(u,k),(v,k)\}:\ k\in K,\ \{u,v\}\in E_k\big\}$.
- 사상 $\varphi:V_0\to V$를 $\varphi(v,k):=v$로 둔다.
- 각 $v\in V$에 대해 $C(v):=\varphi^{-1}(v)=\{(v,k)\in V_0:\ v\in V_k\}$. 이것을 $v$의 복사점 집합이라 한다.

### 보조정리 2.2 (복사점의 기본 성질)

1. $E_{00}\subseteq\binom{V_0}{2}$이다.
2. $\{C(v)\}_{v\in V}$는 $V_0$의 분할이다. 즉 각 $C(v)$는 공집합이 아니고, 서로소이며, 합집합이 $V_0$이다.
3. $\{x,y\}\in E_{00}$이면 $\varphi(x)\neq\varphi(y)$이고 $\{\varphi(x),\varphi(y)\}\in E$이다.
4. $\{x,y\}\in E_{00}$이면 $x,y$는 같은 $k$를 가진다. 즉 $x=(u,k)$, $y=(v,k)$이다.

증명. (1) 정의 2.1에서 $\{(u,k),(v,k)\}$의 두 원소는 $\{u,v\}\in E_k\subseteq\binom{V_k}{2}$에 의해 서로 다르다. 또 $(u,k),(v,k)\in V_0$이므로 $E_{00}\subseteq\binom{V_0}{2}$이다.

(2) $v\in V$에 대해 (D2)에 의해 $v\in V_k$인 $k\in K$가 존재하므로 $C(v)\neq\varnothing$이다. $C(v)=\varphi^{-1}(v)$이므로 $v\neq v'$이면 $C(v)\cap C(v')=\varnothing$이다. $V_0=\bigcup_{v\in V}\varphi^{-1}(v)$이다.

(3) $\{x,y\}\in E_{00}$이면 $x=(u,k)$, $y=(v,k)$, $\{u,v\}\in E_k$이다. $\{u,v\}\in\binom{V}{2}$이므로 $u\neq v$이고, $\varphi(x)=u\neq v=\varphi(y)$이다. $\{u,v\}\in E_k\subseteq E$ ((D3)에 의해 $E_k\subseteq E$)이다.

(4) (3)의 증명에서 바로 나온다. $\square$

### 정의 2.3 (매뉴얼 그래프)

다음을 정의한다.

- $V_1:=\{\,w_v:\ v\in V,\ |C(v)|\geq 2\,\}$. 여기서 $w_v$는 $v$마다 하나씩 정한 새 기호이며 $w_v\notin V_0$이다. 서로 다른 $v$에 대해 $w_v\neq w_{v'}$이다.
- $E_{01}:=\big\{\{x,w_v\}:\ v\in V,\ |C(v)|\geq 2,\ x\in C(v)\big\}$. 이것은 $V_0\times V_1$의 원소를 비순서쌍으로 적은 것이다.
- 각 $v\neq v'\in V$에 대해 $\kappa(v,v'):=\big|\{k\in K:\ \{v,v'\}\in E_k\}\big|$.
- $E_{11}:=\big\{\{w_v,w_{v'}\}:\ v\neq v',\ \kappa(v,v')\geq 2\big\}$.

순서쌍 $\mathfrak{M}(\mathcal{D}):=(V_0,V_1,E_{00},E_{01},E_{11})$를 $\mathcal{D}$에 대한 매뉴얼 그래프라 한다. 점집합과 변집합은 다음과 같다.

$$V(\mathfrak{M})=V_0\sqcup V_1,\qquad E(\mathfrak{M})=E_{00}\sqcup E_{01}\sqcup E_{11}.$$

이 합집합이 서로소인 이유는 다음과 같다. $V_0\cap V_1=\varnothing$이다. $E_{00}$의 원소는 $V_0$의 두 점, $E_{01}$의 원소는 $V_0$의 점과 $V_1$의 점, $E_{11}$의 원소는 $V_1$의 두 점이다. 따라서 세 집합의 원소는 끝점의 종류가 달라서 서로 같을 수 없다.

$E_{11}$은 $(E_{00},E_{01})$로 정해지는 파생 성분이다. $\kappa(v,v')\geq 2$이면 $v$와 $v'$가 두 조각에 함께 속하므로 $|C(v)|\geq 2$, $|C(v')|\geq 2$이고, 따라서 $w_v,w_{v'}\in V_1$이다. 그러므로 $E_{11}$의 정의는 well-defined이다.

$U\mathfrak{M}(\mathcal{D}):=(V_0\sqcup V_1,\ E_{00}\sqcup E_{01})$를 $\mathfrak{M}$의 접합 그래프라 한다. 이것은 $\mathfrak{M}$의 부분그래프이다.

### 명제 2.4 (매뉴얼 그래프의 기본 성질)

$\mathfrak{M}=\mathfrak{M}(\mathcal{D})$에 대해 다음이 성립한다.

1. (M1) 모든 $w\in V_1$에 대해 $|N(w)|\geq 2$. 여기서 $N(w):=\{x\in V_0:\ \{x,w\}\in E_{01}\}$.
2. (M2) 모든 $x\in V_0$에 대해 $x\in N(w)$인 $w\in V_1$은 많아야 하나이다.
3. (M3) 모든 $w\in V_1$와 모든 $x,y\in N(w)$에 대해 $\{x,y\}\notin E_{00}$.
4. $N(w_v)=C(v)$이다 (모든 $v$에 대해 $|C(v)|\geq 2$인 경우).

증명. (4)는 정의에서 바로 나온다. $N(w_v)=\{x:\{x,w_v\}\in E_{01}\}=C(v)$이다.

(1) $|N(w_v)|=|C(v)|\geq 2$이다.

(2) $x\in V_0$를 고정하고 $x\in N(w_v)$, $x\in N(w_{v'})$라 하자. 그러면 $x\in C(v)\cap C(v')$이므로 보조정리 2.2(2)에 의해 $v=v'$이고, 따라서 $w_v=w_{v'}$이다.

(3) $x, y \in N(w_v) = C(v)$, $x \neq y$라 하자. $x = (v,k)$, $y = (v,l)$이다. 만약 $\{x,y\} \in E_{00}$이면 보조정리 2.2(4)에 의해 $k = l$이고, 따라서 $x = y$이다. 이것은 $x \neq y$와 모순이다. □

## 제3장 조립

### 정의 3.1 (블록과 조립)

$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\mathcal{D})$에 대해 다음을 정의한다.

- 블록 집합: $\pi := \{C(v) : v \in V\}$. 보조정리 2.2(2)에 의해 $\pi$는 $V_0$의 분할이다.
- 사상 $\rho : V(\mathfrak{M}) \to \pi$: 각 $x \in V_0$에 대해 $\rho(x) := x$를 포함하는 블록; 각 $w_v \in V_1$에 대해 $\rho(w_v) := C(v)$.
- $\mathfrak{M}$의 조립 $G(\mathfrak{M}) := \big(\pi,\ \{\{\rho(a), \rho(b)\} : \{a,b\} \in E(\mathfrak{M}),\ \rho(a) \neq \rho(b)\}\big)$.

이것은 흰 별 $\{w_v\} \cup C(v)$를 한 점으로 축약하고 중복 변을 하나로 합친 그래프이다.

### 정리 3.2 (조립은 원래 그래프이다)

사상 $\psi : \pi \to V$를 $\psi(C(v)) := v$로 정의하면 $\psi$는 전단사이고, 모든 $\{\beta,\gamma\} \subseteq \pi$에 대해 $\{\beta,\gamma\} \in E(G(\mathfrak{M}))$와 $\{\psi(\beta), \psi(\gamma)\} \in E$가 동치이다. 즉 $\psi$는 그래프 동형 $G(\mathfrak{M}) \cong G$를 준다.

증명.

1. $\psi$의 well-definedness와 전단사성: 블록 $C(v)$는 정확히 하나의 $v$에 대응한다. 보조정리 2.2(2)에 의해 $v \neq v'$이면 $C(v) \neq C(v')$이므로 $\psi$는 단사이다. $C(v) \neq \varnothing$이므로 $\pi$의 각 원소가 $\psi$의 상에 든다. 따라서 $\psi$는 전단사이다.
2. 변의 대응. 먼저 $\{a,b\} \in E(\mathfrak{M})$에 대해 $\{\rho(a), \rho(b)\}$의 상을 계산한다.
   - $\{a,b\} \in E_{00}$이면 $a = (u,k)$, $b = (v,k)$, $\{u,v\} \in E_k$이고, $\rho(a) = C(u)$, $\rho(b) = C(v)$이다. 따라서 $\psi\rho(a) = u$, $\psi\rho(b) = v$이고 $\{u,v\} \in E_k \subseteq E$이다.
   - $\{a,b\} \in E_{01}$이면 $\rho(a) = \rho(b)$이므로 이 변은 $G(\mathfrak{M})$의 변을 만들지 않는다.
   - $\{a,b\} = \{w_v, w_{v'}\} \in E_{11}$이면 $\kappa(v,v') \geq 2$이므로 $\{v,v'\} \in E_k$인 $k$가 존재한다. 그러면 $\{(v,k),(v',k)\} \in E_{00}$이고 $\rho((v,k)) = C(v) = \rho(w_v)$, $\rho((v',k)) = C(v') = \rho(w_{v'})$이다. 따라서 $\{\rho(w_v), \rho(w_{v'})\}$는 $E_{00}$의 변의 상과 같다. 그 상의 $\psi$-상은 $\{v,v'\} \in E$이다.

   그러므로 $G(\mathfrak{M})$의 모든 변 $\{\beta,\gamma\}$에 대해 $\{\psi(\beta), \psi(\gamma)\} \in E$이다.
3. 역방향. $\{u,v\} \in E$라 하자. (D3)에 의해 $\{u,v\} \in E_k$인 $k$가 있다. 그러면 $\{(u,k),(v,k)\} \in E_{00}$이고 $\rho$-상은 $\{C(u), C(v)\}$이다. $C(u) \neq C(v)$이므로 이것은 $G(\mathfrak{M})$의 변이고 $\psi$-상은 $\{u,v\}$이다.

따라서 $\psi$는 동형이다. □

### 정리 3.3 ($G$는 접합 그래프의 마이너이다)

$G \preceq U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$이다. 따라서 $G \preceq \mathfrak{M}(\mathcal{D})$이다.

증명. 각 $v$에 대해 $|C(v)| \geq 2$이면 $T_v := C(v) \cup \{w_v\} \subseteq V(U\mathfrak{M})$로 둔다. 이때 $U\mathfrak{M}[T_v]$는 연결이다. 실제로 $w_v$는 $C(v)$의 모든 점과 $E_{01}$의 변으로 이어져 있다. 서로 다른 $v, v'$에 대해 $T_v \cap T_{v'} = \varnothing$이다. 한 $T_v$를

수축해도 다른 $T_{v'}$는 수축되지 않은 점들로만 이루어져 있으므로, 그 상은 같은 점과 같은 변을 가진 연결 부분그래프이다. 따라서 모든 $T_v$를 차례로 수축할 수 있다. 결과 그래프의 점집합은 $\pi$와 같은 원소 개수를 가지며, 각 블록 $C(v)$가 한 점이 된다. 이 그래프의 변은 $E_{00} \sqcup E_{01}$의 상 중 두 끝점이 다른 것이다. $E_{01}$의 변은 모두 한 블록 안에 들어가므로 사라진다. 따라서 결과 그래프는 $(\pi, \{\{\rho(a), \rho(b)\} : \{a,b\} \in E_{00},\ \rho(a) \neq \rho(b)\})$이다. 이것은 $G(\mathfrak{M})$의 변 집합에서 $E_{11}$의 기여를 뺀 것이고, 정리 3.2의 증명 (2)에 의해 $E_{11}$의 기여는 $E_{00}$의 기여와 같다. 따라서 결과 그래프의 변 집합은 $G(\mathfrak{M})$의 변 집합과 같다. 정리 3.2에 의해 $G(\mathfrak{M}) \cong G$이다. 그러므로 $G \preceq U\mathfrak{M}$이다. $\square$

마지막 문장은 $U\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}$에서 나온다. $\mathfrak{M}$에서 $w_v$ 점과 $E_{11}$의 변을 삭제하면 $U\mathfrak{M}$이 되므로 $U\mathfrak{M} \preceq \mathfrak{M}$이다.

## 제4장 자명 분해와 두 조각 분해

### 명제 4.1 (자명 분해)

$G$의 평면분해 $\{P_1\}$ ($K = \{1\}$)가 존재하는 것과 $G$가 평면인 것은 동치이다 (예 1.2). 이때 $V_0 = \{(v,1) : v \in V\}$, $E_{00} = \{\{(u,1),(v,1)\} : \{u,v\} \in E\}$, $V_1 = E_{01} = E_{11} = \varnothing$이다.

증명. $K = \{1\}$이므로 $C(v) = \{(v,1)\}$, $|C(v)| = 1$이다. 따라서 $V_1 = \varnothing$이다. $E_{01} = \varnothing$은 $V_1 = \varnothing$에서 나온다. $\kappa(v,v') \leq |K| = 1 < 2$이므로 $E_{11} = \varnothing$이다. 나머지 등식은 정의 2.1에서 나온다. $\square$

### 명제 4.2 (두 조각 분해)

$V$를 유한 집합, $E_1, E_2 \subseteq \binom{V}{2}$, $E = E_1 \cup E_2$라 하자. $P_1 = (V, E_1)$과 $P_2 = (V, E_2)$가 평면 그래프이면 $\mathcal{D} = \{P_1, P_2\}$ ($K = \{1,2\}$)는 $G = (V,E)$의 평면분해이다. 이때 다음이 성립한다.

1. $V_1 = \{w_v :\ v \in V\}$ ($|C(v)| = 2$이므로).
2. $E_{11} = \{\{w_u, w_v\} :\ u \neq v,\ \{u,v\} \in E_1 \cap E_2\}$.

증명. (D0), (D1), (D2), (D3)는 가정에서 나온다. $\kappa(u,v) = |\{k \in \{1,2\} : \{u,v\} \in E_k\}|$이므로 $\kappa(u,v) \geq 2 \Leftrightarrow \{u,v\} \in E_1 \cap E_2$이다. 또 $v \in V_1$, $v \in V_2$이므로 $|C(v)| = 2$이다. $\square$

## 제5장 비자명성 조건 (N)

### 정의 5.1 (조건 (N))

$G$의 평면분해 $\mathcal{D} = \{P_k\}_{k \in K}$가 조건 (N)을 만족한다는 것은 다음 세 조건이 성립하는 것이다.

- (N1) $|K| \geq 2$.
- (N2) 모든 $k \in K$에 대해 $|V_k| \geq 3$.
- (N3) 모든 $k \in K$에 대해 $E_k \neq E$. 즉 $E_k \subsetneq E$.

(N3)에서 $E_k \subseteq E$는 (D3)의 결과이므로 $E_k \subsetneq E$와 $E_k \neq E$는 같은 조건이다.

### 명제 5.2 (점이 두 개 이하이면 실현되지 않는다)

$|V| \leq 2$인 그래프 $G = (V,E)$는 조건 (N)을 만족하는 평면분해를 갖지 않는다.

증명. $\mathcal{D}$가 (N)을 만족한다고 가정하자. (N2)에 의해 $k \in K$를 하나 택하면 $|V_k| \geq 3$이다. (D0)에 의해 $V_k \subseteq V$이므로 $|V| \geq 3$이다. 이것은 $|V| \leq 2$와 모순이다. □

### 예 5.3 (삼각형 $K_3$의 (N) 분해)

$V = \{a, b, c\}$, $E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}\}$를 $K_3$라 하자. $K = \{1, 2\}$로 두고 다음 두 조각을 정의한다.

- $P_1 = (V, E_1)$, $E_1 = \{\{a, b\}, \{b, c\}\}$.
- $P_2 = (V, E_2)$, $E_2 = \{\{a, c\}, \{b, c\}\}$.

검증. 두 조각은 길이 2인 경로이므로 평면이다 (D1). $V_1 = V_2 = V$이므로 (D0), (D2)가 성립한다. $E_1 \cup E_2 = E$이므로 (D3)이 성립한다. (N1) $|K| = 2$. (N2) $|V_1| = |V_2| = 3$. (N3) $E_1 \neq E$ (왜냐하면 $\{a, c\} \notin E_1$), $E_2 \neq E$ (왜냐하면 $\{a, b\} \notin E_2$). 따라서 (N)을 만족한다.

### 명제 5.4 ($K_3$의 $K_2$ 분해는 (N2)를 깬다)

$K_3$를 세 변 $\{a, b\}$, $\{b, c\}$, $\{a, c\}$로 나눈 조각들 (각 조각의 점집합은 두 점) 로 이루어진 평면분해는 (N2)를 만족하지 않는다.

증명. 각 조각 $P_k$의 점집합은 두 점이므로 $|V_k| = 2 < 3$이다. □

### 예 5.5 ($K_5$의 (N) 분해)

예 1.4의 분해 $\{P_1, P_2\}$는 (N)을 만족한다. 검증: (N1) $|K| = 2$. (N2) $|V_1| = |V_2| = 5 \geq 3$. (N3) $|E_1| = |E_2| = 5 < 10 = |E(K_5)|$.

## 제6장 평면성과 마이너

### 정리 6.1 (접합 그래프가 평면이면 $G$는 평면이다)

$\mathcal{D}$가 $G$의 평면분해이고 $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$가 평면 그래프이면 $G$는 평면 그래프이다.

증명. 정리 3.3에 의해 $G \preceq U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$이다. (II)에 의해 $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$가 평면이면 그 마이너인 $G$도 평면이다. □

### 예 6.2 (역은 성립하지 않는다)

예 1.3의 $K_4$와 평면분해 $\mathcal{D} = \{P_1, P_2\}$를 생각하자 ($K = \{1, 2\}$). $K_4$는 평면 그래프이다. 실제로 $\phi(0) = (0, 0)$, $\phi(1) = (1, 0)$, $\phi(2) = (0, 1)$, $\phi(3) = (-1, -1)$로 두고 각 변을 직선 선분으로 그리면 교차가 없다. 점 $(0, 0)$은 삼각형 $\phi(1)\phi(2)\phi(3)$의 내부에 있다 ($(0, 0) = \frac{1}{3}(\phi(1) + \phi(2) + \phi(3))$). 아래에서 접합 그래프 $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$가 평면이 아님을 보인다. 따라서 정리 6.1의 역은 성립하지 않는다.

예 1.3에서 $V_1 = V_2 = V = \{0, 1, 2, 3\}$이므로 $|C(v)| = 2$가 모든 $v$에 대해 성립한다. 명제 4.2에 의해 $V_1 = \{w_0, w_1, w_2, w_3\}$이고 $E_{01} = \{\{(v, k), w_v\} : v \in V,\ k \in K\}$이다. 또 $E_{00} = \{\{(u, k), (v, k)\} : \{u, v\} \in E_k\}$이다. 특히 $E_1 = \{01, 13, 32, 20\}$, $E_2 = \{03, 31, 12, 20\}$이다 (두 수의 순서쌍은 비순서쌍을 뜻한다).

부분그래프 $H$. 다음 여섯 점을 정한다.

- $A_1 = (1, 1)$, $A_2 = (2, 2)$, $A_3 = (3, 2)$.
- $B_1 = (0, 2)$, $B_2 = (1, 2)$, $B_3 = (3, 1)$.

다음 아홉 경로를 정한다. 각 경로의 내부 점은 $\{A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3\}$에 속하지 않는다.

| 경로 | 점열 | 각 변의 소속 |
|---|---|---|
| $P^{(1)}$: $A_1B_1$ | $(1,1),\ (0,1),\ w_0,\ (0,2)$ | $\{(1,1),(0,1)\} \in E_{00}$ ($\{1,0\} \in E_1$), $\{(0,1),w_0\} \in E_{01}$, $\{w_0,(0,2)\} \in E_{01}$ |
| $P^{(2)}$: $A_1B_2$ | $(1,1),\ w_1,\ (1,2)$ | $\{(1,1),w_1\} \in E_{01}$, $\{w_1,(1,2)\} \in E_{01}$ |
| $P^{(3)}$: $A_1B_3$ | $(1,1),\ (3,1)$ | $\{(1,1),(3,1)\} \in E_{00}$ ($\{1,3\} \in E_1$) |
| $P^{(4)}$: $A_2B_1$ | $(2,2),\ (0,2)$ | $\{(2,2),(0,2)\} \in E_{00}$ ($\{2,0\} \in E_2$) |
| $P^{(5)}$: $A_2B_2$ | $(2,2),\ (1,2)$ | $\{(2,2),(1,2)\} \in E_{00}$ ($\{2,1\} \in E_2$) |
| $P^{(6)}$: $A_2B_3$ | $(2,2),\ w_2,\ (2,1),\ (3,1)$ | $\{(2,2),w_2\} \in E_{01}$, $\{w_2,(2,1)\} \in E_{01}$, $\{(2,1),(3,1)\} \in E_{00}$ ($\{2,3\} \in E_1$) |
| $P^{(7)}$: $A_3B_1$ | $(3,2),\ (0,2)$ | $\{(3,2),(0,2)\} \in E_{00}$ ($\{3,0\} \in E_2$) |
| $P^{(8)}$: $A_3B_2$ | $(3,2),\ (1,2)$ | $\{(3,2),(1,2)\} \in E_{00}$ ($\{3,1\} \in E_2$) |
| $P^{(9)}$: $A_3B_3$ | $(3,2),\ w_3,\ (3,1)$ | $\{(3,2),w_3\} \in E_{01}$, $\{w_3,(3,1)\} \in E_{01}$ |

$H$는 이 아홉 경로의 합집합이다. 각 경로의 내부 점은 $(0,1)$, $w_0$, $w_1$, $w_2$, $(2,1)$, $w_3$이고, 이들은 서로 다르며 여섯 분기점과도 다르다. 따라서 아홉 경로는 내부점을 공유하지 않는다. $H$는 $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$의 부분그래프이다.

$H$에서 $K_{3,3}$ 얻기. 각 경로의 내부점을 하나씩 간선 수축하면 분기점 여섯 개와 아홉 변 $A_iB_j$ ($1 \le i, j \le 3$)로 이루어진 그래프가 얻어진다. 이것은 $K_{3,3}$이다. 따라서 $K_{3,3} \preceq H \subseteq U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$이다 (부분그래프는 마이너이다. 점과 변의 삭제로 얻는다. 그리고 정의 2.3).

결론. $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$가 평면이라 가정하면 (II)에 의해 $K_{3,3}$도 평면이다. 그러나 $K_{3,3}$은 $|V| = 6$, $|E| = 9$이고 길이 3인 사이클을 갖지 않으므로, (I)의 $9 \le 2 \cdot 6 - 4 = 8$에 의해 평면이 아니다. 따라서 $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$는 평면이 아니다. $\square$

## 제7장 색칠수는 마이너에 대해 단조가 아니다

### 정의 7.1 (색칠수)

그래프 $G = (V, E)$의 색칠수는 $\chi(G) := \min\{q \in \mathbb{N} :\ \exists c : V \to \{1, \dots, q\}\ (\{u,v\} \in E \Rightarrow c(u) \neq c(v))\}$이다.

### 명제 7.2 (색칠수는 마이너에 대해 단조가 아니다)

$C_4$를 점 $\{1,2,3,4\}$와 변 $\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{1,4\}$의 사이클, $C_3$를 점 $\{1,2,3\}$과 변 $\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\}$의 사이클이라 하자. 그러면 $C_3 \preceq C_4$이고 $\chi(C_4) = 2 < 3 = \chi(C_3)$이다.

증명. $C_3 \preceq C_4$: $C_4/\{1,4\}$를 수축하면 점 $\{z,2,3\}$과 변 $\{z,2\},\{2,3\},\{3,z\}$가 얻어진다. 이것은 $C_3$와 동형이다. $\chi(C_4) = 2$: 색 $c(1) = c(3) = 1$, $c(2) = c(4) = 2$가 적절하고, 1색으로는 변이 있으므로 $\chi \ge 2$이다. $\chi(C_3) = 3$: 세 점이 서로 모두 인접하므로 모두 다른 색이어야 하고 2색으로는 불가능하다. 따라서 $\chi(C_3) \ge 3$이고, 3색 $c(1) = 1$, $c(2) = 2$, $c(3) = 3$이 적절하다. $\square$

따라서 "$H \preceq X$이면 $\chi(H) \le \chi(X)$"는 거짓이다. 이것은 색칠수를 마이너 불변량으로 쓸 수 없다는 뜻이다. 이 책에서는 색칠수 정리를 증명하지 않는다.

# 제8장 범주론적 관점 (검증된 결과)

이 장에서는 제2장의 매뉴얼 그래프 $\mathfrak{M} = (V_0, V_1, E_{00}, E_{01}, E_{11})$와 제1장의 평면분해 $\mathcal{D} = \{P_k\}_{k \in K}$를 쓴다. 이 장의 결과는 모두 증명을 갖는다. 증명이 없는 주장은 싣지 않는다.

### 정의 8.1 (반사 단순 그래프의 범주 $\mathbf{RG}$)

$\mathbf{RG}$의 대상은 그래프 $G = (V, E)$ ($V$ 유한, $E \subseteq \binom{V}{2}$)이다. 두 대상 $G = (V, E)$, $G' = (V', E')$에 대해 사상 $f : G \to G'$는 함수 $f : V \to V'$로서, 모든 $\{x, y\} \in E$에 대해 $f(x) = f(y)$이거나 $\{f(x), f(y)\} \in E'$을 만족하는 것이다. 사상의 합성은 함수의 합성이고, 항등 사상은 항등 함수이다.

확인. $f : G \to G'$, $g : G' \to G''$이면 $\{x, y\} \in E$에 대해 $f(x) = f(y)$이면 $gf(x) = gf(y)$이고, $\{f(x), f(y)\} \in E'$이면 $\{gf(x), gf(y)\}$는 $g$의 조건에 의해 같거나 $E''$의 원소이다. 따라서 $gf$도 사상이다. 항등 함수도 사상이다. 결합 법칙은 함수의 합성에서 나온다. $\square$

### 명제 8.2 (조각들의 합집합은 교집합 도식의 코리밋이다)

$G = (V, E)$와 평면분해 $\mathcal{D} = \{P_k\}_{k \in K}$ ($P_k = (V_k, E_k)$)를 고정한다. 각 $k \neq l$에 대해 $I_{kl} := (V_k \cap V_l,\ E_k \cap E_l)$로 둔다. 이것은 그래프이다: $E_k \cap E_l \subseteq \binom{V_k}{2} \cap \binom{V_l}{2} = \binom{V_k \cap V_l}{2}$이다.

도식 $\mathcal{S}$는 대상이 $\{P_k\}_{k \in K}$와 $\{I_{kl}\}_{k \neq l}$이고, 사상이 포함 $I_{kl} \hookrightarrow P_k$, $I_{kl} \hookrightarrow P_l$ (정의 8.1의 사상이다: 점은 그대로이고 변은 $E_k \cap E_l \subseteq E_k$) 로 이루어진다. 각 $k$에 대해 포함 $\iota_k : P_k \to G$ ($v \mapsto v$)는 $\mathbf{RG}$의 사상이다. 왜냐하면 $\{x, y\} \in E_k$이면 $\{x, y\} \in E$이기 때문이다 ((D3)).

주장. $(G, (\iota_k)_{k \in K})$는 $\mathcal{S}$의 $\mathbf{RG}$에서의 코리밋이다.

증명. 임의의 $Z = (Z_V, Z_E)$와 사상들 $g_k : P_k \to Z$ ($k \in K$)가 $\mathcal{S}$의 사상과 가환하는 것, 즉 $k \neq l$에 대해 $g_k|_{V_k \cap V_l} = g_l|_{V_k \cap V_l}$을 만족한다고 하자 (cocone 조건).

1. 존재. $v \in V$에 대해 $v \in V_k$인 $k$가 있다 ((D2)). 함수 $g : V \to Z_V$를 $g(v) := g_k(v)$로 정의한다. 이것이 잘 정의됨을 보인다. $v \in V_k \cap V_l$이면 cocone 조건에 의해 $g_k(v) = g_l(v)$이다. 따라서 $g \circ \iota_k = g_k$ ($k \in K$)이다. $g$가 사상임을 보인다. $\{x, y\} \in E$이면 (D3)에 의해 $\{x, y\} \in E_k$인 $k$가 있다. $g_k$가 사상이므로 $g_k(x) = g_k(y)$이거나 $\{g_k(x), g_k(y)\} \in Z_E$이다. $g(x) = g_k(x)$, $g(y) = g_k(y)$이므로 $g$의 조건이 성립한다.
2. 유일성. $h : G \to Z$가 $h \circ \iota_k = g_k$ ($k \in K$)를 만족하면 $v \in V$에 대해 $h(v) = h(\iota_k(v)) = g_k(v)$이다. 이것은 $g$와 같다. 따라서 $h = g$이다. $\square$

### 명제 8.3 (파생 흰–흰 변의 조각 표현)

$v \neq v' \in V$에 대해 $\mu(\{v, v'\}) := \big|\{k \in K :\ \{v, v'\} \in E_k\}\big|$로 둔다. 그러면 다음이 성립한다.

$$E_{11} = \big\{\{w_v, w_{v'}\} :\ \{v, v'\} \in E,\ \mu(\{v, v'\}) \geq 2\big\}.$$

증명. 제2장의 정의에 의해 $E_{11} = \{\{w_v, w_{v'}\} :\ \kappa(v, v') \geq 2\}$이고, $\kappa(v, v') = \mu(\{v, v'\})$이다. $\kappa(v, v') \geq 2$이면 $\{v, v'\} \in E_k$인 $k$가 있으므로 $\{v, v'\} \in E$이다 ((D3)). 역으로 $\{v, v'\} \in E$이고 $\mu \geq 2$이면 $\kappa \geq 2$이다. $\square$

### 예 8.4 ($E_{11}$은 $G$로부터 정해지지 않는다)

$V = \{u, v\}$, $E = \{\{u, v\}\}$인 그래프 $G = K_2$를 생각한다. 두 평면분해를 정의한다.

- $\mathcal{D}_a = \{P_1\}$, $P_1 = (V, \{\{u, v\}\})$.
- $\mathcal{D}_b = \{P_1, P_2\}$, $P_1 = P_2 = (V, \{\{u, v\}\})$.

두 분해는 (D0)–(D3)을 만족한다. 각 조각이 $K_2$이고 $K_2$는 평면이기 때문이다. 정리 3.2 (조립은 원래 그래프이다)에 의해 $G(\mathfrak{M}(\mathcal{D}_a)) \cong G \cong G(\mathfrak{M}(\mathcal{D}_b))$이다.

그러나 $E_{11}$은 다르다. $\mathcal{D}_a$에서는 $\mu(\{u, v\}) = 1$이므로 명제 8.3에 의해 $E_{11} = \varnothing$이다. $\mathcal{D}_b$에서는 $\mu(\{u, v\}) = 2$이므로 $E_{11} = \{\{w_u, w_v\}\}$이다.

따라서 $G$가 같아도 $\mathfrak{M}$은 다르다. $E_{11}$은 $G$의 함수가 아니다.

### 명제 8.5 ($\mathfrak{M}$에서 $G$로의 사상)

$V(\mathfrak{M}) = V_0 \sqcup V_1$에서 $V$로의 함수 $\Phi$를 $\Phi(x) := \varphi(x)$ $(x \in V_0)$, $\Phi(w_v) := v$ $(w_v \in V_1)$로 정의한다. 그러면 $\Phi : \mathfrak{M} \to G$는 $\mathbf{RG}$의 사상이다. 여기서 $\mathfrak{M}$은 점집합 $V(\mathfrak{M})$과 변집합 $E(\mathfrak{M})$을 갖는 그래프로 본다.

증명. $E(\mathfrak{M}) = E_{00} \sqcup E_{01} \sqcup E_{11}$의 각 변에 대해 두 끝점의 $\Phi$-상이 같거나 $E$의 변임을 보인다.

- $\{x, y\} \in E_{00}$: 보조정리 2.2(3)에 의해 $\varphi(x) \neq \varphi(y)$이고 $\{\varphi(x), \varphi(y)\} \in E$이다.
- $\{x, w_v\} \in E_{01}$ (여기서 $x \in C(v)$): $\Phi(x) = \varphi(x) = v = \Phi(w_v)$이다.
- $\{w_v, w_{v'}\} \in E_{11}$: 명제 8.3에 의해 $\{v, v'\} \in E$이다. $\Phi(w_v) = v \neq v' = \Phi(w_{v'})$ (서로 다른 점이다)이고 $\{v, v'\} \in E$이다.

따라서 $\Phi$는 사상이다. $\square$

명제 8.5에서 $\Phi$는 $E_{01}$의 변을 한 점으로 보낸다. 즉 $\Phi$는 흰 별을 그 중심 $v$로 축약한다. 이것이 제3장의 조립과 일치함은 정의에서 바로 나온다.

## 제9장 이 책이 다루지 않는 것

아래 항목은 연구 중이거나 증명이 완결되지 않았다. 이 책에 없다. 증명이 완결되면 다음 판에 추가한다.

1. 매뉴얼 그래프의 색칠수 정리 (정리 A, 고원 정리, 최고 고원 공식).
2. 리본 조건 아래의 평면성 판정 (정리 D, E, Mix). 이 판정은 외곽면 선택과 위상 불변량을 쓴다.
3. 조건 (N) 아래에서 임의의 $|V| \geq 3$인 그래프가 실현되는지 여부.
4. 조각 평면 조건의 유무가 실현되는 그래프의 집합을 바꾸는지 여부.
5. 평면성 두 이름의 차이를 보이는 예 .
6. 세 조각 이상의 접합이 필요한 그래프의 존재 여부.
7. 실현 정리 M2와 W5 (이전 판의 주장, 재검증되지 않음).
8. 자명 분해와 $K_2$ 분해가 아닌 "비자명" 설명서의 특징화.

## 부록: 기호 목록

| 기호 | 집합 또는 의미 |
|---|---|
| $G = (V, E)$ | $V$ 유한, $E \subseteq \binom{V}{2}$ |
| $\mathcal{D} = \{P_k\}_{k \in K}$ | $K$ 유한, $P_k = (V_k, E_k)$, 조건 (D0)–(D3) |
| $V_0, E_{00}$ | 복사점 집합 $\subseteq V \times K$, 정의 2.1 |
| $\varphi$, $C(v)$ | $\varphi : V_0 \to V$, $C(v) = \varphi^{-1}(v)$ |
| $V_1$, $E_{01}$, $E_{11}$ | 흰 점 집합, 포트 변, 파생 흰–흰 변 (정의 2.3) |
| $\mathfrak{M}(\mathcal{D})$, $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$ | 매뉴얼 그래프, 접합 그래프 |
| $G(\mathfrak{M})$ | 조립, 정의 3.1 |
| $H \preceq G$ | 마이너, 정의 2.3 |
| $\chi(G)$ | 색칠수, 정의 7.1 |