

위·대장내시경 전 혈전약 복용 안내

혈액이 잘 굳지 않게 하는 약을 드시는 분께

단순 위·대장내시경 또는 조직검사만 하는 경우에는 보통 약을 끊을 필요가 없습니다. 평소대로 드십시오.

※ 단, 엘리퀴스, 프라닥사, 자렐토, 릭시아나는 보통 검사 당일 아침 약만 한 번 건너뛰니다. 담당 의사의 안내를 따르십시오.

약을 끊어야 할 수 있는 경우

위 또는 대장의 큰 용종·병변을 전기로 절제하거나 넓게 떼어내는 치료가 예정된 경우입니다.

약을 혼자 끊지 마십시오. 심장 스텐트·심근경색·뇌졸중·심방세동·인공심장판막·다리혈전 또는 폐혈전이 있으면 반드시 담당 의사와 먼저 상담해야 합니다.

드시는 약	대표 약 이름	치료가 예정된 경우의 일반적인 방법
혈소판 약	플라빅스, 브릴린타, 에피엔트	검사 5일 전부터 중단
항응고제	와파린	검사 5일 전부터 중단
새 항응고제	엘리퀴스, 프라닥사, 자렐토, 릭시아나	검사 48시간 전부터 중단

아스피린(아스피린 프로텍트, 아스트릭스)은 대부분 계속 복용합니다. 다만 의사가 따로 중단을 안내할 수 있습니다.

달력으로 보기

검사 5일 전	검사 2일 전 (48시간 전)	검사 하루 전	검사 당일
플라빅스·브릴린타·에피언트 와파린 중단	엘리퀴스·프라닥사·자렐토·릭시아나 중단	중단 상태 유지	위·대장내시경 및 용종·병변 치료

위에서 넓게 병변을 떼어내는 치료 또는 대장의 큰 용종 치료는 출혈 위험이 높습니다. 반드시 의사와 상담하고, 필요하면 상급병원 또는 심장내과·신경과 등 관련 진료과로 의뢰할 수 있습니다.

검사 후 약을 다시 시작하는 날짜는 치료 방법과 출혈 여부에 따라 의사가 정합니다. 검은 변, 많은 피가 섞인 변, 심한 어지럼·실신, 심한 배 통증이 있으면 즉시 병원에 연락하거나 응급실로 오십시오.