

사상 체질 감별

*얼굴형에서는 상(이마)형과 하악(아래턱)형이 체질을 감별하는 대체가 되는데, 만약 이 두 가지가 서로 다른 경우에는 독활지황탕 산제를 복용시켜서 시험하여야 한다. 형을 살필 때에는 반드시 통찰해야지 관찰해선 안된다. 또한 사상의학은 골상학에서 기인했다는 점을 염두에 두라.

01. 안형(얼굴)

1)태음인 : 하악이 두텁지 않은 편이다. 소의 형국

2)소음인 : 체구에 비하여 조금 긴 편이다. 즉 당나귀·염소와 같이 조금 긴 편이나 혹은 둥근 경우도 있다. 당나귀 형국

3)소양인 : 말상으로 계란형이며, 하악이 두터워 안정감이 있다. 소음인보다는 체구에 비하여 조금 덜 긴 편이다. 말의 형국. 사다리꼴 얼굴.

02. 안색

1)태음인: 홍조를 띄며 탁하게(검게) 보인다. 간열이 동하면 뺨부위에 붉은 윤기가 있는 경우도 있다.

2)소음인: 대체적으로 창백한 편이다. 혹은 얼굴전체가 술에 취한 사람같이 붉은 경우도 있다.

3)소양인: 누렇고 검은 편이다. 혹은 하얀 경우도 있다. 혹은 뺨 부위가 붉은 경우도 있다.

03. 상형(이마)★★★

1)태음인:

①이마가 돌출된 곳이 없이 평평하고, 양미간은 동전 한 개를 놔둔 것처럼 넓게 파여 있고, 전발제하 1/5지점부터 전발제까지는 이마가 뒤로 갑자기 꺾여 넘어간다.

②혹은 양미간은 함몰되면서 전발제하 1/5지점에서 돌출된 곳이 있는데, 소양인과는 달리 가운데로 물리는 느낌을 주지 않고 넓적하니 양옆으로 돌출된 느낌을 준다.

③이마가 처음부터 주저앉으면서 뒤로 넘어간다.

2)소음인:

①대체적으로 중간부위가 약간 함몰되어 있으며, 뒤로 부드럽게 넘어가는 편이다.

②좀 들어갔다 뒤로 넘어간다.

③양미간 1/3위에서 조금 들어갔다 다시 올라간다.

3)소양인:

①대체적으로 양미간이 돌출되어 있거나, 전발제하 1/2지점 조금 위쪽 중간부위가 돌출되어 있는데 가운데로 물리는 느낌을 주는 편이다.

②이마가 들어간 듯하면서 튀어 나와 있다.

③그냥 튀어 나와 있다.

④양미간 1/3위에서 들어간 듯하면서 위가 튀어나와 있다.

⑤튀어나온 것이 가운데로 물려 있다.

⑥가운데로 물리고 볼록하면서 튀어나와 있다.

⑦위가 살아 있다.

⑧앞으로 튀어 나와 있다.

04. 안형(눈)

- 1)태음인: 重而平한 우안형(소눈)이다. 혹 부리부리하게 무섭게 보이기도 한다(호상). 혹 둔하게 보인다. 혹 멍하게 보인다. 혹 둔하게 찌졌다. 우직하게 보인다.
- 2)소음인: 大而整한 조안형(닭, 꿩눈)으로 둥글고 탁한 편이다. 즉 울고 난 직후의 형상과 같이 눈물이 고여 있는 듯하여 탁한 모습을 띈다. 눈 주위가 두텁다.
- 3)소양인: 합리적이고 둥글면서 맑다. 혹은 눈이 작으면서 눈꼬리가 있는 경우도 있다. 눈이 영리하게 보이면서 맑다. 눈주위가 맑다. 혹 날카롭게 찌졌다.

05. 비형(코)★

- 1)태음인: 통통하고 얼굴 전체의 면적에서(=하악의 넓이에 비해) 차지하는 비중이 큰 편이다. 혹은 납작하면서 넓은 퍼진 코도 있다. 매부리코도 대부분 태음인이다.
 - 2)소음인:
 - ①대체적으로 코끝에 앵두를 달아 놓은 것 같다.(방울코)
 - ②혹은 콧등이 납작하니 죽어 있으면서 코끝이 살짝 볼록히 올라간 듯하다.(안동지방에 많다)
 - ③혹 예리하나 코끝이 좀 튀어나와 있으면서 끝에 앵두가 달려있는 느낌을 준다.
 - ④혹 넓으면서 코끝에 방울이 달린 듯하다.
 - 3)소양인: 코끝이 대체적으로 예리하고 얼굴 전체 면적에서 차지하는 비중이 비교적 작은 편인데, 혹은 크면서 끝이 뾰족하니 예리한 경우도 있다. 혹 들창코.
- @태음인은 비척 부분이 두텁고 높은 편이다.
소음인은 비척 부분이 좁고 비익 부분이 넓으면서 코끝에 앵두가 달린 듯하다.

06. 순형(입술)

- 1)태음인: 상하순의 모양이 거의 비슷한 편이다. 즉 가지런한 편으로 옆에서 봤을 때 튀어나온 정도가 비슷함.
- 2)소음인:
 - ①상순은 얇고 하순은 두꺼우면서 튀어나와 있다.
 - ②하순이 안 나오면서 전체모양이 닭의 항문같이 둥글하면서 위아래로 벌어짐.
 - ③입이 크면서 상하로 뒤집혀져 있는 경우도 있다.
 - ④하치가 상치를 덮고 있는 경우도 있다.(=반대교합)
 - ⑤염소의 입과 같은 모양형도 있다.(입이 크고 웃는 모습이 염소와 흡사함)
 - ⑥견구형(개입)도 있다.
- 3)소양인:
 - ①하악이 두터우면서 안정감이 있고, 상순이 위로 약간 치켜져 올라가 있는 편이다.(멧돼지 입모양)
 - ②상하순이 매우 얇은 경우도 있으나 상순은 약간 위로 치켜져 올라가 있는 편이나 소음인과 같이 뒤집혀지지는 않는다.
 - ③상하순이 서로 벌어지면서 두텁고, 특히 상순이 약간 위로 치켜져 올라 있는 편이다.

④빠드렁니는 소양인에 많다.

07. 수형(손)

1)태음인: '장대이평면상'으로 소양인에 비하여 살집이 있는 편이다. 혹은 작아도 살집이 있는 느낌을 주며, 옆면 보다 길이가 긴 편이다. 뼈가 덜 튀어나온 듯하다.

2)소음인: '단대이곡선상'으로 안정감이 있다. 촉진상 비단 같으며, 이쁘장하고 모나지 않은 손으로 피부가 반짝 반짝 빛을 반사함. 길이보다 옆넓이가 넓은 느낌을 주는 통통한 손. 짧거나 긴 경우도 있다.

3)소양인: 골격이 굵고 윤기가 없으며, 살집이 없어 뼈만 있는 것 같다. 혹은 손가락의 끝이 뾰족하게 나온 여자도 있다. 혹은 체구에 비하여 크거나 긴 경우도 많다. 균형이 맞지 않는다. 뼈가 많이 튀어나와 있는 것 같다.

08. 족형

1)태음인: 발목이 굵은 편이다.

2)소음인: 중간형

3)소양인: 발목이 가는 편이다. 발목 뼈는 경우 많다. 특히 아킬레스건 부위에 살이 없는 편이다.

09. 수족의 온도

1)태음인: 온 혹 냉한데, 겨울에는 찬 편으로 특히 위수한증은 더욱 찬 편이다.

2)소음인: 사계에 온한 편인데, 위수한증은 평소에는 차나 음성격양으로 갔을 때는 겨울에도 손이 뜨거운 편이다.(내빙외탄으로 인함)

①신수열증: 수족냉, 유한

②위수한증: 수족온, 무한

3)소양인: 봄 가을 겨울에 찬 편인데, 비수한증은 여름에도 찬편이다. 단 겨울에도 수족이 뜨거우면 장차 소갈증이 오려는 징조이다.(위수열)

@이상의 형상 외에도 언어, 동정형태, 요, 복의 형상 등을 항상 종합적으로 통찰할 것.

@사상의학 임상의 단계는 체질감별하고 한증 열증의 강약에 따라서 처방선택한 후 가감한다.

10. 수족장심한출

1)태음인: 폐기허하고 간열이 심하여 상폐하면 수족장심에 한류가 심하다. 수족냉한은 간열 폐조할 때 간수열되어 다발한다.

2)소음인:

①복냉결(위냉경)로 내갈되면 발바닥이 하얗게 말라 잘 벗겨진다.(=폐약자나 장결자). 한이 나오지 않는 경우로 떡가루같이 떨어지며, 소음인의 특징이다.

②망양증이 오면 수족장심에 한류가 심하다. 심하면 전신에 한류가 나타나며, 이때는 부자제를 사용한다.

③발바닥이나 발뒤꿈치가 저리는 것은 소음인에 잘 나타난다.

3)소양인: 손끝이 갈라지거나, 발뒤꿈치가 두꺼워지거나 갈라지는 것이 잘 나타나는 편이다.

①비수한증: 수족장심무한의 중증시 발뒤꿈치가 쉽게 갈라지고, 수족냉심, 냉두통, 무좀, 다 음수, 이방기가 나타난다.~용 독활지황탕

②위수열증: 수족장심무한의 중증시 수지단열이 이발하고, 수면시 족열로 이불을 덮기 싫어 하며, 수열, 열두통이 나타난다. ~형방사백산

*수족냉한은 신양곤열한 신수열증에 다발한다.

*발뒤꿈치의 두꺼워짐과 갈라짐

- 두꺼워짐은 모두 있음

태음인의 갈라짐: 나이들어 신허로 발생. 젊어도 유산 많은 경우 등에 혹 있음

소음인의 갈라짐: 나이들어 신허로 발생함.

소양인의 갈라짐: 젊어도 많음. 심하면 피남.

11. 대변

1)태음인: 용변시간은 오래(중간) 걸리며, 건강시 대변 상태는 ‘두경이미미활’하다.(1회/1일)

모양은 제일 가는 편이고, 발병하면 후중이 잘 나타나는 편이다.

*상폐한 경우나 대장에 냉습이 있는 경우는 용변시간이 더욱 오래 걸린다.

*한열 구분법

①소음인변(두조미조)과 같으면 간수열리열병을 내포한다.

②태양인변(활변)과 같으면 위완수한표한병을 내포한다.

*대변을 참으려면 참을 수도 있고, 타 체질과 달리 참더라도 변비는 오지 않는다.

*참고사항

①대변활: 위완수한증

②두조미활: 위완수한증에 간수열이 온 경우(속을 끓인 경우 등)

③대변조이 2-3일 1회자: 간수열증

2)소음인: 용변시간은 제일 오래 걸리는 편이고, 건강시 대변 상태는 ‘두미조이체장’하여 가 래떡 모양으로 굵고 제일 긴편이나, 소양인보다는 덜 굵은 편이다.(1회/1~7일)

*한열 구분법

①소양인 변과 같으면 신수열표열병을 내포한다.

②태양인 변과 같으면 위수한표한병을 내포한다.

3)소양인: 용변시간은 짧은 편이고, 건강시 대변상태는 두조미활하고 체대이소통하여 제일 굵고 짧은 편이며, 한 덩어리 싸고 마는 편으로 대변 머리가 굵어 변기에 걸리는 경우도 있 다.(1회/1일)

*비장의 냉이 아래로 처지거나, 심허하면 용변시간이 길어진다.

*한열 구분법

①소음인변과 같으면 위수열표열병을 내포한다.

②태양인변과 같으면 비수한표한병을 내포한다.

*대변을 참으려면 못 견뎌서 싸든지 변비가 오는 편이다.

4)태양인: 두미활. 확 풀어지는 대변. 소풍.

*대변은 모든 성정의 문제나 음식물의 소화 등에 관한 인체의 상태에 대한 반영이다. 즉 “내부생리상태의 외적 표현”이다. 임상상 특히 소아의 경우 중요한 의미를 가진다.

[체질별 대변의 모양 및 길이와 굵기의 비교]

모 양 길 이 굵 기

태음인: 두경미미활 / 중간 정도 / 제일 가늘다

소음인: 두미조 / 제일 길다 / 중간 정도

소양인: 두조미활 / 제일 짧다 / 제일 굵다

*대변 모양에 따른 병증의 구분법(체질불문, 공통사항)

①두조미활 : 병이 낫는 대변이다.

②두활미조 : 변비 올 징후, 병이 낫지 않는 대변이다. 다른 병 발생 우려, 악화되는 것.

12. 대변불통시

1)태음인:

①간수열증은 항강증이 잘 오고 구고구갈하나, 소음온수하는 편이다.

②위완수한증은 구고 구갈 항강이 없는 편이고 불음수한다.

2)소음인: 대체적으로 큰 불편을 느끼지 못하는 편이다.

3)소양인: 위수열증은 인건하여 다음수하고, 두통이 잘 나타나는 편이다.

*대변의 상태(기본은 비,조,활,설임)

변비: 하루 서너번 보더라도 토끼똥 염소똥 같은 대변

조변: 경변보다 물기가 있는 대변, 굵고 단단하게 보는 대변

활변: 확 풀어지는 대변, 일반적으로 설사라고 함, 물게 보는 것.

설사: 물처럼 확 쏟아지는 대변

난변: 활변을 보면서 시원치 않은 대변, 봤는데도 뒤가 개름칙한 대변

경변: 딱딱하게 굳어 물기가 없는 대변

당변: 기름지고 차진 대변. 당뇨병 환자의 대변

13. 설사시(특히 소아 체질감별에 중요)

1)태음인: 양치질만 할 정도로 불음수하며, 활동시에는 약간 기쇠하고 구갈이 약간 나타난다.

①위완수한증은 구고 구갈 항강이 나타나는 편인데, 활변이 오래되어도 구고증이 나타날 수 있다.

②간수열증은 설사시 일반적으로 구고 구갈 항강이 없는 편이다.

2)소음인: 물을 전혀 못 마시므로 탈진되며, 구조증이 나타나고, 활동시에는 기쇠가 심하고, 심한 경우에는 수액을 공급해야 할 정도이다.

①위수한증인 경우에는 평소에도 변이 묽을 수 있으며, 설사해도 기운이 덜 떨어진다.

②신수열증 환자가 제일 기운이 떨어진다.

3)소양인: 소음수 하거나 다음수하여 탈진되는 경우는 드문 편이다.

①비수한증은 위수열에 비해 활동시에 약간 기운이 떨어지는 편이다(소음수)

②위수열증은 활동은 여전한데 내갈이 심하게 나타난다(다음수)

14. 소변

1)태음인: 3-5회/일. 단, 당뇨 등 조열병 환자나 심허자는 소변이 삭해진다.

*1-2회/일 이나 6회/일 이상은 비정상이다.

2)소음인: 2-4회/일(신대하므로). 소변양은 대체적으로 많은 편이다.

단 냉이 율축방광되면 소변이 빈삭해진다.

*5회이상/일은 비정상이다.

3)소양인: 4-6회/일(신소하므로)

*1-2회/일 이나 7회이상/일은 비정상이다.

①비수한증으로서 산후조리불량하거나 유산경험이 많은 자는 자궁이 약해져서 비수한증일지라도 소변삭이불금, 해수시 소변실금 등이 오는데, 오줌소태까지는 잘 안오는 편이다.

②위수열증은 방광이 말라 무력해지면 소변이 삭해지면서 오줌소태까지도 잘 오는 편이다.

15. 경도

1)태음인: 출혈기간은 4-7일간 정도이고, 경량은 제일 많은 편인데, 간수열증이 특히 더욱 많은 편이다.

*50이 되어도 4-6일 정도 하며, 폐경이 되고 나면 정충증이 잘 발생한다.

2)소음인: 출혈기간은 3-5일간 정도이고, 경량은 보통인 편이다.

3)소양인: 출혈기간은 2-3일간 정도이고, 경량은 제일 적은 편이다.

16. 생리시

1)태음인: 대체적으로 복통(양다)이 나타나며, 혹은 요복통(양소, 유괴)이 나타난다.

2)소음인: 대체적으로 무통이거나 복통이 나타나는 편이다.

*냉이 극심해지면 요복통도 나타날 수 있다.

3)소양인: 대체적으로 요통이 나타나는 편이다.

*발병하면 요복통이 심하여 진통제를 복용해야만 할 정도이다.

17. 초경시(경산시는 다름)

1)태음인: 대체적으로 복통인데, 혹은 요복통이 나타나기도 한다.

2)소음인: 대체적으로 무통이거나 복통이 나타나는 편이다.

*위냉이 심하면 요복통도 나타날 수 있다.

3)소양인: 대체적으로 미골이 뒤틀리며 빠지는 듯한 통증이 오는 편이다.

*출산시에 탈음 탈항되는 경우가 많은 편이다.

18. 피부

1)태음인: 근육은 건실하고 표피는 두꺼운 편이다. 또한 윤기가 없으므로 거칠게 보이고 만져봐도 거칠다. 주리가 굵다.

2)소음인: 근육은 부연하고 표피는 얇은 편이다. 또한 윤기가 있으므로 부드럽게 보이고 만져봐도 비단결 같이 부드럽다. 주리가 치밀하다.

3)소양인: 근육은 후연하고 표피는 얇은 편이다. 또한 윤기가 없어 거칠게 보이거나 만져보면 부드럽게 느껴진다.

*손끝의 피부가 벗겨지거나 갈라지는 것이 제일 많이 나타나고 주부습진은 유산경력이 많은 여자에 다발하는 편이다.

19. 음수관계

1)태음인: 평소에 잘 안 즐기는 편으로 3체질 중 가장 적게 마시는 편이나(단 음주자나 상폐자는 다음냉수한다) 만약 회음수하면 간열이 동하여 내열이 발생한 것이니 간병과 조열병이 발생하고, 심하면 몽설병과 폐병이 발생한다(열로 인한)

*학질 오한 중에는 다음냉수하고, 발열중에는 한출하여 수액이 빠지는데도 불음수한다.

①위완수한증: 평소에 음냉수하며, 발병하면 다음냉수한다.

②간수열증: 평소에 소음수하나, 발병하면 회온수한다.

2)소음인: 상열감이 많으므로 평소에 다음수하는 편인데, 만약 불음수하면 위가 냉해져서 대장이 마르므로 대변이 활 혹은 비하니 부종 즉 신기능장애가 온다.

*학질 오한 중이나 설사시나 구토후에 불음수한다. 능음수는 일길증야니라.

①신수열증: 평소에 다음냉수하나 발병하면 소음수한다.

②위수한증: 평소에 소음수하나 발병하면 불음수한다.

3)소양인: 평소에 즐기는 편으로 3체질 중 가장 잘 마시며, 위열이 발생하면 자다가 깨서도 찾을 정도인데, 만약 불음냉수이회온수하면 위부가 고갈되어 위궤양이나 소갈증이 발생한다.

*발열 중에는 능음냉수하나 오한 중에는 불음수한다.

*위열이 심하면 회온수 혹은 불음냉수하는데 소갈병 환자는 음냉수한다.

①비수한증: 평소에 소음수하나 발병하면 다음냉수한다.

②위수열증: 평소에 다음냉수하나 발병하면 회온수한다.

20. 삼복에 불능 음냉수

1)태음인: 간수열증에 신이 허해 조열병이 온 경우에 나타날 수도 있으나 거의 없는 편이다.

2)소음인: 위극냉한 경우에 나타난다.(냉수를 보면 흐느끼 정도이다. 대변 활하다)

3)소양인: 이극열의 경우에 나타난다.

21. 구갈의 양상

1)태음인: 입천장(인후-코 사이)에서 인후부로 말라들어간다.

2)소음인: 입술과 설전부에서 인후부로 말라 들어간다.(내병외탄)

고로 순창증이 잘 발생하고 심하면 입술이 뒤집어지며, 겨울철 입술이 잘 벗겨진다.

3)소양인: 인후부에서 입술 쪽으로 말라나온다.(위열때문)

*음식을 짜게 먹거나 했을 때의 구갈의 양상은 다를 수 있다. 여기서는 식간의 양상을 말한다.

경	중등	중
위수열증 / 소증		/ 소갈병, 당뇨병
다음냉수 / 회온수		/ 회음수
위열	/ 위극열(열이 땀함)	/ 위가 말라 진액고갈된 상태
	양격산화탕	

[구취]

- 1)태음인: 경증으로 구취는 약하고, 구고가 심하다.(폐허나 간열로 인하며, 신허해저도 나타남)
- 2)소음인: 태중증으로 구취가 심하고, 구갈은 약하다(위냉으로 인함)
- 3)소양인: 태중증으로 구취과 구갈이 심하고, 구고는 약하다. 설태황(위열로 인함)

22. 한액(땀)

- 1)태음인: 평소에 다한하는 편이나, 소한 혹 무한하는 경우도 있다.
*다한 즉 완실이무병이니라.
- 2)소음인: 평소에 신수열증은 유한하고, 위수한증은 무한하는 편이다.
*위냉이 심하여 상폐하면 다한하는데, 전신과 수족장심에 모두 한출한다.
*망양증
 - a.신수열증: 보중익기탕, 승양익기탕 < 승양익기부자탕
 - b.위수한증: 관계부자이중탕 관계 대 계지
- 3)소양인: 평소에 소한하는 편이다.
*음허하면 비국의 음기와 신국의 음기가 일승일강작용을 못하여 다한하는데 이 때에는 전신에는 한출하나 수족장심에는 무한한다.

23. 병유지한

- 1)태음인: 한출이 이후 고골(유양돌기) 면부발제부터 시작하여 대통어흉역간한다.
- 2)소음인: 인중에 선한하고 관부->경부->흉부에 한출한다.
- 3)소양인: 수족장심에 발한한다.

24. 수족장심냉한

- 1)태음인: 간수열증에 다발하는 편
- 2)소음인: 신수열증에 다발하는 편
- 3)소양인: 별로 없음

25. 수족장심무한

- 1)태음인: 위완수한으로 인한 상폐자이며, 병이 가벼워지면 조금 나는 듯하다가 없어짐.
- 2)소음인: 폐약자나 장궤자는 수족무한하여 손바닥과 발바닥이 허영게 잘 벗겨진다.
- 3)소양인: 위수열증이나 비수한증으로서 수족무한자의 중증은 손끝이나 발 뒤꿈치가 잘 갈라진다.
*증상: 수족냉심, 무좀, 다습수 - 독활지황탕 투여

26. 수족다한

- 1)태음인: 간열이 심하여 상폐하면 발생(열다한소탕, 갈근해기탕)
- 2)소음인: 위냉이 심하여 상폐하면 발생(보중익기탕, 승양익기탕)
- 3)소양인: 위열이 심하여 상폐하면 발생(양격산화탕)

27. 맥진(건강시 기본맥)

- 1)태음인: 장이긴. 처음부터 끝까지 눌러도 힘이 있다.
- 2)소음인: 완이약. 완백이 있다가 힘주면 없어짐.
- 3)소양인: 미세불현(미맥;무력한 맥, 세맥;실같이 가는 맥)

28. 흉모사기

- 1)태음인: 거처에 예의가 있고, 修整正大하다.
 - 2)소음인: 簡易小巧하여 태도에 자연성이 풍부하고 아담한 편이다.
 - 3)소양인: 有剽銳氣하다. 즉 형상이 용감하고 성질이 경급하다.
- *주걱턱인 경우에는 매우 게으른 편이다.

29.형국의 상

- 1)태음인: 우지성(소)
- 2)소음인: 려지성(나귀)
- 3)소양인: 마지성(말)

30. 체형기상

- 1)태음인: 요위지입세는 성장하나 뇌추지기세는 고약하다. 즉 원기둥 모양이다.
 - 2)소음인: 방광지좌세는 성장하나 흉금지포세는 고약하다. 즉 상허하실한 체형으로서 엉덩이가 좀 큰 편이다. 사다리 모양이다.
 - 3)소양인: 흉금지포세는 성장하나 방광지좌세는 고약하다. 즉 상성하허하고 흉실축경하여 표예호용한 형상을 띄며, 사람 수가 역시 많아 사상인 중에 가장 구분하기가 쉽다. 역사다리 모양이다. 즉 어깨부위가 발달하고 엉덩이가 조금 작은 편이다.
- *상폐한 여자의 경우는 어깨부위가 좁은 경우도 있다.

31. 성질

- 1)태음인: 성취욕이 강하다.
- 2)소음인: 端重하는데 장점이 있고 표리부동한 경우가 많은 편이다.
- 3)소양인: 剛武에 장점이 있다.

32. 재간

- 1)태음인: 거처에 능하다.
- 2)소음인: 당여에 능하다.
- 3)소양인: 사무에 능하다.

33. 성정

- 1)태음인: 恒有怯心하니, 怯心이 寧靜則居之安資之深而造於道也오, 怯心이 益多則放心桎梏而物化之也라.
만약 怯心이 至於放心하면 정충증이 발생하는데, 정충증은 태음인병중에 중증이다.

항상 급박한 마음을 갖고 있는데, 이를 잘 조절하면 간혈이 화평할 수 있다.

*심계항진 정충 등 있는 심허한 자는 충격을 받을 때 옥대변하여 활변을 보는 편이다.

2)소음인: 항유불안정지심하니, 이를 잘 조절하면 비기가 활할 수 있다.

*불안정지심 - 위수한증의 중증으로서 비기가 절한 것이다.

용 백하오관중탕 가감

3)소양인: 恒有懼心하니, 懼心이 寧靜則居之安資之深而造於道也오,

懼心이 익다 즉 방심질곡이물화지야라.

만약 懼心이 至於 恐心하면 건망증이나 흥복통이 발생하는데, 건망증이나 흥복통은 소양인 병중에 함증이다.

*노심->애심->비관->구심->건망증, 흥복통

34. 칠정

1)태음인: 항상 옥화를 갖고 있는데, 이를 잘 조절하면 간혈이 화평할 수 있다.

또한 회심 낙심을 항상 경계해야 한다.

2)소음인: 적극적으로 일을 추진하여 항상 불안정한 마음을 갖지 않도록 하며, 회심 낙심을 항상 경계하여야 한다.

3)소양인: 안을 살펴서 항상 구심을 갖지 않도록 하며, 애심 노심을 항상 경계하여야 한다.

35. 건강한 상태(완실무병)

1)태음인: 한액이 통창하면 완실이무병

2)소음인: 음식이 선화하면 완실이무병

3)소양인: 대변이 선통하면 완실이무병

36. 발병주류

1)태음인: 폐당의 위완, 설, 이, 두뇌, 피모 등의 약화로 인하여 발병.

또한 외감뇌추하고 내측위완병한다.

2)소음인: 비당의 위, 유, 목, 배, 근 등의 약화로 인하여 발병.

또한 외감배부하고 내측위장한다.

3)소양인: 신당의 대장, 전음, 구, 방광, 골 등의 약화로 인하여 발병한다.

또한 외감방광하고 내측대장병한다.

37. 병리관계

1)태음인: 위완한사에 대한 저항력이 약한 자로서, 만약에 한사가 침범시에 완제하지 않으면 장구한 기간을 잠복하다가 스트레스나 음식 등으로 저항력이 약한 때가 되면 발병하려 하는데, 이는 장부의 선천적인 성작용 때문이다.

2)소음인: 위계에 가해진 한독과 신계에 가해진 열독과 비계에 가해진 한독 등 악성작용의 진도에 따라 신동맥혈과 비동맥혈의 輸廻작용이 불안정하게 되어 신계의 양성작용과 비계의 양성작용과의 일승일강이 쇠퇴하게 되므로 발병한다. 이는 위수한독으로 인하여 신계와 비계와의 양성교류작용이 중단되기 때문이다. 고로 신에서 열을 내어 온위냉하면 무병할 수 있다.

3)소양인:

①내상: 비장계의 음기와 신장계의 음기는 위부계의 강대한 열사로 인하여 일승일강이 불능함으로써 그 기능이 패하니 만병이 발생한다.

②외감: 풍 한 량 조 등의 영향으로 인하여 만병이 발생한다.

고로 비국의 음기와 신국의 음기의 일승일강작용이 위국의 양기를 조절할 수 있으면 무병할 수 있다.

38. 치료의 난이도

1)태음인: ①폐병류-속치 ②신병류-난치,구사일생 ③위병류-구치

2)소음인: ①폐병류-난치 ②신병류-구치 ③위병류-속치

3)소양인: ①폐병류-구치 ②신병류-속치 ③위병류-구치

39. 치병위주

1)태음인: 한액을 소통시키는 것을 위주로 한다.

①위완수한증: 한액을 소통시키는 것을 위주로 한다.

②간수열증: 먼저 대변을 소통시키면 한액이 소통된다.

2)소음인: 소변을 통리시키는 것을 위주로 하는데, 소화를 우선적으로 생각하여야 한다.

3)소양인: 대소변을 통리시키는 것을 위주로 하는데, 통대변이 더욱 중요하다.

40. 감기시에 해열제를 복용한 경우

1)태음인: 발한시켜야 하는데 해열제를 복용하니 괜찮은 편이다.

2)소음인: 순기시켜야 하는데 해열제를 복용하니 좋지 않은 편이다.

3)소양인: 청열시켜야 하는데 해열제를 복용하니 좋지 않은 편이다.

41. 체질에 따른 해수의 계절별 발병비율

1)소음인: 동계에 출산하고 하계에 발병하는 경우가 많다.

2)소양인: 하계에 출산하고 동계에 발병하는 경우가 많다.

42. 두통의 양상

①좌편두통: 신경성이나 스트레스에 의한 간혈울체에 의한 것이다.

②우편두통: 폐기허에 의한 두통이다.

1)태음인:

①위완수한증: 전두부가 잘 아픈 편

②간수열증: 후두부(뒷목,어깨,뒷골)가 잘 아픈 편

2)소음인:

①신수열증: 후두부가 잘 아픈 편

②위수한증: 전두부가 잘 아픈 편

*냉승시 두통야(내빙외탄)

3)소양인: 냉두통으로서 양전두부에서 정문혈부위로 잘 나타나는 편이다.

①남자: 모발을 건드리기만 하여도 싫다고 한다.

②여자: 머릿속이 흔들린다고 한다.

43. 구토시

1)태음인: 원래 습이 많으므로 위완부의 냉습을 토하니 속이 편해지고, 구토 후에 물은 양치 할 정도로 마신다(위완부의 냉결)

*일토는 길증야니라.

2)소음인: 원래 기혈이 부족한데 위부의 냉습을 토하고 나서 불음수하니, 기진되어 중증으로 된다.(위냉결)

3)소양인: 위부의 열습을 토하니 편한 듯하나 더욱 열성하게 되니 인후가 건조하고 가슴이 타는 듯한 느낌이 오면서 더욱 괴로워지고 다음수한다.(열성)

44. 구고증

1)태음인: 간수열증에 빈발하는 편

2)소음인: 위수한증에 다발하는 편(평소에 활변을 보다가 변비가 되며 나타남)

3)소양인: 위수열증에 다발하는 편

45. 천식

1)태음인: 폐성 천식으로서 다발하는 편이다.

2)소음인: 심장성 천식으로서 소발하는 편이다. 난치증이다. 불용 인삼 대 백하수오

3)소양인: 기관지성 천식으로서 다발하는 편이다.(신허하여 위열이 성하므로 발생)

46. 태식

1)태음인: 평소에 잘 안하는 편이나 심허해지면 나타난다.

2)소음인: 원래 기허하므로 평소에 잘 하는 편이다.

3)소양인: 평소에 잘 안하는 편이나, 기관지에 장애가 와 그로 인해 폐기능이 약해지면 나타난다.

47. 당뇨병에 걸린 경우

1)태음인: 일음이수하니, 초기부터 체중감소가 심하게(5~10kg) 나타나는 편이다.

2)소음인: 체중감소가 초기에는 심하지 않은 편이나, 中증이 되고 나면 체중감소가 나타난다.

3)소양인: 체중감소가 초기에는 심하지 않은 편이나, 中증이 되기 직전에는 나타난다.

48. 항문부위

1)태음인: 생선회 돼지고기 닭고기 등 자주 먹을 때 하초가 습해지며, 성생활 문란에서도 발생한다.

2)소음인: 특징적으로 항문이 짓무르는 것(습진과 비슷)이 잘 발생하는 편이고, 치질 항문개구증으로 발전하여, 항문개구증도 잘 나타나는 편이다. 용 적백하오관중탕

3)소양인: 보신탕 삼계탕 등 자주 먹거나 색에 빠질 때 잘 발생하는데, 여자가 자궁수술 후 바로 성생활하면 자궁 항문부위에 찬 바람이 나기도 한다.

49. 종아리의 정맥류

- 1)태음인: 다발하는 편이고, 자궁적출하거나 산후조리가 불량한 여자에 잘 발생하고, 다음주하여 냉이 아래로 처진 남자에게도 발생한다. 여자의 경우에는 탈음증까지도 수반하는 경우가 많다.
- 2)소음인: 정맥류는 드물고, 팔다리에 멍이 잘 드는 경우가 많다.
- 3)소양인: 드물다.

50. 족혈로 이불을 못 덮는 경우

- 1)태음인: 간수열증에 다발하는 편이다(상폐로 인함). 용 보폐탕, 열다한소탕
- 2)소음인: 폐결핵 환자의 경우에 발생한다.
- 3)소양인: 위수열증에 다발하는 편이다.(상폐, 기관지로 인함)

51. 족저

- 1)태음인: 간수열증의 경우에는 발 뒤꿈치가 갈라지는데, 수면시에 족혈로 이불속에 발을 넣지 못한다.
- 2)소음인: 복냉결로 내갈되면 용천혈에서 연곡혈까지의 부위가 허영게 말라서 벗겨지는 편인데, 뒤꿈치가 갈라지거나 아프다고 한다.
- 3)소양인: 신허나 산후조리불량 또는 위열이 심한 경우에는 발바닥이 마르고, 더욱 심해지면 갈라지는데 비수한증에 이발하는 편으로서 발이 차서 꼭 이불을 덮고 자는 편이다.

52. 기타사항

- 1)태음인: 고집이 센 편이고, 골격이 장대하며, 발목이 굵고, 허리를 펴고 곧바로 걷는 편이다.
- 2)소음인: 목소리가 굵은 편이고, 허리를 굽히고 걷는 편이며, 어혈이 잘 생기는 편임, 또한 평소에 찐 것을 좋아하는 편인데, 만약 감미를 좋아하게 되면 안좋은 징조이다.
- 3)소양인: 목소리가 가는 편이고, 발목이 가는 편이며, 허리를 펴고 좌우로 흔들면서 걷는 편이고, 남의 일에 참견하기를 좋아하는 편이다.

53. 좋은 식품

- 1)태음인: 온성식품

멥쌀, 수수, 율무, 콩, 감자, 마, 무, 옥수수

밤, 도라지, 연근, 은행, 보리, 쇠고기, 양(소뺨통), 사슴, 우유, 호박, 칩, 칩순, 수박, 배
살구, 녹용, 오징어, 명태, 호도, 잣, 설탕, 멸치

*상추를 먹으면 졸리다고 한다.

- 2)소음인: 열성식품

참쌀, 차조, 찰수수, 찰옥수수, 대추, 찰빔쌀, 닭고기, 개고기, 염소, 흑염소, 노루, 꿩, 뱀, 자라, 소금, 마늘, 후추, 고추, 토란, 생강, 고구마, 꿀, 꿀, 오렌지, 복숭아, 인삼, 땅콩, 파, 계란, 홍합, 잉어, 들기름, 홍당무

*밀가루를 많이 먹으면 담석증에 걸리기 쉽다.

3)소양인: 한성식품

메조, 팔, 녹두, 돼지고기, 참기름, 상추, 새우젓, 굴, 가지, 오이, 시금치, 더덕, 숙주나물, 조개류(단 대합조개는 제외), 아몬드, 딸기, 산딸기, 참외, 토마토, 파인애플, 바나나, 키위, 꿀뱅이, 홍차, 동규자차, 유자차, 결명자차, 배추, 한치, 광어, 붕어, 가물치

4)태양인: 량성식품

사과, 머루, 다래, 포도, 앵두, 감, 대합조개, 송화, 메밀, 밀가루, 영지버섯

54. 커피 마신 후

1)태음인: 위완수한증은 잠을 잘 자는 편이고, 간수열증은 좋지 않다.

2)소음인: 구조증과 흉조증이 나타나서 잠을 못자고, 속이 쓰리다. 흘는다고 한다.

3)소양인: 심계, 정충증이 나타나서 잠을 못자고 속이 쓰릴 수도 있다.

55. 청심연자탕 복용 후

1)태음인: ①위완수한증: 소화불량, 대변활 등이 나타날 수 있다.

②간수열증: 가슴이 시원하다.

2)소음인: 현훈과 소화불량이 나타나고 무기력해진다.

3)소양인: 두통과 흉조증이 나타나고 심하면 정충증이 온다.

56. 조리폐원탕 복용 후

1)태음인: ①위완수한증: 편하다.

②간수열증: 심번증과 불면증이 나타난다.

2)소음인: 구역증이 나타나고, 대변을 자주 보게 되고, 혹 가슴이 답답할 수도 있다. 무기력해질 수도 있다.

3)소양인: 현훈, 양기무력, 설사, 살빠짐 등이 나타나고, 심하면 소변색이불금, 홍변, 두통, 불면 등도 나타날 수 있다.

57. 마황발표탕 복용 후

1)태음인: ①위완수한증: 편하다.

②간수열증: 홍변 불면이 나타난다.

2)소음인: 탈진이 되어 무기력이 심하게 나타난다.

3)소양인: 홍변조 소변색 두통이 나타난다.

58. 관중탕 복용 후

1)태음인: 취하면서 두통이 나타나고, 심하면 어지러운 듯하여 드러누울 수도 있다.

2)소음인: 피하다.

3)소양인: 복통과 속쓰림이 나타나고, 심하면 졸도할 수도 있다.

59. 독활지황탕 복용 후

1)태음인: 술에 취하는 듯이 머리가 횡하고(어찢함, 어지러움), 사지가 나른하고, 구역증도 올 수 있고 정충증(가슴떨림, 흥분됨)과 속쓰림이 나타날 수 있고, 심하면 드러눕는다.

2)소음인: 두통 복통 속쓰림이 오며서 포만감이 나타나고, 혹은 안면하악부에 열이 나면서 인건증도 올 수 있고, 냉연도 발생할 수 있다. 하품을 여러차례 할 수도 있다.

3)소양인:

①비수한증: 편하다

②위수열증: 비만증과 인건증이 올 수 있다. 양격산화탕증일 경우에는 속쓰림도 올 수 있다.

60. 형방사백산 복용 후

1)태음인: 현훈증이 나타난다.

2)소음인: 복통이 나타난다.

3)소양인:

①비수한증: 속이 거북하면서 가슴이 허전하고 복통 설사도 나타날 수 있다.

②위수열증: 편하다.

61. 개고기 먹으면

1)태음인:

2)소음인: 편하다.

3)소양인: 비대해진다.