

사상임상의학회

증후별 정리

♣ 症候別 整理 目次 ♣

■ 변증과 관련된 사항들	1
변증은 증상만으로 하는 것이 아니다. 변증의 중요한 원칙. 정황을 통해 접근하는 변증- 신허, 간, 심간혈증, 간음허증, 간양상항증.....	1
얼굴과 몸의 체형이 다를 경우 어떻게 해석해야 합니까?	1
상황보음 vs 정심보음(맥으로 구분이 안 되는 양형과 음형의 구분은 커피반응으로 대신한다) 2 동의수세보원 소음인편 간략 정리	2
한열구분 문진 tip(각 체질에서의 한열, 음형 양형의 판단요령)	3
心병증 肝병증 膽병증의 차이(간병에는 불면이 없다. 심병은 소변과 땀에서 이상이 생긴다. 심담은 공통적으로 불면이 있다. 간은 눈(현훈 안화 야맹), 근(쥐내림, 근육경련, 안면경련), 손톱(갈라짐, 푸석푸석) 에 문제가 있다.	4
소증에 근거한 한열도 체질이다.(안선생님의 한열개념과 류선생님의 한열개념의 미묘한 차이)5 남자 안면홍조를 간양상항으로 볼 수도 있겠다.	7
체질판단에 있어서 약 반응이 외모, 체격에 근거한 판단보다 우선한다.	7
비염과 생리통이 공존할 때 치병순서(병의 근본을 치료하는 것이 원칙이나 표증이 급하면 표병을 먼저 치료한다)	7
간병을 판단하는 기준들(눈 침침, 손톱푸석, 쥐내림, 빈혈은 간병증)	8
여타증상이 열증이라도 배변을 하루에 한 번 이상 하면 소증은 한증. 단 현증이 열증상이 심하면 마황이 들어간 처방은 쓰지 않는다.	8
노인분들 변증할 때 주의점(40세가 넘으면 신허가 시작되므로 노인은 기본적으로 신허를 깔고 있고 한열판단에는 왕도가 없다)	9
소음인과 태양인 감별하는 팁(체형상 다리비율/코끝방울의 모양/눈빛)	9
약을 먹고 피부가 건조해지는 것으로 처방의 적합성여부를 판단할 수 없다. 계절적원인. ...	10

양형, 음형 구별법(촌맥과 척맥의 강도로 구별. 척맥은 음허경향을 의미)	11
寒者는 간기울결, 熱者는 간양상향.	11
비병은 소화장애 더부룩함 위병은 통증. 소증이 열증이라도 생냉지물에 상해 寒이 문제가 되면 먼저 그것을 해결하고 다음에 소증을 다룬다.	11
식적은 대체로 한증으로 오지만 열이 발생되므로 열증약을 가미한다. 열증이 위장의 불편을 12	
심비기허증과 心脾兩虛證의 차이(심비기허는 심기허와 비기허 공존, 심비양허는 비기허와 혈허의 공존)	12
태음인 소증 한열과 현증에 대한 질문(소증이 한증경향이면서 현증으로 열증이 있어보이면 13	
간화상염은 급성적인 상황(火熱, 實證), 간양상향은 만성화된 것(陰虛에 淸熱이 가미).	14
양형처방과 음형처방을 쓰는 기준과 의미에 대하여(음형처방이 음허가 강하므로 나이가 있거나 슬관절 허리쪽에 문제가 있으면 음형처방을 쓸 가능성이 높다)	15
소양인 한열구분에서 상복부 가스차면서도 변비 있으면 한증? 열증?-->변비유무는 한열판단의 기준이 되지못함, 상복부 가스여부가 유일한 기준. 한증의 변비는 인동 연교를 가하거나 간기울결의 경우 결명자를 가해서 해결한다.	15
肝病과 心病의 구분(분노, 어지러움, 전근, 손톱의 증상은 간병증/ 우울, 심계, 정충, 다몽, 불면, 불안 증상은 심병증)	16
커피에 인이 백이면 한자도 커피에 불면 없어질 수 있다. 열증도 장이 나빠지면 하루에 여러번 배변 가능 따라서 변비기왕력을 묻는 것이 중요. 열자가 설사할 때는 대항량을 1/2 혹은 1g정도로까지 줄인다.	17
태음인한자도 커피만 드시면 설사를 할 수 있다.	18
■ 본초관련 제반내용들	18
부자 강활 지골피 당근 대황 형개에 대하여	18
附子(한열불문하고 수분손실로 인한 소변적소에 사용)	18
강활 지골피 - 소양인의 하지불안증후군(지골피는 보간신하고 강활은 거습지통 강근골)	18
당근(태음인 위장질환에 유효)	19
산수유(소양인에게 위산증가)	19
대황(★5개. 식적 담음 어혈을 제거하고 이담한다)	19
형개 (보혈하고 초하면 지혈. 소양인 빈혈에 가장 중요)	19
지각 유근피 백질려 대계	19
지각(소음인에게 항히스타민작용. 비염, 가려움증, 가래에 유효)	19

유근피(태음인. 점막에 작용해서 누린 콧물, 속쓰림, 냉대하에 좋음)	19
백질려(남가새. tribulus) 부교감신경활성화해서 뇌와 피부로 몰린 혈액을 골반과 복강으로 몰고간다. 남성의 발기부전, 여성의 생리통, 피부가려움에 굿	19
대계 (영경귀. milk thistle. 이담작용, 간보호작용으로 酒傷에 좋다)	20
양파(양총피); 태양인. 거담 이수 해독. 고지혈증, 고혈압에 특효.	20
이제마 선생님의 형방지황탕에 있는 '숙지황'이 류주열 선생님의 형방지황탕에서 '홍모오가피'로 대체된 이유- 거습기능을 강화시키기 위함.	20
항암 종양 약물의 사상체질적 분류(건칠, 대항, 귀전우 백렴, 백질려, 별갑 대계 와송)	21
건칠(태음인. 신생혈관억제. 大熱. 한자의 자궁근종을 거의 해결. 열자는 대항)	21
대항 / 귀전우 / 백렴 / 백질려(태음인, 대항은 뱃속의 식적 담음 어혈해결.	22
별갑 /대계(소양인. 구판은 보음, 별갑은 간으로 주로 작용해서 간양이 올라	23
와송(태양인. 염증을 없애고 혈뇨에 탁월. 일체의 혈증에 듣고 청열 生肌한다)	23
소음인 약 중에는 항암에 뛰어난 약이 별로 없는 것 같습니다. 인삼.....?	23
신이화(magnolia). 소음인, 비만세포의 히스타민분비를 억제. 기관지점막 코점막에 같이 작용해서 기침, 콧물, 가래 등을 해결한다. 소양인의 우방자, 태음인의 상백피도 동일함.	23
황기(혈관재생에 탁효. 이뇨작용과 혈관확장으로 혈압강하효과. 생기작용이 혈관생성을 포함하는 듯)	24
포공영(이담작용, 이뇨작용이 동시에 있다. 페비신 상중하초에 모두 쓰이는데 해독능력이 매우 탁월. 각종 염증에 좋음. 清熱解毒, 利濕通淋, 癰腫瘡瘍(乳癰; 腸癰; 喉痹; 目赤腫痛) 濕熱黃疸, 熱淋	24
백질려(두통 고혈압 안질 등에 좋음. 복강내 어혈약. 성교통, 질건조증, 성욕저하, 골반통, 피부질환, 발기부전 등에도 좋음. 혈액을 복강으로 끌어내려 두면, 피부에서의 충혈을 경감) ..	25
백선평(청열조습, 피부가 짓무는 상황에서 습을 제거하기 위해 삼백초등과 같이 쓴다. 자궁평활근에 강력한 수축작용-> 산모의 자궁수축과 부종해결, 기관지의 물을 빼서 가래많은 기침에도 듣는다)	27
태음인약 호장근의 약성(어혈과 거습을 동시에 할 때 적합. 현저한 이뇨작용, 소변불리, 소변삽통, 피가 섞인 가래, 생리통 냉대하)	28
진교가 이담작용이 있고 풍한습비질환에 많이 쓰입니다(관절질환치료). 그리고 술로 인한 황달을 치료한다고 동의보감에 나옵니다(주황,황달을 해독) 그리고 대소변을 잘 통해줍니다.	29

이담작용 약물 다시 한번 강조 (강조하셨기 때문에 다시 한 번 올립니다)	29
소음인의 인삼과 태양인의 당삼의 약성은 거의 동일하다.	31
육식으로 보하는 경우=>한자는 보양해서 좋지만 열자는 주의해야한다.	31
석고의 약성(瀉胃熱 口渴 외에 발열을 발한으로 해기함으로써 치료한다)	33
차전자의 약성(활석과 같이 止瀉, 화담지해 작용으로 담을 삭히고 기침을	33
차전자와 관련된 또다른 내용(차전자, 고삼, 연교).	33
길경과 지각(길경은 태음인 비염이나 축농증 중이염치료에 가장 핵심. 지각은 두드러기에 좋 고 귀나 코에서 배농작용을 한다)	34
황기의 약성(계지와 함께 위기를 조절하고 이뇨함으로써 외사가 소변으로 나가게 한다. 배농, 생기하여 비염, 중이염치료의 핵심. 이런 이유로 비염치료 위해 향사양위탕에 가감)	34
지각과 오약의 약성비교(지각은 하기하는데, 피부의 흥분을 가라앉혀 두드러기를 치료한다) 35	
향부자와 목단피(모두 간에 작용. 갱년기장애로 간기울체 있으면 소음인은 향부자로 리기해울, 소양인은 목단피로 파혈 활혈 해울. 목단피는 소양인의 식체로 인한 울혈을 푼다. 독활지향탕)	36
생강 대추(생강은 위기를, 대추는 영기를 조절한다)	37
태음인 산약, 태양인 양파 적용례(산약은 태음인에게 보음하면서 보기하고 양파는 태양인 오 심 구역 현훈 등의 담음증상에 도움이 된다)	37
아토피에서 맥문동 천문동은 건조성에 듣고, 승마 황금 황련 황백은 조습청열하므로 짓무르는 증상에 쓴다.	38
백렴(가위톱)	38
산약을 생용하면 보음혈, 초용하면 보기해서 냉대하, 설사 치료	39
목통. 태음인, 심소장의 열을 소변으로 배출. 심계 불면 있을 때만 사용.	39
유근피(속쓰리면 5분, 열증에는 1돈까지 사용. 기관지, 비강, 위, 장 등의 점막손상에 모두 응 용)	39
태음열자로서로 변이 묶고 설사하는 사람에게는 引經을 위해 대황을 1g까지 줄여쓰기도	39
소양인 혈약으로 대계, 소계(녹혈, 하혈)	39
단삼대황탕의 백렴과 가감방의 백질려(태양인의 현호색처럼 백렴은 기체혈어에 씌)	39
대황주증은 밀막걸리로 한다.	40

전탕 시간(대황은 후하해서 30분, 마황 형개 곽향등의 방향성약물은 1시간, 보통은 2시간 전탕한다.)	40
상황.여정실vs산약 연자육(산약 연자육은 건비, 보기+보신, 여정실은 생용하면 간열을 사하고 주증하면 보음, 상황은 보음 보혈한다)	41
오미자를 생용하면 외감으로 기관지에 작용, 증하면 보음(당뇨에 用), 오미자 증하는 방식	41
황금은 조습청열하므로 잘 못 사용하면 더 건조해지고 인설이 생긴다. 고본도 조습.	42
대황은 1시간 이내로 전탕한다.	42
< 체질별로 <이진탕> 같이 담음을 해결하는 약물들	42
< 음인 - 향부자>, <소양인 - 시호>처럼 간기울결을 풀어줄 수 있는 대표적인 약물	43
갈근조위탕의 나복자, 식적, 변비에 쓸 때는 炒用하고, 기침 천식 등에 응용하고자 할 때는 생용한다.	44
탈모증에 쓰는 가미상황보음환 하루 복용량은 어떻게 정하나요?	44
체질별 한방음료수?? 소양인에게는 결명자, 구기자차가 좋다.	45
하수오는 간혈을 보하거나 신허에 필수적인 약(태양인)	45
문어(大八梢魚, 태양인)는 태양인 최고의 보혈약, 어지럼증에 𡇗. 낙지(소팔초어, 태양인)	45
애엽(소음인)/인진(소음인)/청호(태음인)/참쑥(태양인)의 기원. 청호는 면역의 과흥분으로 인한 염증에 좋다(아토피, 루프스 등)	46
소음인 천궁은 일천궁 쓰면 되나요? -> 토천궁 쓰세요	46
고본이 뇌세포를 활성화하고 뇌기능을 회복합니다.	47
대황, 청호, 울금, 감국, 포공영, 진교 등 태음인 이담약물의 처방사용례	47
대황 8개 처방- 장엽대황(이담 강), 당고특대황(사하 강)	47
청호 3개 처방	47
울금 4개 처방	48
감국 16개 처방	48
포공영 8개 처방	49
진교 6개 처방	49
숙지황, 구기자... 소양인 간신허겸풍한습비증... 숙지황독활탕	50
숙지황 27개 처방	50
구기자 11개 처방	51
인동등, 사과락, 시호... 소양인 열자 풍한습비증... 인동등지황탕	51
인동등 6개 처방	51
사과락 11개 처방	52
시호 15개 처방	52

홍모오가피, 영지, 선모, 대맥근... 소양인 한자 풍한습비증.. 강활홍오탕	53
홍모오가피 4개 처방	53
영지 10개 처방	54
선모 4개 처방	54
대맥근 5개 처방	54
방풍, 강활, 독활, 인동등..... 소양인 풍한습비증 공통 약재	55
소양인 풍한습비증 처방	55
방풍 33개 처방	55
강활 15개 처방	57
독활 19개 처방	58
인동등 6개 처방	60
속지황독활탕은 간신히겸풍한습비증에 쓴다.	60
마황, 백지, 석창포, 녹각상..... 태음인 한자 풍한습비증... 마황의이인탕	60
마황 22개 처방	60
백지 17개 처방	61
석창포 21개 처방	63
녹각상 6개 처방	64
상지, 창이자, 백선파..... 태음인 한자 풍한습비증... 상지의이인탕	64
상지 4개 처방	64
창이자 10개 처방	65
백선파 8개 처방	65
진교, 목통, 백렴, 백자인..... 태음인 열자 풍한습비증... 진교의이인탕	65
진교 6개 처방	66
목통 9개 처방	66
백렴 17개 처방	66
백자인 11개 처방	67

백렴은 냉한 약으로서 氣滯血瘀에 쓰이는 경우가 가장 많습니다. 즉 생리통 등의 복강내 어혈에 기체를 뚫어주고 어혈을 깨줍니다. 68

의이인, 해동피..... 태음인 풍한습비증의 기본 약재	68
의이인 처방 44개	68
해동피 9개 처방	70
약재정보(계속 업데이트 예정)	71
귀판교, 별갑교 등의 30g은 귀판, 별갑의 80g에 해당된다.	73
비파엽은 냉한데 식도 위장과 폐 기관지에 작용한다. 하기하는 성질이 있어서 천식에	73
약물 가감법(이현우 원장)	74

황기. 이뇨작용있음. 알려지성 비염이나 다한증에서 수분이 소변으로 나오면서 새살이 뜰게 된다 75

송이버섯은 소나무 밑에서 자라서 태양인 음식으로 판명됨	75
함초는 태음인약으로 변비에 지속적인 효과있음. 당뇨나 고지혈증에도 good	76
버섯; 영지는 소양인, 운지는 태양인, 송이는 태양인, 나머지는 거의 태음인	76
청호는 면역의 과흥분으로 인한 염증열을 내린다. 면역억제효과. 루프스, 아토피.	76
천마는 직접 뇌에 작용, 어지럼증 두통 언어장애 파킨슨씨병 노인들의 精不足證에 좋다. ..	76
포항은 태음인산모에 필수, 산후자궁원상복구에 효과, 평활근수축, 산후복통, 생리통, 오로...	76
오가피는 간신부족으로 인한 풍한습비에 가장 적당. 利水消腫하여 부종을 동반한 관절통에 좋 음. 보약에도 사용	77
단삼을 生用하면 혈전을 녹여 활혈하고(협심증, 관상동맥질환), 초하면 보혈한다.	77
태양인의 야교등은 양혈안신한다.	77
소양인 보간탕에 형개들어가는 것은 다른 약과 어울려 보혈하기 때문.	77
와거자(상추씨)는 소양인약으로 불면에 매우 좋음. 유즙불통, 소변불리에도 굳	77
와거(상추)	77
오미자를 생용하면 기침 등의 외감질환에 작용하고, 蒸하면 보음한다. 태음인 소갈에도 오미 자는 가장 중요한 약. 소양인 소갈에는 인동등	78
파고지는 신양허로 인한 설사에 씀.	78
육종용은 체질판단이 안 된 약이다.	78
오공(지네)은 간질 구안와사 아관긴급 파상풍 등 풍질에 주로 사용. 민간에서는 좌섬요통에 응 용	78
포도근은 산머루근	79
옥죽을 생용하면 그냥 보신하고 주증하면 신양을 보하는 성질이 강해진다(노인의 신양허쇠로 인한 요슬의 통증), 우슬을 생용하면 어혈에 작용하고 주증하면 보간신한다. 여정실도 생용하 면 청간명목하고 주증하면 보간신한다.	79
태양인 발개는 청미래덩굴로서 신양을 돕고 온신촉노한다. 태양인 아이의 오줌싸개. 민청미래 덩굴인 토복령과는 다른 약이다.	79
국산전호는 태양인약 아삼이고, 소양인약 전호는 중국산인 백화전호다.	80
산조인은 직접 뇌의 송과체에 들어가 교감신경항진을 회복, 스트레스성 소화불량 다한증 불면 증 등을 치료한다. 스트레스성 소화불량, 다한증에는 초용하고 불면증에는 瀉熱 위해 生用한 다. 식욕조절하므로 태음인 비만에도 활용가능. 생산조인은 간열을 사하고, 초산조인은 보혈한	

다. 간기울결로 인한 불면은 사열해야 하므로 생용, 노인의 불면은 혈허로 인한 것이므로 초
용. 80

약재 정보 몇가지 2(여정실주증, 오미자주증하는 방법 외.....) 81

홍맥구입에 대해서 83

사상인 환약은 어떻게 만들어 쓰시나요? 83

상황은 신장과 자궁질환에 중요한 약으로 쓴다. 북한산. 약업사연락처 83

형개, 곽향, 소엽은 후하가 좋다. 산조인은 한증은 초용, 열증은 생용한다. 마황은 탕포를 안
해도 약효에 문제가 없다. 84

凉血止血藥 大薊(소양인 자궁출혈, 하혈의 특효약) 84

동충하초는 태양인의 대표적인 보약으로서 폐신을 도우므로 감기 잘 걸리는 사람에게 좋다.
85

계혈등은 보혈약으로 태양인 빈혈이나 산후혈증에 특효약이고, 호장근은 태음인의 습열을 사
한다. 85

미후도는 국산참다래로서 소식작용을 하고 식물을 없앤다. 85

유근피는 어느 태음인 약이고, 신이는 소음인 약이다. 86

원잠의 시세 구입처, 원잠은 허로에 쓰이고, 원잠아는 신양을 도와서 발기부전에 쓴다. 86

■ 외감 및 기관지 폐관련 질환들 87

태음열증의 감기는 갈근승기탕을 설사할 때까지 쓴다. 87

체질별 감기약 88

태음인 열자의 기침약으로 갈근포공영탕, 한자의 기침약은 자완상백피탕 88

소양인 목에 걸리는 뻑뻑한 가래, 마른 기침을 폐음허증의 지황양폐탕으로 치료하다 88

소음인 한자 천식을 향사양위탕가감 비염처방으로 호전시키다. 비염처방은 천식에도 응용가능
90

노인의 만성감기를 신허로 보고 치료, 효과보다(상황보음탕). 90

태양인의 식도성 해수를 석곡양위탕(燥傷胃[胃脘灼痛,乾嘔,呃逆等])가감으로. 91

역류성식도염과 그로 인한 해수를 길경죽여탕가감방으로 92

정말 오래가는 태음인 해수에 자완상백피탕, 갈근포공영탕 92

태음인열자 갈근포공영탕으로 오래된 기침을 치료하다. 93

입에서 시큼한 맛이 올라오고 가래없는 기침을 태음조위탕 거 오미자, 가 갈근 승마 울금 청
호로 치료하다. 94

태음조위탕으로 감기탈출 사례	94
갈근포공영탕 치험례(기침, 열사용폐, 담열옹폐, 열담증)	95
태음인기침 묶은 가래, 사삼보폐탕가감으로 호전시켰다가 패증발생. 이를 갈근포공영탕(행인 자완 2배증)으로 호전시키다.	95
추위를 무지하게 타는 소양인 한증, 체력부진 맑은 콧물 제채기를 신양허로 보고 토사자보양 탕, 외감고려하여 형개 방풍 시호 연교를 가해서 치료하다.	96
태음인한자의 감기 끝 기침을 한다열소탕 복용하고 구운 백과 수시로 먹어서 호전시침. 그러 고도 잘 안 떨어지는 가래는 마황 0.5~1돈, 백과초 3돈을 가하되 그러고도 안 되면 마황보폐 탕가 백과초 관동화로 간다(가래를 뱉고 싶어도 안 뱉어지는 상황).	96
감기끝무렵의 잔기침을 사삼유근피탕으로 호전시키다-기초질문방에 올렸던 환자 경과	97
태양인 감기 뒤끝 마른 기침을 역류성식도염으로 보아 당삼보위탕 거 현호색, 앵도육 가 아삼 구인 각 8g, 양충피 4g으로 호전시키다.	98
소음인 50대 여성환자, 긴 감모, 목쉼, 가래 피로 등의 증상을 소엽청열탕으로 경쾌시키다. 감 기에는 열증약을 현재 증상에 열이 있으면 한자에게 써도 된다. 다만, 증상이 호전되면 설사 함.	99
태음인기침에 갈근승기탕	100
감기 후 기침이 그치지 않는 것은 풍열범폐증에 해당	100
태음인한증의 기침에는 한다열소탕이 좋고, 끈적거리는 가래 기침이 심하면 백과초를 3돈까지 사용. 만성허로성기침은 녹용대보탕	100
소양인 감기후 오래된 기침에도 지황백호탕이 잘 듣는다.	100
임신상태에서 태음인열증 감기약	100
가래 기침 천식 기관지확장증 아주머니, 열증으로 보고 갈근조위탕, 갈근조위탕은 내상약이니 외감과 관계있는 열다한소탕에 행인 상백피 백과초 마황 대황 혹은 갈근승기탕 등을 응용한 다. 열이 위로 확 오르는 것은 신음허증으로 외감과 무관.	101
태양인이 야간에만 마른기침할 때 오가피쌍해산 가 구인2돈, 백강잠1돈. 구인은 자음하고 지 해하며 백강잠은 거풍하고 피부를 열어준다.	102
감기가 계속되는 환자에게 태음조위탕가 갈근 승마 녹용 혹은 자완청열탕	103
감기후의 가래기침, 길경죽여탕같은 담증처방이 가능할까요?--> 풍열범폐증에 해당되는 갈근 청열탕, 백부근청열탕, 자완청열탕이 적당.	103

태양인열증 감기로 1-2 주 이상 된 기침 가래 노인에게는 풍열범폐증의 오가피청열탕이 적당하다.	104
감기와 관련한 갈근승기탕에 관한 글모음. 중요!!(태음인의 갈근조위탕, 소양인 지황백호탕, 소음인 팔물군자탕)	105
■ 寒熱關聯(上氣 熱感 冷感, 汗出)	111
소양인 발시린 환자. 57세. 신양허로 보고 토사자보양탕가 목단피 1.2g(소화곤란)	111
손발시리고 열이 오르며 머리에서 소리가 나는 태음인 열자 할머니. 신음양양허증으로 보고 정심보음탕가 쇄양으로 호전. 잘 못 먹고 한열 속부대김에 갈근조위탕거 오미자 가 승마4 산약 연자육 마황2로 호전시키다.	112
태양인 환자 음허화동에 신음허 처방인 원잠보음탕가 양강 한 돈으로 good	112
주야바뀐 과로, 상초발열감에 독활지황탕가 인동 연교 구판 별갑 각 한 돈, 황련 치자 시호 3푼으로 good	113
33세. 태음인 열증 남성. 목어깨 결림 상열증 언어장애 기억력장애 등에 황금청심탕가 갈근승마, 상황보음탕가 원지 석창포를 쓰다.	113
등에서만 열이 오른다는 44세 여성환자. 갈근조위탕가 승마4g으로 유효. 상열감에는 양명열을瀉하는 승마가 가장 중요하다.	115
태음인 환자 노인이 손발시려한다. 혈이 부족하면 얇은 옷을 입은 것처럼 추위를 느낀다. 보혈하는 단삼(초)이나 상삼자 상황을 가한다. 노인은 무조건 음혈을 보하는 약을 먼저 생각한다.	116
태음인 열증. 상열 있으면서 종아리 시리고 쥐가 잘 난다. 수족냉증의 문제는 신음양양허증으로 접근, 쥐내리는 증상은 간혈허증,	116
여성들, 수승화강이 안 되는 증상. 간비불화를 먼저 고려??	116
하지냉증, 발시림 한증이면 신양허증, 열증이면 신음양양허증으로 약을 쓴다.	117
수족소소한출긴장하면 손끝이 차가워진다. 심열로 보고 청심연자탕 투여. 1제 복용후 호전반응, 2제 복용후 5개월 지난 지금까지 재발 없음.	117
49세 태음인한증 남성(자한), 비위습열로 변증해서 두황의이인탕(갈근 증) 가 승마 청호 사상자 부소맥 4g으로 저효.	117

71세 태음인 한자 여성의 다한증. 폐기허로 간주하고 사삼보폐탕가 부소맥 마황근 4g으로 저
효 118

소양인 수장 다한증에 독활지황탕가 지모 황백 염수초, 구판 고삼 차전자 각1돈 영지2돈 2제
로 저효. 119

다한증 원인의 경우의 수(기허증, 위열증, 간담습열증이 대부분. 신음허도 고려해야) 119

소음인, 무력 도한 자한 심함. 도한이면 음허인데 신양허증에 쓰는 홍삼보양탕에 총울자를 가
해서 신음양양허증으로 접근해봐야 하겠습니다. 120

다한, 한출 부위, 한증 상체는 폐기허, 열증 하체는 신음허가 가장 많다(유주열) 120

소음인 수족다한에 보중익기탕 가미방을 쓰는데 속도 더뎴.--> 당귀 천궁 백작약 등으로 음혈
을 보한다. 인삼 황기를 증량할 수 있다. 소엽에는 발한작용이 있으니 빼는 것이 좋다. ... 120
태양인 태음인 소양인 다한증에 가감할 약재. 소양인은 지모 황백, 태음인은 갈근 승마로 청
열 마황으로 폐기 선발, 태양인은 기허에 당삼 신경성에는 진주모 석결명 비만하거나 습열에
는 초롱담, 백강잠도 피부에 작용한다. 121

태음인 열증의 수장한에 갈근조위탕 가감방. 여정실 생용하면 간열을 사하고 주증하면 보음,

산조인은 교감신경의 흥분을 억제해서 땀을 줄이고 잠을 자게한다. 121

■ 眼耳鼻咽喉科 질환들(비염, 각종안면질환, 두통, 현훈...) 122

1. 비염 122

체질별 비염, 중이염, 천식 처방(단위는 g) 122

태음인 비염처방을 다시 한번 강조함. 123

태음인 비염, 비염으로 인한 불면에 태음조위가감방. 황금이 빠지면 듣지 않고, 행인을 가하면
더욱 좋다. 124

신경 쓰면 잘 체하고 가스차는 태음인 한증의 비염여성에게 연자소간탕가 창이자 황금 자완
백지 각1돈, 마황 녹용 반돈을 써서 유효하다(간비불화). 124

태음인 열자의 천식, 알레르기성 비염을 갈근조위가감방으로 현저하게 좋아지게 하다. 125

태음인 열자의 축농증에 맑은 코 寒氣 참고해서 寒者處方 자완청열탕으로 좋은 효과를 보다.
125

태양인 비염에 오가피쌍해산가감방, 미후등식장탕 가감방으로 효과를 보다.	126
소음인에게 향사양위탕가 천궁 소엽 지각 당귀 각 한 돈으로 저효를 보다. 황기추가하고 맑은 콧물 심하면 천초를 3~5푼 추가	128
소음인의 비염을 향사양위탕가감방으로 역시 효과를 보다.	128
태음인의 축농증에 갈근조위탕가감방 활용	129
상안검 부종, 불문향취 비색 후비루 등의 증상에 일단 위축성비염으로 보고 맥문동양폐탕가 상황 비파엽 포공영 승마 상엽으로 효과를 보다. 상안검부종은 면부풍열로 보고 갈근조위탕에 승마를 가해서 시도해본다(승마위풍탕개념)	129
태음인의 맑은 코 흐르고 재채기 하는 비염, 혈뇨에 갈근조위가감	129
소음인 비염 세가지 처방 질문입니다(향사양위탕가감, 소엽청열탕, 계지반하생강탕가감)	130
갈근조위가감방, 자완청열탕, 백부근청열탕으로 효과 안 나는 태음인비염, 아토피에 의이인청 폐탕을 고려한다.	130
2. 眩暈	131
태음인 어지럼증을 갈근조위탕가 천마 조구등 백질려 각4, 녹각2g으로 치료하다. 대항은 이 담, 이노작용을 동시에 하면서 식적, 담음, 어혈, 부종, 생리통, 오심, 현훈 등을 모두 치료한 다.	131
노인현훈을 신음허로 보고 상황보음탕가 산약	132
72세 태음인 할머니의 현훈증을 위장상태가 안 좋음에도 불구하고 신음허로 간주, 청심보음탕 가 감국 천마 조구등 각2g 처방해서 유효	132
74세. 태음인 여성. 양방 다이어트 치료 후 발생된 현훈증에 신양허로 간주, 연자보양탕 가 천마 원지 석창포로 유효하다.	133
소화기 문제와 신허문제가 공존하는 태음인 현훈. 먼저 갈근조위탕으로 위장을 다스리고 다음 에 신허를 다스리는 약을 장복한다.	134
태음인 메니에르 증후군(거담하는 약물이 많이 들어가있는 청심연자탕이 적당하다)	134
태음인 한자 사경증을 조위승청탕가 천마로 치료하다(권투선수)	135
태음인 열증 뇌좌상으로 인한 어지럼증과 시야 불투명 말 어눌해짐--> 중풍의 초기증으로 보 아 간양화풍으로 봐야한다.	135

3. 코피	136
코피(소음인에 지유초, 태음인에 측백엽, 포황)	136
태음인한증 9세 여아의 코피 어지럼증 소화곤란 등의 증상에 태음조위탕가감방	136
태음인 한증 소아의 코피를 태음조위탕가 갈근8 승마4 연자육6 측백엽(초)4g으로 호전시키다.	136
 4. 頭痛, 顔面痛	137
찬바람 쐬면 머리가 시리면서 두통 생기는 증상을 風寒으로 보고 가감갈근해기탕으로 해결하 다.	137
태음인 한자 안면신경통을 외감풍한으로 변증, 류씨한다열소탕처방으로 著效	137
짜증 많이 내는 안면마비감환자를 간양상향으로 해석, 백자양간탕 거 산약 가 황금 천마 조구 등 백질려 처방해서 저효.	138
61세. 태음여성 두통. 가슴답답 우울감 약간의 한열왕래 있으면서 소화상태 안 좋은 것을 간 비불화로 간주, 연자소간탕을 써서 두통 가슴답답 우울감 등의 증상이 소실되다.	138
태양인 안면경련 환자, 온갖 간 관련, 신양허 관련 처방 써 보았으나 아무런 반응도 보이지 않다.	139
태음인 한증의 구안와사에 태음조위탕 가 갈근8, 승마, 백지, 천마, 조구등4, 전충1로 효과를 보다, 안면신경마비는 경추 혹은 상위흉추에 봉독을 활용한다.	140
구안와사초기에는 외감에 준해서 표증약인 갈근승기탕을 2~3일 먼저 쓴다.	141
구안와사는 거의 한약으로 안 되는 듯.	141
태양인의 두통과 변증의 원칙에 대해(태양인의 담음두통에는 담음을 없애주는 미후도 적소두 백모근 문합 백강잠 양총피 교맥 모과 등을 응용한다)	141
 ■ 기타(매핵기, 중이염, 인후 구강관련질환들....)	142
태음인 열자 양형의 매핵기의 원인을 역류성식도염으로 보고 간위울열증으로 해석, 갈근화위 탕가감방으로 저효.	142
설건 설통 농설에 사삼양심탕 거 호박 가 여정실 저실자 상심자 지부자 1봉. 혀가 헐거나 구 내염 등은 모두 심화가 원인. 열증이면 심음허나 심화항염에 해당. 음허하면 여정실 주증, 혀 허하면 단삼으로 보혈한다.	143
태음인 입이 쓰고 가끔 허끝이 얼얼한 환자분에게 갈근조위탕가 산약 연자육 각2, 승마1로 구 고, 혀 얼얼이 거의 없어지다.	143

소양인 한자 중이염에 형방패독산 가 지모 치자 박하 연교 황련 석고 등을 쓴다.	144
소음인의 인후통에는 삼계팔물탕과 독삼관계이중탕을 써야 한다.	145
태음인 이명에 갈근조위탕가 승마 대황 황금 석창포 각 한 돈으로 유효하다.	145
태음인 비문증. 비문증은 정부족이므로 보신, 보정하는 약물을 쓴다. 태음인에게 감국이 도움 이 된다.	145
태음인 안구건조 및 눈물과다에 상황보음탕 가 산조인 백자인으로 약간의 效. 상열감과 이명 이 그대로. 백질려 염초 조구등 염초 등 거풍하는 약을 검토한다. 극침도 좋음	145
소양인의 목의 이물감은 독활지황탕만으로도 호전가능. 결명자로 변을 통하게 해준다.	146
목소리가 쉬는 것은 腎病이다. 한증이면 신양허증에 해당	146
태음인 열증의 돌발성 난청에 간음허, 간양상향을 고려.	146
태음인열증 인후통에 갈근승기탕	146
소양인의 피로 이명. 신음허로 보고 구판보음탕 가 지모 황백 한 돈. 열이 위로 뜨면 별갑도 쓴다.	146
딸국질은 하기 해울 청열. 태음조위탕가 갈근 승마 울금 청호 대황.	146
소양인 여자의 이명. 열증 53세. 신허이므로 보간신하는 약을 쓴다. 지골피, 구기자, 산수유활 용.	146
■ 소화기질환(위장, 대장, 肝膽질환들...)	147
1. 위장, 소장 및 식육부진 관련	147
소양인 속쓰림 위산통 치료에 모려분(열자), 오적골(한자)	147
위열과 위음허의 감별	147
위장도 감기걸린다.(태음조위탕에 마황이 들어가는 이유,생냉지물에 상한 경우)	149
소음인열자의 식육부진에 십이미관중탕으로 효과를 보다.	149
소음인 위장장애에 백출건비탕	150
스트레스 태음인 변비 부종 현훈 알려지성비염 복부가스에 산조인소간탕가 대황 목통 삼백초 행인 패모 갈근으로 저효.	150
태음인 한자의 酒傷에 태음조위탕가 대황5푼, 갈근 울금 청호로 탁효	150
태음인 역류성 식도염에 길경죽여탕가감방으로 탁효.	150
복통, 미식, 혈변에 燥傷胃에 쓰는 백합양위탕가 백령(지통, 지혈작용)	150
태양인 설사, 역류성식도염를 류씨미후도식장탕으로 급한 설사를 먼저 잡다	150

소음인 위하수 위무력 만성설사에 백출건비탕으로 저효. 백출건비탕의 핵심은 계내금. 계내금은 위액분비촉진, 위무력, 위 연동운동 촉진의 최고의 약이다.	151
태음인 담습역류성 위염(분노의 역류)에 갈근조위탕으로 저효.	152
비염있는 태음인 한자 소화불량, 복냉에 태음조위탕가감방, 의이인건비탕 가 길경 마황 녹용	154
소음인 위암환자의 장관출혈로 인한 대변흑색 빈혈 어지럼증, 수혈에 간헐히 처방인 당귀보간탕 가 홍삼1돈으로 제반증상 호전례, 위장관내 출혈로 인한 빈혈에는 비불통혈 처방이 better	155
역류성식도염, 소화기장애, 수족 붓는 증상에 갈근조위탕가 유근피 승마. 소화는 좋아졌으나 설사 복통 수족부기가 해결되지 않다--> 한증으로 보고 태음조위탕 증 의이인5돈으로(去皮 안하고), 가 갈근 승마(후중), 삼백초(이수삼습)	155
태음인이 쌀막걸리 먹고 생긴 미칠듯한 구갈은 음허로 해석해서 보간신하는 약을 끝까지 쓴다. 오미자는 쨌해서 2배로 구갈이 없어질 때까지 쓴다. 청열하는 청호를 가할 수 있다. 술은 음혈을 모손한다.	156
태양인 식후 체한 느낌. 구역질, 이체. 양치 때의 구역질을 류씨미후도식장탕과 교맥관장탕으로 다스린다. 구역의 원인은 담음인데 비위의 약으로 담음은 저절로 없어진다(교맥관장탕).	156
스트레스로 인한 식욕부진은 간비불화. 속쓰림이나 위의 통증이 있으면 위음허.	157
태음인한증 위용종은 위한증. 炒用 의이인이 용종에 특효.	157
갈근조위탕으로 미식거리면 비음허증.	157
많이 먹지 못해 핑 어지럽고 깎박거리면 기운없으면 저혈압. 간헐허약으로 빈혈기를 회복하고 다음에 비위병증을 본다. 일단 피가 회복됨.	157
[소음인] 한증 구역 오심 흉민. 두드러기 비염증상(십이미관중탕 거 적백하수오 양강 지실 가지각 한 돈, 인삼 황기. 속쓰림 심하면 오령지 加)	157
酒傷은 食傷에 준한다. 식상의 습열, 담음 등과 같은 방식으로 접근.	158
위병과 비병의 구분의 판단기준. 쓰리거나 아프면 위병, 더부룩하거나 소화 안되거나 기운이 처지면 비병. 비병 중에서 비양허증과 한습곤비증에는 통증이 있는데 이 경우는 따뜻하게 하면 통증이 경감된다.	158

2. 대장관련질환 160

1) 변비 160

변비의 원인별 체질별 처방정리 160

함초가 태음인 변비개선 161

소양인 변비나 대변이 안 시원할 때 동규자차를 권할만하다. 162

소양인의 변비에는 신음허로 접근한다. 변비로 인한 하복부의 가스는 寒者라는 판단의 근거가 되지 못한다. 식사직후 30분 혹은 1시간후 상복부가 불러와야 한증. 162

신양허의 토사자보양탕으로 발시림, 변비, 골다공증, 요슬통이 좋아지다. 162

소양인한자의 변비에 독활지황탕가감방으로 가도 되냐는 질문에 대하여--> 한증이고 소변이 시원찮으면 신양허증. 결명자는 간열을 사하고 윤장시켜 배변을 좋게 한다. 동규자는 사하작용이 있어 노인에게는 곤란 162

소양인 간기울결 간화상황에서의 변비에 독활지황탕 가 결명자3돈으로 쉽게 해결되다. · 163

태양인 혈허변비에 백모근보간탕가 도인3돈으로 대박낸다. 태양인 변비에 현미만으로도 도움이 된다. 변대기도 굿. 다른 체질의 보간탕도 변비에 좋을 듯. 163

자두가 변비에 좋다. 164

소양인 열증의 변비. 쥐 나는데 천화분양비탕가 구기자 164

심한 변비에 사삼양비탕가감방 활용(燥傷大腸證, 大腸津虧證) 165

변비가 있는 노인환자에게는 신음허에 쓰이는 보음탕에 대항을 가미한다. 165

태음인변비에는 윤장하는 마자인(추말). 양명경의 열을 사하는 승마 대항을 가할 수 있다. 165

갈근조위탕의 대항으로도 변이 시원치 않은 경우에는 행인 마자인 해송자 등으로 윤장. .. 165

창백하고 월경량 적으면 혈허변비로 당귀보간탕가 지실 빈랑 각 1돈(소음인) 165

소음인의 변비에는 하기하는 목향 지각이 위주가 됩니다. 당귀나 흑호마(검은깨)를 윤장할 165

2) 설사 165

헛배불러하는 소양인의 복통 설사에 형방지황탕가 목단피로 著效 165

구토 설사 등의 증상을 보이는 태음인 열설에 갈근라복자탕으로 저효(소양인은 열자 저령차전자탕, 한자는 활석고삼탕, 소음인의 경우, 태음병에 쓰이는 백하오이중탕 혹은 백하오부자이중탕 활용가능 166

설사하는 치매할머니를 대장허한증의 연자육양비탕 5일분으로 설사를 멈추게 하다 166

속이 안 좋으면 화장실 가기 전에 대변을 지리고 방구를 꾸면 변이 나오는 12세 남아 열자.
장염대황을 1/2이하로 줄여 쓴다. 167

태음인과민성대장증상에 대해(술을 많이 먹어서 냄새가 지독한 것은 장위습열. 새벽설사가 위
주가 되고 몸이 차면 신양허증, 태음병으로 보고 태음조위탕 쓰는 것이 일반적. 내용물이 없
어서 변을 못 보는 것은 변비가 아니다) 167

태음인열증의 비위습열증의 설사에는 저근백피가 가장 중요. 혈변에도 중요함. 167
태음인설사에는 삽장작용 있는 저근백피 한 돈을 가한다. 20일전 장어를 먹고 설사를 지속
함. 갈근조위탕, 의이인건비탕으로도 설사가 개선되지 않음. --> 삽장작용이 있는 저근백피를
한돈 가해서 사용해 보세요. 168

태양인 설사 168

태음인 열증의 설사. 장기간의 스트레스가 원인이라면 비위나 장에 초점을 맞추면 무조건 빗
나간다. 칠정이 원인이면 간기울결 중 오매소간탕 검토(오매가 설사를 치료). 간비불화, 간기
범위, 간음허 등을 고려한다. 168

태음인 한자 간경화로 인한 심한 복수, 황달에 간담습열에 쓰는 울금청담탕 가 의이인5돈으로
저효. 대황을 초하면 이뇨작용이 강해진다. 이담작용 약물이 중요. 포공영, 소양인은 고삼 치
자 동규자 대계 활석 차전자, 치자와 대계가 중요. 168

태음인 황달에 대황 청호 울금 등을 활용한다. 169

간경화로 인한 복수에 갈근조위탕이 좋다. 설사나면서 부종 빠짐. 류주열선생처방으로는 울금
청담탕(간담습열, 간담울열처방) 169

담낭염(담석)으로 인한 극심한 통증은 간경습열약으로 보고 처방하면 좋아진다. 169
태음인 울금청담탕은 간, 담, 췌의 염증에만 써야 하나요?--> 황달이나 간염에 유효 170

■심장질환(고혈압, 중풍, 갑상선, 당뇨...) 171

태음인 심간혈허증. 빈혈, 어지럽고 피로 불면 심계 불안. 간혈허증에 심계가 있어서 심간혈허
증으로 변증. 단삼보간탕가 백자인1돈(심계고려)--> 40첩 복용으로 정상. 171

혈전, 고지혈증, 관상동맥 질환에 은행잎, 소양인은 택사가 좋다. 172
소양인 심장병과 태음인 심장병의 한열별 처방 및 가감법, 치료대강(중요) 172
소양인 빈맥 부정맥 기외수축으로 수술 권유받은 환자를 혈허로 보고 숙지황보간탕!! 173
태음인 심계, 후두통, 불면을 심기허로 보고 연자보심탕을 쓰다. 174

태양인 심계 심허 환자를 심혈허로 보고 당삼보심탕거 옥축칠 가 계혈등 백하수오로 효과를 보다. 다음에 체중을 늘리기 위해 태음병약 처방예정(류씨미후도식장탕). 체중회복에 태음병 처방이 좋다. 태양인의 심간병증에는 문어로 보혈. 174

소양인고혈압. 대체로 신음허로 본다. 형방사백산가 인동 연교 목통 황련 치자 지모 황백을 쓸 수도. 소양인은 치자 황련만 달여 먹어도 효과가 있다. 175

태음인열증의 고혈압 처방. 고혈압은 한약으로 완치곤란. 이수 거담하는 방향으로. 175

소양인한증 만성변비 갑상선기능저하증 우울증 있는데 다이어트 원함. 신양허증 처방에 결명자를 3돈 이상 가해서 대변을 통해줘야 한다. 우울한 증상도 정부족이다. 175

갑상선질환. 한열불문하고 기능저하, 항진 다 온다. 대체로 음허를 기본으로 해서 기음양허증으로 접근한다. 176

태음인당뇨 54세 남자. 갈근조위탕이 식적과 이열을 다스릴 수 있어서 당뇨에 좋다. 포공영상지등이 혈당강화에 탁월하다. 뽕나무줄기. 주식이 가장 중요한데, 쌀밥이 가장 해롭고 밀 수 수 울무 등을 먹어야 한다. 176

당뇨같은 소모성질환에는 신허증이 가장 많다. 177

갑상선기능항진, 심간병증의 가능성도 생각해야(정신적인 원인) 177

88세 할머니의 심간혈허증(변비 현훈 손저림 슬관절 발의 통증 갈증 심계 불면) 177

실제적인 빈혈양상이 확인되면 간혈허증(얼굴에 핏기없고, 손톱색 없고 월경량 적거나 색이 묽다) 177

심간혈허의 증상. 혈허에 심장증상 있으면 심간혈허. 177

소양인의 심병치료. 열증이면 심허, 한증이면 기허 혹은 양허. 심병은 심계, 불면, 소변적색, 한출 등을 확인해야 한다. 같은 불면이라도 담병에는 이런 증상이 없다. 177

태음인 한증 중풍에는 조위승청탕에 산약 백자인으로 심음을 돕고, 감국으로 거풍할 수 있다. 초기에는 승기탕을 써서 사하시킨 후 조리할 수 있다. 178

■신, 방광질환(소변관련, 성기능, 부종 관련질환들...) 179

1. 소변관련질환 179

소음인열증의 전립선 비대증으로 인한 소변 빈삭을 신음양양허증으로 보고 백작약보음탕가 포부자5푼 15일분으로 저효를 내다. 179

태음인 소변불금, 소변빈삭을 태음조위탕가 같은 승마 산약 연자육, 신기불고의 연자보양탕 거 쇠양 가 산약 차례로 처방하였으나 치료실패. 열증, 방광습열증의 양형으로 보아 천문동 도적산을 처방하여 저효를 끌어내다. 소변빈삭에서 간신음허도 고려한다. 179

태음인의 소변불리에서 목통의 사용. 심소장의 열을 소변으로 빼내는 작용을 한다. 심계, 불면 확인하고 쓴다. 181

노인의 소변빈삭은 허리 무릎상태, 기억력, 어지럼증 등을 확인해서 신허증을 확인한다. 신음 양양허증으로 접근해서 황금 등심 목통 등의 심화를 사하는 약을 가해주는 것도 고려한다. 181

태음인 낭습증의 경우 어떻게 처방 구성을 해야 할까요? 처방과 가감법 181

2. 성기능관련질환 182

발기 부전, 정력 감퇴 - 40세 이전이면 많이 써먹어서 신이 망가진 것으로서 신정부족, 4을 넘었으면 신음허 혹은 신양허, 40대보다 나이가 더 들어 허리 무릎 시리고 기억력까지 현저하게 떨어지는 경우라면 신음양양허에 해당. 정신적인 문제도 고려한다(심신불교, 간비불화..등) 182

태음인 성기능저하를 연자회생탕가감방으로 개선시키다(김주선생처방), 처방있음. 183

3. 부종. 184

족번열을 동반하는 소양인부종을 신음(양)허 처방 가감방으로 치료한 3 케이스 184
노인의 소화기장애 없는 부종은 신허다. 종아리, 발의 부기를 연자보양탕원방으로 치료. ... 185
소양인 IgA 신증을 선인장(백년초)로 정상에 가깝게 호전시키다. 씨앗이 더 효과적. 185
갑상선암 수술, 방사선 치료 후 발생한 임파부종에 신허수범개념으로 시도해보다. 186

감기 달고 지내는 태음인 寒者 6세 아이의 선천성 음낭수종을 자완청열탕가 녹용으로 감기 줄이고 수종을 치료하다. 187

대항이 이담작용, 식적을 풀어서 부종을 치료한다. 188
신부전으로 인한 부종, 천식, 탈력감에 대한 변증은 어떻게 접근해야할까요? 188
태음인 열증의 부종 188

더운 곳만 가면 붓다는 경우 어떻게 봐야 할까요?? 화열로 봐야 합니다. 황련, 치자, 연교를 활용합니다. 189

■ 부인과질환(생리불순, 갱년기장애....등) 189

태음인열증의 갱년기증후군. 상열감. 무력감, 손가락의 통증	189
태음인 다낭성난소 증후군. 8개월째 무월경. 탈모 습진 심한 변비 등을 어혈저체증으로 해석, 단삼대황탕가 조각자 천패모 전충을 가해서 1년만에 생리를 하다.	190
신경 많이 쓰면서 천면 심계 현기증 수반하는 월경과다를 간비불화로 판단, 연자소간탕가 단삼 녹각교를 처방해서 생리량을 줄이다.	190
태음인열자의 생리전증후군(유방통, 부종 몸살, 신통)을 가감단삼대황탕가 주증대황으로 증상 소실(안)	190
태음인 열자의 임신정심보음탕가감, 연자양혈탕 가감을 활용하다.	191
시험관아기 임신시도에 상황생화탕을 썼으나 별 무효. 관원부위 왕뜸이 도움되다.	191
소양인 간혈허증(빈혈)으로 인한 수면장애 생리전후복통 무기력 전근 전신마목감 등을 빈혈에 쓰는 간혈허증의 생지황보간탕으로 호전시키다. 빈혈은 간혈허증으로 접근.	192
생리전 증후군(부종 하복통 유방창통 식욕항진). 비신양허로 보고 교맥건비탕가 발계, 음양곽 동충하초 어성초를 가했으나 별 무효. 스트레스가 많다는 호소에 따라 현호색소간탕가 용담초 1돈으로 제반증상 소실. 태음인의 대황 소양인의 황련처럼, 태양인에게는 용담초가 중요하다.	193
태음열자의 생리통에 가감단삼대황탕 가감방 3례. 생리통제거 효과가 대단히 탁월하다. ..	194
황대하에 연자소간가미방(간비불화, 간경습열, 간기울결, 습열재간담 등에 활용)임상2례	195
황금의이인탕가 대황 삼백초로 심한 생리통도 덜해지다.	196
건울보양탕 임신성공례 정용재 원장님	196
윤승일 원장님의 임신치험례. 태음인 열자는 상황보음탕가 어혈약가감, 소양인 한자에게는 토사자보양탕 어혈약 가감방으로 임신 성공하다.	196
태음인 열증 만성 골반염을 어혈로 보고 가감단삼대황탕가 백령, 조구등. 냉대하가 심하면 습열형으로 접근한다.	196
사삼유근피탕으로 가래없는 식도성기침 해결하고 건울보양탕으로 임신, 배 따뜻해지고 손발의 냉기도 줄다.	197
소화곤란, 변비가 심하면서 생리불순 수족냉, 하지의 심한 통증. 갈근조위탕(대황8)가 승마 포공영4g으로 호전시키다. 대소변불통과 中滿을 선결하는 것이 치료의 대원칙.	198
20년 된 만성대하(질염), 45세, 신음허로 보고 정심보음탕가 살충 양혈 지혈하는 괴화, 천문동	

목통으로 증상 거의 소실. 은행(백과)초를 같이 먹게하다. 은행초에 지대작용이 있다. 199

소양인 열증여성 갱년기 장애. 갱년기장애는 무조건 신허. 열증음허에 쓰이는 구판보음탕가 지모 황백 염초 별갑1돈으로 증상 소실. 구판은 보음하는 작용이 강하고 별갑은 잠양해서 되 열하는 작용이 강하다. 200

산후풍(출산 1개월반 후 각종 부종, 어지러움, 소변불편, 불면, 관절통)에 연자생화탕으로 저효 201

11세 여아 원발성 生理痛, 태음열증. 간혈허로 보고 단삼보간탕처방. 저효. 201
태음인 희발월경, 부종 미릉골통, 여드름을 열다한소탕가감방으로 치료하다. 201

생리전증후군을 간병으로 보고 백자양간탕 혹은 상자양간탕에 조구등 백질려 감국, 대황 포황 호장근 단삼 홍화 등을 가한다. 호장근은 담음과 어혈을 동시에 다스린다. 202

갱년기증상은 신음허로 변증합니다. 202
태음인 열증의 생리통에는 가감단삼대황탕이 있다(처방내용있음). 202
생리량이 적은 것도 간혈허에 속한다. 202

한열이 不明한 장기간의 산후허로, 갈근조위탕으로 한열을 가린후 보신하는 약을 장복한다. 202

태음인 열자의 자궁근종 수술 후 하복부 통증 및 하혈증상을 어혈로 보고 상황생화탕을 기본 으로 가감하려 함. 태음인의 활혈지혈에는 포황초가 가장 적합, 어혈에 대황주증을 쓴다. 밀막 걸리 사용. 203

태음인 열자. 출산하면서 포를 상한 주부의 경우 어떻게 처방에 접근을 해야 할까요? 203
태음인 열증, 갱년기장애. 일단 신음허로 시작해서 나머지증상 잡아나간다. 203
태음인한증의 임신오저(6주경과)처방 있음. 204
태음인 49세 갱년기장애, 상열감..한열왕래, 두면부다한 204

갱년기증후군은 거의 신허증이다(신음허 혹은 신양허). 당뇨같은 소모성질환도 신허증이 가장 많다. 204

통증이 심해서 실증인 태양인의 생리통에 도인백모근탕가 양강(기체혈어) 204
태음열증. 스트레스 받고 생리량 줄어서 간혈허의 단삼보혈탕 205
51세 태음인 열증의 갱년기피로, 갈근조위탕가감으로 실패하다. 산약 연자육은 소변 대변 정 액 등이 아래로 쉼 때 쓴다. 변비에는 오히려 역작용한다. 205

태음인 열증 산후풍에는 어떤 처방이 좋습니까? 오래되지 않았으면 생화탕, 오래 된 경우라면 신음양양허나 간음허증, 혹은 간혈허증으로 본다. 관절이 두루 시리면 간병증으로, 요슬위주가

되면 신병증으로 간주한다.	205
---------------------	-----

갱년기장애는 신허, 열증은 신음을 보하는 처방에 보양하는 약을 가하고, 한증은 신양을 보하는 처방에 보음하는 처방을 가하므로, 같은 음양양허라도 한열에 따라 처방이 달라진다. 별갑은 소양인의 녹용에 해당할만큼 좋다.	206
---	-----

다이어트하고 나서 6개월째 생리 끊긴 한증 태음인, 간혈이 모자라서 끊긴 것이다. 원인을 생각한다. 신경을 많이 썼으면 간기울결이나 간화상염, 불면이 심했으면 심화로 본다. 음식을 제대로 먹지 않아서 빈혈증상이 있거나 손톱이 잘 부서지거나 근육의 전근 시력저하 등을 호소하면 간혈을 도와야한다.	206
---	-----

태음인 출산후 심한 하혈로 인한 소변불리, 과다출혈에는 비불통혈 처방	207
생리통에 흉요추 연접부의 협척혈치료를	207
태음인 6개월간 經閉, 혈병은 혈장기인 심간을 다스려야 한다. 갈근조위탕에 산약 연자육 황금(심화) 승마 포공영(간열)을 가해본다.	207

소음인 한증의 갱년기 증상에는 무슨 처방습니까? 무조건 신허. 열자는 신음허증, 한자는 신기허증. 신양허증으로 접근하지 않는다. 열을 더하기 때문이다. 홍삼보양탕에 건강 부자는 뺀다.	208
---	-----

소음인 아가씨의 생리가 멈추지 않는데 대한 접근방법. 원인별 기본처방과 가감법정리.	208
---	-----

■소아과질환	208
---------------------	-----

2년간 항생제 달고 있는 소아에 자완청열탕 치험례	208
태음인 소아 야뇨 치험례- 간비불화증의 연자소간탕 가 채양 녹각교 호도	208

야뇨치료의 대강(처방의 대강은 자료에 있음). 신장 방광을 보강하는 약을 먹이면서 생선, 고기, DHA영양제를 먹이면 신속하게 좋아진다.	209
---	-----

9개월 태음인 아이의 야경증-황금청심탕가감방으로(心肝火熾證)	209
심하게 나대는 태음인 한증 아이에게 조위승청탕가 원지 산조인 석창포로 정신안정	210
소아 식욕부진-한자는 비기허증의 건비탕류, 열자는 비음허증의 양비탕류	210
아이들의 성장 치료의 大綱- 체질에 맞는 음식이 중요	210

ADHD 변증의 대강-신음허, 간기울결, 거담하거나 기혈허약을 보하면서 안신지제, 청열제를 활용한다. 精不足 風熱 痰火가 핵심	211
--	-----

소아의 비위상태를 어떻게 판단해야 할까요?	213
소아성장부진, 한자에게는 신기허, 열자에게는 신음허약을 쓴다.	213

■신경정신과 213

소양인 스트레스, 예민, 불면 및 소화불량. 혈허 음허 심화 모두 불면의 원인이 된다. 형방지 황탕 가 목단피 황련 치자를 각 한 돈씩 가해 써본다. 213

태음인 불안장애에 연자양혈탕(심비기혈양허) 214

이를 가는 초등학생... 연자소간탕(간기울결, 간비불화, 기체증...) 214

태음인 한자 49세남 불면, 안면홍조. 연자소간탕, 산소인소간탕(간기울결) 214

소양인 스트레스로 인한 간비불화에 토사자소간탕으로 저효. 214

소양인의 우울증. 스트레스. 소화곤란. 한증을 아침에 독활지황탕, 저녁에 황련청심탕쓰다가 토사자소간탕, 독활지황탕가 황련 치자 각 2그램으로 증상 거의 소실됨. 215

연자소간탕(간비불화 간기울결 기체증...) 임상 2례, 스트레스 많은 아이의 야뇨증, 수험생에게 쓰다. 215

화병으로 마음의 병이 심하면 황금청심탕 고려할 것. 216

태음인 열자 불면증을 정심보음탕가감방으로(신정부족). 노인에게는 補精 216

엄마에게 욕하는 젊은 여성에게 열다한소탕(증 대항3돈으로)으로 저효 217

소양인열증, 불안장애 불면증 수전증 약물의존증을 심음허로 해석, 지황양심탕 가 217

충격 후 다리 힘 풀릴 때 황금청심탕(간양상항)으로 유효, 태음남성. 정신적인 문제가 갑작스럽고 급격하면 심으로....장기적이고 누적된 문제라면 간으로 책임을 돌린다. 이 경우는 급격하고 갑작스러운 경우. 218

태음인여성, 간기울결 연자소간탕 먹고 착해진 임상례 219

태음인 사삼양심탕 처방례(심혈허, 심음허) 219

태음인 당뇨 고혈압 불면증 할머니, 신음허의 상황보음탕가 산조인 녹용으로 잠 잘 자고, 혈당수치도 개선되다. 노인은 간신부족을 도와야 한다. 220

태음인의 변비 불면 상열에 갈근양비탕, 상황보음탕가 녹용, 췌양 221

열증 태음인의 공황장애에 열다한소탕 원방. 가슴이 조이면서 아프거나 빈맥 등의 증상이 있으면 청심연자탕. 222

불면 223

불면이면 간병증보다 심병증일 가능성이 높다(안). 223

태음인 가슴답답 아침의 안면부종에 청심연자탕가 대항. 변비에서 설사로. 대항량을 줄이더라도 대항은 써야.... 223

소양인 한증여성의 한기, 스트레스로 인한 복잡해 보이는 증상들. 스트레스로 인한 것이면 간기울결. 소간탕에 위장이 안 좋으니 황련 치자를 초해서 3~5푼 가한다. 황련 치자는 심장에 쓸 때는 생으로, 위장이 안 좋으면 초해서 쓴다. 223

소양인 한자 우울증환자에게 간기울결처방 가 황련 치자 각 5푼. 변비에는 결명자를 3~4돈 쓴다. 연교를 5푼 이하로 쓰면 건위작용. 224

태음인 기억력감퇴 불안신경증 환자, 기억력감퇴 두려움 등의 증상, 신음허 심음허 간음허 간양상항 등을 고려한다. 치료순서는 환자가 해결을 원하는 것에 준해서... 224

태음인의 열자의 제반정신질환에 청심연자탕, 황금청심탕(심화항성, 담화요심) 225
뇌혈관성 치매, 일단은 신음허로 간주. 문제가 되는 증상들은 하나씩 해결. 225

극심한 스트레스 후 상열감, 전신발적 등등 증상은 열증의 간화상염으로 본다. 225
태음인한증의 공황장애에 조위승청탕가감방 검토. 백자인 감국이 중요. 백자인은 심간의 혈을 돕고, 감국은 거풍한다. 225

스트레스 심한 여성의 갱년기 장애, 소화기장애 병발에 갈근조위탕가 심장을 돕는 산약, 연자육, 심계가 있으므로 황금을 가한다. 226

변비있는 태음인 화병에 갈근조위탕의 활용 226

불면증에 온담탕을 쓰는 기준. 담음증상이 있어야, 구고 인건 목현 흉협통 등膽의 증상에 오심 구역 등의 담음증 혹은 비위의 증상을 보고 온담탕 써야함. 227

공황장애 그동안 쪽 치료했던 과정. 태음인에게는 쌀밥과 김치가 안 좋다. 통밀 수수 울무가 good. 현미가 태음인에게는 가장 해로운 음식. 227

태음인 열증으로 불안과 공포 초조가 있으면 심병증으로 보고 심음허 처방에 심화를 사하는 황금이나 목통을 가해서 쓴다. 229

갈근조위탕으로 비만에 도움되게 하려면 오미자(소화액분비 촉진)를 거하고 황금을 가한다. 산조인초 2돈 쓰면 불안도 줄이고 식욕항진에도 도움이 된다. 230

태양인 한증 8살 자폐아이-갑자기 흥분 불면 자해 등을 담화요심으로 보고 석곡청심탕 230

■ 피부(피부건조, 여드름, 아토피, 습진, 사마귀, 탈모....등) 231

위장수술 받고나서 전신에 발적, 부어오르면서 소양감이 심하다. 갈근조위탕의 대항이 이담작용으로 가렴증 개선. 이로 미흡하면 창이자폐장탕(풍재피부). 가렴증 심하면 부평 2배증량, 부

기 있으면 백선평, 삼백초를 가함.	231
27세 남성, 지루성피부염으로 피나도록 긁고 아침에 각질. 갈근조위탕가 천문동 울금 청호 승마.	231
물사마귀 치험례. 의이인이 최고다.	231
심한 사행성 원형탈모를 간신부족으로 간주하고 가미상황보음환	232
베체트병, 구토 자주하고 비습한 체형이라 濕淫으로 변증, 상지부평초탕가감방으로 저효.	232
태음인 한자 소아의 화상을 갈근해독탕(화열상염)으로 치료(한살)	233
주소증: 대상포진을 갈근해독탕가 대항2돈으로 치료.	233
태음인 23세 여성 아토피를 갈근질려탕가미방으로 호전	234
태음인 6세 아이 아토피를 자완청열탕가 백선평로 호전	234
물집커지고 진물 나는 피부질환을 창이자패장탕가 목통 의이인 삼백초로 호전. 건조해지면 목목통 의이인을 빼고 천문동 청호를 가한다.	235
갈근질려탕과 의이부자패장산으로 호전되지 못한 가려움증이 갈근조위탕가 녹용으로 개선되다.	235
스테로이드로 인한 전신습창이 재발하다. 소음인	236
태음인 두드러기에 갈근질려탕, 갈근조위탕으로 효과를 보다.	236
아토피에서 맥문동 천문동과 승마 황금 황련 황백의 용도	236
곰팡이로 인한 피부질환(피부 가렵고 긁으면 검어짐)과 구설생창에 음혈 길러주는 단삼보간탕가 백질려 부평으로 효과를 보다(갈근질려탕, 상황보음탕가산조인, 상자양간탕으로 무효) ..	237
태음인의 한증 아토피 태음조위탕 가 갈근2돈 승마 1돈 천문동,맥문동,포공영 1돈 대항 5푼	238
소양인 탈모에 대한 변증별 처방종류. 독활지황탕가 황련 치자 시호 박하 백화사설초 연교 홍맥 각1돈, 영지 별갑2돈으로 효과를 보다.	238
설사경향의 소양인 面발진 手·前腕부 발진, 형방지황탕에 피부약 가미해서 호전. 얼굴의 발진 일으키는 습이 형방지황탕으로 없어지면서 호전된 것. 식체가 원인이면 독활지황탕에 가감해야.....	238
태양인 여드름, 어성초백강잠탕으로 무효. 성격 예민해서 소화기문제 있는 것을 보고 간비불화 당삼소간탕가 어성초2돈, 백강잠1.5돈, 와송1돈으로 효과.	239
소양인 여드름, 양격산화탕으로 안 되는 것을 독활지황탕 가감방으로 호전	239
태음인 두드러기, 가려움증을 내상발반으로 판단, 류씨태음조위탕가 황금 부평초 선평 녹용	

각1돈으로 저효를 보다.	239
태음인 아토피에 비음허 처방, 간기울결 처방을 시도해보다.	240
태양인 아이의 태선화된 피부에 풍열혈조, 風在皮膚의 어성초백강잠탕으로 저효. 아토피 관리 요령, 체질별 입욕제.	241
태음인열증의 여드름을 열다한소탕 가 대항 포공영 각 한돈반, 화피 부평초3돈으로 저효 · 243 만성적인 소양증, 태음조위가감, 갈근조위가감, 산조인소간탕(간기울결)등으로 마무리 안 되다 가 창이자패장탕(風在皮膚)으로 완벽하게 마무리하다.	243
태음인 여드름 가감법(안). 짓무는 여드름이면 황금을 쓰시고 건조해지는 편이면 맥문동 천문 동이 중요합니다. 덩어리가 뭉쳐지면 조각자를 써서 깨줍니다.	244
태음인 여드름이 거의 끝나갑니다. 갈근조위탕 등의 기본방에 백급, 백설피, 선퇴 등의 풍열약 을 가미해서 좋은 성과를 거두다. 여드름 치료는 원래 오래 걸린다고 얘기해야.	244
태음인, 손바닥 손끝 갈라지면서 통증, 혈조상부처방에 보음혈하기 위해 상심자 가하고 갈라 져 출혈 있으면 단삼을 炒用	246
탈모 불면 심계 불안감, 심계가 있고 잠이 안 오면 심병증에 가깝다. 태음인 탈모에는 측백엽 흑두가 가장 좋다.	246
태음인 열자 두드러기에는 당장 효과가 안 나는 것처럼 보여도 갈근조위탕(대항의 이담작용) 247	
소음인 가려움증에는 이담작용있는 인진과 피부가림증의 요약인 지각을 활용한다. 술 마셔서 심해지면 습, 인진 익모초가 좋다.	247
태음인 소양증은 대항 들어간 갈근조위탕으로	247
소음인피부 따끔거림. 풍열증 인진지각탕으로 무효면 곽향정기산으로 해기해본다.	247
태음인 열증 33세 직장여성의 여드름, 만성피로. 간기울결에 쓰이는 갈근소간탕이나 산조인소 간탕에 간열을 끄는 감국1돈...청열해독하는 포공영1-2돈 결절이나 낭종을 깨는 하고초를 2돈 가하는 방향으로.	247
26세 여성의 수장각화증. 수장각화증은 생수요법과 음식지도가 매우 중요하다.	248
소양인소양증. 두드러기처럼 올라오는 것이 없는 가려움증은 간담의 문제이므로 치자온담탕에 이담하는 대계를 가해 쓴다. 가림증이 있을 때 항상 소화장애나 오심 급체 등이 동반되면 풍 열이 아니다. 반드시 식적을 내리고 이담하는 약물을 쓴다. 치자 백화사설초 대계(소계 포함)	

고삼 등 이담작용이 강한 소양인이 약물을 기억할 것.	249
소양인 두드러기, 추우면 심해진다. 가려운 두드러기는 풍열이고 추울 때 심해지면 풍한의 가능성이 많다.	250
태음인 역류성식도염 및 피부소양증, 겨울되면 가려움증. 접촉성 피부염. 가려움증.	250
태음인 여드름. 장기관리 필요, 외부관리도 필요하다. 검게 덩어리 잡히는 여드름은 조각자로 깨고 포공영으로 청열해독합니다.	251
태음인 구순헤르페스. 화음증후군의 갈근해독탕	251
태음인 두드러기 붓고 수포가 생기는 경우는 삼백초 목통 익이인 등을 써서 리수해야 신속히 호전됩니다.	252
태음인 두드러기. 배 아프면서 나는 두드러기는 장위습열증. 이담작용을 고려.	252
태음인 얼굴의 심한 여드름. 변증시 고려해야할 중요한 요소들-증상외 여러 정황들	252
염색약을 쓰신 뒤로 귀, 손, 목 등등에 심한 가려움과 발진을 호소. 가렴증이 심하면 風邪다. 갈근질려탕 혹은 창이자패장탕	253
피부변증의 원칙들- 가려운 증상이 확실하고 가려움이 주소증이라야 풍사로	253
태음인 여드름에 대한 접근. 풍사상피부는 화농이나 결절 낭종 등과 관계없이 가려움이 주소증이 되는 경우. 스트레스를 받으면 심해지는 경우는 간기울결. 비위가 문제가 되면 비위의 약에 습담을 제거하는 약을 가함.(승마 대항 청호등)	253
탈모는 신정부족. 상황보음탕가 산약초 녹각교	254
한냉두드러기는 5사변증에서 風에 상한 것. 자초한련초탕	254
탈린트 아가씨 피부 두드러기 소양인한증에 독활지황탕가 차전자 고삼 황련 치자로 효과를 보다(식적해결로 두드러기 치료?).	254
소양인 봉독 알려지환자. 양독백호탕이 간해독에 문제가 되니 황련이 가장 좋다. 결명자 구기자도 좋음	255
태음인 열증 피로 소화불량 아토피	256
태양인 두드러기에는 백강잠을 써서 피부를 열어줘야 겠습니다. 그리고 어성초가 중요합니다. 2돈이 적당합니다.08.05.14 14:47	256
■ 각종 통증관련, 사지관련질환	256

허리 다리 무릎 아픈 소양인의 필수약(강활은 지통거습하고 지골피 보간신한다)	257
진교가 이담작용이 있고 풍한습비질환에 많이 쓰입니다(관절질환치료). 그리고 술로 인한 황달을 치료한다고 동의보감에 나옵니다(주황,황달을 해독) 그리고 대소변을 잘 통해줍니다. ..	257
과거에 생긴 어혈이 치료중 올라오는 신기한 현상	258
태음인열자 요각통을 여정자진교탕 가 오공 전충으로 치료하고, 마른 가래는	258
태음인 열자 할머니의 요각통을 여정자진교탕가 오공 전충으로 치료.	259
태양인, 디스크 수술 후 하지저림과 근육떨림 호소환자, 신음허로 보고	259
태음인 한증 요각통, 다리 당기고 슬관절통증을 신양허로 간주하고 건울보양탕가 곡기생1돈, 녹각교 처방--> 당기는 증상이 소실되다. 슬관절통도 간신허에 풍한습으로 인한 비증이므로 처방 리피트. 곡기생은 보간신하면서 거풍습한다. 다리 특히 장딴지 당기는 데는 곡기생이 최고다.	260
태음인 운동 후 견볼거를 어혈저락으로 보고 단삼대항탕가 진교 상지	261
10일전의 계류 유산 후 생긴 슬통, 요통, 완관절통을 갈근조위탕가 산약, 연자육 각8 포황4 홍화 1.2g	261
태음인 야간통증 및 하지저림 환자분이 간신음허 처방인 정심보음탕가 감국 산조인초로 호전. 상황을 뺐는데 그래도 되나요?--> 상황 빠진 정심보음탕은 숙지황빠진 육미와 같습니다.	261
소양인의 통증관련해서 강활 독활 지골피의 활용- 지골피는 허열을 끄고	262
71세 태음인열자 대퇴골 골절 후 조리에는 비증에 쓰는 여정자진교탕보다 신음허처방에 강근골하는 속단, 어혈약인 단삼을 가해서 써본다.	262
수술후유증신음허로 보고 거기에 강근골하는 속단, 상기생, 어혈약을 가해보는 것이 어떨까요	262
58세 소양인 한증여성의 관절통, 퇴행성관절염, 불면 등이 있을 때 관절통증의 치료는?--> 요슬통, 불면은 신허증. 토사자보양탕에 구판 별갑 등을 가해서 신음을 도와주고 방풍 강활 독활로 거습지통, 지골피로 보간신하면서 골절통을 다스린다. 관절염에는 황백(생), 인동등 등을 응용.	262
태음인 열증 오십견, 관절통 처방 문의. 태음인 열증, 64세 여환. 보간신하고 서글활락하는 여정자진교탕에 대한 가감법 언급(필히 확인!!)	263

경추손상으로 사지마비된 환자가 근육이 굳는다고 한다--> 보음, 보혈로 접근해야 하는 것이지만 몇 년에 걸쳐 약을 복용할 것이 아니면 손대지 않는 것이 낫다.	263
태음인 관절통에 전충 홍화 각 3~5푼이면 빠른 진통효과	264
잘 호전되지 않는 태음인 허리디스크와 슬통. 수족냉. 다한. 수족냉은 비위의 문제가 가장 많고 아니면 신양허증. 양증의 양허는 신음양양허증. 허리와 소퇴(장딴지)의 문제는 신허이고 시린 느낌이 있다면 신양허이다. 수족에 땀나는 증상은 생산조인이 가장 좋다. 수족에 땀이 많은 것은 일종의 자율신경실조인데 산조인은 자율신경을 조절한다. 시호나 여정실로 간열을 사할 수도 있다-중요!!	264
상지마목 손가락관절통 손마디가 아프면 전충 홍화를 3푼씩 가합니다.	265
자고나면 붓는 것은 대부분 식적. 다크서클, 부종 없으면 신양허. 태음조위탕.	265
하지무력하고 허리 자주 아픈 태양인 해역병에는 오가피장척탕	265
어깨의 통증에 갈근조위가감방을 써도 안 들어서 갈조가감방을 써알지,	265
태양인 한증 손가락 골절엔 어떤 약물이 가감되는 게 좋나요?--> 상황에 따른 가감방법과 가감원칙을 말함. 중요!!	266
태음한증슬통처방. 슬관절통에 가장 효과과 좋은 태음인 약은 전충. 나이가 40이 넘고 슬통이 있다면 보신하는 처방에 곡기생 속단 등을 가하고 전충 홍화를 5푼 이하로 씁니다. 전충 홍화는 손가락 등의 다발성 관절염에도 특효약입니다.	266
간신히 검 풍한습 체질별 처방(중요)	266
태양인 대퇴골절후에 어떤 방법의 처방을 하는지요?--> 연세 많으시고 당뇨병같은 소모성 질환이 있으니 허증으로 접근, 한증이면 신양허에 가 오가피, 열증이면 신음허에 가 오가피. 어혈 있으면 파혈하는 구인 현호색을 가함. 문어를 常食	267
태음인 노인. 열증의 슬관절통에 대한 질문. 날씨가 흐릴 때 안 좋으면 습증이지만 노인은 신허를 겸하면서 습이 끼어든다고 봐야 한다. 열증이라서 신음허가 된다. 여정자진구탕은 보간신하면서 풍한습을 흠어주는 처방.	267
각 체질별 척추 관절질환 처방	268
2. 사지관련 기타질환(손발저림, 수족떨림증, 파킨슨병...)	268
태음인 열자 수전증. 심계 불안 변비. 심음허로 보고 사삼양심탕가 대황1돈. 수전증은 심허다.	269
태음인 머리가 맑지 않고 언어어눌, 두통, 손발 저림, 요통, 뒷목경직, 만성피로	269
태음인 한자 사경증을 조위승청탕가 천마로 치료하다(권투선수)	270

태음인 열증 파킨슨병을 간신음허로 보고 정심보음탕가 감국5푼, 산조인초1돈, 271

야간통증 하지저림 치매 하지무력으로 거동곤란한 여성에게는 일단 補肝血하는 것이 중요하다. 노인들의 저린 증상은 일단 혈허로 접근해서 보혈해줘야 한다. 어혈약이 비증약을 함부로 쓰지 않는다(82세 여성 태음열증). 271

■ 비만 272

3년간 관찰한 태음인 열자 다이어트 사례 여성 59킬로 272

공개하는 비만방(태음인 소양인). 272

태음인 열자의 비만에 태음조위탕 가감 처방례 273

소양인비만. 비만치료에 있어서의 총론적 원칙. 276

소양인 갑상선기능저하증 우울증 변비 환자 다이어트. 신양허증에 처방에 결명자를 3돈 이상 가해서 대변을 통하게 해준다. 276

■ 피로 보약 277

사삼유근피탕 먹고 어떻게 피로가... 277

태음열자의 기허증상 치험례. 기음양허를 피로에 활용한다. 278

66세 여성 기운이 없다(폐기허로 보고 사삼보폐탕가 마황근 천마. 태음인의 한출은 대개 사삼 보폐탕을 해결가능) 278

만성피로에 청열약가미하는 것이 좋다. 상황보음탕 가 포공영 감국 녹각교 각4 279

태음인 열증 환자 갈근조위탕가 승마 황금 포공영 각 한 돈으로 치료 280

태양인 피로 281

노인보양에는 간신을 보하는 것이 핵심(뇌출혈 이후 밥을 너무 못 먹고 기운 없고 쉼 목소리, 발음부정확) 282

■ 처방에 대한 반응 혹은 처방설명 282

갈근승기탕에 관한 글모음(태음인의 갈근조위탕, 소양인 지황백호탕, 소음인 팔물군자탕) 282

태음인 vs 태양인 음식 반응 문진 요령 중 하나... 289

갈근조위탕의 해독작용 289

약물의 체질 적합판정 여부, 주소증의 호전의 정도가 아니라, 피로감, 대소변상태, 수면으로만 살핍니다. 환자는 주소증만 보려고 합니다. 똥통 떠다니는 느낌은 신허증입니다. 290

약 먹고 가려운 경우에는 이담화위하는 감국온담탕 혹은 청호온담탕을 쓰는 것이 좋다. .. 290

시호소간탕을 먹고 나른해 하는 데 대해	290
주소증이 흉번, 심계, 상열한출, 백자양심탕으로 생긴 약진--> 자노아를 거하고 보혈하고 심장의 통증을 잡아주는 단삼을 가한다.	290
갈근조위탕으로 속이 불편하면 위음허증으로 접근	291
형방지황탕으로 설사가 나면 소양인이 확실히 아니다. 태음인으로 접근....	291
소양인약으로 졸립고 취한 반응이 나오면 태음인일 가능성이 높다.	291
가래 기침 천식 등에 내상약인 갈근조위탕은 쓰지 않는다. 기침에는 외감과 관련있는 열다한 소탕에 행인 상백피 백과초 마황 대황등을 가한다.	291
조위승청탕을 잘 먹고 결과도 좋았으나 태음조위비염방 먹고 부작용이 많이 생긴 할머니 ·	291
소음인이 갈근조위탕 가감방을 먹고 복통 설사 등의 반응을 보인 예.	291
잘 못 자던 사람이 갈근조위탕을 먹고 잠이 너무 온다고 하면 매우 좋은 반응이다.	292
태음인이 청심연자탕 먹고 속이 불편한 것은 위장이 약해서 그런 것. 갈근조위탕으로 먼저 조리한다.	293
태음인 열증의 설사에 갈근조위가감방을 썼는데 설사를 지속하는 경우	294
류씨태음조위탕과 의인건비탕 비교. 류씨 태음조위탕은 태음병 소음병, 의인건비탕은 비기허에 쓴다.	295
태음인 청심연자탕증인데 대변이 변비 경향이라면? 갈근 승마로 청열하고 부족하면 대황을 가한다.	295
태음조위탕 드시고 대변이 시원치 않다면 열증일까요? 한열이 섞인 경우로서 갈근 승마를 가하거나 혹은 마황을 빼고 조습하는 건울을 1돈으로 내릴 수 있다. 생냉지물에 상한 것이 아니면 태음조위탕에서 마황을 빼도 무방하다.	296
사백산을 먹고 가스가 찬다고 하면--> 설사가 아니면 별 문제 없다.	296
갈근승기탕 먹고 소변이 붉게 나올 수 있을까요?	297
■ 변증별 처방정리	297
제1절 외감병변증	297
1.四時傷寒辨證	297
2.六經辨證	298
3.衛氣營血辨證	302
4.三焦辨證	304
제2절 內傷雜病辨證	306

1.臟腑辨證	306
2.陰陽氣血津液辨證	316
3.五邪辨證	321

■ 체질별 방제 324

태음인 방제	324
소양인 방제	331
태양인 방제	335
소음인 방제	338

■ 변증과 관련된 사항들

변증은 증상만으로 하는 것은 아니다. 변증의 중요한 원칙. 정황을 통해 접근하는 변증- 신허, 간, 심간혈증, 간음허증, 간양상항증.....

정황으로 때려잡는 경우가 더 많습니다. 예를 들어 노인이 허리가 잘 아프면 일단 신허를 생각합니다. 젊은 여자가 장기간 스트레스에 노출되어 피부가 안 좋아졌으면 간병을 생각합니다. 생리량이 현저히 줄거나 빈혈을 동반하면 심간혈증이 됩니다. 혈허증이 없으면 간음허증의 가능성이 가장 높습니다. 간음허가 장기간 계속된 후 상부로 열이 뜨게 되면 간양상항증입니다.

건강의 요소(잠과 음식이 결정적. 운동은 별로 중요치 않음)

- 1st 수면 : 무엇보다도 잠이 엄청 중요하다. 중간에 깨지 않고 7~8시간은 꼭 자야 한다.
- 2nd 음식
 - : 체질에 맞는 음식을 먹는 것이 정말 중요하다.
 - 예를 들어 당뇨병자 체질식으로 가려 먹으면 2~3개월 내에 당뇨 100% 좋아진다.
- 3rd 운동
 - : 사실 운동은 해도 되고 안 해도 된다.

얼굴과 몸의 체형이 다를 경우 어떻게 해석해야 합니까?

얼굴을 보면서 양인이겠구나 생각했다가 체형을 보면서 당황할 때가 있습니다.

한 성격 할 거 같은 눈매에 빠른 말투, 빠르고 빈틈없는 일처리 작은 입술....

그러다가 체형을 보면 작고 동그랗고 처진 어깨에 큰 골반과 둔부 (여성입니다.) 운동하고 움직이기 싫어하는 성격. 진료받으러 온 사람이 아니라 사진은 없고요, 요즘 주변사람들 보면서 무슨 체질일까 나름 생각해보고 있는데 이럴 경우 어떻게 해석하고 어디에 더 초점을 맞춰 관찰해야 할지 모르겠습니다. 조언 부탁드립니다.

안준철

어차피 체질을 알고 보면 얼굴과 체형이 맞아 들어가고...체질감별이 잘 안되면 얼굴과 체형이 매치가 안 됩니다. 예를 들면 얼굴은 소양인 같은데 체형은 소음인 같아 보이지만...나중에 알고 보면 태양인으로 확인되는 경우가 많습니다.

얼굴이 헛갈리면 체형을 기준으로 하시고 체형이 헛갈리면 얼굴을 기준으로 합니다. 습득하는

데 시간이 많이 걸립니다. 시간이 많이 걸리는 것 역시 동양학문의 특징입니다. 체질감별에 왕도가 없는 거 같습니다. 시간이 흐르고 경험이 축적되는 수밖에 없습니다.

어떤 외모를 보고 무슨 체질이라고 생각하면 안 됩니다. 어떤 외모를 보고 최소한 <무슨 체질은 아니겠구나>하는 생각을 가져야 됩니다. 체질은 4개뿐이고 3개를 배제하면 감별이 되는 겁니다.

상황보음 vs 정심보음(맥으로 구분이 안 되는 양형과 음형의 구분은 커피반응으로 대신한다.)

두 처방 공통으로 상황, 여정실, 저실자, 지부자, 오미자, 상심자가 들어가고 흑두와 사삼과 군약이 상황이나 여정실이나 의 차이가 있네요. 이번에 허리수술을 2회하시고 허리가 자꾸 구부러지고 발 저림, 변비, 소변삭, 수족냉증은 없는 허증으로 볼 수 있는 태음인 할머니(몸집이 있으신 분)둘 중 하나를 처방하려고 했습니다.

양형인지 음형인지 구분하기 위해 맥을 보았는데 맥이 침맥수준이라 촌인지 척인지 거의 구분이 안 되었습니다. 맥으로 구분이 안 될 때는 어떤 식으로 접근을 해야 좋은지 조언부탁드립니다. 결과발표에 보면 음형에 청열약물이 더 들어간 걸로 알고 있습니다.

그렇다면 증상이 기본적인 신허증에 열증의 다소로서 처방을 골라야 하는 건가요?

두 처방의 적응증들에 대해 알고 싶습니다.

안준철

한열을 불문하고 음허하면 커피에 불면 반응이 있습니다. 커피에 불면이 있었으면 음형입니다. 음형처방은 보음하는 약과 청열하는 약이 더 강화된 처방이라고 이해하면 됩니다. 사삼은 대표적인 보음약입니다. 사삼은 주로 음형처방에 많이 쓰이고 있습니다. 예)마황보폐탕=>양형, 사삼보폐탕=>음형

이때 음형 양형을 잘못 쓰면 마황으로 인해서 불면반응이 생깁니다.

동의수세보원 소음인편 간략 정리

• 三陽病과 三陰病

- 삼양병은 쉽게 말해서 열나는 병이다. (열을 식혀야 한다)
 - : 망양은 땀이 나서 탈수로 죽는 병이다.
 - : 울광은 대변이 나오지 않아서 자가 중독을 일으키는 병이다.(대변 자가 중독증)
- 삼음병은 쉽게 말해서 배가 차서 설사하는 병이다. (배를 데워야 한다)
 - : 설사를 많이 해서 탈수로 죽어가는데 이것을 어떻게 해결하는 것이냐를 논한 것이다.

• 亡陽

- : 땀이 엄청 나서 피부로 탈수가 되어 전해질 불균형으로 인해 죽어가는 것.
- 망양 초증 : 피부에서 땀이 엄청나고 있다 → 황기로 땀을 막자 → 황기계지탕
- 망양 중증 : 황기계지탕으로 땀이 멈추지 않는다 → 인삼 → 보중익기탕, 승양익기탕(자한 + 변비)

- 망양 말증 : 탈수로 소변까지 안나오는 것 (小便赤澀) - 부자를 써야 한다 - 승양익기부자탕
 : 부자 - 氣化 시켜 소변이 나가게 한다.

• 三陰病

: 설사로 인한 탈수로 전해질 불균형으로 인해 죽어가는 것.

- 태음병 설사 : 밥 잘먹는다 (口中和) → 덜위험하다 → 백하오이중탕(설사만)
 백하오부자이중탕(설사 + 소변적삽)

- 소음병 설사 : 밥 잘못먹는다 (口中不和) → 위험하다 → 관계부자이중탕
 : 총체적 난국
 (설사 + 입맛 없고 + 땀 + 소변적삽)

* 땀 - 官桂와 인삼 다량 사용(열 식혀야 함)

- 궤음병 설사 : 음양분리 상황. 極冷과 極熱 동반 → 죽기 일보직전 → 오수유부자이중탕
 손발은 차갑고 두통과 發熱
 (발열-생존을 위한 최후의 발악)

cf. 궤음병은 실체가 잘 없다.

• 鬱狂

: 대변자가중독증

- 울광 초증 : 천궁계지탕 (울광 초증에는 천궁으로 피부를 열어 땀이 살짝 나게 한다)
 - 울광 중증 : 팔물군자탕 (소음인의 승기탕. 백작약 당귀 천궁으로 윤장시켜 통변)
 → 그래도 대변 안나오면 독삼팔물군자탕 (인삼으로 더 열을 꺼서 통변시키려함)
 → 그래도 안되면 파두단

• 誤治

: 평소에 태생적으로 대변을 못보고 있었는데 의사가 오치로 발한 시켜(마황) 대변을 더 못보게 된 것. 즉 망양 + 울광.

- 승양익기탕. 승양익기부자탕(소변적삽)

한열구분 문진 tip(각 체질에서의 한열, 음형 양형의 판단요령)

소음인 `소양인` 태양인은 한증이 아니냐라는 식으로 끊임없이 추궁하고 유도신문해야 하고, 태음인은 열증이 아니냐는 식으로 몰아가야 한다.

소음인 `태양인`은 한자 월등이 많고, 태음인은 열자가 많다.

	寒者	熱者	비고
소음인	위가 약하다. 편식도 있다.	위가 좋고 잘 먹는다.	쉽다.

	조금만 과식해도 탈난다. 항상 음식 조심해서 먹는다. 한증이라도 대변 2~3일에 한 번 보는 사람이 많다.	살도 찌고 덩치도 좋다. 많이 먹어서 장이 탈나서 문제지 위장이 나빠서 못먹지는 않는다. 엄청 잘 먹고 체하는 법이 없다.	위장상태만 파악하면 끝. <질문법> 과거에는 어땠나? 많이 먹어도 탈 없나?
태양인	(∴) 먹는 양이 적기 때문 소화 ` 식욕을 집중 추궁해서 조금이라도 멈칫 하면 다 寒者		
소양인	상복부 (心口)에 가스가 찬다. (위산이 모자라서 이상 발효) *예외 - 식초 `올리고당` 콩식품 먹는 사람은 다 가스 찬다.	상복부 과식을 해도 가스가 차지 않고, 속이 쓰리거나 아프거나 등등	소양인은 寒者 熱者가 대변이랑 전혀 관계 없다. 오히려 寒者에 변비가 더 많다. <질문법> 많이 먹으면 윗배에 가스 차지 않느냐?
태음인	대변 횟수 하루에 1번 이상. 변비 과거력 없음. 커피 많이 마셔도 수면과 관계 없음	대변 하루에 1번 이하. (ex. 일주일에 5번. 3일에 2번 등) 변비 과거력 있음 (과거에 1번이라도) 커피 마시면 잠을 못자거나 잠자리에 드는 시간이 늘어남 (과거에 1번이라도)	수세보원 처방과 안준철선생님 처방 사용시

cf. 태음인 류주열 선생님 처방 사용시 寒者 熱者 陽形 陰刑 구분

	寒熱	대변 횟수		커피 반응 (= 마항 반응)	비고
태음인	寒者	대변 횟수 하루에 1번 이상. 변비 과거력 없음.	陽形	커피 많이 마셔도 수면과 관계 없음	양형처방
			陰刑	커피 마시면 잠을 못자거나 잠자리에 드는 시간이 늘어남 (과거에 1번이라도)	음형처방
	熱者	대변 하루에 1번 이하. (ex. 일주일에 5번. 3일에 2번 등) 변비 과거력 있음 (과거에 1번이라도)	陽形	커피 많이 마셔도 수면과 관계 없음	양형처방
			陰刑	커피 마시면 잠을 못자거나 잠자리에 드는 시간이 늘어남 (과거에 1번이라도)	음형처방

* 위와 같지만 대변 매일 보고 변비 과거력 없고 커피에 불면이지만 열자인 경우가 많다.

心병증 肝병증 膽병증의 차이(간병에는 불면이 없다. 심병은 소변과 땀에서 이상이 생긴다. 심담은 공통적으로 불면이 있다. 간은 눈(현훈 안화 야맹), 근(쥐내림, 근육경련, 안면경련), 손톱(갈라짐, 푸석푸석)에 문제가 있다.

간병증은 불면이 오지않습니다. (불면이 오더라도 약하고 주증이 아니고 차증이 됩니다.)

심병증이나 담병증은 불면이 생기게 됩니다.(심담허겁)

심병증과 담병증은 모두 불면이 오지만 便汗에서 차이를 보입니다.

즉 심병은 소변과 땀에서 문제를 나타내지만 담병은 소변과 땀에서 문제를 일으키지 않습니다.

心主便汗(동의보감) :심병은 소변이 붉어지거나 도한이 나거나 얼굴이 붉어지면서 헛땀이 나는 증상을 나타냅니다.

肝心膽의 공통점은 화열이 생기면 口苦 즉 입이 쓰게게됩니다.(입이 쓴 증상은 간심담에서 열이 생기면 나타나는 공통된 증상입니다.)

정리하면 심담은 불면이 오는데 便汗이 문제가되면 심병이고 便汗에 문제가 없으면 담병입니다. 간병은 잠은 대체로 잘 자지만 눈(眩暈 眼花 야맹), 筋(전근 쥐내림 근육경련 안면경련), 손톱(손톱이 갈라진다. 푸석푸석해진다.) 등의 부위에서 증상이 나타납니다.

그리고 심간담병은 변증을 통해서도 따지지만 원인으로 유추해서 변증합니다. 즉 극심한 스트레스후에 잠을 못자면 심 또는 담병이고 잠을 잘 자면 간병입니다.

잠을 못자면서 소변이 붉고 헛땀이 난다면 심병증입니다. 잠을 못자면서 소변이 정상이면 담병증입니다.

심과 간은 같은 血分の 장기이고 간담은 표리장기이면 심담은 상통하는 장부입니다.

그래서 간기울결에서 출발한 간열이 심열로 또는 담열로 이행하고 다양한 증상이 발현됩니다.

심간이 함께 문제면 두 혈장기의 문제이고 심간혈허 등의 증상으로 이행됩니다.

혈허는 심과 간에서만 문제가 됩니다.

膽은 痰熱과 痰飲이 문제입니다.

청정지부인 膽은 痰飲에의해서 膽鬱痰擾證이 됩니다.

간은 칠정과 혈의 문제의 출발이 되어서 가장 중요하고 변증의 빈도가 높은 장기입니다.

그 다음은 간이 비를 압박하는 문제도 생각해 볼 수 있습니다.

점점 간이 중요해집니다.

간담의 공통점은 울체가 오고

간심의 공통점은 혈병이 오게됩니다.

심담의 공통점은 담음에 의해서 문제가 된다는 사실입니다. (담미심규,담울담요증)

소증에 근거한 한열도 체질이다.(안선생님의 한열개념과 류선생님의 한열개념의 미묘한 차이)

사상의학의 가장 큰 특징은 체질을 가려놓고 병증을 본다는 것이라고 하겠습니다.

체질 그 다음은 한열을 가리는 것인데여기에서의 한열이란 소증의 한열을 말합니다.

소증의 한열이란 일평생 변하지 않는 것을 말합니다.

즉 병이 발생되기전의 증을 말하는 것이고 이것은 일평생 변하지 않습니다.

소증의 한열도 체질이라고 말할 수 있습니다. 왜냐하면 체질이 평생 변하지 않는 것과 마찬가지로 지이기 때문입니다. 물론 소증이 열증인 사람은 현증도 열증으로 갈 가능성이 많습니다.

소증이 한증인 사람은 현증이 한증으로 나타날 가능성이 많습니다.

한열이 협작된 경우는 소증을 다스리는 처방에 현증을 제거하는 가미가 이루어져야됩니다.

그럼 사상의학이 아니라 팔체질의학이라고 생각할 수도 있습니다만 아무리 소증이 변하지 않아도 현증은 한열을 넘나들기 때문에 사상인것이죠. 즉 네개의 필드에서 사건이 이뤄지고 있다는 것입니다. 체질과 소증의 한열은 평생 변하지 않습니다. 그래서 한열도 체질이라고 말할 수도 있습니다. 한열의 중요성에 대해서 정리해 봤습니다.

정용재

강의 들으신 분들은 소증의 중요성과 힘을 충분히 실감하시리라 생각합니다. 백분 공감되는 내용입니다. 그런데 마지막 문장에서 소증(타고난 한열)이 체질인 이유로 '변하지 않기 때문'이라 하셨는데, 이 부분은 퍼뜩 와닿지가 않네요? 뭔가 뒤가 개운치 않는데, 뭔지 모르겠습니다. 제가 뭐 땀에 헛갈려 하는지 누가 설명 좀...^^;;

안준철

소증의 한열은 변하지 않고 현증만 변한다는 뜻입니다. 그래서 요즘은 유주열 선생님은 소증의 한증을 寒者 소증의 열증을 熱者라고 표현을 하시고 계십니다. 즉 한자 열자는 소증의 한열을 의미하는 용어가 되겠습니다.

정용재

한열의 소증은 변치 않으나 현증은 변한다고 한다면, 한열은 변하는 중 변하지 않는 것이 있다고 결론내려야 하지 않을까요? 그러므로 한열이 평생 변하지 않는다고 말씀하시는 건 다소 비약이 아닌가 생각되지만....^^;;

안준철

건강한 상태의 증상을 소증이라고 표현합니다. 병이 오기 전의 편향을 말하는 것입니다.(인간은 병이 오기 전에도 병적이고 한열의 편향성을 가집니다.) 변하는 중 변하지 않는 것이 있다는 말도 맞습니다. 그러나 우리는 처방을 찾아야되고 그 순서는 체질 다음에 소증의 한열이 된다는 뜻입니다. 평생 변하지 않는 것을 변하지 않는다고 말하면 오류인가요? 우리는 인간의 문제를 해결해야 한다는 전제를 확실히 해야겠습니다. 문제 해결의 순서와 중요도를 말하는 것이지요.

만약 변화하는 것을 위주로 하고 소증을 뒤로 한다면 그것은 증치의학과 다름없고 사상의학의 가장 큰 강점을 살리지 못하는 것입니다. 그래서 체질 다음은 무조건 소증의 한열을 따지

는 것입니다. 체질은 알고 소증의 한열을 가리지 못하면 오치할 확률은 매우 높아집니다.
체질은 정확한데 소증의 한열을 정확히 가리지 못하면 처방은 현증을 보고 쓰게될 것이고 현
증을 보고 처방한다는 것은 인체의 숨겨진 이면을 보지 못하고 처방을 하는 결과가 됩니다.
현증을 소홀히 할 수 없지만 소증을 전제로 하지 않으면 매우 위험해 집니다.

정용재

자상한 가르침 감사합니다. 깊게 새기겠습니다.

송재한

유주열 원장님의 "새로 쓴 사상의학"에 보면 寒 熱을 간단하게 서술한 것 같습니다. 예를 들면
변비자는 열자, 변연자는 한자 식으로요. 그래서 소증과 현증의 구분에 대하여 엄격하지 않음
을 느꼈습니다. 다만 변증시 열증계열과 한증계열을 구분하여 놓았지만 변증은 현증의 반영일
텐데 약간 의구심이 들더군요. 강의하신다니까 거기에 대한 언급이 있으리라 생각이 듭니다.

김태규

"새로 쓴 사상의학" 에서 한열에 대해 간단하게 서술하셨다고 하셨는데, 242 페이지 부터 10
여 페이지 가까이 한열 변증에 대해서 자세하게 설명하고 계시네요. 류주열 선생님은 변증 중
에서도 한열변증을 가장 중요하게 생각하시고, 처방에서의 열증계열 한증계열도 모두 소증의
한열을 얘기 하시는 걸로 알고 있습니다.

송재한

간단하다는 말은 서술이 간단하다는 말씀이 아닙니다. 예로 소양인 소화 안 되고(가스찬다) 변
비자에 구견이 있고 수족에 땀이 있다면 유주열 선생은 소양인 열자로 봅니다. 안선생님은 소
양인 한자로 보고요. 키는 소화에 가스여부가 한열에 근거가 되는데 반하여 제반증에 열증이
우세하면 유선생님은 열자로 본다는 말씀입니다. 이 차이가 처방에 어떤 영향을 주는지는 논
외입니다.

오현우

저는 소증의 한열이 조금 마음에 걸리는 부분이 유전에 있다고 봅니다. 체질은 유전이 되어야
그 유의성이 있다고 보는데, 한열의 소증이 유전이 안 된다면 언제, 왜 결정되는지가 굉장히
궁금합니다.

남자 안면홍조를 간양상항으로 볼 수도 있겠다.

체질판단에 있어서 약 반응이 외모, 체격에 근거한 판단보다 우선한다.

외모와 체질이 아무리 태음인이라도 약 반응이 우선입니다.

누가 뭐라고 해도 약이 들어야 그 체질입니다. 태음인 약에 부작용이 있으면 태음인이 아니
죠.

비염과 생리통이 공존할 때 치병순서(병의 근본을 치료하는 것이 원칙이나 표증이 급하면 표
병을 먼저 치료한다)

비염과 생리통이 공존할 때 무엇을 먼저 치료해야 하는지에 대한 질문

안준철

병의 근본을 치료하는 것이 원칙이나 표증이 급하면 표병을 먼저 치료합니다. 생리통과 비염은 직접적인 인과관계가 없어 보입니다. 환자가 원하는 증상을 먼저 해결하는 것이 좋겠습니다. 저의 경우 생리통 치료가 더 어렵습니다. 대체로 반응이 빠른 비염을 먼저 시도해보시고 생리통은 시간을 가지고 치료하는 것이 좋겠습니다. 생리는 한 달에 한번 문제가 되고 치료반응도 한 달을 기다려야 되기 때문입니다.

간병을 판단하는 기준들(눈 침침, 손톱푸석, 쥐내림, 빈혈은 간병증)

유주열 선생님의 간기울경에 나오는 현호색소간탕이나 당삼소간탕을 쓰면 좋겠습니다. 마르고 체력이 약한 편이라서 당삼소간탕이 더 좋을듯 합니다. 눈이 침침하고 빈혈증상이나 어지럼증 사진전근(쥐내림) 손톱에 핏기가 없어서 분홍색이 아니고 하얗게 뵈으면 혈허로 보고 계혈등보간탕으로 보혈하는 것이 좋겠습니다. 보간탕 계열은 반드시 혈허(빈혈)을 확인하시고 소간탕 계열은 간의 증상(눈 손톱 근육경련)을 확인하고 쓰셔야 됩니다.

안면경련이 심하셨다고 알고 있습니다. 기본적으로 간병증상은 틀림이 없습니다. 소간탕류가 효과적일 것으로 보입니다. 그러나 명백한 혈허증이 있으면 보간탕류를 먼저 써야됩니다. 안면경련이나 근육경련(쥐내림)은 간증상의 대표증상입니다. 눈에 별이 보이는 것...손톱이 푸석푸석하거나 손톱이 파이는 증상(스폰네일)도 역시 간병증의 대표적 증상입니다. 즉 간증상은 눈 손톱 근육으로 옵니다.

여타증상이 열증이라도 배변을 하루에 한 번 이상 하면 소증은 한증. 단 현증이 열증상이 심하면 마황이 들어간 처방은 쓰지 않는다.

선생님께서 누차 말씀하셨듯이..대변횟수가 하루 평균 1회 이하면 열자라고 기준잡고 있습니다. 과거에 변비 경력이 있어도 열자이구요..대변을 매일 본다고 하더라도 배변 시간이 길거나 변이 단단하면 열자일 가능성이 높구요..

오늘 문의할 내용은..변비 경력도 없고, 대변도 쉽게 잘 보는데..

얼굴이 벌겋고, 땀을 많이 흘리고, 더위 많이 타고, 손발 따뜻한 사람이 간혹 있는데, 이 경우가 궁금합니다.

이런 사람들 자기는 열이 많아서 더운데 못 간다고 합니다...

대개 배나온 아저씨들이 이런 경우가 있는데요..

대변을 제외한 나머지가 거의 열자의 소증을 보인다면, 어떻게 판단해야 할까요?

만약 테스트약을 쓴다면, 갈근조위탕을 먼저 써야 할까요, 태음조위탕을 먼저 써야 할까요?

안준철

다른 증상을 보면 아무리 열증이라고 하더라도 대변을 하루에 한번 이상 보면 한자입니다. 갈

증이나 얼굴이 붉거나 땀이 많은 증상도 모두 현재의 증상에 지나지 않습니다. 소증과는 무관합니다. 소증의 한열은 대변이 유일한 기준이 됩니다.

위의 경우 모든 증상이 열증이지만 대변이 한증의 기준에 맞다면 소증은 한증입니다.(물론 현증은 열증입니다.) 그러나 한증이라고 하더라도 태음조위탕에 부적합 반응을 보이는 사람도 있습니다. 음허하거나 열이 있는 사람이 여기에 해당합니다.(마황의 부작용입니다. 한자도 마황에 부작용을 보이는 사람이 있습니다. 이때는 마황이 들어있는 태음조위탕을 쓸 수 없습니다.)

노인분들 변증할 때 주의점(40세가 넘으면 신허가 시작되므로 노인은 기본적으로 신허를 깔고 있고 한열판단에는 왕도가 없다)

연세 드신 분들은 체형이나 얼굴형태가 젊어서와는 많이 달라져서 우선 체질 판별이 어려운 경우가 많은 것 같습니다. 비쩍 마른 분이라도 문진을 하다보면 예전에는 아주 뚱뚱했었다고 하는 경우도 있고, 눈꼬리도 대개 처지는 것 같고.. 팔다리는 대개 얇아지고, 배쪽으로 살이 붙는 경우가 많고..연세 드신 분들 체질 감별에서 중요하게 봐야 할 점은 무엇일까요?

한열 변증이 또한 어려운 것 같습니다. 한자의 경우 젊어서는 대변을 잘 보다가도 입맛 떨어지고 식사량 줄면 대변을 거르기도 하는 것 같습니다만...

노인에 있어서도 매일 대변 보는 것이 확실한 기준이 되는지 궁금합니다.

소양인 열자의 경우에도 노인분들은 가스차는 것을 어떻게 문진할 지도 어려운 것 같습니다. 장부 변증에 있어서도 참고할 만한 내용이 있으면 부탁드립니다. 최근 노인 분들 약쓰고 사이드가 많이 나네요..

안준철

노인들은 기억력 감퇴 요슬통 어지럼증 등 신허가 기본적으로 깔려있다고 생각하면 됩니다. 40살이 넘으면 신허가 시작됩니다. 체질과 한열을 가리는 데는 왕도가 없습니다. 재주껏 가려야 됩니다. 3-4년 정도의 트레이닝이 필요한 거 같습니다. 태음인의 경우 음식을 적게 먹거나 굶어서 대변을 못 보면 열자라고 할 수 없습니다. 커피의 불면반응도 함께 찾아보시면 더 도움이 됩니다.

소양인의 경우 가스 차는지의 여부는 상복부의 문제입니다. 양방적으로 말하면 위산부족증입니다. 위산이 부족하면 정상적인 소화가 되지 않고 발효가 일어나서 상복부에 가스가 차게 됩니다. 가스가 잘 차는 한증도 소식을 하면 가스가 차지 않습니다. 열증도 두부나 콩 탄산음료 올리고당 식초 등을 많이 먹으면 가스가 잡니다. ==>이것은 음식에서 가스가 발생하는 경우입니다. 장에 가스가 차는 건 한열과 무관합니다.

그래서 소양인에게는 과식하면 가스가 윗배에 잘 차는지...헛배가 잘 부르지 확인하면 됩니다. 숙련되면 매우 쉽습니다. 참고로 소양인은 한자가 열자보다 더 많습니다. 태음인은 열자가 더 많습니다.

소음인과 태양인 감별하는 팁(체형상 다리비율/코끝방울의 모양/눈빛)

한의원에서 소음인 보기가 어려워서 그런지....제가 잘 몰라서 그런지
저는 태양인과 소음인 구분이 쉽지가 않더라고요..
선생님들~^^;;..... 태양인과 소음인 구분하는 방법 좀 알려주세요.
체형 얼굴 등등 감사 드립니다...^^,, ㅎㅎ

하만종

이거 참 말로 설명하기가 쉽지 않은 문제 같아요. 일단은 둘 다 신국이 발달해 보이는 경우라는 전제가 있어야 되겠구요. 굳이 제가 보는 포인트를 잡자면 1. 체형상 다리길이비율 / 2. 코끝방울의 모양 / 3. 눈빛인 것 같습니다.
코끝모양이 태양인이 아래로 떨어지는 모양이라면(그래서 휘어보일 때도 있죠), 소음인코끝은 보다 더 옆으로 유여하게 자리잡는 것 같습니다.
그리고 태양인은 확실히 머리가 큼니다. 머리 크기랑 다리길이랑 비율을 잡으시고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 얼마 전에 김태희가 작은 키에도 8등신이라는 분석사진을 본 적이 있습니다;; 소음인은 신국이 길어서 머리가 커 보이는 경우도, 하체에 비하면 작은 편이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다.

약을 먹고 피부가 건조해지는 것으로 처방의 적합성여부를 판단할 수 없다. 계절적원인.
대소변, 수면, 피로감으로 적합성 판단. 한열판단이 중요.

가을겨울철에 약을 먹고 피부가 많이 건조해지네요.

안준철

요즘 계절에 의한 문제인거 같습니다. 건조한 환절기의 문제 같습니다. 이런 경우 대소변 수변 피로감 등을 살펴서 약물의 적합 부적합을 확인하면 됩니다.

김상인

그냥 지나가다가...^^;;...다 아시는 내용이지만...(일단 안선생님께서 말씀하신 것을 기본으로..).

1. 체질 `한자` 열자 다시 체크해 보시면 어떨까요?

<개인적 경험>제 아버님 태음인. 이제까지 변 잘 보신다고 하셔서 한자로 보고 신양허 처방 위주로 많이 드렸지요.

약 먹으면 먹을 수록 자꾸 몸이 가렵다고 하셔서 한열 체크 다시 하니까 예전에 한 번씩 대변 거르시기도 하셨다고 하시네요..열자로 바뀌서 처방 한 후 문제 없습니다..

2. 변증을 다시 한 번 체크해 보심이 어떠실까요?

실증(식적 `습` 심화 등등)에 보하는 경우, 기허증에 혈약 주는 경우(붓는다) 등등이 사이드 있다고 강의때 배웠던 것 같습니다.

(안준철)

좋은 말씀입니다. 한열이 맞지 않으면 당연히 내열이 조성되고 그 결과 불면 심계 구갈 피부 건조 피부소양 등이 나타날 수 있습니다. 체질과 한열은 항상 전제로 합니다. 항상 체질에 맞는지 한열에 맞는지를 확인하는 습관을 가져야 됩니다.

양형, 음형 구별법(촌맥과 척맥의 강도로 구별. 척맥은 음허경향을 의미)

기초질문란이라서 이런 질문도 드려도 될 것 같은데...좀 가르쳐주세요

태음인 간화상염증에 처방이 2개 있잖아요. 갈근청간탕이랑 하고초청간탕이요

그럼 앞의 것은 양형처방이고 뒤의 것은 음형처방이죠?

그러면 양형과 음형은 어떻게 구분하는거죠? 전에 안준철선생님 임상결과발표하신데 보면 척맥이 강하게 뛰어서 음형처방을 주셨다는 것을 보았습니다.

맥으로 촌맥과 척맥을 비교하는 것이지요? 다른 처방보면 태음인 한자 처방에도 연자보간탕, 여정자보간탕이 함께 있는데, 이것도 앞의 것이 양형, 뒤의 것이 음형처방이죠?

궁금합니다.

안준철

음형처방은 양형에 비해서 보음하는 약물이나 청열하는 약이 더 보강되어 있습니다. 즉 음형은 양형에 비해서 음허하거나 음허로 인한 열이 좀 있어서 열을 꺼야하는 사람이라고 생각하면 됩니다. 음허하면 척맥이 강하게 뛰고 음허가 없으면 척맥이 안정되게 된다는 사실에서...관맥을 잡아서 촌맥쪽이 더 강하면 양형처방을 쓰게 되고...관맥을 잡아서 척맥쪽이 더 강하면 양형처방을 쓰게 됩니다.

노인은 어린이에 비해서 상대적으로 더 음허하게 됩니다. 그러므로 나이가 더 들수록 척맥이 더 강하게 뛰게 되고 음허를 보여줍니다. 그러므로 노인은 음형처방을 쓸 가능성이 더 많습니다. 어린이는 양형처방을 쓸 가능성이 더 많습니다. 이 문제는 태음인 처방에서만 해당하는 이야기입니다. 다른 체질은 음형 양형을 가릴 필요가 없습니다.

寒者는 간기울결, 熱者는 간양상항.

질문이 조금 두리뭉실해서 죄송합니다.

간기울결이 보통 한자에게 적용이 되는데요,

열자가 간기울결 증상을 가지면 간음허증이 되는지요?

예전에 간기범위 증상에서도 열자면 위음허증으로 갔던 것 같은데요...

고건 부탁드립니다. 감사합니다.

안준철

열증에게 간병증은 간음허를 기본적으로 깔고 있다고 생각하면 됩니다. 즉 간병증에서 열증은 기본적으로 간음허가 있는 상태에서 간양상항으로 진행됩니다. 즉 한증의 경우 간기울결이 되는 상황에서...열증은 이미 간양상항으로 진행됩니다. 다시 말하면 한증이 간기울결증 약을 써야 될 상황이라며 열증은 간양상항증 약을 써야 된다고 생각하면 됩니다.

비병은 소화장애 더부룩함 위병은 통증. 소증이 열증이라도 생냉지물에 상해 寒이 문제가 되면 먼저 그것을 해결하고 다음에 소증을 다룬다.

복통은 비병이 아니고 위병입니다. 비병은 복통은 문제가 되지 않고 소화장애나 더부룩함이 주로 문제가 됩니다.(비병은 운화지기의 문제입니다.) 출발부터 순조롭습니다. 표본완급에서 급하면 현증을 보고 당장 문제가 되는 상황을 해결합니다. 소증이 열증이라도 생냉지물에 상한 한이 문제가 되면 한을 다스리게 되고...급한 불이 꺼졌으면 그 환자가 가지고 있는 본래의 문제(소증)을 보고 다스려 나갑니다. 매우 적절한 시점에 적절한 약물이 쓰여졌다고 보여집니다.

식적은 대체로 한증으로 오지만 열이 발생되므로 열증약을 가미한다. 열증이 위장의 불편을 호소하면 비음허 혹은 위음허로 접근한다.

팔강변증을 구분할 때

- 외감, 내상 -
- 식적, 어혈, 담음 -
- 풍, 한, 습 -
- 오장육부변증 -

대략 이런 순서로 접근하려 노력하고 있습니다. 류샘책에 보면 대부분 위의 변증에서 한열별로 처방이 구분되는데, 식적처방은 한자만(태조가감, 독지가감등) 언급된 것 같습니다(350페이지). 물론 우리에게겐 갈근조위탕이 있지만, 왜 식적처방은 한열의 구분을 두지 않으셨는지요? 제가 책과 강의내용을 숙지하지 못하여, 이런 질문을 드리는 것 같습니다. 감사합니다.

안준철

팔강변증을 하고난 후에 오장변증이나 오사변증(풍열습조한) 또는 음양기혈변증(담음 어혈)을 합니다. 이것을 차서변증이라고 합니다. 즉 팔강을 먼저 가린 후에 다시 한 번 더 변증하는 걸 말합니다.

식적은 그 자체로 열입니다. 체하면 열이 자동으로 발생합니다. 그래서 한증약을 쓰더라도 반듯이 열증약이 가미됩니다. 소양인은 황련 태음인은 대황 등이 가미됩니다. 한증약에 가미가 되지만 한열이 협작된 상태이고 처방 역시 한증약에 열증약을 가미해서 씁니다.

일단 열증은 식적이 잘 발생되지 않는다고 생각하면 됩니다. 만약 열증이 위장의 불편을 호소하면 비음허나 위음허로 접근한다고 생각하면 됩니다.

하만종

칠정상은 간심담, 식적은 비위와 연계하여 이해하겠습니다. 감사합니다.

심비기허증과 心脾兩虛證의 차이(심비기허는 심기허와 비기허 공존, 심비양허는 비기허와 혈허의 공존)

류샘 노트에 보면 아이들 신경과 어른들 신경질환에서 처방이 같기도 하고 다르기도 합니다
스트레스나 심리적 문제가 결국 소화기에 영향을 끼친 걸로 이해하면 될까요?
한증으로 봐야겠지요? 크게 봐서는 다 같은 걸로 봐야할까요? 감사합니다

안준철

심비기허증이나 심비양허증이나 모두 한증이라는 공통점이 있습니다. 그리고 심비기허는 심기허에 비기허증이 첨가된 증상입니다. 즉 심계 불면 등의 심장증상에 밥을 잘 안 먹는 비기허 증상이 추가로 있는 경우입니다. 그래서 심기허에 쓰이는 보심탕에 비기허에 쓰이는 보비하는 약물이 가미되어 있습니다.

심비兩허증은 기혈이 모두 허한 경우입니다.(氣血兩虛증입니다.) 즉 기허해서 소화 안 되고 밥 잘 안 먹고 혈허해서 빈혈기가 있는 경우입니다. 결론적으로 기허와 혈허가 동반된 경우입니다. 심비기허는 심허증에 비허증이 겹쳐있어서 심기허증처방에 비를 보하는 약물을 가합니다. 심비양허증은 밥도 안 먹고 혈색도 없는 경우입니다. 그래서 기혈양허에 쓰이는 처방을 씁니다. 결과적으로 심비기허증은 보심하는 처방에 가미하고 심비양허증은 기혈양허에 쓰이는 원방을 쓴다고 생각하시면 됩니다. 심비기허는 심기허+비기허...심비양허는 기혈양허로 기억하면 좋겠습니다.

윤승일

P72 소아의 주의력결핍 장애에서는 심비기허증인데 보심탕 대신에 양혈탕으로 나와있습니다. 예외적 조항으로 보면 될까요? 심비기허증-말을 많이 하고 많이 움직이는데 불면증 있거나 수면불안 있으며 얼굴이 누르스름하고 윤기가 없거나 희끄무레하고 소화가 안되고 나른하고 기운이 없으며 입술이 연하다. 설질은 담하고 치흔이 있다. 처방이 연자양혈탕(단삼양혈탕+석창포) 복신보심탕+구기자모려분 백하오양혈탕+진주모 가감귀비탕

안준철

기혈양허증에 해당한다고 이해 하시면 됩니다.

태음인 소증 한열과 현증에 대한 질문(소증이 한증경향이면서 현증으로 열증이 있어보이면 한자의 음형처방을 써보고 반응을 본다)

태음인 소화 잘 안되고 어깨 아프신 아주머니.....

선생님께서 태음인으로 판정해주셨는데요..제가 변증은 기허로 인해서 소화가 안 되는 걸로 파악해서 '중허기체증 (비허기체증)'으로 변증했습니다.

얼굴색도 희고 입맛이 없다고 하고 자기양보다 조금 더 먹어도 소화 안 된다고 하고 자꾸 피곤하다고 하고 나이도 있고 해서 소화 안 되는 것을 비허기체증으로 변증했습니다...

그런데 이 아주머니가 대변을 매일 꼬박꼬박 보기는 본다고 하고,

기억에는 한 번 정도 대변을 거른 적이 있다고 해서 한열이 애매한 상태입니다.

(커피는 안마십니다.)

제가 원래는 그래도 열증이겠지 해서 갈근조위탕 쓰려다가 류선생님 처방 한 번 써보려고 변증을 중허기체증으로 했는데....이 아주머니가 열증이라면 중허기체증 변증은 틀린 것이 아닐런지요? 열증이면 음허증으로 변증을 해야 하나요?

한증이라야만 중허기체증의 변증이 옳은 것일런지요?

고견 부탁드립니다. (처방에 관한 고견도 부탁드립니다)

안준철

이거 상당히 중요한 문제입니다. 한열이 명료하지 않아서 처방을 결정할 수 없는 상태입니다. 이 경우 류씨의 기준으로는 한증이 됩니다. 그래도 한열은 불분명합니다. 이때 류씨처방을 쓰려면 한자의 음형처방을 씁니다. 한자의 음형처방은 한자이면서 음허가 겹치고 열이 좀 있는 상태입니다. 즉 음형처방은 양형처방에 비해서 보음하는 약이나 청열약이 더 포함된 처방입니다. 그래서 한열이 애매하고 한증 같은데 열증의 증상도 보이면 한자의 음형처방을 씁니다. 이렇게 써보다가 증상의 호전은 있으나 변비가 된다거나 불면이 따르면 기능항진이 된 것이고 결론적으로 열증인 것이 드러나게 됩니다.

처음부터 한열이 명료하면 좋겠으나 이렇게 한열이 불분명하여 한자의 처방을 쓸 때는 음형처방을 먼저 써보는 것이 맞습니다. 물론 음형 양형은 맥으로 구분이 가능하나 맥으로도 불분명하면 일단 한자의 음형으로 접근합니다. 한자의 음형처방은 한자와 열자의 중간 정도라고 생각하면 됩니다만....이것은 제가 일단 요령으로 알려드리는 것이고 더 궁극의 문제가 있습니다. 시간을 가지고 충분한 설명해야될 것 같습니다. 좀 더 미묘한 문제가 있습니다.

만약 이분이 열증이라면 음허증으로 봐야됩니다. 열증이라고 알 수 있는 방법은 약을 써본 결과로 말하는 것이라서...이렇게 한열이 애매하면 초진은 어차피 완벽한 한열 구분이 어렵습니다.

김상인

넵...고견 정말 감사드립니다..어렵습니다...일단 처방으로 구분 하는 수밖에 없겠군요...일단은 갈근조위탕에다가 가미해서 처방해 보겠습니다..그럼 한열 구분이 어느 정도 되겠지요...

하만중

넵, 고견 정말 감사드립니다(2).. 저도 항상 궁금하고,치면 항시 애매했던 문제입니다. 제 부족한 소견으로 보면, 류씨는 변증마다 설진을 강조하시는 것 같습니다. 특히 애들같은 경우에, 한열이 애매할 때(아이는 잘 먹지 않거나 양약 달고 살아서, 변비되는 경우도 많다고 하셨습니다.) 설질이 담하면 한증으로 봐야한다고 하셨습니다.(물론 이 또한 주관적 판단으로 인한 개인차가 날 가능성이 충분하다고 생각하지만..) 뭐, 어쨌든 그렇습니다^.^;

간화상염은 급성적인 상황(火熱, 實證), 간양상항은 만성화된 것(陰虛에 清熱이 가미).

안준철

음허가 장기적으로 진행되면 양향이 생깁니다. 즉 간양상항은 간음허가 오래 진행된 경우입니다. 음이 닳고 말라서 양적으로 항진된 경우입니다. (만성적 경향)

간화상염은 갑작스런 경우에 해당합니다. 정신적충격 등으로 인해서 화가 치성해서 화열의 양상을 나타냅니다(급성의 경우). 그래서 간화상염은 약이 차고 강합니다. 반드시 실증입니다. 이에 반해 간양상항은 간음허가 오래된 경우라서 간음허를 보하는 약에다가 열을 끄는 약이 좀 가미됐다고 생각하면 됩니다.

간양상항은 음을 보하는 약에 양열을 사하는 약이 가미되어 있습니다. 간화상염은 급성적이고 실질적인 화열을 사하는 조금 강한 약으로 구성되어 있습니다.

양형처방과 음형처방을 쓰는 기준과 의미에 대하여(음형처방이 음허가 강하므로 나이가 있거나 슬관절 허리쪽에 문제가 있으면 음형처방을 쓸 가능성이 높다)

정용재

맥은 어려워서 저도 잘 적용 못하는데요, 그럴 때 쓸 수 있는 간단팁이라면 약물구성으로 봤을때 상초 증상 위주-> 앞 처방, 하초(보음) -> 뒤 처방으로 하시든지, 체질 속성으로 봤을때 평소 성격이 아주 둔함(목양의 특성) -> 앞 처방, 아주 예민(목음의 특성) -> 뒤 처방으로 하시든지.....그냥 팁...^^;; 그런데 너무 부담갖지 마시고 대충 쓰셔도 될듯....^^; 더! 잘났고 더! 깔끔하게 마무리하기 위해 뒷 처방이 있는 것이니...

사상맥법은 한쪽만 보셔도 됩니다. 확인차 양쪽을 다 보는지요. 그리고 장부배속과는 전혀 무관한 걸로 알고 있습니다.

전창환

장부배속과는 상관이 없지만 상하초 개념으로써 寸, 尺脈의 의미는 있는거네요? 고맙습니다!

안준철

전제로 알고 있어야될 몇 가지 사항이 있습니다. 어린이는 음이 성하고 나이가 들수록 음을 소모해서 음이 모두 고갈시키면 생명이 끝나게 됩니다. 그리고 음이 허해질수록 척맥 쪽에 현맥이 나타나게 됩니다. 그로 인해서 척맥이 강할수록 음허가 심하거나 열이 많다는 뜻입니다. 나이가 들고 몸이 더 허해질수록 뒷쪽 처방을 쓸 가능성이 높아지게 됩니다. 또 무릎 허리 등의 하초가 약해질수록 뒷쪽 처방을 쓸 가능성이 많아지게 됩니다.

그래서 뒷쪽 처방인 청열약이나 음허를 보하는 약이 더 들어가 있다고 생각하면 됩니다. 신허가 더 심하고 허열이 더 많다고 생각하면 됩니다. 병이 조금 더 깊다고 생각해도 상관없습니다. 여기에서도 몇가지 문제가 발생합니다. 앞 처방과 뒷 처방을 쓸 사람이 태생적이고 영원한 소증과 같은 문제인가? 아니면 나이가 들수록 척맥이 강해져서 뒷쪽 처방을 쓸 가능성이 많아지게 되는 건지? 몇 가지 정리가 필요합니다.

소양인 한열구분에서 상복부 가스차면서도 변비 있으면 한증? 열증?-->변비유무는 한열판단의 기준이 되지못함, 상복부 가스여부가 유일한 기준. 한증의 변비는 인동 연교를 가하거나 간기울결의 경우 결명자를 가해서 해결한다.

가스가 차고 속이 더부룩한데도 변비로 오랫동안 고생하는 경우
간혹 토끼똥도 쏘다 이런 경우는 한증으로 보나요?
독활지황탕을 쓰는 경우 변비가 더욱 심해질 수도 있는지요? 감사합니다

하만종

소양인이 상복부 가스감을 잘 느끼면, 한증입니다. 변비로 고생하는 경우, 심화로 인한 경우는 인동, 연교를 쓰시고, 간기울결로 인한 경우는 결명자를 쓰시면, 도움이 된다 하셨습니다. 안 선생님의 결명자를 쓰신 치험례는 <한줄메모장>에서 찾아보실 수 있네요~, 독지에 결명자를 3돈까지 가했다고 하셨습니다. 숙지황이 4돈으로 군약이므로, 4돈이상은 쓰지 않는 걸로 알고 있습니다~

(안준철)

태음인은 변비의 경우 열증인 경우가 거의 대부분입니다. 태음인의 경우 변비의 기왕력이 없으면 한증일 가능성이 높습니다. 그러나 소양인은 한증이 오히려 변비가 더 많고 열증이 설사를 더 잘하는 것이 관찰되었습니다. 한증이라는 건 숙지황 산수유가 잘 듣는 사람이라는 뜻이 되고 열증이란 생지황 지모 석고 등이 잘 듣는 사람을 의미한다고 할 수 있습니다.
그래서 소양인은 변비의 유무로 한열을 가리면 안 됩니다. 다른 체질은 한열 감별이 쉽지만 소양인은 정말로 어려웠습니다. 10여년 만에 소양인의 한열을 가리는 쉽고도 명쾌한 기준은 상복부의 가스가 잘 차는지가 관건이었습니다. 한증이 변비가 되는 것은 한에 열이 협한 것입니다. 땀 식욕 대소변 더위 타는 것 추위타는 것 등등 이 모든 것은 소증의 한열감별의 기준이 못됩니다.

肝病과 心病의 구분(분노, 어지러움, 전근, 손톱의 증상은 간병증/ 우울, 심계, 정충, 다몽, 불면, 불안 증상은 심병증)

肝病과 心病의 구분이 궁금합니다.

스트레스, 화병, 정신과 계통의 병들(七情傷)이 장부변증에서는肝病과 心病에 속하는 것 같은데요. 안선생님 강의 중에서도 소양인의 화를 肝火와 心火로 나누어 설명하셨는데요
그것을 구분하는 기준이 궁금합니다. 예를 들어 간혈허와 심혈허 증상이 비슷해 보이는데 어떻게 구분하는지 정확하게는 잘 모르겠습니다.

예전(2002년) 류주열 선생님 강의 때는 스트레스를 받았을때,
우울해지고 기운이 꺼라지고 하는 심약형이면 心病證!
짜증이 나고 화가 치밀어 오르고 하는 분노형이면 肝病證!
이렇게 구분한다고 하셨는데 요즘도 이렇게 구분하시는지
아니면 증상으로 구분을 해야하는지 궁금합니다.
가르침 부탁드립니다.

안준철

스트레스에 대해서 자아(에고)가 저항하는 상태가 간병이고 스트레스에 대해서 외면하는 상태가 심병이라고 표현합니다. 간병증은 저항하니까 열이 나고 위로 치켜오르고 공격성이 있습니다. 심병증은 외면하기 때문에 침착하고 안정적입니다. 그러나 심병증은 심계와 불면이 오고 체력이 약해보이고 무력해보입니다. 심병증은 약하고 불안해서 심계 불면이 옵니다.

간병증은 심계나 불면과는 거리가 멀게 됩니다. 얼굴이 붉어지고 갑자기 성질이 나는 것은 간병이고 심병이 아닙니다. 즉 심병은 혼자서 앓는 것이고 간병은 옆 사람에게 피해를 주게 되고 또 다른 사람에게 또 스트레스를 주게됩니다. 간병은 억울에서 출발하는 공격성이 있기 때문입니다. 간혈허는 어지럽고(눈의 증상) 팔다리에 전근(쥐내림, 근육의 증상) 그리고 손톱이 갈라지거나 잘 부러짐(손톱의 증상)이 문제가 됩니다. 심혈허는 심계 정충 다몽 건망 불안 등이 중요한 문제가 됩니다. 공통점은 둘 다 혈색이 없다는 것입니다.

그래서 간병환자는 쥐어박으면 대들고 항변하고 성질내고 심병환자는 쥐어박혀도 기가죽고 혼자서 가슴 뛰고 잠 못 자고 억울해도 대들지 못합니다. 설명이 적절한가요 ? 잘 이해하시길 바랍니다. 중요

커피에 인이 백이면 한자도 커피에 불면 없어질 수 있다. 열증도 장이 나빠지면 하루에 여러 번 배변 가능 따라서 변비기왕력을 묻는 것이 중요. 열자가 설사할 때는 대항량을 1/2 혹은 1g정도로까지 줄인다.

작년 8월 초에 약 해드렸던 분이 오늘 오셨네요

작년 8월이면 제가 선생님께 체질 강의 듣고 막 체질 처방을 쓰기 시작할 무렵이네요...ㅎㅎㅎ 그런데 무식하면 용감하다고 오늘 보니 좀 이상한 점이 있어서 질문드립니다

33세 건장한 남자환자분이고요. 그 당시에는 커피 체크를 제대로 안했고요... 대변을 1일 2회 정도 보는데 좀 오래 보시고 좀 굳게 보는 편이라고 하셨습니다

그래서 작년에 태음인 열증으로 보고 갈근조위탕을 썼네요?(그것도 대항 한돈으로)

그 뒤로도 며칠 더 침맛으러 오셔서 약 드시는 과정을 체크했는데 좋았고 큰 불편함은 없으셨다고 합니다. 그런데 오늘 오셔서 커피 반응을 체크해보니 수면에 별로 영향이 없다고 하십니다. 거기에 대변은 1일 2회 정도...(다만 10분 이상 오래 보시고 굳은 변을 보신다는 상황이 좀 첨가가 되겠네요). 지금 상황이라면 한증이 아닐까? 하고 이래저래 고민을 할 거 같은데요...굳이 열증으로 볼만한 상황이라면 대변을 오래 보시고 굳게 보는 거라고 할 수 있는데이. 이런 경우도 열증으로 봐야할까요? 정말 무식하고 용감했지만 소 뒷걸음치다 쥐잡은 것일까요? 아니면 지금이라도 한증으로 보고 태음조위탕으로 해봐야 할까요?

안준철

이 환자는 열증으로 봐도 좋겠습니다. 변비의 기왕력을 꼭 확인해보는 것이 좋겠습니다. 열증도 커피에 인이 배기면 잠 잘 자게됩니다. 그러나 저녁에 커피를 마셨다거나 저녁에 10잔을 마셔도 문제가 없고 변비의 기왕력이 확실히 없어야 한증이 됩니다.

열증도 장이 나빠지면 하루에 여러번 대변을 보게 됩니다. 역시 이 경우에도 대항을 쓰게됩니다.

윤승일08.07.16. 13:17

태음인 열증자가 변이 묶거나 설사가 있는 경우에 대황은 원래 반 정도로 줄이면 될까요? 좋은 말씀 같습니다 아무튼.감사합니다

안준철

일반적으로 변이 묶거나 설사를 잘 하면 대황을 1/2로 줄이면 되고 설사를 심하게 하면 대황을 1그램 정도 쓰기도합니다.

태음인한자도 커피만 드시면 설사를 할 수 있다.

태음인으로 보이고요...

평생 변비가 돼본 적이 없으시다고 합니다

그래서 일단 한증으로 보고 마지막 확인 절차로 커피 반응을 물어봤는데요

커피만 드시면 설사를 해서 안 드신다고 합니다.

그래서 커피를 거의 안 드시다보니 커피의 수면에 대한 영향은 잘 모르시겠다고...

태음인인데 커피에 대해 이런 반응도 나올 수 있을까요?

혹시 다른 체질도 의심해봐야

안준철

얼마든지 이럴 수 있습니다. 커피가 장에서 알레르기 반응을 일으킨다고 생각하면 좋겠습니다. 태양인이 고등어나 참치에 대해서 알레르기 반응을 일으키는 경우도 왕왕 보게됩니다. 이것은 체질과 무관하게 개개인의 알레르기 반응입니다. 알레르기 반응은 주로 점막에서 일어나게 됩니다. 기관지 점막(천식) 장점막(특정음식에 대한 설사) 등이 대표적입니다. 자신의 체질에 맞는 음식에 대해서도 얼마든지 알레르기 반응이 일어날 수 있습니다.

■ 본초관련 제반내용들

부자 강활 지골피 당근 대황 형개에 대하여

附子(한열불문하고 수분손실로 인한 소변적잡에 사용)

- 다시 한번 강조

- 부자는 熱證에도 寒證에도 사용할 수 있다.

- 외감 ... 삼양병 ... 몸이 뜨거운 상태 ... 亡陽으로 땀이 빠져 나가서 탈수로 인한 소변적잡 ... 부자... 삼음병 ... 몸이 차가운 상태 ... 설사로 수분이 빠져 나가서 소변적잡 ... 부자
내상잡병에서는 腎陽虛 증상을 보고 부자를 써야 탈이 없다.

강활 지골피 - 소양인의 하지불안증후군(지골피는 보간신하고 강활은 거습지통 강근골)

- 강활 지골피 6~8g/ 첩
- 시호역간탕이 유효하는 보고가 있어 간과 관련이 있을 것으로 추정됨.
<허리 다리 무릎 아픈 소양인의 필수약>
소양인들 허리 다리 무릎이 아프다고 할 때는 강활 + 지골피 cap짱!! 반드시 써야 낫는다!!
강활은 祛濕止痛하고, 지골피는 補肝腎한다. 一瀉一補.
보통 6~8g 정도를 사용한다.
지골피는 사상의학적으로 볼 때 소양인 최고의 補肝腎약이다. 祛濕작용은 없다.
소양인 하지 질환 (저림 통증 관절염 등) - '홍모오가피' 도 응용할 수 있습니다.

당근(태음인 위장질환에 유효)

- 태음인 위장 질환에 역류성 식도염을 제외한 나머지 질환은 당근만 먹어도 엄청 좋아진다.

산수유(소양인에게 위산증가)

- 산수유는 소양인 한자에게 식초와 같은 약이다. 즉 위산을 증가 시켜준다.

대황(★5개. 식적 담음 어혈을 제거하고 이담한다)

- 태음인이 대변을 보지 못하면 무조건 대황을 써주라!!!
태음인은 陰陽이 俱盛하므로 괜찮다.
- 대황 : 食積 痰飲 瘀血을 제거하고 利膽한다. 간청소를 하고 지용성 물질에 대한 해독. (※※)
ex) 보신약 + 대황

형개 (보혈하고 초하면 지혈. 소양인 빈혈에 가장 중요)

- 일반적으로 형개를 발산풍한약으로 알고 있다.
- 형개는 補血하고 초하면 지혈작용도 있다.
- 소양인 빈혈에는 최고로 중요한 약이 형개이다. (※※)

지각 유근피 백질려 대계

지각(소음인에게 항히스타민작용. 비염, 가려움증, 가래에 유효)

- 소음인
- 항히스타민 작용 → 점막에 작용
: 코 점막에 작용하여 비염 치료
: 피부 점막에 작용하여 가려움증 치료
: 기관지 점막에 작용하여 가래 치료

유근피(태음인. 점막에 작용해서 누런 콧물, 속쓰림, 냉대하에 좋음)

- 태음인
- 항산화 이노 작용 → 점막에 작용
: 코 점막에 작용하여 누런 코물 치료
: 위장 점막에 작용하여 속쓰림 치료

: 자궁 점막에 작용하여 냉대하 치료

백질려(남가새. tribulus) 부교감신경활성화해서 뇌와 피부로 몰린 혈액을 골반과 복강으로 몰고 간다. 남성의 발기부전, 여성의 생리통, 피부가려움에 굿

- 태음인

-백질려 (남가새. tribulus)가 미국이나 유럽에서는 오래전부터 불임의特效약으로 사용되었고 남성에게는 발기부전이나 여성의 생리통 등에 많이 응용되었다.

태음인의 골반통이나 생리통에 백질려를 응용하여 탁월한 효능을 보였다.

- 교감신경이 활성화 되면 혈액은 피부와 뇌로 몰린다고 합니다.

(피부와 뇌는 외배엽성 발생기관으로 발생 기원이 같습니다.)

따라서 뇌를 좋게 하려면 피부 자극을 해주어야 되는데 온탕욕이 좋습니다)

백질려는 부교감 신경을 활성화 하여 뇌와 피부로 몰린 혈액을 골반과 복강으로 몰고 갑니다. 골반과 복강으로 혈액이 몰리니까 당연히 남성 발기부전 치료와 여성의 불임 성교통 냉대하 생리통 등에特效로 사용할 수 있습니다.

또한 모두다 아시다시피 피부 가려움에도 사용이 됩니다.

왜? 피부로 몰려 있던 혈액이 복강 쪽으로 가니까 충혈되어 있던 피부가 안정되는 것입니다.

cf. 急滯 했을 때 왜 머리가 아프고 어지럽냐?

: 급제 하게 되면 위장 장애를 해결하기 위해서 혈액이 위장으로 몰리게 됩니다.

위장으로 혈액이 몰리게 되면 뇌쪽에서는 일시적으로 허혈 상태가 발생하게 되므로

두통과 어지러움이 생기게 되는 것입니다.

대계 (영경귀. milk thistle. 이담작용, 간보호작용으로 酒傷에 좋다)

- 소양인

- 대계는 이담작용과 간보호작용이 있어서 歐美國에서는 음주로 인한 간손상에 매우 많이 사용되는 약물입니다. 과장해서 말하면 미국이나 유럽의 술꾼들 중에서 태반은 대계를 먹고 있습니다. 대계를 涼血止血藥이나 瘀血藥으로만 사용되고 있어서 안타까울 따름입니다.

cf. 태음인 - 대황 백사울금 청호 등등...

양파(양총피); 태양인. 거담 이수 해독. 고지혈증, 고혈압에 특효.

양총피가 태양인의 담을 없앤다는 사실에 주목하면 됩니다. 주소증은 거담 이수 해독입니다. 고지혈증 고혈압에特效약입니다. 흰색 부분보다 버리는 껍질에 유효성분이 많습니다.

이제마 선생님의 형방지황탕에 있는 '숙지황'이 류주열 선생님의 형방지황탕에서 '홍모오가피'로 대체된 이유- 거습기능을 강화시키기 위함.

<정용재>

토사자온신탕에 토사자없네요. 류쌤이 빼셨답니다. 당황하지 마시길.ㅋ
그리고 형방지황탕에 우리 숙지황이를 류쌤이 홍모오가피로 바꾸셨네요.
도저히 이해불가입니다.--;

ㄴ <안준철> 10:49

홍모오가피는 강활처럼 거습지통하면서 강근골합니다. 거습하는 작용이 지사작용과 연결됩니다. 형방지황탕에서도 강활 독활의 거습작용이 설사를 멎게합니다.

독활지황탕의 독활도 뱃속의 습을 없애줍니다.

홍모오가피도 거습지통하는 작용이 있어서 같은 맥락에서 이해될 수 있습니다.

숙지황이 보음하지만 설사에는 적절치 못해 보입니다.

거습하거나 이수하는 작용이 없어서...

그래서 류쌤은 강근골 보음 거습을 동시에 만족시켜주는 홍모오가피를 선택하신 거 같습니다.

홍모오가피가 간신을 보하는 건 확실합니다. 그래서 보음한다고 할 수 있습니다.

ㄴ <정용재> 12:14

네 감사합니다. 의문이 많이 해소되었습니다.

형방지황이는 보음해서 설사를 멎게 하므로 지황이 중요한 약재라고 생각했습니다.

그래서 동무도 지황을 처방명에 드러내셨겠지요.

근데 형방지황탕에 거습약은 많은 거 같은데 보음약을 빼고 거습약을 또 추가하셨으니 조금 의문이 들었습니다. 류쌤은 소양인 설사에 보음보다 거습을 중시하셨다라고 이해가 되네요.

적응증도 거의 다 습을 끼고 있군요.(p.529) 정말 감사합니다.^^

아, 홍모오가피가 보음도 하는군요~ 자오가피도 간신을 보익하구요. 처음 알았습니다.^^;

암튼 나날이 정교해지는 처방을 보니 각성이 많이 됩니다.

병을 아는 것만큼 처방이 정교해지는구나 라는 생각도 들구요.^^;

홍모오가와 자오가는 체질만 다르고 약성은 거의 유사하다고 생각됩니다. 자오가도 간신을 보익하네요. 가르침 감사합니다. 류쌤이 정말 대단하다는 생각이 들구요, 그걸 다 꿰뚫고 계시는 선생님도 대단.

향암 종양 약물의 사상체질적 분류(건칠, 대항, 귀전우 백렴, 백질려, 별갑 대계 와송)

어제 마지막 부분에 안준철 선생님께서 강의해 주신 향암 약물에 대해서 정리하겠습니다.

향암 효과가 있는 체질약물

건칠(태음인. 신생혈관억제. 大熱. 한자의 자궁근종을 거의 해결. 열자는 대항)

그런데 옷이 향암 작용이 굉장히 강합니다.

그리고 혈관 신생을 억제해서 세포가 영양공급을 못 받으니까 세포가 크지 못하고 줄어들습니다. 요즘에는 발효해서 파는 것도 있습니다. 발효하면 독성이 많이 줄어든다고 합니다.

옷은 열성이고 태음인약입니다. 건칠이죠.

옷나무를 벗겨서 수질을 말리면 송진처럼 나와서 검게 됩니다. 처음에는 검지 않습니다.

이게 大熱한 약이고 (매우 뜨겁죠) 알려지가 심합니다.

그런데 태음인 寒者는 옷만 잘 사용하면 자궁근종이 거의 다 해결이 됩니다.
태음인 熱者는 대황을 잘 사용하면 됩니다.

대황 / 귀전우 / 백렴 / 백질려(태음인, 대황은 뱃속의 식적 담음 어혈해결.
자궁근종, 자궁암에 대황 귀전우가 탁효. 백렴은 청열해독약. 어혈을 깨고 행기시킨다. 스트레
스로 인한 간기울결은 백질려가 혈액을 아랫배로 끌고 내려가 해결한다. 발기부전, 갱년기의
음부건조증, 성교통에 도움)

대황은 항종양작용이 있고 600페이지에 달하는 책이 나올 정도입니다.
대황이 항종양작용 항암작용 간보호작용 등이 있는데...
실로 놀라운 사실은 동의보감에 ‘식적 담음 어혈’이란 말이 무수히 나옵니다.
배속의 문제는 식적 담음 어혈입니다. 장기에 나타나는 병들은 거의 식적 담음 어혈이고
팔다리에 나타나는 시리고 저리고 이런 것들은 욕음에 의한 것들이 많습니다.
대황은 ‘식적 담음 어혈’을 다 없애줍니다. 무슨 말인지 아시겠죠?
대황은 중국이나 일본 등 아시아권에서만 사용한 것이 아니고
아랍이나 인도 페르시아에서도 굉장히 많이 썼다고 합니다.
그런데 국산 대황은 태음인 약이 아닙니다. 당고특대황과 장엽대황만이 태음인 약입니다.
국산 대황은 어느 체질 약인지 확인도 안 되었고 대황이 아니라고 합니다.
여기다가 어혈약 복강내부에 작용하는 어혈약에다가 대황을 쓰고 귀전우를 써봤습니다.
귀전우가 항암작용이 뛰어납니다. 귀전우 화살나무.

<안준철>

대황이 평활근 이완에도 최고의 약이라고 합니다.
즉 내장의 근육과 자궁의 평활근에 작용해서 이완을 한다는 뜻입니다.
자궁 근종에도 대황 귀전우 등이 탁월한 효과가 있었습니다.
자궁암의 경우에도 대황이 통증완화에 탁월했습니다.
80세가 넘는 자궁암 말기의 할머니가 통증으로 고생하다가 어혈약에 대황 귀전우를 가한 처
방을 드시고 잠도 잘 자고 편하게 살다가 여생을 마친 예가 있습니다.
자식들이 아주 고마워했습니다. 통증이라도 없어졌다고...
자궁암도 통증이 대황으로 잡히더라는 것입니다. 귀전우도 굉장히 효과적이었습니다.

그때 또 같이 사용했던 것이 백렴입니다.
백렴이 뭐냐하면 양방병리상으로 청열해독제입니다.
주치는 氣滯血瘀입니다. 瘀血을 깨고 行氣도 시킵니다. 깨고 소통을 시키는 것입니다.
사실 이것만 쓰면 병의 증상만 보고 쓰는 것이고, 병이 생긴 원인을 봐야 합니다.
병이 생긴 원인까지 생각해서 쓴다면 스트레스가 가장 큰 원인이니 간기울결을 풀어주는 가장
대표적인 것이 백질려입니다.
백질려가 생식기로 혈류를 증가시켜 발기부전과 갱년기 이후의 음부건조증 성교통에도
백질려가 탁월하게 듣기도 합니다.
백질려가 어떻게 된거냐 하면 교감신경을 억제하고 부교감 신경을 활성화시켜 줍니다.
부교감 신경이 활성화 되면 혈류가 머리로 가던 것이 생식기로 흘러가는 것입니다.

즉 피부와 뇌로 (껍데기쪽)으로 흘러가던 것이 내장안으로 들어가게 됩니다.
생식기와 소화기로 흘러 들어가게 되므로 피부에 충혈이 되지 않는다는 말이고
그 작용으로 인해서 가려움증이 멎게 됩니다.

제가 드리고 싶은 말이 무엇이나 하면 김순렬선생님이나 윤승일선생님 강의 내용 중에
교감 부교감 신경계에 대해서 기본적으로 알면 중의학에서 연구된 것을 쉽게 이해 할 수 있습
니다. 교감 신경이 억제되고 부교감 신경이 활성화 되면 (미주신경이 흘러가는 것이 75%가
복강으로 흘러감) 복강내 장기 소화기나 생식기에 혈류량이 현저히 증가되고 피부나 뇌로 가
지 않습니다. 피부나 뇌는 둘 다 외배엽성 발생기관입니다. 피부가 따뜻해지면 뇌가 행복해합
니다. 백질려는 또한 간하고 관계가 됩니다. 소간 작용도 있고.....

원인이 스트레스이면서 자궁근종이 온다면 백렴이 기체혈어를 깨어주고,
귀전우로 종양을 억제하고 태음인 寒者 같으면 건칠을 쓰고
태음인 熱者 같으면 대황을 쓰고 건칠이 최원철교수가 계발해서 넥시아라고 신약 등록되어 있
습니다. 넥시아가 혈관 생성을 억제합니다.
angiogenesis. 혈관이 영어로 angio. 생성이 genesis.
넥시아가 antiangiogenesis 작용을 하는 거죠. 혈관신생을 억제하는 것.

**별갑 /대계(소양인. 구판은 보음, 별갑은 간으로 주로 작용해서 간양이 올라
허열 뜰 때 쓴다. 별갑이 구판보다 차다. 軟堅散結한다. 대계는 간보호 이담작용 탁월)**

소양인 같으면 대계 별갑을 씁니다. 별갑이 潛陽하고 補陰합니다.
구판은 腎에 주로 많이 작용하고, 별갑은 肝쪽입니다.
별갑도 補腎을 하지만 더 간에 가깝습니다. 그래서 肝陽이 오르면 별갑을 씁니다.
단순히 補陰할 때는 구판이 더 낫습니다. 補陰하는 효과는 구판이 더 낫고, 허열이 뜨면 별갑
이 낫습니다. 별갑이 肝陽上亢에 쓰는 것입니다. 潛陽시키고 청열 시키고
별갑이 구판보다 더 차다.
그 다음에 핵심이 별갑이 軟堅散結하는 작용이 있습니다.
딱딱한 것을 풀어주고 어혈을 깨고....실지로 근육통이나 뭉친 곳에 듣습니다.
대계(영경귀)는 간보호 이담작용이 뛰어납니다.

와송(태양인. 염증을 없애고 혈뇨에 탁월. 일체의 혈증에 듣고 청열 生肌한다)
태양인들은 와송을 많이 씁니다. 이름이 와송이라서 그런데 기와 위에 얹힌 게 아니고 배추
키우듯이 밭에서 키웁니다. 와송이 제일 핵심적인 것은 염증을 없애고 혈뇨에 탁월합니다.
일체의 血症에 듣는 것이고 清熱작용과 生肌작용이 있습니다.

소음인 약 중에는 항암에 뛰어난 약이 별로 없는 것 같습니다. 인삼.....??
꼭 기억하십시오. 대황 건칠 귀전우 (백렴 백질려) / 대계 별갑 / (와송)

신이화(magnolia). 소음인, 비만세포의 히스타민분비를 억제. 기관지점막 코점막에 같이 작용해서 기침, 콧물, 가래 등을 해결한다. 소양인의 우방자, 태음인의 상백피도 동일함.

신이화는 잘 아시듯이 목련꽃입니다.

앞도 나기 전에 꽃잎만 커다랗게 폈다가 혼자서 떨어지는걸 보면 봄이 왜 슬픈계절인지 알게 하는 꽃입니다. 예전에 맥노리아라는 슬픈 영화가 있었는데...신온해표제 이고 약효는 아래와 같습니다.

항알리지작용 : 비만세포의 세포사멸을 촉진, 항보체작용, 히스타민 분비 억제

28일 수요일날 면역학 잘 배우셨죠.(비만세포 보체 뭔지 아시겠지요)

비만세포(mast cell)은 혈액에서 돌아다닐 때는 호염기구(basophil)의 형태로 조직 내에서는 비만세포로 된다는 사실. 신이화가 비만세포의 히스타민 분비를 억제해서 콧물 가래 등을 해결합니다.

중요한 사실은 신이화가 콧물에만 쓰이는건 아니고 가래에도 잘 듣는다는 사실입니다.

신이화가 비만세포를 억제하면 콧속이든 기관지도 다 억제합니다.(신이화가 코약으로 알려진 거는 정말 잘못된겁니다.기관지 점막 코점막에 함께 작용합니다.)

그래서 소음인의 소염청열탕에 신이화가 들어가게 됩니다.(기침 콧물에 다 듣습니다.)

소양인의 우방자 태음인의 상백피도 다 마찬가지입니다.(비만세포를 사멸해서 히스타민 분비를 억제합니다.)

신이화를 쓸때 마다 신온해표약임은 물론이고

비만세포 히스타민 점막 면역 등의 단어를 떠올려 주세요.

황기(혈관재생에 탁효. 이노작용과 혈관확장으로 혈압강하효과. 생기작용이 혈관생성을 포함하는 듯)

황기가 혈관재생에 가장 뛰어난 약물로 알려져 있습니다.

이노작용과 혈관확장 작용으로 장기적 혈압강하효과도 있습니다.

물론 항산화효과도 탁월하다고 합니다.

angiogenesis(국제 혈관 재생학회) 학회에서 최근 가장 주목하고 있는 약물이라고 합니다.

生肌작용이 혈관생성을 포함한 말 같습니다.

본초의 바다는 넓고도 깊습니다. 누군가 藥海라고 말했지요.

의성 허준이나 동무 이제마께서 지금 시대에 살고 계신다고 해도 약리 실험이나 성분 분석을 했을 것입니다. 약리작용이나 성분을 알아서 해로울건 없습니다. 약물에 대한 더 풍부한 이해

를 줄 뿐입니다.

포공영(이담작용, 이뇨작용이 동시에 있다. 폐비신 상중하초에 모두 쓰이는데 해독능력이 매우 탁월. 각종 염증에 좋음. 淸熱解毒, 利濕通淋, 癰腫瘡瘍(乳癰; 腸癰; 喉痹; 目赤腫痛) 濕熱黃疸, 熱淋

작년 4월 강화도에 피어있던 민들레.

민들레는 각종 염증에 효과가 좋은데, 특히 설화가 전하는 것처럼 유방의 멍울, 염증 질환, 젖몸살에 좋다. 간염·장염·위염·인후염·림프선염 등에도 두루 쓰인다.

민들레를 끓여 보면 짠맛이 난다. 이 짠맛은 소금처럼 방부제 역할을 하고 열을 내리며 해독하는 효능이 있다. 따라서 편도가 부은 경우, 눈이 충혈된 경우, 열나고 기침하는 경우에 좋다. 민들레의 약간 쓴맛은 열을 내리고 소화를 도우며 체기를 내리는 작용을 한다.

민들레, 고들빼기, 씀바귀는 모두 국화과에 속한 식물이라서 먹어 보면 비슷한 쓴맛이 나고 흰 즙이 나온다. 동의보감에서는 이 흰 즙을 사마귀에 바르면 사마귀를 치료할 수 있다고 했다. 흰 즙은 소나무의 송진처럼 개체를 보호하는 작용이 있어서 사마귀를 없앤다. 민들레는 성질이 차갑기 때문에 몸에 열이 많으면서 멍울이 잘 잡히고 염증이 많은 사람에게 알맞다.

(이상은 조선일보기사)

10.04.28. 11:54

이담작용과 이뇨작용이 동시에 있음에 주의를 기우릴 필요가 있습니다. 모든 지용성 물질은 담즙의 형태로 이담작용을 통해서 배설되고...모든 수용성 물질은 신장을 통해서 소변으로 배출됩니다.(일부는 땀으로) 이담과 이뇨가 동시에 되는 약은 많지 않습니다. 지용성 수용성 모든 물질을 모두 배설 가능하다는 이야기 입니다. 동의보감에서도 포공영의 사용례가 가장 많습니다.

안준철

포공영은 폐 비 신 3장(상중하초)에 다 쓰이고 외감과 내상이 다 쓰입니다. 상하 표리 내외에 다 쓰입니다. 우리가 현재 쓰고 있는 약물 중에서 가장 중요한 약이라고 하겠습니다.

윤승일

포공영 증말 조은 약같습니다. dandelion root 미국서도 영양제로 너무 많이 쓰이고 있습니다 해독능력 뛰어납니다. 좋은 말씀 감사합니다~

김상인

* 태음인 - 苦甘 寒 - 肝胃 胃肝

* 淸熱解毒, 利濕通淋, 癰腫瘡瘍(乳癰; 腸癰; 喉痹; 目赤腫痛) 濕熱黃疸, 熱淋

* (생약학 480) 항세균, 항진균작용, 면역증강작용, 항암작용 : 다당류

항알러지작용(hexosaminidase의 유리를 억제),

혈액응고과정을 억제하는 단백질(이 단백질은 열에 약하다)

이뇨작용(다량의 칼륨염에 의한 것으로 보고 있다)

건위작용, 완하작용

백질려(두통 고혈압 안질 등에 좋음. 복강내 어혈약. 성교통, 질건조증, 성욕저하, 골반통, 피부질환, 발기부전 등에도 좋음. 혈액을 복강으로 끌어내려 두면, 피부에서의 충혈을 경감)

백질려는 거풍하고 肝經에 引經되어 조구등과 함께 두통 고혈압 안질 등에 쓰이는 약으로 알려져 있습니다. 그런데 이 백질려가 복강내 어혈약으로 쓰여지고 있습니다.(이런 건 기효에 속합니다. 잘 알려지지 않은 효과입니다.)

Tribulus terrestris라는 식물은 Puncture Vine이라고도 부르며 Tribulus라는 말은 라틴말로 trouble이라는 의미를 가지고 있으며 열대와 온대 지방에서 널리 분포하는 식물로 여러 지역에서 여러 용도로 사용 해오고 있는 약초입니다. 예를 들어 그리스에서는 이뇨제와 무드 조성제로 또 인도사람들은 트리뷰루스를 이뇨제와 살균제와 소염제로 사용하였으며 중국인들은 신장이나 간이나 심장질환을 위해서 사용했습니다. 그리고 불가리아인들은 Tribulus terrestris를 불임치료와 성기능 강화제로 사용하였습니다.

최근 동유럽인들은 경기력 향상을 위해서 이 약초를 사용하기도 합니다. 한마디로 Tribulus terrestris라는 약초는 남성 호르몬인 testosterone 분비 촉진제 역할을 합니다. 연구에 의하면 이 약초가 DHEA와 androstenedione과 함께 작용할 때 그 효과가 크게 나타나는 걸로 알려져 있으며 Tribulus가 LH 호르몬 분비를 증가시켜주고 LH 호르몬이 성기능에 관련이 있는 남성 호르몬인 testosterone 호르몬 분비를 도와주기 때문에 불임증이나 성기능 강화를 위해서 많이 사용하고 있는 것입니다. 연구에 의하면 Tribulus를 복용하게 되면 50% 이상의 남성 호르몬이 증가 된다고 하였습니다. 실험실에서의 동물을 대상으로 한 연구에 의하면 이 약초를 30일간 복용한 후에 정자의 수가 늘었고 더욱 활발하게 되었습니다. 이 약초는 남성들만을 위한 것이 아니고 여성들 또한 성기능을 강화하고 에너지를 얻기 위하여 사용할 수 있습니다. 세계적으로 유명한 잡지인 Muscle Media를 펴내는 Bill Phillips씨에 따르면 Tribulus terrestris는 필수 영양제는 아니지만 운동선수나 보디빌더가 근육을 강화시키려면 DHEA와 Andro를 함께 사용하면 큰 효과를 얻을 수 있으며 잡자리 문제도 크게 도움이 된다고 하였습니다. 여성들이 이 제품을 복용했을 때에 여성들의 성 욕구를 돋워 주는 호르몬인 Estradiol의 양이 증가 되었고 이로 인해서 생산 기능이 향상되고 성욕과 배란 능력이 향상된다고 하였습니다. Tribulus는 간을 위해서도 중요한 역할을 하는 걸로 알려져 있는데 콜레스테롤과 간 지방을 분해하여 호르몬과 에너지로 전환시켜주어 스테미나를 강화하고 힘이 나게 합니다. 간 기능을 향상시켜 주는 이러한 역할은 특히 운동선수나 보디빌더의 능력 향상을 위해서 많은 도움이 됩니다.

유럽과 서구지역에서 오랫동안 다음과 같은 경우를 위해서 사용하였습니다.

*성기능 향상과 생식 능력을 향상하기 위하여 *간, 신장 *소변기계통의 질환 *피부질환 *근육강화 *스테미나와 끈기와 힘 *콜레스테롤을 줄이기 위해서 *무드 향상을 위해서 사용하였습니다.

현재까지는 부정적인 효과는 알려지지 않았고 안전하게 사용할 수 있으나 어떤 분은 이 제품을 복용했을 때에 속이 아프다는 말씀을 하시는데 이때는 음식과 함께 복용하시면 해결할 수 있으며 남성 호르몬을 강화하고 성기능을 높이기 위해서 사용하는 화학 제품보다 효과는 느리

나 부작용 없이 일상으로 이용하실 수 있는 안전하고 유익한 약초입니다.

백질려는 남성호르몬 androgen을 만들어서 성욕부진 배란촉진 등에 응용해 왔습니다.(즉 복강내로 혈류를 증가시켜 복강내 어혈약의 보조약으로 쓰입니다.)

-
백질여는 남성의 성기능저하 성욕저하 발기부전 등에 쓰이고 여성에게도 성욕저하 성교통 배란장애 등에 쓰입니다.

즉 생식기를 활성화하는 작용이 있습니다.(그래서 복강내 어혈약에 쓰입니다.)

안준철

복강내 어혈에 왜 백질려가 쓰이는지 이제야 이해가 됐습니다.(남녀 모두에게 복강내 혈류를 증가해서 성기능을 향진 시킵니다.) 유럽에서는 오래전부터 생식능력 향상을 위해서 쓰여왔다니 참 놀랍습니다. 중국에서 도 그런 용도로 쓰이고 있고 우리나라만 모르고 있습니다. 본초에 관심을 가지면 이렇게 기묘를 하나씩 알게되나 봅니다. 안질이나 피부병에 백질려를 썼는데 밤낮으로 발기가 너무 심하게 된다는 불평을 들어보신 적 없나요? 왕년에는 이런 말을 무시했는데 우연한 일이 아닙니다.

한방 비아그라 제조에 도전하고 있는 분들이 많으신데...백질려가 중요한 약이 되겠습니다.

어제 강의때 말씀드린 백질여의 학명은 Tribulus terrestris L. 남가새 (납가새)

영어명 : Puncture vine or Goathead

이용양 원장님도 피부병 환자에게 백질려를 썼는데 성기능 향진을 경험했다고 합니다.

동서고금이 모두 경험하는 문제인데 그냥 거품하는 약으로 우기고 무시하고 지나가는 거 같습니다. 실제로 골반통 불임 생리불순 남성기능저하에 핵심적인 약입니다.

백질여에 주목해 주세요. 본초는 이렇게 경험을 한 개씩 배워서 이해 해가는 방법뿐인 거 같습니다. 인류의 경험과 함께 합니다

백선평(청열조습, 피부가 짓무는 상황에서 습을 제거하기 위해 삼백초등과 같이 쓴다. 자궁평활근에 강력한 수축작용-> 산모의 자궁수축과 부종해결, 기관지의 물을 빼서 가래많은 기침에도 듣는다)

백선평은 기본적으로 청열조습약에 속합니다.

그래서 피부가 진무는 상황에서 습을 제거하는 삼백초 등심 등과 함께 잘 쓰입니다.

[중약대사전]에

진균 억제

강심작용 : 심장 흥분, 박출량 증대

자궁 평활근에 대하여 강력한 수축작용

해열작용

태음인 산후에 쓰이는 생화탕에 왜 백선평이 들어가는지 이제 이해가 됐습니다.

강력한 자궁수축작용에 청열이습 청열해독 작용까지 겸해서 산모의 자궁수축과 부종을 해결하는 중요한 약이 됩니다.

P.S:백선피가 기관지의 물을 빼서 가래가 많은 기침에도 듣는다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 그래서 귀경은 폐 비 방광 소장 등입니다.

안준철

그래도 진무는 피부를 이뇨해서 말리는 작용이 첫째입니다. 피부약 백선피가 산후에 쓰는 생화탕에 왜 쓰였을까? 의문이 확 풀립니다. 양방에서도 산모에게 감염 방지를 위해서 3-4일간 항생제를 먹입니다. 백선피의 진균억제 작용은 그런 차원에서 이해하면 좋겠습니다. 가려운 냉대하 등도 대부분 진균의 감염과 관련이 있습니다. 만약 산모가 감염 된다면 고열과 함께 패혈증 등 위험한 상황으로 가게됩니다.

태음인약 호장근의 약성(어혈과 거습을 동시에 할 때 적합. 현저한 이뇨작용, 소변불리, 소변삽통, 피가 섞인 가래, 생리통 냉대하)

호장근은 기본적으로 활혈거어약입니다.(어혈약입니다.)

그리고 현저한 이뇨작용이 있습니다.

그래서 어혈과 거습을 동시에 해야할 때 가장 적합한 약물이 됩니다.

1. 소변불리나 소변삽통이 있으면서 혈뇨가 동시에 있을때.(호장근의 이뇨작용으로 소변도 잘 나오게 하고 혈뇨도 동시에 해결됩니다. 예를 들면 방광염의 경우)

2. 피가 섞인 가래가 나오는 경우(호장근으로 물 가래는 이뇨시키고 피가래에는 파어작용이 있어서 동시에 좋아집니다)

3. 냉대하가 심하면 습으로 볼 수 있는데 이때 생리통도 심하고 생리혈에 덩어리가 많으면 어혈입니다.(호장근으로 습을 빼내고 어혈도 동시에 깨줄 수 있습니다. 즉 생리통의 어혈과 냉대하의 습을 동시에 해결합니다.)

결론적으로 호장근은 활혈이습하므로 습과 어혈이 함께 공존하는 상황에서 습과 어혈의 증상을 동시에 해결하는 매우 중요한 약재입니다.

(피가 섞인 가래, 생리통과 냉대하, 소변불리와 혈뇨 등)

안준철

습과 어혈이 동시에 문제일때 1타2피를 한다는 말입니다. 한지 약으로 두지가 동시에 해결되므로 매우 효율적입니다. 부인과 기관지 비뇨생식기 질환에 정말 중요합니다. 부인과 기관지 비뇨생식기 질환은 습과 어혈의 문제를 동시에 가지는 경우가 정말 많습니다.  **한지** 중요

부종과 어혈을 동시에 해결한다고 생각해도 됩니다. 즉 염증이 생기면 부종과 어혈이 생깁니

다. 염증의 치료도 부종을 빼는 게 일차목표가 되고 그 다음은 어혈이 됩니다. 그럼 호장근은 염증약? ㄱ

정용재

류원장님은 천문동도적산, 단삼대황탕, 연자생화탕에 활용하셨네요. 부인과 기관지 비뇨생식기 질환은 습과 어혈의 문제를 동시에 가지는 경우가 정말 많다. 습열과 어혈의 호장근 잘 기억해 두겠습니다~

안준철

대부분의 급성 염증성 질환은 습과 어혈을 동시에 가집니다. 산모도 어혈과 습을 빨리 해결해 줘야 되는 상황입니다. 이때 호장근이 더 빛나보입니다.

진교가 이담작용이 있고 풍한습비질환에 많이 쓰입니다(관절질환치료). 그리고 술로 인한 황달을 치료한다고 동의보감에 나옵니다(주황,황달을 해독) 그리고 대소변을 잘 통해줍니다.

이것이 뭐겠습니까 카~ 간해독이 되면 관절이 보호되는 기전과 연결되는 순간입니다. 윤승일 원장님이 말씀하신 황이 해독에 관여하고 황이 부족하면 슬연골의 황을 끌어다 해독하게되고 그러면 슬연골은 망가지게 됩니다. 이때 진교가 이담해서 간해독을 하고 슬연골을 보호하게 되는 기전이 성립됩니다. 요즘 황성분이 있는 녹각교 아교 규판교 별갑교 등도 관절염에 주목되는 약물이지만 진교는 아는 사람만 아는 풍한습 관절질환에 핵심이 되는 약입니다.중요

(계속 안선생님 말씀) 최신 입수된 최고급 정보입니다.ㄱ 류샘도 진교를 자식처럼 아껴 쓰신답니다.ㅎㅎ원원장님께 한 수 안배웠으면 기전을 제대로 몰를뻔 했습니다. 감사합니다. 통마늘 진액도 마늘속 황을 이용한 해독 식품입니다. 현대의학적 해석이 여러가지 문제를 이해할 수 있게 합니다. 의성 허준이나 동무 이제마가 지금 내려온다 해도 현대의학적 해석에 귀 기울릴 것입니다. 약물을 이용한 실험도 더 많이 할 것입니다.

(이어서) 이담작용이 있는 약물이 왜 중요한지 다시 한번 느끼는 순간입니다. 모든 수용성 물질은 신장을 통해 소변으로 배설되고...모든 지용성 물질은 담즙의 형태로 대변으로 배설됩니다. 이때 생야재가 담즙을 흡착해서 대변으로 나가게 됨으로 소장에서의 콜레스테롤 재흡수를 방지할 수 있습니다. 하여튼 이담작용은 간에 작용해서 선천과 후천을 다 회복시켜줍니다.(간 신동원이라서 선천이고 간은 소화기이기도 합니다.) 간이 우리 몸의 화학공장이라는 말이 생 각됩니다. 하여튼 이담작용이 있는 약물이 중요합니다. 쓰임새가 넓고 고지혈증 당뇨 고혈압 등 대사성 질환과도 밀접한 관계가 있습니다. 간보호 관절보호로도 연결이 되는군요.

(이어서) 용담과 식물입니다. 초롱담만큼 강한 작용은 아니지만 간담습열에 쓰이는 초롱담 비 (이어서) 간 대장 상통이라는 말이 요즘은 마음에 와 닿습니다. 담즙이 나와야 대변이 원활하 고..또 대변이 원활해야 간담의 疎泄작용이 제대로 되는 거 아니겠습니까? 이담작용이 간의 소설작용과 같지는 않지만 상당부분 일치합니다. 흑마늘로 간이 해독되고 이어서 대장은 저절 로 좋아질 수 있다고 생각됩니다. 태음인의 경우 소고기도 이담작용이 있습니다.(특히 한증) 태음인이 소고기 많이 먹으면 콜레스테롤이 바로 떨어집니다. 이담작용 때문입니다. 태음인의 경우 고지혈증에 소고기 안 먹으면 제대로 고치기 어렵습니다. 소고기==>태음인의 이담제.(특 히 한증, 열증은 효과가 느립니다. 소고기는 태음인 한증약이기 때문입니다.)

이담작용 약물 다시 한번 강조 (강조하셨기 때문에 다시 한 번 올립니다)

구분	약물	설명
태음인	대황	빌리루빈수치 저하 당고특대황은 사하작용이 강하다. 장염대황은 이담작용이 강하다.
	청호	청호는 기본적으로 청열약입니다. 허열을 끄는 작용이 있습니다. 청호는 면역억제 효과가 있어서 루프스와 같은 면역질환에 청열작용을 합니다. 아토피에도 같은 기전으로 매우 중요한 약이 됩니다. 면역이 과흥분되서 오는 염증으로 인한 열을 내려줍니다.
	울금	울금 : 백사울금 - 태음인 약 vs 강황 - 체질 불명
	감국	
	포공영	이담+이뇨 굉장히 중요, 감기에서 위장까지 모두 가능, 민간요법 간경화에 응용 cf. 이담 - 지용성 물질대사 vs 이뇨 - 수용성 물질대사
	진교	거풍습 작용이 주고, 이담 작용은 빼이다.
소양인	치자	한약 중에서 혈당이 가장 잘 떨어지는 약물 黃蓮은 心火를 직접 내리고, 木通은 소장을 통해서 방광으로, 梔子は 몸전체로 작용. 高血壓, 糖尿患者도 黃蓮 혹은 黃蓮+梔子만 加해도 안정된다.
	대계	清熱 涼血藥 알콜성 간손상에 무조건 처방. 어혈약, 지혈약으로 하혈에 사용. 간에서 어혈이 깨짐 대계 소계 없이는 자궁하혈 못 고친다. 놀라운 효과가 있다. 쌍코피에도 잘 듣는다. 대계는 엉덩퀴...소계는 조뱅이 입니다. 대계가 키고 크고 꽃도 큼니다.
	고삼	燥濕清熱 - 정막에 cap짱! - 진무르는 피부병 (건조성 피부병에 쓰면 악화), 종기, 가려움증 고삼은 소양인의 항 히스타민제. 벌겔게 짓무르고 혈관이 팽창된 경우에 쓸 수 있다. - 골반내부의 장기질환에 잘 듣는다. 냉대하, 장염 .설사, 복통, 이질, 방광염, 낭습증, 여성 백음백탁 등.. cf. 소변백탁 (단백뇨) - 지모 황백 고삼 (cap짱! 중요) - 이담작용으로 소양인 황달 (간담습열 질환)
	백화사설초	굉장히 차다. 구내염. 진짜 습열 증상 궤양. 실질적 간염 등
태양인	초롱담	피부 진무는 증상

	백모근	白茅根은 번열 없애고, 태양인의 혈뇨(양혈 지혈작용)
	산장	
소음인	인진	얼굴이 누릿누릿하고 께죄죄하고 습으로 인해 얼굴이 얼룩덜룩하고 기미도 생기는 경우 여자가 임신 중에 기미가 많이 생기는데 애 낳고도 기미가 잘 안 빠지고 그럴 때 인진을 쓴다. 한달 이상 먹으면 대단히 많이 좋아진다. 인진도 거습작용. 비습하거나 술 먹지 않으면 가하지 않는다. 여드름에도 茵陳 가미해서 응용. 인진은 간 해독을 해서 피가 맑아진다고 생각하시면 됩니다. 피부병 알려지성 결막염 피부질환에 쓸 때는 해독을 목적으로 인진 습열 황달
	희청	고혈압에도 사용. 습열을 말리는 작용이 있어 다소 肥人에게 적용해야 한다. 瘦人에게 적용하면 휘청거린다.
	옥미수	
	소회향	

소음인의 인삼과 태양인의 당삼의 약성은 거의 동일하다.

인삼은 소음인약이고 당삼은 태양인약입니다.

두 약물 모두 보중익기하고 생진지갈합니다.

그리고 귀경 역시 비폐경입니다.

인삼이나 당삼이나 모두 사지무력 식욕부진 면색위황에 응용합니다.

그리고 금기증 역시 같습니다.

즉 외감이 풀리지 않고 實邪가 있으면 사용할 수 없습니다.

(인삼과 황기는 땀을 막아서 외사가 나가는 길을 차단합니다. 이 경우도 인삼과 당삼은 공히 금기입니다.)

인삼과 당삼의 차이는 오로지 해당 체질이 다르고 당삼은 인삼에 비해서 약효가 비교적 약하고 더 순하다는 것뿐입니다.

안준철

실사에는 쓰지 못하므로 오로지 보한다는 뜻이 됩니다. 인삼이나 당삼이나 모두....

당삼이 태양인에게는 너무나 중요하고 광범위하게 응용됩니다

육식으로 보하는 경우=>한자는 보양해서 좋지만 열자는 주의해야한다.

동의보감 내상문에서

[민간에서 고기를 보하는 성질이 있는것이라고 하지만, 고기는 보하는 성질이 없고 양을 보하는 성질만 있다. 지금 허손된 사람이 양에 문제가 없고 음에 문제가 있는데 고기로서 보음하려고 하면 산에서 물고기를 구하는 것과 같다.丹心]고 나와 있습니다.

이것을 사상의학의 입장에서 보면 체질 알게 되면 먹어서 유익한 음식과 해로운 음식을 구별할 수 있게되고 소증의 한열을 가리게 되면 한자는 양기를 주는 육식을 많이 먹어도 되지만 열자는 양열의 정도에 따라서 육식을 적절히 통제해야됩니다.

체질을 알아야 먹을 음식을 알게 되고 한열을 알아야 육식의 양도 조절할 수 있습니다.

소증이 한증인 환자는 양열지기가 부족해서 양열을 돕는 한약과 함께 체질에 맞는 육식을 충분히 먹게 해야 치료가 더 빨리 될수 있습니다.

소증이 열증인 사람은 기본적으로 음허하기 때문에 양열지기를 돕는 육식을 지나치게 많이 먹게 되면 음허를 더 유발할 수 있습니다. 결과적으로 체질과 더불어 한열의 감별이 정말로 중요해 진다는 걸 재삼 이해할 수 있습니다.(양생도 한열을 알아야 가능합니다.)

안준철

육류는 실제로 열량이 많아 보입니다. 그래서 북한사람이나 러시아 같이 추운 지방사람이 고기를 많이 먹게 되고...태음인이라도 한자는 소고기를 많이 먹으면 보기 모양이 되겠지만 열자는 양열을 보해서 음혈을 오히려 모손하게 됩니다. 소양인의 돼지고기 소음인의 닭고기도 같은 경우입니다. 한열이 정말 중요해 집니다.

(윤승일)

감사합니다. 가령 소양인 열자인 경우엔 돼지고기를 최소한으로 먹어야 하나요 아니면 열자는 고기를 아예 금기시킬까요? 감사합니다

(안준철)

열의 정도에 따라서 육식을 조절해야 된다고 여겨집니다. 가령 당뇨병 등으로 구갈 다한 등이 있으면 일단 육식은 열을 더 돕기 때문에 좀 자제하고 담담한 음식으로 보를 해야 됩니다. 동의보감에 오곡이 오장을 튼튼히 한다는 대목이 나옵니다. 체질에 맞는 곡물이 열자에게는 가장 중요해 보입니다. 결론적으로 말씀드리면 소갈 등의 열의 증상이 극심하지 않으면 열자도 육식을 어느 정도는 먹어야 된다고 생각합니다.

예를 들어 태음인 고지혈증의 경우 한자는 소고기를 많이 먹었을 때 콜레스테롤이 급격히 줄어듭니다. 열자도 체질에 맞는 육식은 콜레스테롤이 줄어들기는 하지만 한자에 비해서 매우 미진합니다. 이런 사실만 보더라도 육식은 한자에게 잘 맞다는 것을 알 수 있습니다. 육식을 소화시킬 때 담즙의 배설이 잘 되기때문에 콜레스테롤이 줄어듭니다. 담즙의 주성분은 콜레스테롤입니다. 그래서 대변색이 누런 담즙색이면 좋은 대변으로 봅니다.

사람은 누구나 나이가 들어감에 따라서 음혈이 고갈되는 방향으로 노화가 진행됩니다. 그래서 나이가 많을수록 육식을 줄여야 되고 담담한 음식으로 음을 보해야 됩니다. 술과 과로 수면부족 방로과도는 음혈 모손에 가장 큰 주범입니다. 잠을 잘 때 음혈이 길러집니다. 잠을 잘 잘 수 있는 노인이 수명이 깁니다. 음혈이 보충되는 시간이 그만큼 많다는 의미입니다. 12시

전에 자고 7시간 이상 숙면해야 됩니다.

주영준

아, 그렇군요. 제가 고기를 먹은 다음 날 대변을 볼 때면 변비경향이 뚜렷하게 나타난다는 것은 양열지기가 더욱 조장되서 그렇군요

석고의 약성(瀉胃熱 口渴 외에 발열을 발한으로 해기함으로써 치료한다)

석고에 대해서 일반적으로 위열을 사하고 구갈이나 발열에 쓰인다는 사실은 잘 알고 있습니다. 동의보감 汗門에 解肌하고 땀을 낸다고 나와 있습니다.

그래서 백호탕이 외감열에 쓰이는데 그냥 열이 떨어지는 것이 아니고 땀을 내서 피부를 통해서 해열함을 알 수 있습니다.

대변 소변 땀이 아니면 열이 나갈 길이 없음을 확실히 이해해야 됩니다.

모든 해열기전은 대변 소변 땀과 관계한다는 사실이 중요합니다.

그냥 해열이 되지 않습니다. 대소변 땀과 함께 열이 나갑니다. 석고는 땀과 함께 열이 나가도록 하는 약입니다.

석고가 땀을 나게하기 때문에 외감에 그렇게 많이 쓰이고 중요한 약입니다.

석고가 해기한다는 사실을 꼭 기억해야됩니다

차전자의 약성(활석과 같이 止瀉, 화담지해 작용으로 담을 삭히고 기침을 멎게 한다. 治오림, 소변윤편, 비강 내 점막의 흥분을 진정시켜 비염치료, 보간신)

차전자는 질경이의 씨입니다.

활석과 같이 쓰면 설사를 멎게 합니다. (지사작용)==>[차전자가 들어가는 형방지황탕도 태음병 즉 설사를 멎게 할 목적으로 만들어진 처방]

일체설사에 초해서 사용한다고 나와있습니다.

동의보감에 化痰止咳한다고 나와있습니다.(담을 삭히고 기침을 멎게한다)==> 패독산이나 형방지황탕 저령차전자탕 등에서 외감성질환에 차전자가 가장 핵심이 되는 약입니다.

그리고 오림과 소변윤편에 쓰입니다.

중요한건 화담지해 한다는 사실이 됩니다. 그래야만 수세보원의 소양인 처방을 제대로 이해할 수 있습니다. 차전자 전초는 혈뇨 육혈 토혈에 쓰입니다. 즉 일체의 피가 나오는 질환에 쓰입니다. 습을 제거해서 황달에도 쓰입니다.

민간요법으로 차전자 전초를 단미로 비염에도 씁니다.

비강내 점막의 흥분을 가라앉힌다고 알려져 있습니다. (이것도 결국은 외감과 관련해서 이해하면 되겠습니다.)

실제로 차전초(차전자 전초) 단미로 비염에 효과를 보는 경우를 봅니다.

값싸고 흔한 차전자! 간신을 보하는 건 물론입니다. 구기자 복분자 토사자 등과 함께 五子로

불리기도 하지요.

차전자와 관련된 또다른 내용(차전자, 고삼, 연교).

차전자가 비염에도 중요합니다. 비강내 점막의 흥분이 줄어듭니다. 비염에 차전자 전초를 차로 상복하고 치료된 예도 있습니다. 차전자가 혈관이나 점막의 흥분을 안정시켜 준다고 생각하면 됩니다. 천연의 항히스타민제 같은 역할을 한다고 생각하시면 됩니다. 그래서 혈관의 흥분은 두드러기로 나타나고 비강내 점막의 흥분은 비염으로 나타나게 됩니다. 약은 똑같이 차전자를 씹습니다.

고삼은 청열 燥濕합니다. 조습한다는 사실이 주요합니다. 그리고 이담작용이 있어서 황달에도 쓰입니다. 즉 간담습열에 대표적인 약미가 됩니다. 간이 청소되고 습열이 빠져서 두드러기에 효과가 있다고 생각하면 됩니다.

두드러기에 연교를 쓸수도 있습니다. 육울탕에서 열을 날리는 효과가 있습니다. 연교는 심 소장관계에서 열을 제거합니다. 스트레스와 관련이 많은 약입니다.

길경과 지각(길경은 태음인 비염이나 축농증 중이염치료에 가장 핵심. 지각은 두드러기에 좋고 귀나 코에서 배농작용을 한다)

길경 지각탕을 쾌기탕이라고도 하고 배농산이라고도 부릅니다.

흉격의 울체된기를 소통하는 작용이 있어서 쾌기탕이 되고... 실질적 염증과 농을 배출하는 효과가 있어서 배농산이라고 불리게 되는것 같습니다.

태음인에게 길경이 비염이나 축농증 중이염에 응용할 때 가장 핵심이 되는 약이 됩니다.

즉 태음조위탕에 갈근 승마 포공영 비파엽 백부근 대황을 가하고 마황을 증량하는 방법을 쓰는데 길경도 증량해줘야 효과가 신속합니다.

열증에도 갈근조위탕에 가미할 때 길경이 가미되어줘야 신속한 배농효과를 노릴 수 있습니다.

소음인의 경우 지각은 단미로 두드러기에도 응용할 수 있고 형계연교탕 등에서 쓰이면서 귀나 코에서 배농작용을 한다는 것을 알 수 있습니다.

태음인의 경우 길경과 더불어 백지가 중요하리라고 보여집니다만 아직 응용해 보지는 못했습니다.

후세방에서의 우리조상들의 경험과 지혜를 각 체질별로 이해하고 응용해야 우리의 미래가 있다고 생각합니다.

백지도 길경과 함께 응용해보고 결과를 취합해야 되겠습니다.

동의수세보원이나 사상의학만 공부해서는 사상의학이 절대로 안 됩니다.

동무공도 동의보감과 허준에 크게 의지하고 있다는 사실을 잊어서는 안되겠습니다.

황기의 약성(계지와 함께 위기를 조절하고 이뇨함으로써 외사가 소변으로 나가게 한다. 배농, 생기하여 비염, 중이염치료의 핵심. 이런 이유로 비염치료 위해 향사양위탕에 가감)

황기는 이뇨작용이 있습니다.

그리고 汗出 오한에 작용합니다. 그리고 무너진 衛氣를 조절합니다. ==>외사와 관련이 있는 약입니다.

본초에 맥부 오한 한출을 다스린다고 되어있습니다.

강활 독활 형제 방풍도 위기를 조절하고 표사를다스립니다. (表陰降氣) 강활 독활 형제 방풍도 소변으로 표사를 제거하는 작용을 합니다.

衛氣를 조절함에 소음인은 황기와 계지가 주약이 되고 소양인은 강활 독활 형제 방풍이 됩니다. 즉 황기 계지가 강활 독활 형제 방풍과 같은 일을하고 있다는 말이 됩니다.(위기를 조절하고 이뇨함으로 외사가 소변으로 나가게됩니다.)

그래서 소양인의 비염치료에서는 패독산에 가감하게 되고 소음인의 비염은 향사양위탕에 황기를 가하게 됩니다. 황기는 새살을 돋게 하고 배농작용이 있어서 소음인 비염에 핵심적인 약이 됩니다. 물론 향사양위탕에 천궁 소엽 당귀 지각 각1돈 천초3푼(백출은 창출로 대체) 등을 가해야 합니다. 황기가 위기를 조절하고 배농하고 生肌하며 위기를 조절한다는 사실을 꼭 기억해야 비염 중이염등을 완치할 수 있겠습니다.

귀한 가르침 감사드립니다. 소양인 비염의 기본방은 이제 패독산이 되는건가요?

안준철

표한을 다스리는 것이 우선인 것 같습니다. 그리고 리열을 사하는 지황백호탕을 응용하면됩니다. 치자 박하 황련 연교 등도 증에 맞게 함께 써야 됩니다.

전창환

와, 향사양위탕에 가미하는 약물이 좀 달라졌네요? 감사합니다 잘 읽었습니다!!

오현우

감사히 잘 읽었습니다. 황기를 외사에 관련지어 꼭 기억하겠습니다.

안준철

비염에 향사양위탕을 쓸때는 백출을 창출로 대합니다. 발산력이 있고 실증인 습을 처리하는 창출이 더 효율적입니다.

한무규

모학회 강의를 보니까 황기는 5돈씩 대량으로 써야지 이뇨작용이 일어난다고 합니다. 황기를 쓰게 되면 신장으로 가는 혈관이 확장되어서 혈류량이 증가되어 소변량이 증가한다고 하네요. 반대로 인삼에는 항이뇨작용이 있다고 합니다

지각과 오약의 약성비교(지각은 하기하는데, 피부의 흥분을 가라앉혀 두드러기를 치료한다)

<지각과 오약의 약성 비교.>

지각과 오약은 향부자 오약 등과 더불어 소음인의 가장 중요한 리기약 중 하나입니다.

지각은 주로 육부에 작용하고 하기합니다.

지각은 식적이나 기체를 위에서 아래로 내려주게된다.

오약은 주로 오장에 작용하고 신이나 방광을 덮혀서 비폐에 까지 영향을 주게된다.

즉 오약은 밑에서 덮혀서 위에까지 올라간다.

오약과 익지인이 들어가는 축천환은 신 방광을 덮혀서 기화시켜주는 것이 목표가 된다.

오약은 신온하고 열을 가해주는 약이기 때문에 열자는 린한다.

지각은 신고하고 하행하기 때문에 임신부나 허증에는 신중하게 써야한다.

그리고 지각은 소음인의 피부질환(두드러기)의 대표약임을 잊어서는 안 되겠습니다.

안준철

둘다 순기제인데 지각은 쓰고 약간 찬 약이라서 위에서 아래로 내려가고.....오약은 신온해서 하초를 덮혀 올라가서 순기한다는 차이를 말하고 있습니다.

오현우

다시 새겨서 기억하겠습니다^^ 지각을 두드러기에 응용할때 식적에 의한 두드러기 말고 모든 종류, 예를들면 피부묘기증같은 두드러기에 응용해도 되나요?

안준철

피부의 흥분을 가라앉힌다고 생각하면 됩니다.

향부자와 목단피(모두 간에 작용. 갱년기장애로 간기울체 있으면 소음인은 향부자로 리기해울, 소양인은 목단피로 파혈 활혈 해울. 목단피는 소양인의 식체로 인한 울혈을 푼다. 독활지황탕)

향부자는 理氣藥이고 목단피는 理血藥이고 파혈약입니다.

공통점은 肝에 작용한다는 것입니다.

갱년기 장애로 간기울체 등의 증상을 보이면 소음인은 향부자로 理氣 해울하고 소양인은 목단피로 파혈 활혈 해울합니다. 이렇게 같은 증상이지만 체질에 따라서 치법은 달라집니다.

그러나 귀경은 역시 같은 간경이라는 사실이 더 중요하겠습니다. 즉 간울의 질환은 소음인은 향부자로 行氣 理氣해서 치료하고 소양인은 목단피로 해울합니다.

같은 질환은 같은 귀경의 약을 써야하고 체질에 따라서 치법과 약물이 달라진다는 사실을 말하고 있습니다.

이세희

감사합니다...소양인의 소화장애에 목단피를 쓰는 이유는 뭡까요? --;;

안준철

식물을 풀어주게 됩니다. 독활지황탕의 가장 핵심이 되는 약입니다. 즉 식체로 인한 울열을 풀어줍니다. 소양인의 소화장애는 울열과 리열입니다.

생강 대추(생강은 위기를, 대추는 영기를 조절한다)

계지탕에서 계지는 표에서 위기를 조절해서 외사와 대응하는 작용을 하게된다.

백작약은 리에서 영기를 조절하는 작용을 하게된다.

생강은 표에 작용해서 위기를 돕고 외사를 밀어내는 작용을 하게 된다.

대추는 리에 작용해서 영기를 도와서 화음하는 작용을 하게 되고 계지나 생강이 외사와 싸울 수 있는 물질적 기초를 이루게 하는 것이다,

즉 생강은 계지와 함께 위기에 작용해서 외사에 대응하고 대추는 작약과 함께 영기에 작용해서 위기가 외사와 싸울 수 있도록 해주는 영양물질이 되게 되는 것이다.(삼양병에 해당하는 울광 망양 병 처방은 모두 생강 대추가 있다.)

그래서 생강 대추가 다 들어가는 처방은 영위를 모두 조절할 필요가 있는 경우이고 생강만 들어가면 위기만 조절할 목적이고 대추만 들어가면 영기만 조절할 목적으로 만들어진 처방이라는 것을 알 수 있게된다.

그리고 생강 대추가 모두 빠진 처방은 영위의 조절과 무관한 삼음병의 처방이 되는것이다.(삼음병의 백하오이중탕 백하오부자이중탕 관계부자이중탕 오수유부자이중탕 등은 모두 생강 대추가 빠져있다.)

그래서 대추만 쓰이고 생강이 빠진 적백하오관중탕은 영기를 조절할 의도가 있는 것으로 파악하면 되고 그 약효가 어디에 미치는 지를 알게된다.

또 생강만 쓰이고 대추는 없는 계지반하생강탕은 위기를 조절하고 영기의 문제는 건드리지 않는다는 것을 알 수 있게 된다.(내부에서 영기의 문제는 이상이 없고 다만 담음이 발생해서 반하로 거담하려는 상황이다. 물론 생강이 있어서 위기가 문제가 됨을 알 수 있다.)

동무공의 처방은 약미 하나 용량 하나도 간과 할 수 없습니다.

필연적 이유와 엄격한 기준에 의해서 약미의 가감과 용량이 결정되었음을 알 수 있습니다.

태음인 산약, 태양인 양파 적용례(산약은 태음인에게 보음하면서 보기하고 양파는 태양인 오심 구역 현훈 등의 담음증상에 도움이 된다)

1. 57세 태음인 열자 아줌마. 아저씨 문제로 몹시 스트레스가 심하신 분이였습니다.

이분은 두통, 견비통으로 치료받으셨는데. 속이 늘 체한듯 트릿하고, 쓰리고 아프고 하셔서 힘들다고 하셨습니다. 내과에서 오랫동안 치료받고 계시고...

한달~석달 정도 치료하면 괜찮다가 다시 불편하고를 반복. 별로 치료 의지가 없어 보였습니다

다. 마침 침 치료 중 코코아와 홍합을 먹고 뒷머리가 몹시 아프면서 두통이 심해지시시고, 공복에 더 불편하다고 하셔서 '산약'을 생으로 먹길 권해드렸네요.

하루 먹고는 속이 더 뒤집힌답니다. 그래서 볶아서 드시라고 했습니다.

그 뒤로 한참 안 오시다가 엿그제 다시 오셨는데. 속이 점점 편해지면서 지금은 너무너무 편해지셨다네요~ 굴 한상자 놓고 가셨습니다.

안선생님께서 산약은 보음도 하지만 태음인에게 보기하는 효과도 있다는 게 중요하다 하셨습니다. 이분이 신경을 많이 쓰시면서 속이 불편한 분이라 처음에는 더 뒤집혔나 봅니다.

간기범위, 위습열증에 산약이 들어가면 속이 더 아플 수도 있다네요. 위허하면서 위장병 왔을 때는 산약이 매우 속이 편하게 한다네요.

2. 36세 태양인 한자 아줌마. 부산에 계십니다. 체력이 몹시 달리고. 좀 예민한 분입니다. 성격 깔끔하심. 얼마 전부터 속이 울렁 매식거리면서, 어지러움이 잠깐잠깐씩 있었습니다.

이비인후과에서 안경쓰고(프렌즈?) 검사해서 전정신경염 진단 받으셨습니다.

이전에 약 드시고 좋았던 기억나서 전화문의 주셨네요. 태양인 약재도 없고, 약 바로 지어드리기도 뭐해서. 오심,구역,현훈... 담음으로 생각. 일단 양파즙 드셔보시라고 했네요.

양파즙 2일 먹고, 속도 편하고 어지러움 없어졌습니다.

까먹고 있었는데, 3주 지나 다시 전화와서는... 다시 약간 어지러울듯한 기미가 보일듯 말듯(?) 불안 하셔서, 양파즙 계속 먹어도 되는지 전화주셨네요. 속 매식하면 바로 드시라고 했습니다. 새해가 밝아오면 한약지으러 KTX타시겠다는군요.

평소 섭생이 매우 중요한 모양입니다. 감사합니다

(안)

짜 짜 짜 훌륭하십니다. 이렇게 단미로도 충분히 효과를 보게 되면 복방은 말할 것도 없겠습니다. 산약은 태음인의 보기약입니다. 근데 당근은 어디 갔나요?ㅋ

아토피에서 맥문동 천문동은 건조성에 듣고, 승마 황금 황련 황백은 조습청열하므로 짓무르는 증상에 쓴다.

양부모가 태음인이라서 어린이는 태음인 열증이 확실해 보입니다. 승마는 조습청열합니다. 건조한 아토피에는 천문동 맥문동 위주로 약을 습니다. 황금도 짓무는 경우에는 잘 듣습니다만 건조한 경우에는 쓰지 않습니다. 황금 황련 황백 등은 조습청열한다는 사실이 중요합니다. 아토피 역시 증상에 따라서 다양하게 접근합니다.

백령(가위톱)

성분 : 점액질의 전분등.

포도과(포도과;Vitaceae) 식물 백령(가위톱;Ampelopsis japonica (Thunb.) Mak.)의 괴근.

성분이 고르고 맛이 쓰고 달며 독이 없고
옹저(癰疽), 창종(瘡腫), 발배(發背), 나력(癰瀝), 장풍(腸風), 치루(痔瘻),
면상포창(面上疱瘡), 타박손상(打撲損傷), 도전상(刀箭傷)을 치료하고
생기지통(生肌止痛)하며 종독을 탕화창(湯火瘡)에 발라준다.

산약을 생용하면 보음혈, 초용하면 보기해서 냉대하, 설사 치료

산약은 생으로 쓰면 음혈을 보하고(생은 보음 보정) 초하면 온성이 더해져서 설사 냉대하등에 쓰입니다(초는 보기).

목통. 태음인, 심소장의 열을 소변으로 배출. 심계 불면 있을 때만 사용.

목통은 심 소장 열을 소변을 통해서 빼내는 역할을 합니다. 심계나 불면 등의 증상이 없으면 사용하지 않는 것이 좋겠습니다. 소변이 지나치게 빠져나가서 변이 더 굳어집니다.

유근피(속쓰리면 5분, 열증에는 1돈까지 사용. 기관지, 비강, 위, 장 등의 점막손상에 모두 응용)

용골은 어느 동물의 뼈인지 알수 없습니다. 그래서 어느 체질약인지 알 수 없어서 태음인약으로 쓰면 안됩니다. 속쓰림에는 유근피 5푼만 쓰세요. 열증에는 유근피를 1돈까지 씁니다. 참고로 유근피는 기관지 비강 위 장 등의 점막에 작용합니다. (기침 비염 위장 등의 점막 손상에 모두 응용합니다.

태음열자로서로 변이 묽고 설사하는 사람에게는 引經을 위해 대황을 1g까지 줄여쓰기도

잠을 못자는 것은 마황의 부작용으로 보여집니다. 태음인 열증으로 봐야겠습니다. 갈근조위탕에 대황을 5푼 줄여서 쓰면 좋겠습니다.(변이 아주 묽고 설사를 정말로 잘하는 사람은 대황을 1그램까지 줄여서 쓰기도합니다. 위로 인정하는 약이라서 빼면 안 됩니다.)

소양인 혈약으로 대계, 소계(녹혈, 하혈)

소양인 육혈에 대계 소계가 잘 듣습니다. 하혈에도 대계 소계가 탁월합니다.

단삼대황탕의 백렴과 가감방의 백질려(태양인의 현호색처럼 백렴은 기체혈어에 씀)

단삼대황탕에는 기체혈어로 백렴이 나오는데 가감방에는 백질려가 골반혈류증가한다고 알고 있습니다. 백렴과 백질려의 차이점에 대해 알고 싶습니다.

백렴: 청열해독약,기체혈어,창구불렴,창양종독..(포공영,패장,우황,웅담...)

백질려: 평간잠양(평간명목,소간해울,...

안준철

백렴은 기체혈어에 쓰입니다. 태양인약 현호색처럼 기체혈어에 쓰입니다. 차이는 백렴은 성질이 寒하고 현호색은 온성입니다.

백질려는 거풍하는 작용이 있어서 두통 안질 고혈압 등에 효과가 많습니다. 일반적으로 下氣할 목적으로 염초해서 사용합니다. 그리고 피부나 뇌의 충혈을 없애줍니다. 그리고 골반과 복강내로 혈류를 증가 시킵니다. 조구등도 비슷한 효과가 있습니다. 피부나 뇌에 충혈된 혈류를 골반내부로 돌려준다고 생각하면 됩니다. 백질려는 조구등과 함께 골반내의 어혈에 보조약으로 많이 쓰입니다. 직접적인 破瘀작용은 약합니다.

교감신경이 항진되면 뇌 피부 안구 등에 충혈이 되고 혈압이 높아집니다. 백질려는 이때 뇌 피부 등에 충혈된 혈류를 골반 복강으로 내려줍니다. 이 두 가지 작용이 동시에 일어난다는 사실에 주목해야 됩니다. 그래서 백질려는 불임 생리통 성기능장애 등의 복강내 질환의 요약이면서 피부과의 요약입니다. 결론적으로 백질려는 교감신경을 억제하고 부교감신경을 활성화하는 매우 좋은 약입니다.

대항주증은 밀막걸리로 한다.

대항 주증포제가 궁금합니다. 밀막걸리가 따로 있나요 아니면 그냥 막걸리 아무거나 되는지 궁금합니다. 또 전 대웅약탕기 사용하는데 통에 밀막걸리를 넣고 위엔 체를 걸치고 거기에 대항을 넣어 증기로 찌면 되는 건지 궁금합니다. (오미자는 그렇게 했거든요)

안준철

오미자는 주증이 아니고 그냥 증합입니다. 맹물로 찌서 건조시킨 후 사용합니다. 증하면 보음하고 생으로 쓰면 기관지 비위 등에 작용합니다.(태음조위탕은 생으로 보음탕에서는 증합니다.)

시증의 말걸리는 대부분 쌀로 만든 쌀막걸리입니다. [이동주조 018-333-4257 장보영]으로 연락하시면 밀막걸리를 구할 수 있습니다. 1박스에 택배비 포함2만원입니다.

막걸리에 대항을 1-2시간 담궜다가 찹니다.

전탕 시간(대항은 후하해서 30분, 마황 형개 곽향등의 방향성약물은 1시간, 보통은 2시간 전탕한다.)

사상처방으로 시스템을 변경하려하니 처음부터 궁금한것이 많습니다.

너무 기초적인 질문이지만...저는 전탕시간을 기존에 보통 2시간(감기약)-3시간(일반약) 정도로 해왔었는데요,(무압력 용기약탕기 기준), 사상처방은 전탕 시간을 어떻게 해야 하나요?

어떤 원장님께서서는 2시간이면 충분하다 하시는데 어떤 것이 좋은지 궁금합니다.

ps. 추가질문.

약량은 아래 모원장님 질문처럼 2첩으로 3팩(1일),
즉 45팩(15일분)이면 30첩 분량으로 전탕하면 되나요?^^

안준철

2첩 3팩 1일분입니다. 보통 2시간 전탕하면 됩니다. 대황은 후하하는 약이므로 30분만 다립니다. 대황을 오래 다리면 주요성분이 가수분해가 일어납니다. 형계 마황 곽향 등의 방향성약물은 1시간만 달입니다. 후세방과 똑 같습니다. 다르면 이상한거지요.

상황.여정실vs산약 연자육(산약 연자육은 건비, 보기+보신, 여정실은 생용하면 간열을 사하고 주증하면 보음, 상황은 보음 보혈한다)

60세 중소기업CEO이고 면적, 술 가끔, 지각발달, M자형탈모(탈모약 복용중),땀많다.전립선염(과음시)발생,맥유신....열태음인으로 판단
2번정도 보약개념으로 갈근조위탕+산약연자육 드렸습니다.

이번에도 소화정상,대변정상,크게 불편한곳은 없고 다만 스트레스와 피곤함을 주소로 약간은 보약개념으로 약을 지으려고 합니다. 유선생님 처방을 공부중이라 이번엔 상황, 정심보음탕으로 할까 생각중인데 여기에 상황, 여정실 류의 약물과 산약연자육류의 약물의 차이점이 뭔지 좀 알고 싶습니다.

처방은 정심에 상황도 군약으로 올려 상황,여정실3돈+ 산약연자육 인데
좋은 의견있으면 부탁드립니다...
늘 좋은 말씀에 감사드립니다.^^

안준철

산약 연자육은 健脾 補氣작용이 강합니다. 그리고 補腎하는 작용도 있습니다. 여정실은 생으로 쓰면 간열을 사합니다. 여정실을 주증하면 보음합니다. 상황 역시 보음하고 보혈합니다. 산약 연자육은 상황 여정실에 비해 보기 보비작용이 우선이고 보신하는 작용도 함께 있다고 생각하면 되겠습니다.

오미자를 생용하면 외감으로 기관지에 작용, 증하면 보음(당뇨에 用), 오미자 증하는 방식

유선생님처방에 포제가 나오는데 그 중에서 오미자(증)은 어떤 작용을 위한 것인가요?
또 실제로 약제로 주문하시는지 원내에서 어떤 식으로 하시는지 궁금합니다.

안준철

오미자를 생으로 쓰면 기관지에 주로 작용합니다. 증하면 보음하는 효과가 있습니다. 그래서 보음탕에는 증해서 씁니다. 해수 등에는 생으로 씁니다.
채반을 깔고 수증기로 찌 후에 말려서 씁니다. 오미자 산수유 등은 보음하고 진액을 생기게

합니다. 그래서 소갈(당뇨)등의 소모성 질환에 끝까지 죽을 때까지 쓰이는 약이다...이렇게 말하기도 합니다. 이때도 오미자는 증해서 사용합니다.

황금은 조습청열하므로 잘 못 사용하면 더 건조해지고 인설이 생긴다. 고본도 조습.

화피나 부평초와 황금 고본 등이 체질에 맞음에도 불구하고 부작용이 나는 경우는 어떤 경우가 있을까요.? 고견부탁드립니다.

안준철

화피는 아직 어떤 체질약인지 확인이 안됐습니다. 황금은 조습청열합니다. 피부병 등에서 건조한 경우에 잘못사용하면 더 건조해지고 인설이 생기는 부작용이 있습니다. 고본 역시 한습에 쓰이는 약입니다. 조습하는 작용이 있습니다. 체질에 맞아도 증에 맞지 않으면 부작용이 납니다. 체질에 맞지 않아도 증에 맞으면 일시적이지만 효과가 납니다.

대황은 1시간 이내로 전탕한다.

오래 끓이면 사하작용이 없어져 오히려 변비가 생기지 않는가?

그렇다면 후하해야 하는 거 아닌가요?

(안)

대황을 오래 달이면 유효성분이 가수분해 됩니다. 대황은 후하가 원칙이나 번거로운 관계로 1시간 이내로 전탕합니다. 제노사이드성분이 부족한 일부 대황은 오히려 변비를 일으키는 경우도 있습니다.

(김)

강하게 쓰고 싶으면 20~30분 물에 담가서 담근물과 함께 20분 달이면 된다 해서 갈근조위탕은 그렇게 탕전하고 있습니다.

각 체질별로 <이진탕> 같이 담음을 해결하는 약물들

이진탕이 치담약인 것은 다 아실테구요

이진탕 처방과 같은 역할을 하는 처방은 <새로쓴 사상의학>의 '진액변증문'을 참고하면 될까요? 예를 들자면 태음인 열자이다. 그런데 현증은 습담이다.

이러면 열담약을 위주로 습담 약재를 몇 개 가미해야 할지요?

이용양 선생님 동의보감 강의 '담음' 할 때부터 궁금했었는데 제 머리로는 잘 모르겠습니다.

여러 선배 후배님들의 고견 부탁드립니다.

안준철

태음인은 라복자 비파엽 죽여가 거담작용이 있습니다. (비파엽 죽여는 성질이 차서 한증은 5푼 정도 사용되고 열증은 2돈 이상 쓰입니다. 비파엽은 위와 폐에 주로 작용합니다.)

라복자는 비위에 작용해서 거담할 때는 초해서 씹니다. (라복자를 기관지의 가래에 쓸 때는 생으로 씹니다.)

석창포는 온성이고 割痰합니다.(석창포는 특히 중풍의 언어장애 또는 목소리가 쉰데 씹니다.) 오미자 길경 등도 온보하면서 거담작용이 있습니다.

원지 역시 거담작용이 있는데 특히 뇌신경을 안정시키는 작용이 있습니다.(거담안신)

태음인약 폐모도 확실한 거담작용이 있습니다. 천패모는 윤폐작용과 거담작용이 함께 있고 순해서 만성 해수에 주로 응용합니다.(어린이도 천패모를 위주로 씹니다.)

절 패모는 청열작용이 강해서 급성 외감성 해수에 주로 씹니다.(감기에는 절패모를 주로 씹니다.) 천패모와 절패모는 기원이 완전히 다른 약재입니다. 구분해서 쓰여야 합니다.

의이인 건울도 거담합니다. 의이인은 이습해서 거담하고 건울은 조습작용이 강해서 거담합니다. 태음조위탕은 거담이수가 기본적인 작용입니다. 마황도 거담작용이 있습니다.

소양인의 거담제는 차전자 복령 택사 과루인이 중요합니다. 형방지황탕에 차전자가 쓰이는 태양인은 양총피(양파) 적소두 목과가 거담에 씹니다.

적소두는 심 소장에 작용해서 청열이수합니다.(도적산의 의미)

양총피는 태양인 거담제 중에서 가장 중요합니다. (특히 고혈압 고지혈증의 특효약입니다. 고혈압등에 잘 듣는 이유는 탁월한 거담작용에 있습니다.

모과는 거습화위합니다.(거습하는 작용이 있어서 풍습질환인 관절염 등에도 씹니다.거습해서 위가 편해집니다. 목과가 거습 화위해서 위장질환에도 매우 중요한 약입니다.)

소음인은 잘 알려진 대로 반하 남성 생강 진피 등을 씹니다.

정용재

류선생님께서 <새로쓴 사상의학>에서 딱 부족한 게 담음처방이라고 하셨습니다. 그래서 강의 자료에서 새로 담음처방을 공개하셨습니다. 개인적으로 류 선생님의 담음처방은 담음이 매우 두드러진 증상에 한해서 쓰고 담음증상이 약하게 나타날 때는 기본방에 가감하는 게 더 좋다고 생각합니다. 담음처방 써서 효과 본 임상례 좀 올려주세요. 저는 성공한 적이 없어요.ㅠㅠ

이제마의 담음약이 <동무유고>에 나오네요. 비교해 보면 재밌을것 같습니다 : 肺之痰飲黃芩青礞石也. 脾之痰飲半夏南星也. 腎之痰飲竹瀝瓜蒌仁也. 肝之痰飲五加皮木瓜也. 肺之痰藥重用之則樗根皮大黃也. 脾之痰藥重用之則巴豆砒霜也. 腎之痰藥重用之則蘆薈甘遂芫花也.

<소음인 - 향부자>, <소양인 - 시호>처럼 간기울결을 풀어줄 수 있는 대표적인 약물로 태음인에게는 산조인, 태양인에게는 현호색이 있다. 산조인을 생용하면 간담화를 사해서 불면을 치료하고, 炒用하면 간혈을 자양해서 불면, 다한증에 쓴다.

윤선생님 영양학 강의 듣고 나니까 근골격계 치료에 있어서도 심리적인 스트레스를 풀어주는 것이 중요하단 싶습니다. 그래서 한약에서도 카테콜라민의 역할을 할 수 있는 약물을 근골격

게 치료에 응용하고 싶은데요..

<소음인 향부자>, <소양인 시호>처럼 理氣 安神 解鬱 등의 효능을 가진 대표적인 약물이 어떤 것이 있을까요?

정용재 10.04.17. 14:40

류 선생님 처방 앞에 이름을 뽑아보셔도 도움이 됩니다. 류선생님 처방은 거의 "주약+주치湯"의 일관된 형식으로 작명되어 있습니다. 시호소간탕, 향부자소간탕 역시 그러하구요.

처방명의 주약의 효능이 본초편과 조금 다른 것도 있는데, 이는 류선생님의 새로운 본초 인식이라고 보시면 될 것 같아요. 여기 당신의 경험이나 민간요법, 약리학적 분석까지 다 녹아 있는 거죠. 본초편은 전통한의학의 효능 중 류선생님이 취사선택하신 것이라 이걸로 류선생님 처방이 다 이해되지는 않는 것 같습니다.

안준철 10.04.18. 13:01

태음인은 산조인입니다. 산조인은 소간한다는 의미보다 간기울결로 생긴 열을 끈다고 생각하면 더 쉽습니다. 산조인은 간담열을 끈다는 점에서 소간지제인 향부자나 시호와 달라 보여도 증상은 향부자나 산조인을 쓰는 경우와 같다고 생각하면 됩니다.

태양인은 현호색입니다. 현호색은 기체혈어에 쓰입니다. 즉 기체를 불어서 어혈을 없애고 그 반대의 일도 합니다. 중요한 사실은 현호색은 온성입니다.

산조인을 생으로 쓰면 간담열을 꺼서 불면 다한증(자한,도한)에 쓰이고 산조인을 초해서 쓰면 혈을 길러서 불면 다한증에 쓰입니다.(즉 생산조인은 실증에 간담열을 끄고 초한 산조인은 간혈을 자양해서 불면 다한증에 쓰여집니다. 매우 중요한 사실입니다.

갈근조위탕의 나복자, 식적, 변비에 쓸 때는 炒用하고, 기침 천식 등에 응용하고자 할 때는 생용한다.

갈근조위탕 실열변비에 쓸 때 원방은 그냥 나복자로 되어있는데 통변을 목적으로 할 땐 초하는게 더 좋은가요? 대항은 몇 그램까지 증량 가능한지도 궁금합니다.

안준철

消食해서 식적을 내릴 때는 초해서 사용합니다. 그러므로 갈근조위탕을 변비 식적 등에 쓸 때는 초해서 씁니다. 생으로 쓰는 경우는 祛痰 定喘하는 작용을 노립니다. 즉 생으로 쓰는 경우는 가래를 없애는 작용을 이용해 기침 천식 등에 응용합니다. 다시 말하면 내상에는 무조건 초합니다.(태음조위탕, 갈근조위탕 등) 그리고 외감과 관련된 질환은 생으로 씁니다.(기침 천식 등에 거담 下氣합니다.) 위장관에 작용하는 경우는 초해서 쓰고...기관지에 작용하는 경우는 생으로 쓴다고 간단히 생각하면 됩니다.

탈모증에 쓰는 가미상항보음환 하루 복용량은 어떻게 정하나요?

환제를 처음 써봐서 기초적인 질문이지만 은단대로 만들었습니다. 전체용량은 2500그램 정도

만들었습니다. 환자에게 드려야하는데 하루 복용량을 잡을 수가 없네요
탕제 처방 그람수 만큼 나눠서 드려야할지 ...지도 부탁드립니다.

안준철

육미지황탕도 원래는 육미지황원입니다.(원래 탕제가 아니고 환약으로 장복하는 약입니다.) 숙지황8냥으로 나와서 1/20로 계산해서 한첩당 4돈씩 육미지황탕을 씁니다. 이렇게 만들어진 환약을 오자대로 1회에 5-10환씩 복용한다고 나와 있습니다. 위의 처방도 오자대로 계산해서 1회에 10환이 넘지 않게 복용하는 것이 맞다고 봐집니다. 그 이후에 소화장애 등 아무런 문제도 없으면 복용량을 늘릴 수 있습니다.

육미지황탕도 탕제로는 1회에 숙지황을 4돈씩 복용하지만 환약에 있어서는 그 분량보다 현저히 적게 복용한다는 뜻입니다. 일반적으로 보음약의 경우 환약은 오자대로 40환까지 씁니다.

김기범

제가 정확히 찾은건지 모르겠지만요 오자대가 375밀리그램 오자대10환 3.75그램 1회복용양 오자대10환 4그램으로 시작해보겠습니다. 감사합니다.

체질별 한방음료수?? 소양인에게는 결명자, 구기자차가 좋다.

오미자청 한 박스를 받았는데요 액상과당이 들어있는 게 좀 꺼림직하긴 합니다
이왕이면 체질별 대표 약재를 한방음료로 만들면 환자체질에 맞게
권해줘도 좋을듯 싶은데요. 오미자청 한박스 20개 들어있나 이것이 25000원 환자에게 받는답
니다. 다른 체질로는 어떻게 좋을까요?

가령 소양인-대계? 태음인-포공영? 소음인-대추 생강 인삼?

한증열증에 두루 도움 줄 수 있는 대표약재를 선정해서 만들어달라고 하든지 아니면
자체적으로 만들지 해서 환자에게 주는 것은 너무 순진한 발상일까요?
좋은 의견주세요 감사합니다

안준철

소양인은 결명자가 좋습니다. 장복하고 시력이 좋아지는 경우를 많이 봅니다. 구기자와 같이 쓰는 것도 간에 좋을 거 같습니다.

하수오는 간혈을 보하거나 신허에 필수적인 약(태양인)

간혈을 보하거나 신허에는 없어서는 안되는 약입니다. 간신에 필수적인 요약입니다. 간이나 신을 위한 처방에는 거의 다 들어간다고 해도 과언이 아닙니다.

문어(大八梢魚, 태양인)는 태양인 최고의 보혈약, 어지럼증에 굿. 낙지(소팔초어, 태양인)

정용재

최근에 <보제연설>이란 100년 전에 만들어진 사상정리집을 입수해 봤는데 태양인 처방 중 대팔초탕이란게 있습니다. 大八梢魚를 국을 끓여 먹는 건데요, 문어탕이네요. ㄹ 肉滯를 치료하고 養血成胎한다고 합니다. 안선생님께 문어가 태양인 최고의 보혈약이란 말씀을 들었는데, 처방으로 접하니 새롭습니다.^^

안준철

어지럼증에 문어를 3번 실컷 먹으면 최고다.==>경북 바닷가의 민간요법입니다. 문어가 많이 나고 제사상에도 문어를 최고로 중요하게 여깁니다. 잔치에서도 마찬가지입니다. 전라도의 홍어 같이 귀한 존재입니다. ㄹ

애엽(소음인)/인진(소음인)/청호(태음인)/참쑥(태양인)의 기원. 청호는 면역의 과흥분으로 인한 염증에 좋다(아토피, 루프스 등)

1) 한인진

•더위지기 *Artemisia iwayomogi* Kitamura (한약규격집)

2) 인진

•사철쑥 *Artemisia capillaris* Thunberg (한약규격집)

•- 봄에 채취한 것을 '면인진(綿茵陳)'이라 하고, 가을에 채취한 것을 '인진호(茵陳蒿)'라 한다.

3)애엽

•황해쑥 *Artemisia argyi* Lev. et Vant. (한약규격집)

•쑥 *Artemisia princeps* Pamp. var. *orientalis* Hara (한약규격집)

•산쑥 *Artemisia montana* Pampani (한약규격집)

4) 청호

•개똥쑥 *Artemisia annual* Linné 또는 개사철쑥 *Artemisia apiacea* Hance (국화과 *Compositae*)의 지상부 (한약규격집)

한무규

개똥쑥이나 개사철쑥은 태음인에 쓰는 청호이고요, 사철쑥은 소음인에 쓰는 인진입니다. 일반적으로 음식으로 먹는 식용쑥은 어느 체질에 맞는 음식일까요?? 혹시 아시는 원장님 계시면 좀 가르쳐주십시오.

안준철

쑥떡 해먹는 쑥은 참쑥이고 태양인약입니다.

청호는 면역억제 효과가 있어서 루프스와 같은 면역질환에 청열작용을 합니다. 아토피에도 같은 기전으로 매우 중요한 약이 됩니다. (면역이 과흥분되서 오는 염증으로 인한 열을 내려줍니다.) (안선생님)

소음인 천궁은 일천궁 쓰면 되나요? -> 토천궁 쓰세요

고본이 뇌세포를 활성화하고 뇌기능을 회복합니다.

오늘 인기 검색어 열다한소탕>>치매에 호전율이 좋다고 하네요

아~~ 정말 이런 연구 많이 나왔으면 좋겠습니다.

ㄴ <안준철 10:26>

고본이 뇌세포를 활성화하고 뇌기능을 회복합니다. 열다한소탕의 효능이라기보다는 고본의 효능이라고 말하는 게 더 맞겠습니다. 고본은 정신질환에도 중요합니다.

열다한소탕은 전광 등의 정신질환에도 응용합니다(대황과 함께).

대황, 청호, 울금, 감국, 포공영, 진교 등 태음인 이담약물의 처방사용례

대황 8개 처방- 장엽대황(이담 강), 당고특대황(사하 강)

고, 한 / 비 위 간 심포 대장

공적도체사, 랑혈해독, 활혈거어

015 갈근승기탕 8g	(열자) 태양부증-방광축혈, 양명부증, 소음겸양명증 기분증-열결기분내입위장(변비)	대장실열
016 의이인승기탕 2g	(한자) 태양부증-방광축혈, 양명경증, 양명부증 기분증-열결기분내입위장(변비)	대장실열
027 우각청영탕 4g	하초습열-습체대장 (열자) 영분증-영위합사, -열재영분, -열입심포, 혈분증-열재혈분, -열동간풍 중초습열-습열양담몽폐심포	혈열
033 갈근청간탕 2g		간화상염, 간경습열, 담열 기폐증
045 황금청심탕 4g		습음증-습열재간담 심화항성, 담화요심
084 갈근청장탕 4g		화음증-허화상염
096 단삼대황탕 4g (주증)		대장습열
122 울금청간탕 4g		(열자) 혈어 간담습열, 간담울열, 체담울열

청호 3개 처방

고, 미신, 한 / 간 담

퇴허열, 청열량혈, 청열조습, 청열해서, 대학

070 청호온담탕 6g		담울담요(膽鬱痰擾)
071 감국온담탕 4g		담울담요
122 울금청담탕 4g		간담습열, 간담울열, 체담울열

울금 4개 처방

신, 고, 량 / 심 간 담 폐

행기화어, 청심해울, 리담퇴황

045 황금청심탕 4g		심화항성, 담화요심 화음증-허화상염
046 단삼해백탕 4g		심혈어저 한음증-심한홍비
071 감국온담탕 4g		담울담요
122 울금청담탕 8g		간담습열, 간담울열, 체담울열

감국 16개 처방

감, 고, 량 / 폐 비 간 신

소산풍열, 평간명목, 제흉중번열, 퇴예명목, 리혈맥, 치유풀, 안장위, 청위열, 청열해독

004 백부근청열탕 4g	(열자) 풍열범폐, 조사상폐, 폐경풍열 위분증-풍온상위, -추조상위(온조)	
005 자완청열탕 6g	(한자) 풍열범폐, 폐경풍열 위분증-풍온상위, -추조상위(온조)	
009 자완상백피탕 4g	(한자) 기분증-열사옹폐	담열옹폐 열담
032 산조인소간탕 4g		간기울결, 간경습열 기체, 담기호결 습음증-습열재간담
034 하고초청간탕 4g		간화상염, 간경습열, 담열 기폐 습음증-습열재간담
036 상자양간탕 4g		간음허, 간양상항, 간양화풍
071 감국온담탕 6g		담울담요
079 유근피청위탕 4g		위열, 비위습열
080 건률청위탕 4g		위열
085 유근피청장탕 4g		대장습열
089 유근피화위탕 2g		간기범위
091 상백피청폐탕 4g		간화범폐
093 단삼양혈탕 2g		심비량허 기혈량허
103 감국구풍탕 6g		풍담

		풍음증-풍사중면부락맥, -풍재근골
105 창이자패장탕 4g		풍음증-풍사상피부 풍열작양, 풍습온부
107 감국해독탕 6g		화음증-화열상염

포공영 8개 처방

고, 감, 한 / 간 위

청열해독, 청열리습, 통리소변

006 갈근청열탕 4g	(열자) 풍열범폐, 폐경풍열, 조사상폐 위분증-풍온상위	
008 갈근포공영탕 8g	(열자) 기분증-열사용폐	담열옹폐 열담
024 황금의이인탕 4g	(열자) 기분증-습온재기 중초습열-습열저색기기, -습열 울발백배, 하초습열-습체방광	
027 우각청영탕 4g	(열자) 영분증-영위합사, -열재 영분, -열입심포, 혈분증-열재혈 분, -열동간풍	혈열
028 단삼청영탕 8g	중초습열-습열양담몽폐심포 (한자) 영분증-영위합사, -열재 영분, -열입심포, 혈분증-열재혈 분, -열동간풍 중초습열-습열양담몽폐심포	
073 천문동도적산 4g		소장실열, 방광습열
114 의이인청폐탕 4g		폐경울열범비
116 백지창이자탕 4g		열독외침폐규

진교 6개 처방

고, 신, 평 / 간 위 담

거풍승습, 통락치옹, 퇴감적체열, 청골증조열, 퇴습열황달, 리수통림.

029 맥문동양액탕 6g	(열자) 혈분증-혈열상염, -망 음실수	망음증
073 천문동도적산 4g		소장실열, 방광습열
098 마황통맥탕 6g		血寒
099 홍화통맥탕 4g		혈한
111 상지의이인탕 4g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습 재경락

112 진교의이인탕 8g	(열자) 풍한습비증, 습음증-습재경락
---------------	----------------------

숙지황, 구기자... 소양인 간신허검풍한습비증... 숙지황독활탕

숙지황 27개 처방

감, 미온 / 심 간 신

자신양간, 자음, 치음허해천, 소갈, 보혈조경

012 류씨소시호탕 4g	(한자) 소양경증, 소양경태양증, 소양경태음증	
013 형방지황탕 4g	태음증, 태양부증-방광축혈, 소음증-소음한화, 소음검태양증, 권음증-권역 위분증-습온상위, 기분증-습온재기 상초습열-습곤기표, 중초습열-습열저색기기, -비위승강실조, 하초습열-습체방광	한습곤비, 수한범폐 탁음불강, 수음내정, 수습범람, 한습, 습담 습음증-습재상재외, -습일기부, -습담재폐, -습재비위 소장허한
014 독활지황탕 16g		식체비만, 식상비위
021 숙지황고삼탕 16g		(한자) 신음허검방광습열
022 시호소간탕 8g		간기울결, 간경습열 기체, 담기호결 습음증-습열재간담
025 구기자양간탕 16g		간음허, 간양상항, 간양화풍
026 숙지황보간탕 4g		(한자) 간혈허, 혈허생풍, 심간혈허
027 생지황보간탕 16g		(열자) 간혈허, 혈허생풍, 심간혈허
029 지황양심탕 12g		(열자) 심음허, 심혈허, 심신불교
030 복신양심탕 4g		심양허, 수기능심, 심비량허
034 천화분양비탕 16g		비음허, 대장진후 조음증-조재대장
035 가감독활지황탕 8g	권음증-한결, -구토하리(허한구토)	비양허, 비신양허, 한체간맥, 소장기체
037 지황양폐탕 12g		폐음허, 간화범폐, 폐신음허 진액휴손, 조담 화음증-음허폐열, -조사상폐 신정부족
038 이씨육미지황탕 16g		신양허, 신불납기, 방광허한
040 토사자보양탕 8g		한음증-신한요통
041 구판보음탕 16g		신음허, 간신음허
046 생지황양위탕 12g		위음허

049 삼황양심탕 16g		조음증-조사상위
053 숙지황목단피탕 8g		심간화왕
054 생지황목단피탕 12g		(한자) 혈어
		(열자) 혈어

056 방풍통맥탕 8g		혈한
057 생지황윤조탕 6g		혈조, 풍열혈허
062 인동등지황탕 4g		(열자) 풍한습비증, 습음증-습재경락
063 사과락청폐탕 4g		폐경울열범비
065 숙지황생화탕 8g		(한자) 산후어혈저체, 산후혈풍
066 생지황생화탕 16g		(열자) 산후어혈저체, 산후혈풍
067 숙지황독활탕 8g		간신허겸풍한습비증

구기자 11개 처방

감, 평 / 간 신

보신익정, 보혈안신, 생진지갈, 윤페지해, 자보간신

025 구기자양간탕 8g		간음허, 간양상항, 간양화풍
026 숙지황보간탕 8g		(한자) 간혈허, 혈허생풍, 심간혈허
027 생지황보간탕 8g		(열자) 간혈허, 혈허생풍, 심간혈허
028 복령보심탕 8g		심기허
029 지황양심탕 6g		(열자) 심음허, 심혈허, 심신불교
038 이씨육미지황탕 8g		신정부족
039 산수유보신탕 4g		신기허, 신기불교
040 토사자보양탕 4g		신양허, 신불납기, 방광허한
041 구판보음탕 4g		한음증-신한요통
		신음허, 간신음허
042 토사자온신탕 8g	소음한화-양허수범	신허수범, 심신양허
		습음증-한습재신

067 숙지황독활탕 4g		간신허겸풍한습비증
---------------	--	-----------

인동등, 사과락, 시호... 소양인 열자 풍한습비증... 인동등지황탕

인동등은 풍한습비증에 공통약재지만 열자의 군약이라서...

사과락도 한자처방에도 2g 들어갔지만 여기서는 6g 들어가서...

인동등 6개 처방

신, 감, 한 / 심 폐

청열해독, 서근활락, 보허료풍, 산어지통

018 양격산화탕 8g	영분증-영위합사, 사열치성, 독열옹체	
058 방풍구풍탕 6g		풍담증 풍음증-풍사중면부락맥, -풍재근골
060 가감양격산화탕 8g		화음증-화열상렴
061 강활홍오탕 2g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습재경락
062 인동등지황탕 12g		(열자) 풍한습비증, 습음증-습재경락
067 숙지황독활탕 4g		간신허검풍한습비증

사과락 11개 처방

감, 한 / 폐 간

통경활락, 청열화담, 량혈지혈

003 은교청열탕 8g	(열자) 풍열범폐, 조사상폐, 폐경풍열 위분증-풍온상위, -서온상위, -추조상위(온조)	
004 방풍청열탕 6g	(한자) 폐경풍열, 풍열범폐 위분증-풍온상위, -추조상위(온조)	
005 방풍차전자탕 4g	한담요폐	한담저폐 한담 한음증-한재폐
006 사과락과루인탕 8g		담열옹폐 열담
032 목단피과루인탕 4g		심혈허저 한음증-심한흉비
043 치자온담탕 4g		담울담요
056 방풍통맥탕 4g		혈한증
058 방풍구풍탕 4g		풍담증 풍음증-풍사중면부락맥, -풍재근골
061 강활홍오탕 2g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습재경락
062 인동등지황탕 6g		(열자) 풍한습비증, 습음증-습재경락
063 사과락청폐탕 8g		폐경울열범비증

시호 15개 처방

고, 량 / 심포 간 담 삼초

화해소양, 서간화위, 승양거함소, 서간해울, 청설상화, 거풍제비

001 이씨형방패독산 4g	(열자) 풍한속폐 태양중풍, 태양상한 위분증-추조상위(량조)	
006 사과락과루인탕 4g		담열옹폐 열담
008 류씨저령차전자탕 4g	(한자) 태양부증-방광축수	
012 류씨소시호탕 4g	(한자) 소양경증, 소양경태양 증, 소양경대음증	
022 시호소간탕 6g		간기울결, 간경습열 기체, 담기호결 습음증-습열재간담
023 대맥소간탕 2g		(한자) 간기울결, 식상비위 기체
024 결명자청간탕 6g		간화상렴, 간경습열, 담열 습음증-습열재간담
028 복령보심탕 2g		심기허
043 치자온담탕 4g		담울담요
049 삼황양심탕 2g 초		심간화왕
050 토사자소간탕 6g		간비불화
051 시호화위탕 6g		간기범위
054 생지황목단피탕 6g		(열자) 혈어
058 방풍구풍탕 2g		풍담 풍음증-풍사중면부락맥, -풍재 근골
062 인동등지황탕 4g		(열자) 풍한습비증, 습음증-습 재경락

홍모오가피, 영지, 선모, 대맥근... 소양인 한자 풍한습비증.. 강활홍오탕

홍모오가피 4개 처방

신, 온 / 간 신

거풍습 리관절 강근골

002 방풍해표탕 4g	(한자) 풍한속폐 태양상한, 태양중풍, 소양경태양	풍음증-풍재두, -풍재기육관 절, 한음증-한재기육관절
056 방풍통맥탕 4g		혈한증
061 강활홍오탕 4g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습 재경락

067 속지황독활탕 4g	간신허검풍한습비증
---------------	-----------

영지 10개 처방

감, 평 / 신 간 심 폐

익정保神, 堅筋好色, 補腎充耳, 양심안신, 보기익혈, 지해평천

020 홍맥건비탕 4g		비기허, 비기하함, 비불통혈 청양불승
028 복령보심탕 8g		심기허
030 복신보심탕 8g		심양허, 수기능심, 심비량허
033 복신과루인탕 6g		담미심규
036 방풍보폐탕 8g		폐기허, 폐양허, 폐기쇠절, 심 폐기허, 폐비량허, 폐기허비색
039 산수유보신탕 4g		신기허, 신기불고
045 맥아보위탕 8g		위기허, 위한
053 속지황목단피탕 4		한음증-위한통, -한결대장 (한자) 혈어증
061 강활홍오탕 4		(한자) 풍한습비증, 습음증-습 재경락
065 속지황생화탕 4		(한자) 산후어혈저체, 산후혈풍

선모 4개 처방

신, 열, 소독 / 신 비 간

온신장양, 온비양, 거한습, 강근골, 배농

035 가감독활지황탕 4g	궤음증-한결, -구토하리(허한 구토)	비양허, 비신양허, 한체간맥, 소장기체
040 토사자보양탕 4g		신양허, 신불납기, 방광허한 한음증-신한요통
042 토사자온신탕 4g	소음한화-양허수범	신허수범, 심신양허 습음증-한습재신
061 강활홍오탕 4g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습 재경락

대맥근 5개 처방

감, 고, 온 / 비 심

리습소종, 理氣利胸, 해독

023 대맥소간탕 4g	(한자) 간기울결, 식상비위
--------------	-----------------

		기체증 심혈허저
032 목단피과루인탕 12g		한음증-심한흉비(心寒胸痺)
033 복신과루인탕 4g		담미심규
045 맥아보위탕 4g		위기허, 위한
061 강활홍오탕 4g		한음증-위한통, -한결대장 (한자) 풍한습비증, 습음증-습 재경락

방풍, 강활, 독활, 인동등..... 소양인 풍한습비증 공통 약재

소양인 풍한습비증 처방

P061 강활홍오탕 (한자 풍한습비증)	P062 인동등지황탕 (열자 풍한습비증)	P067 숙지황독활탕 (간신히 겸 풍한습비증)
방풍 8, 강활 독활 6 인동등 2	방풍 6, 강활 독활 4 인동등12	방풍 6, 강활 4, 독활 8 인동등 4

방풍 33개 처방

신, 감, 온 / 방광 간 비
발표산풍, 거풍승습, 거풍해경

001 이씨형방패독산 4g	(열자) 풍한속폐증 태양중풍증(중용방풍, 가석고), 태양상한증(중용형개, 가석고) 위분증-추조상위(량조)	
002 방풍해표탕 8g	(한자) 풍한속폐증 태양상한증, 태양중풍증, 소양겸태양증	풍음증-풍재두, -풍재기육관절, 한음증-한재기육관절
003 은교청열탕 4g	(열자) 풍열범폐, 조사상폐, 폐경풍열 위분증-풍온상위, -서온상위, -추조상위(온조)	
004 방풍청열탕 8g	(한자) 폐경풍열, 풍열범폐 위분증-풍온상위, -추조상위(온조)	
005 방풍차전자탕 8g	한담요폐증	한담저폐증

		한담증 한음증-한재폐
006 사과락과루인탕 4g		담열옹폐증 열담증
007 형방사백산 4g	(열자) 태양중풍증, 소양경증, 소양겸양명부증, 소음증-소음열화, 권음증-권역, -구토하리 위분증-서온상위, -습온상위, 기본증-열결기본내입위장, -습온재기 상초습열-습곤기표, -표습화열, 중초습열-습열저색기기	풍음증-풍재두, 습음증-습재상재외
008 류씨저령차전자탕 4g	(한자) 태양부증-방광축수	
009 지황백호탕 4g	양명부증, 태양부증-방광축혈, 소음겸양명증 기본증-열결기본내입위장(변비) 하초습열-습체대장	대장실열
010 저령차전자탕 4g	양명경증, 소음증-소음열화, 권음증-권역 기본증-열결기본내입위장(하리)	
011 형방도적산 4g	(열자) 소양경증, 소양겸태양증, 소양겸태음증 기본증-열사용폐	
012 류씨소시호탕 8g	(한자) 소양경증, 소양겸태양증, 소양겸태음증	
013 형방지황탕 4g	태음증, 태양부증-방광축혈, 소음증-소음한화, 소음겸태양표증, 권음증-권역 위분증-습온상위, 기본증-습온재기 상초습열-습곤기표, 중초습열-습열저색기기, -비위승강실조, 하초습열-습체방광	한습곤비, 수한범폐 탁음불강, 수습내정, 수습범람, 한습증, 습담증 습음증-습재상재외, -습일기부, -습담재폐, -습재비위 소장허한
014 독활지황탕 4g		식체비만, 식상비위
015 활석고삼탕 4g	권음증-구토하리(상열하한) 중초습열-습열올발백배	
016 황련청장탕 4g	권음증-구토하리(신열하리) 하초습열-습체방광	대장습열
018 양격산화탕 4g	영분증-영위합사, 사열치성증, 독열옹체증	
020 홍맥건비탕 2g		비기허, 비기하함, 비불통혈 청양불승
023 대맥소간탕 6g		(한자) 간기울결, 식상비위 기체증
026 속지황보간탕 4g		(한자) 간혈허, 혈허생풍, 심간

	혈허
--	----

030 복신보심탕 4g		심양허, 수기능심, 심비량허
035 가감독활지황탕 4g	궤음증-한궤, -구토하리(허한구토)	비양허, 비신양허, 한체간맥, 소장기체
036 방풍보폐탕 6g		폐기허, 폐양허, 폐기쇠절, 심폐기허, 폐비량허, 폐기허비색
045 맥아보위탕 4g		위기허, 위한증
056 방풍통맥탕 8g		한음증-위한통, -한재대장
057 생지황윤조탕 4g		혈한증
		혈조증, 풍열혈허증
058 방풍구풍탕 8g		풍담증
		풍음증-풍사중면부락맥, -풍재근골
059 자초한련초탕 8g		풍음증-풍사상피부, 풍열작양, 풍습온부
061 강활홍오탕 8g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습재경락
062 인동등지황탕 6g		(열자) 풍한습비증, 습음증-습재경락
064 양격청폐탕 4g		열독외침폐규
065 숙지황생화탕 6g		(한자) 산후어혈저체, 산후혈풍
067 숙지황독활탕 6g		?

강활 15개 처방

신, 고, 온 / 방광 신

해표산한, 거풍승습, 산풍지통

001 이씨형방패독산 4g	(열자) 풍한속폐증 태양중풍증, 태양상한증 위분증-추조상위(량조)	
002 방풍해표탕 6g	(한자) 풍한속폐증 태양상한증, 태양중풍증, 소양경태양증	풍음증-풍재두, -풍재기육관절, 한음증-한재기육관절
004 방풍청열탕 4g	(한자) 폐경풍열, 풍열범폐 위분증-풍온상위, -추조상위(온조)	
005 방풍차전자탕 6g	한담요폐	한담저폐 한담 한음증-한재폐
007 형방사백산 4g	(열자) 태양중풍증, 소양경증, 소양경양명부증, 소음증-소음열화(심번불매), 궤음증-궤역(열궤), -구토하리(신열하리) 위분증-서온상위, -습온상위,	풍음증-풍재두, 습음증-습재상재외

	기분증-열결기분내입위장(하리빈번), -습온재기 상초습열-습근기표, -표습화열, 중초습열-습열저색기기	
010 저령차전자탕 4g	양명경증, 소음증-소음열화(수열호결), 권음증-권역(열결) 기분증-열결기분내입위장(하리빈번)	
011 형방도적산 4g	(열자) 소양경증, 소양겸태양증, 소양겸태음증 기분증-열사용폐	
012 류씨소시호탕 4g	(한자) 소양경증, 소양겸태양증, 소양겸태음증	
013 형방지황탕 4g	태음증, 태양부증-방광축혈, 소음증-소음한화, 소음겸태양표증, 권음증-권역 위분증-습온상위, 기분증-습온재기 상초습열-습근기표, 중초습열-습열저색기기, -비위승강실조, 하초습열-습체방광	한습근비, 수한범폐 탁음불강, 수습내정, 수습범람, 한습증, 습담증 습음증-습재상재외, -습일기부, -습담재폐, -습재비위 소장허한
015 활석고삼탕 4g	권음증-구토하리(상열하한) 중초습열-습열올발백배	
016 황련청장탕 4g	권음증-구토하리(신열하리) 하초습열-습체방광	대장습열
056 방풍통맥탕 6g		혈한증
058 방풍구풍탕 4g		풍담증 풍음증-풍사중면부락맥, -풍재근골
061 강활홍오탕 6g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습재경락
062 인동등지황탕 4g		(열자) 풍한습비증, 습음증-습재경락

독활 19개 처방

신, 미고, 온 / 신 방광

신온해표, 거풍승습, 산한지통, 소비산종, 조습지양

001 이씨형방패독산 4g	(열자) 풍한속폐 태양중풍, 태양상한 위분증-추조상위(량조)	
002 방풍해표탕 4g	(한자) 풍한속폐 태양상한, 태양중풍, 소양겸태양	풍음증-풍재두, -풍재기육관절, 한음증-한재기육관절
004 방풍청열탕 4g	(한자) 폐경풍열, 풍열범폐	

	위분증-풍온상위, -추조상위(온조)	
005 방풍차전자탕 4g	한담요폐	한담저폐 한담 한음증-한재폐
007 형방사백산 4g	(열자) 태양중풍, 소양경증, 소양겸양명부증, 소음증-소음열화(심번불매), 권음증-권역(열결), -구토하리(신열하리) 위분증-서온상위, -습온상위, 기분증-열결기분내입위장(하리), -습온재기 상초습열-습근기표, -표습화열, 중초습열-습열저색기기	풍음증-풍재두, 습음증-습재상재외
009 지황백호탕 4g	양명부증, 태양부증-방광축혈, 소음겸양명증 기분증-열결기분내입위장(변비) 하초습열-습체대장	대장실열
010 저령차전자탕 4g	양명부증, 소음증-소음열화(수열호결), 권음증-권역(열결) 기분증-열결기분내입위장(하리)	
011 형방도적산 4g	(열자) 소양경증, 소양겸태양증, 소양겸태음증 기분증-열사용폐	
012 류씨소시호탕 4g	(한자) 소양경증, 소양겸태양증, 소양겸태음증	
013 형방지황탕 4g	태음증, 태양부증-방광축혈, 소음증-소음한화, 소음겸태양표증, 권음증-권역(회결) 위분증-습온상위, 기분증-습온재기 상초습열-습근기표, 중초습열-습열저색기기, -비위승강실증, 하초습열-습체방광	한습근비, 수한범폐 탁음불강, 수음내정, 수습범람, 한습증, 습담증 습음증-습재상재외, -습일기부, -습담재폐, -습재비위 소장허한
014 독활지황탕 4g		식체비만, 식상비위
015 활석고삼탕 4g	권음증-구토하리(상열하한) 중초습열-습열울발백배	
035 가감독활지황탕 4g	권음증-한결, -구토하리(허한구토)	비양허, 비신양허, 한체간맥, 소장기체
056 방풍통맥탕 6g		혈한증
057 생지황윤조탕 4g		혈조증, 풍열혈허
059 자초한련초탕 6g		풍음증-풍사상피부, 풍열작양, 풍습온부
061 강활홍오탕 6g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습재경락

062 인동등지황탕 4g		(열자) 풍한습비증, 습음증-습재경락 한기편중 用 방풍4g, 강활 독활 중용
067 숙지황독활탕 8g		?

인동등 6개 처방

신, 감, 한 / 심 폐

청열해독, 서근활락, 보허료풍, 산어지통

018 양격산화탕 8g	영분증-영위합사, 사열치성, 독열웅체	
058 방풍구풍탕 6g		풍담증 풍음증-풍사중면부락맥, -풍재근골
060 가감양격산화탕 8g		화음증-화열상림
061 강활홍오탕 2g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습재경락
062 인동등지황탕 12g		(열자) 풍한습비증, 습음증-습재경락
067 숙지황독활탕 4g		간신허검풍한습비증

숙지황독활탕은 간신허검풍한습비증에 쓴다.

숙지황독활탕은 간신허검풍한습비증에 쓰입니다. 후세방 독활기생탕을 생각하시면 되시겠습니까. 근데 홍원장님 엄청 부지런하십니다. 새해부터 쉬지도 않으시고...대단하세요. 이렇게 정리해서 모으면 큰 자료가 될거 같습니다. 감사합니다.

마황, 백지, 석창포, 녹각상..... 태음인 한자 풍한습비증... 마황의이인탕

마황 22개 처방

신, 고, 온 / 폐 대장 방광

발한해표, 선폐평천, 리수소종, 산한통비

001 가미해기탕 4g	(열자) 태양중풍증	
002 갈근해표탕 2g	(한자) 풍한속폐증	풍음증-풍재두, -풍재기육관절, 한음증-한재기육관절, -한재폐
003 류씨한다열소탕 2g	(한자) 풍한속폐증 태양중풍증, 소양검태양증 위분증-서온상위	풍음증-풍재두
007 한다열소탕 4g	(한자) 소양경증, 소양검양명부	한담증, 습담증

	증, 소양검태음증, 궤역증-한궤 위분증-추조상위-량조 하초습열증-습체대장	습음증-습재상재외, -습담재폐
010 가미발표탕 6g	(열자) 태양상한증	
011 마황발표탕 6g	(한자) 태양상한증	한음증-한재기육관절
014 마황부평탕 4g	(한자) 태양부증-방광축수 위분증-습온상위 상초습열증-습곤기표, -표습화 열	
018 갈근나복자탕 4g	(열자) 태음증 위분증-습온상위 상초습열증-습곤기표, -표습화 열, 중초습열증-비위승강실조	
019 태음조위탕 4g	(한자) 태음증, 소음증-소음한 화, 소음검태양표증, 궤음증-회 궤, -구토하리 중초습열증-비위승강실조	한습곤비, 소장허한, 위기허, 위 한증, 식상비위증 탁음불강증, 한습증 습음증-습일기부, -습재비위, 한음증-위한통, -한궤대장
026 두황의이인탕 4g	(한자) 기분증-습온재기 상초습열증-표습화열, 중초습열 증-습열저색기기, -습열울발백 배, 하초습열증-습체방광	
040 여두난간전 4g		한체간맥, 소장기체
049 가감승청탕 4g		수기능심
054 마황보폐탕 4g		폐기허, 심폐기허, 비폐량허, 폐 기허비색, 한담저폐 한담요폐
058 산약보폐탕 4g		폐양허
059 녹용대보탕 4g		(한자) 폐기음량허, 폐기쇠절 기음량허
062 동과자온폐탕 6g		수한범폐 수음내정
068 건률온신탕 4g	소음한화증-양허수범	신허수범, 심신양허 수습범람 습음증-한습재신
072 마황정통탕 8g		소장기체, 위한증
098 마황통맥탕 2g		혈寒증
110 마황의이인탕 4g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습 재경락

113 마황정천탕 12g		한음증-한재폐 풍한閉肺증
117 조위승청탕 4g		심비기허, 심비허검한습, 한습곤 비

백지 17개 처방

신, 온 / 폐 비 위

해표, 거풍조습, 지통, 소종배농, 거풍지양

001 가미해기탕 4g	(열자) 태양중풍증	
002 갈근해표탕 4g	(한자) 풍한속폐증	풍음증-풍재두, -풍재기육관절, 한음증-한재기육관절, -한재폐
003 류씨한다열소탕 4g	(한자) 풍한속폐증 태양중풍증, 소양검태양증 위분증-습온상위	풍음증-풍재두
004 백부근청열탕 2g	(열자) 풍열범폐, 조사상폐, 폐경풍열 위분증-풍온상위, -추조상위(온조)	
005 자완청열탕 2g	(한자) 풍열범폐, 폐경풍열 위분증-풍온상위, -추조상위(량조)	
006 갈근청열탕 4g	(열자) 풍열범폐, 폐경풍열, 조사상폐 위분증-풍온상위	
010 가미발표탕 4g	(열자) 태양상한증	
012 갈근해기탕 4g	(열자) 풍열범폐, 조사상폐 태양상한, 소양경증, 소양검태양증, 소양검태음증 위분증-서온상위, -추조상위(온조)	풍음증-풍재두, -풍재기육관절
015 갈근승기탕 4g	(열자) 태양부증-방광축혈, 양명부증, 소음겸양명증 기분증-열결기분내입위장(변비)	대장실열
017 열다한소탕 4g	(열자) 양명경증, 소양겸양명부증, 소음열화증, 궤음증-열결, -구토하리(신열하리) 기분증-열결기분내입위장(하리빈번)	
022 가감갈근해기탕 4g	(열자) 풍한속폐	
025 의이인삼백초탕 4g	(열자) 기분증-습온재기 중초습열-습열저색기기, -습열울발백배, 하초습열-습체방광	
098 마황통맥탕 2g		혈한증
099 홍화통맥탕 2g		혈한증
104 갈근질려탕 4g		풍음증-풍사상피부, 풍열작양증, 풍습온부증
110 마황의이인탕 4g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습

116 백지창이자탕 8g	재경락 열독외침폐규증
---------------	----------------

석창포 21개 처방

신, 고, 온 / 심 위 간

제담개규, 총이명목, 화습화위, 산한제비

018 갈근나복자탕 4g	(열자) 태음증 위분증-습온상위 상초습열-습곤기표, -표습화열, 중초습열-비위승강실조	
019 태음조위탕 4g	(한자) 태음증, 소음증-소음한 화, 소음겸태양표증, 궤음증-회 궤, -구토하리 중초습열증-비위승강실조	한습곤비, 소장허한, 위기허, 위 한, 식상비위 탁음불강, 한습증 습음증-습일기부, -습재비위, 한음증-위한통, -한결대장 한습곤비, 소장허한, 위한, 식상
020 류씨태음조위탕 4g	(한자) 태음증, 소음증-소음한 화, 궤음증-회궤, -구토하리 중초습열증-비위승강실조	비위 탁음불강 습음증-습재비위, 한음증-위한 통
026 두황의이인탕 4g	(한자) 기분증-습온재기 상초습열증-표습화열, 중초습열 증-습열저색기기, -습열울발백 배, 하초습열증-습체방광	
041 연자보심탕 4g		심기허, 심양허
042 소맥보심탕 4g		심기허, 심양허
048 창포천마탕 4g		담미신규
049 가감승청탕 4g		수기능심
050 연자건비탕 4g		비기허, 비기하함, 비양허, 비불 통혈 청양불승
051 의이인건비탕 4g		비기허, 비기하함, 비양허, 비신 양허 청양불승
072 마황정통탕 4g		소장기체, 위한
075 건롤보위탕 4g		위기허
081 이건롤청위탕 4g		위기허挾위열
082 연자육양장탕 4g	소음한화-허한하리	대장허한
086 연자소간탕 4g		간비불화, 간기울결 기체증 습음증-습열재간담
092 연자양혈탕 4g		심비량허
098 마황통맥탕 4g		기혈량허 혈한증

102 천마구등탕 4g		풍담증 풍음증-풍사중면부락맥, -풍재 근골
103 감국구풍탕 4g		풍담증 풍음증-풍사중면부락맥, -풍재 근골
110 마황의이인탕 4g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습 재경락

117 조위승청탕 4g		심비기허, 심기허겸한습, 한습 곤비
--------------	--	------------------------

녹각상 6개 처방

함, 온 / 간 신

보신조양, 健脾祛寒

062 동과자온폐탕 4g		수한범폐 수음내정
068 건롤온신탕 4g	소음한화-양허수범	신헌수범, 심신양허 수습범람 습음증-한습재신
069 여정자건롤탕 4g	소음한화-양허수범	신헌수범 수습범람 습음증-한습재신
098 마황통맥탕 4g		혈한증
099 홍화통맥탕 2g		혈한증
110 마황의이인탕 4g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습 재관절

상지, 창이자, 백선파..... 태음인 한자 풍한습비증... 상지의이인탕

상지 4개 처방

췌, 平/ 폐 간 비

거풍사, 통혈락, 거풍습리관절, 리수소종

013 상지부평탕 8g	(열자) 태양부증-방광축수 위분증-습온상위 상초습열-습곤기표, -표습화열	습음증-습일기부
103 감국구풍탕 6g		풍담증 풍음증-풍사중면부락맥, -풍재 근골

108 상지삼백초탕 6g		습음증-습재상재외
111 상지의이인탕 6g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습재경락

창이자 10개 처방

신, 고, 온, 유소독 / 폐 간 비 위

견비지통, 설편통비, 발한해독, 소풍살충

002 갈근해표탕 4g	(한자) 풍한속폐	풍음증-풍재두, -풍재기육관절, 한음증-한재기육관절, -한재폐
003 류씨한다열소탕 4g	(한자) 풍한속폐 태양중풍, 소양겸태양증 위분증-서온상위	풍음증-풍재두
004 백부근청열탕 2g	(열자) 풍열범폐, 조사상폐, 폐경풍열 위분증-풍온상위, -추조상위(온조)	
005 자완청열탕 4g	(한자) 풍열범폐, 폐경풍열 위분증-풍온상위, -추조상위(량조)	
022 가감갈근해기탕 4g	(열자) 풍한속폐	
105 창이자패장탕 4g		풍음증-풍사상피부, 풍열작양증, 풍습온부증
111 상지의이인탕 6g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습재경락
114 의이인청폐탕 4g		폐경울열범비증
115 창이자청폐탕 6g		폐경울열범비증
116 백지창이자탕 4g		열독외침폐규증

백선평 8개 처방

고, 함, 한 / 폐, 비, 소장, 방광

청폐지해, 청열리습, 거풍조습, 청열해독, 청열정경

009 자완상백피탕 4g	(한자) 기분증-열사용폐	담열옹폐증 열담증
091 상백피청폐탕 4g		간화범폐
101 사삼윤조탕 4g		혈조증, 풍열혈허증
105 창이자패장탕 6g		풍음증-풍사상피부, 풍열작양증, 풍습온부증
107 감국해독탕 6g		화음증-화열상염
111 상지의이인탕 4g		(한자) 풍한습비증
115 창이자청폐탕 4g		습음증-습재경락
121 여정자생화탕 4g		폐경울열범비증 (한자) 산후어혈저체, 산후혈풍

진교, 목통, 백렴, 백자인..... 태음인 열자 풍한습비증... 진교의이인탕

백자인이 비증에도 쓰는 약이군요.

백렴은 또 왜 들어갔을까요?

진교 6개 처방

큰잎용담의 뿌리.(이외의 근연식물은 태음인의 진교로 쓰지 않는다.)

고, 신, 평 / 간 위 담

거풍습습, 통락치옹, 퇴감적체열, 청골증조열, 퇴습열황달, 리수통림.

029 맥문동양액탕 6g	(열자) 혈분증- 혈열상음 , -망음실수	망음증
073 천문동도적산 4g		소장실열, 방광습열
098 마황통맥탕 6g		血寒
099 홍화통맥탕 4g		혈한
111 상지의이인탕 4g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습재경락
112 진교의이인탕 8g		(열자) 풍한습비증 , 습음증- 습재경락

목통 9개 처방

고, 한 / 심 폐 소장 방광

강화이뇨, 통경하유, 리뇨소종, 활혈통비, 청열해독

043 백자양심탕 4g		(열자) 심음허, 심혈허, 심신불교
045 황금청심탕 4g		심화항성, 담화요심
048 청포천마탕 4g		화음증-허화상렴
049 가감승청탕 4g		담미심규
073 천문동도적산 4g		수기능심
074 유근피도적산 4g		소장실열, 방광습열
112 진교의이인탕 6g		(열자) 풍한습비증 , 습음증- 습재경락
119 연자생화탕 2g		(한자) 산후어혈저체, 산후혈풍
120 상황생화탕 4g		(열자) 산후어혈저체, 산후혈풍

백렴 17개 처방

고, 감, 신, 미한 / 심 간 위

청열해독, 이기산결, 량혈지혈, 식풍지경, 생기지통

031 갈근소간탕 4g		간기울결
--------------	--	------

		담기호결, 기체증
		간기울결, 간경습열
032 산조인소간탕 4g		기체증, 담기호결
		습음증-습열재간담
046 단삼해백탕 4g		심혈어저
047 이씨우황청심환 7푼		한음증-심한흉비
048 청포천마탕 4g		심혈어저, 담미심규
		담미심규
086 연자소간탕 4g		간비불화, 간기울결
		기체증
		습음증-습열재간담
087 오매소간탕 4g		간비불화
088 갈근화위탕 4g		간기범위
089 유근피화위탕 2g		간기범위
095 단삼포황탕 4g		(한자) 혈어증
096 단삼대황탕 4g		(열자) 혈어증
097 가감단삼청영탕 4g		혈열증
		풍담증
102 천마구등탕 4g		풍음증-풍사중면부락맥, -풍재 근골
		풍담증
103 감국구풍탕 4g		풍음증-풍사중면부락맥, -풍재 근골
106 갈근해독탕 4g		화음증-화열상림
107 감국해독탕 4g		화음증-화열상림
112 진교의이인탕 4g		(열자) 풍한습비증, 습음증-습 재경락

백자인 11개 처방

감, 평 / 심 간 비

양심안신, 익음양혈, 윤장통변, 수렴지혈, 거풍치비

035 백자양간탕 4g		간음허, 간양상항, 간양화풍
037 연자보간탕 4g		(한자) 간혈허, 혈허생풍, 심간 혈허
039 단삼보간탕 4g		(열자) 간혈허, 혈허생풍, 심간 혈허
043 백자양심탕 8g		(열자) 심음허, 심혈허, 심신불 교
044 사삼양심탕 4g		심음허, 심혈허, 심신불교
052 갈근양비탕 4g		비음허, 대장진후
		조증후-조재대장
053 사삼양비탕 4g		비음허, 대장진후
		조증후-조재대장
072 마황정통탕 4g		소장기체, 위한증
092 연자양혈탕 4g		심비량허

		기혈량허
093 단삼양혈탕 4g		심비량허
		기혈량허
112 진교의이인탕 4g		(열자) 풍한습비증, 습음증-습재경락

백렴은 냉한 약으로서 氣滯血瘀에 쓰이는 경우가 가장 많습니다. 즉 생리통 등의 복강내 어혈에 기체를 뚫어주고 어혈을 깨줍니다.

그런데 여기서 가장 중요한 사실은 백렴은 냉한 약이라서 열증에만 씁니다. 간기울결에도 기체가 생기고 열이 발생합니다. 이때도 청열하고 기체혈어를 다스리는 소간탕에 백렴이 사용됨
홍성국

백렴이 생각보다 많이 쓰여서 의외였습니다. 상당히 활용범위가 넓은 약이군요. 청열, 기체혈어... 감사합니다.

의이인, 해동피..... 태음인 풍한습비증의 기본 약재

의이인 처방 44개

나이도 젊은데 비만 오면 아프다는 애기엄마가 왔길래 심심해서 <새로 쓴 사상의학>에서 뽑아봤습니다. 쪽 한번 훑어보시죠. 해놓으니깐 보기 편하네요.^^

시간나는대로 태음인 풍한습비증에 쓰인 상지, 백선피, 백지, 해동피, 진교, 곡기생 한번 찾아보렵니다. 둘째칸은 외감병, 셋째칸은 내상잡병 변증입니다..

003 류씨한다열소탕 8g	(한자) 풍한속폐 태양중풍, 소양겸태양 위분증-서온상위	풍음증-풍재두
007 한다열소탕 12g	(한자) 소양경증, 겸양명부증, 겸태음증, 궤역증-한결 위분증-량조 하초습열-습체대장	한담증, 습담증 습음증-습재상재외, -습담재폐
013 상지부평탕 12g	(열자) 태양부증-방광축수 위분증-습온상위 상초습열-습근기표, -표습화열	습음증-습일기부
014 마황부평탕 12g	(한자) 태양부증-방광축수 위분증-습온상위 상초습열-습근기표, -표습화열	
016 의이인승기탕 4g	(한자) 태양부증-방광축혈, 양명 경증, 양명부증 기분증-열결기분내입위장(변비) 하초습열-습체대장	대장실열증

018 갈근나복자탕 8g	(열자) 태음증 위분증-습온상위 상초습열-습근기표, -표습화열, 중초습열-비위승강실조	
019 태음조위탕 12g	(한자) 태음증, 소음증-소음한 화, 소음겸태양표증, 궤음증-회 궤, -구토하리 중초습열-비위승강실조	한습근비, 소장허한, 위기허, 위 한, 식상비위 탁음불강증, 한습증 습음증-습일기부, -습재비위, 한 음증-위한통, -한결대장 한습근비, 소장허한, 위한, 식상
020 류씨태음조위탕 12g	(한자) 태음증, 소음증-소음한 화, 궤음증-회궤, -구토하리 중초습열-비위승강실조	비위 탁음불강 습음증-습재비위, 한음증-위한 통
023 갈근의이인탕 12g	(한자) 기분증-열결기분내입위 장(하리빈번)	
024 황금의이인탕 12g	(열자) 기분증-습온재기 중초습열, 하초습열	비위습열
025 의이인삼백초탕 12g	(열자) 기분증-습온재기 중초습열, 하초습열	
026 두황의이인탕 12g	(한자) 기분증-습온재기 상초습열, 중초습열, 하초습열	
049 가감승청탕 12g	수기능심증	
050 연자건비탕 12g (초)		비기허, 비기하함, 비양허, 비불 통혈 청양불승
051 의이인건비탕 12g (초)		비기허, 비기하함, 비양허, 비신 양허 청양불승
054 마황보폐탕 8g		폐기허, 심폐기허, 폐비양허, 폐 기허비색증, 한담저폐 한담요폐
055 사삼보폐탕 8g		폐기허, 폐양허, 심폐기허, 폐비 양허, 폐기허비색, 한담저폐 한담요폐
058 산약보폐탕 8g		폐양허
059 녹용대보탕 6g		(한자) 폐기음양허, 폐기쇠절 기음양허
068 건롤온신탕 12g	소음한화증-양허수범	신헌수범, 심신헌양허 수습범람 습음증-한습재신헌

070 청호온담탕 8g		담울담요
072 마황정통탕 12g		소장기체, 위한

075 건물보위탕 12g (초)		위기허
079 유근피청위탕 4g		위열, 비위습열
080 건물청위탕 4g		위열
081 이건물청위탕 8g		위기허挾위열
082 연자육양장탕 12g (초)	소음한화-허한하리	대장허한
083 오매양장탕 8g	소음한화-허한하리	대장허한
084 갈근청장탕 8g		한음증-한결대장
085 유근피청장탕 6g		대장습열
		대장습열
086 연자소간탕 8g (초)		간비불화, 간기울결 기체
		습음증-습열재간담
087 오매소간탕 8g (초)		간비불화
088 갈근화위탕 8g		간기범위
089 유근피화위탕 8g		간기범위
108 상지삼백초탕 8g		습음증-습재상재외
109 가감갈근부평탕 12g		습음증-습재상재외
110 마황의이인탕 12g		(한자) 풍한습비증 습음증-습재경락
111 상지의이인탕 12g		(한자) 풍한습비증 습음증-습재경락
112 진교의이인탕 12g		(열자) 풍한습비증 습음증-습재경락
114 의이인청폐탕 4g		폐경울열범비증

117 조위승청탕 12g		심비기허, 심기허兼한습, 한습 근비
118 사삼유근피탕 6g		痰鬱위열
119 상황생화탕 12g		(열자) 산후어혈저체, 산후혈풍
120 여정자생화탕 12g		(한자) 산후어혈저체, 산후혈풍
총 44개		

해동피 9개 처방

태음인 풍한습비증 처방 3개... 의이인 12g 해동피 4-6g

苦, 辛, 平 / 간 비

거풍습, 통경락, 거습지리, 살충지양통

025 의이인삼백초탕 4g	(열자) 기분증-습온재기 중초습열-습열저색기기, -습열 울발백배, 하초습열-습체방광	
084 갈근청장탕 4g		대장습열증
085 유근피청장탕 4g		대장습열증
104 갈근질려탕 6g		풍음증-풍사상피부, 풍열작양, 풍습온부
105 창이자패장탕 4g		풍음증-풍사상피부, 풍열작양,

		풍습온부
108 상지삼백초탕 4g		습음증-습재상재외
110 마황의이인탕 4g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습재경락
111 상지의이인탕 4g		(한자) 풍한습비증, 습음증-습재경락
112 진교의이인탕 6g		(열자) 풍한습비증, 습음증-습재경락

[안준철](#) 09.12.28. 11:15

정리하시느라 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. 의이인은 거피하지 않은 것이 더 좋습니다. 비만의 경우에는 더 그렇습니다. 부기가 훨씬 더 잘 빠집니다. 쌀로 말하면 현미에 해당한다고 말할 수 있습니다. 껍질이 있으면 더 강한 약이라고 생각 하시면 됩니다.

약제정보(계속 업데이트 예정)

(맨 아래 거래처 전화번호 있습니다. 변동사항 있거나 추가 사항 있으면 리플에 적어주세요. 반영하겠습니다)

ㄱ

감부리(킴프리) : 약제에 문제가 있는것 같아서 류원장님이 사용을 보류 하셨습니다. 신장암 유발 등 몇가지 문제가 있는것 같다고 합니다.

ㄴ

나도근 : 옴니허브에서 나오는 도근을 쓰면 된다고 합니다.

옴니허브에 전화해보니 나도근(찰벼)은 없고 도근(벼뿌리줄기)만 있다고 하던데 그냥 그것 쓰면 된답니다.

ㄷ

대황 : 장엽대황

동충하초 : 시중 약재상에서 구할 수 있음. 40그램 정도 되는 것이 3천원 정도 함.

ㄹ

맥이당(보리엿) : 왕비천 하늘조청에서 구매 쓴다. 옴니허브것을 썼었는데 연해서 지금은 안쓴다.

왕비천 하늘조청은 진하고 단맛이 강하다.

소양인 애들약에는 맥이당을 자주 넣는편이다. 맛이 좋아 애들도 좋아한다.

왕비천 하늘조청 : 054-783-7837

ㅁ

入

사원자 : 다른 곳에서 쓰다가 옴니허브에 구해달라고 얘기를 해서 현재 옴니허브에서 구해 쓰고 있다.

산앵두 : 구하기가 워낙 힘들고 고가여서 그냥 앵도육으로 쓰고 있다.

수삼 : 농협에서 구해 쓰고 있다.

저희 거래 약업사에는 수삼이 없더군요 ㅠㅠ.

〇

아교 : 다른 아교는 안되고 꼭 옴니허브의 아교를 써야한다. 옴니허브는 산동아교로 100% 당나귀가죽으로 만든 것이다.

다른 아교는 소가죽으로 만든것도 있고, 튀밥처럼 희게 된것은 공업용 아교로 못 쓴다.

아삼 : 국산전호를 쓰면 됨

양총피 : 동성한의원에서는 시장의 양과가게에 부탁해서 약재를 구한다고 하시면서 보현약업사에 한번 문의해보라고 하셨는데

보현약업사에 문의 해보니 도저히 단가가 안맞아서 작업을 하지 않는다고 합니다. ㅠㅠ.

구하기가 어려울것 같습니다.

여정실주증 : 우리는 옹기 약탕기로 찌는데 그냥 아무데나 찌면 된다.

여정실을 100%밀막걸리로 촉촉하게 버무려서 놓고 물로 찌면 된다.

보통 2시간 정도 찐다.

오가피 : 옴니허브 꺼 쓰고 있다. 장백산에서 채취한 것인데 수령이 30,40년 된 나무에서 채취한 것이다.

검증이 된 약재다.

자오가피 : 예전엔 구할 수 있었는데 현재는 수입에 문제가 있어서 구할 수가 없다. 그냥 오가피로 대체하고 있다.

오미자증 : 오미자증은 그냥 끓는 물에 1시간정도 찌면 된다.

원잠 : 예천 양잠조합 (아래 전화번호)

丿

자노아 : 총목피라고도 하며 시중 약재상에서 구할 수 있음

ㄷ

충위자 : 보현약업사에서 구해 쓰고 있다.

ㅎ

해동피 : 책에는 음나무를 쓰면 안된다고 나와 있는데 저희 한의원에 들어오는 해동피가 음나무라고 적혀 있어서 문의해보니

수입 음나무를 쓰면 된다고 합니다. 국산 음나무는 쓰면 안된다고 합니다. 그러니까 수입 해동피를 쓰면 되는 것 같습니다.

홍국 : 참살이 닷컴(www.wellbeing4u.net)

홍모오가피 : 가시가 잔잔하게 많이 있는 중국산 오가피다. 일반약업사에서도 구할 수 있을거다.

우리는 보현약업사에서 구매 쓴다.

홍맥 : 좋은나라 1588-1134

동성한의원 053-755-3553

보현약업사 053-951-1150

나눔제약 1544-1233

휴먼허브 1544-2375

옴니허브 080-345-1255

귀판교, 별갑교 등의 30g은 귀판, 별갑의 80g에 해당된다.

귀판교, 별갑교, 녹각교 등의 약재가 고체형태로 되어 있는경우에 용량을 어떻게 투여하는 게 바람직한지요...처방에 귀판 1돈이라고 나와 있을 경우 고체형태의 귀판교로는 몇 g을 투여해야 할 지 모르겠습니다.

안준철

20첩 기준으로 귀판 1돈이면 80그램이 됩니다. 이때는 귀판교를 30그램 정도가 적정량이라고 알려져 있습니다.(20첩에 30그램이 한첩에 한돈씩 쓰는 용량입니다.)

변재석

감사합니다. 약재의 형태가 변하니 감을 잡기 어려워 고체 귀판교를 한 제에 100g씩 썼는데 그렇게 많이 쓰지 않아도 되는 것이었군요

비파엽은 찬한데 식도 위장과 폐 기관지에 작용한다. 하기하는 성질이 있어서 천식에 좋고 역류성식도염에 최고 주약이 된다. 딸국질에도 쓰고 구갈에도 중요함.

비파엽을 위병에는 강습초를 하고 폐병에는 밀구 라고 되어있네요.[본초강목]

폐 위 식도 기관지에 주로 작용합니다.(동무공의 위완의 계념에 딱 맞아 떨어집니다.)

비파엽은 성미가 냉한데 소증의 한열 개념이 없어서 온성을 줄려고 꿀이나 생강즙을 쓴 거 같습니다. 위나 기관지에 동시에 작용해서 역류성 식도염에 최고 주약이 약이 되네요. 기를 내려주고 하행하는 성질이 있어서 천식이나 역류성 식도염에 사용되는 게 더 잘 이해됩니다. 下氣합니다.(폐는 숙강해야하고 위기도 하행해야됩니다.) 딸국질에도 사용되는데 역시 下氣하는 작용을 생각하면 되겠습니다.

안준철

폐나 위의 기운이 열로 인해 역상하면 비파엽의 차가운 성질로 내려줍니다. calm down합니다. 냉정하게..ㅋ그래서 간기범위증 위열증 위음허증에도 위열을 끌려고 쓰였습니다.

윤승일

말씀을 듣고 보니 캄다운됩니다 ㅋㅋ 감사합니다

안준철

비파엽은 하여튼 하행합니다. 결과적으로 귀경은 폐위가 되고 그것도 열증에 쓰입니다. 폐열 위열을 내리고 하행합니다. 구갈에도 중요한 약입니다

Re:비파엽

찾아보니 7가지 병증에 사용하셨네요.

1. 담울담요 (70청호온담탕 4g, 71감국온담탕 4g)
2. 위음허 (76맥문동양위탕 4g, 77백합양위탕 4g)
3. 위열 (78갈근청위탕 4g, 79유근피청위탕 4g)
4. 간기범위 (88갈근화위탕 4g, 89유근피화위탕 4g)
5. 간화범폐 (90천문동청폐탕 4g, 91상백피청폐탕 4g)
6. 폐경울열범비 (114의이인청폐탕 6g, 115창이자청폐탕 8g)
7. 담울위열 (118사삼유근피탕 8g)

약물 가감법(이현우 원장)

藥物加減法

- 가래가 있고 숨도 차면서 기침을 할 경우(痰咳) : 加 白何首烏(1-2錢까지), 白芥子, 蘇子 1錢, 半夏 5分.
- 鬱狂初證에는 蘇葉을 家해서 쓴다. (그 때는 땀을 내는 것이 좋다)
- 産後풍에 팔다리가 많이 아플 경우에는 濕痰이 끼인 것으로 보고 半夏를 加한다.
- 팔다리가 좀 아프다면(骨節痛) 半夏와 蘇葉을 가한다.
- 傷肺者 : 人蔘 代 白何首烏
- 속을 끓여서 消化障礙가 더 심해졌을 경우 : 加 砂仁
- 胃冷甚 (消化障礙, 小便不快, 便滑) : 加 何首烏 去 人蔘
- 汗出甚 加 桂枝 2錢
- 大便滑 減 川芎 5分
- 下利清水하면 藿香을 1錢 加한다.

- 食滯黃疸에는 茵陳을 君藥으로 한다.
- 浮氣(浮腫을 이야기 하는 것이 아니라 아침에 일어나면 손발이 조금 붓는 것) 小便不利 : 加 益智仁 1錢.
- 주로 가슴 쪽으로 문제가 많이 오는 心臟과 肺의 질환일 경우에는 枳實을 枳殼으로 바꾸는 것이 좋다.
枳實은 心下고 上腹에 작용하고 下氣작용이 더 강하다.
- 臍腹痛으로 배꼽 주위가 심하게 아프면 五靈脂를 加한다.
- 속이 쓰리고 아프면서 腰痛이 같이 겹했을 때는 小茴香을 아주 조금 加한다.
- 陽氣가 떨어진 때는 肉蓯蓉을 加하고 杜沖을 炒해서 쓴다.
- 太陰病이 심해져서 陰毒證이 되면 白何首烏 대신 人蔘을 사용해야 한다.
- 汗多 : 官桂 代 桂枝
- 半身不遂 : 藿香, 蘇葉을 加한다.
- 冷이 너무 심해서 大便이 묽어졌을 때 : 良薑 2錢, 草豆蔻 1錢을 加한다.
- 酒疸 : 加 茵陳 5錢 (술 먹고 黃疸이 왔을 경우)

황기. 이노작용있음. 알리지성 비염이나 다한증에서 수분이 소변으로 나오면서 새살이 돋게 된다

기억력

뇌와간에서의해독작용-SOD증가시키기때문에

강력한항산화제

쥐실험-baroreflex의활동을증가시킴으로써혈압이높은쥐를낮게했다

황기는 여러 작용 중에 간에서의 해독 항산화능력이 출중한 거 같습니다-본초에서의 배농생기, 해독 이런 것과 일맥상통한다고 봐야할까요? 땡쓰~ 윤승일
astragalus

HRA improved the memory, raised SOD activity in brain and liver, decreased the MDA content in the liver of aged mice, reduced the MDA content in ischemia-reperfusion kidney, decreased the creatinine level in blood of rats, and promoted the activity of NK cells in immunosuppressed mice. CONCLUSION: Similar to the natural A. membranaceus, HRA has senility-preventing, antioxidizing and immunomodulating functions

정용재09.11.14. 14:10

SOD는 수퍼옥사이드 디스뮤타아제(Super Oxide Dismutase)의 약자로 활성산소 해독효소라 불립니다. 활성산소 중에서도 체내의 구석 구석에서 가장 많이 발생하는 초과산화수소이온을 과산화수소와 산소로 분해하는 항산화효소라고 합니다. 1990년대 이르면 질병의 90%가 생체 내 과잉 활성산소와 과산화지질에 의해 생긴다는 지견이 일반화 되면서 더불어 주목받게 됩니다. 윤원장님 말씀은 항상 번역이 필요해서....^^;;

안준철

항기가 이노작용도 있다는걸 꼭 기억해 주세요. 그래서 알레르기성 비염이나 다한증의 경우 수분이 소변으로...그러면서 새살이 돋게됩니다.(生肌작용)

송이버섯은 소나무 밑에서 자라서 태양인 음식으로 판명됨

함초는 태음인약으로 변비에 지속적인 효과있음. 당뇨나 고지혈증에도 good

안준철

함초는 태음인 약으로 확인되었습니다. 변비에 대단히 좋습니다. 고지혈증이나 당뇨에도 확실한 효과가 있습니다. 환으로 장복합니다. 곤포(다시마)보다 변비에 더 좋습니다. 다시마는 끊으면 다시 변비가 되는 경향이 있는데 함초는 지속성이 더 뛰어납니다. 전남 서남해 지방이 주산지이고 바닷물이 빠지고 난후에 수확합니다.

버섯: 영지는 소양인, 운지는 태양인, 송이는 태양인, 나머지는 거의 태음인

영지는 소양인약, 운지버섯은 태양인약, 송이버섯도 태양인약, 그 외의 모든 버섯은 거의 다 태음인약이다.

청호는 면역의 과흥분으로 인한 염증열을 내린다. 면역억제효과. 루프스, 아토피.

청호는 면역억제 효과가 있어서 루프스와 같은 면역질환에 청열작용을 합니다. 아토피에도 같은 기전으로 매우 중요한 약이 됩니다. (면역이 과흥분되서 오는 염증으로 인한 열을 내려줍니다.) (안선생님)

천마는 직접 뇌에 작용, 어지럼증 두통 언어장애 파킨슨씨병 노인들의 精不足證에 좋다.

1. 천마는 BBB를 뚫고 뇌로 들어가서 뇌순환을 촉진해서...뇌순환장애로 인한 어지럼증과 두통을 다스린다고 합니다. 평간 식품작용이 있어서 경련성 질환, 언어장애에도 탁월한 효과를 발휘하게 됩니다.

2. 천마에 뇌신경전달물질의 전구물질을 풍부하게 함유하고 있다고 합니다. 이렇게 되면 태음인의 뇌와 관련된 질환에 천마가 더욱 더 중요해지는군요, 세로토닌 도파민 등이 부족한 환자에게 도움이 될 수 있는 거 아니겠습니까? 예를 들면 파킨슨병 같은 경우가 되겠습니다. 태음인 노인들의 정부족증에도 두루 응용가능해지게됩니다. 물론 증을 봐서 평간식품해야되는 상황이라야 효과적이겠습니다. (안선생님)

포황은 태음인산모에 필수, 산후자궁원상복구에 효과, 평활근수축, 산후복통, 생리통, 오로...

포황은 자궁의 평활근을 수축하고 산후에 자궁을 원상 회복하는 효과가 있으며 산후복통 생리통 오로에 탁월한 효과가 있어서 태음인 산모에게 필수적인 약이 됩니다.(안선생님)

오가피는 간신부족으로 인한 풍한습비에 가장 적당. 利水消腫하여 부종을 동반한 관절통에 좋음. 보약에도 사용

오가피는 補하는 가운데 散하는 작용이 있다. 즉 간신부족으로 인한 풍한습비증에 가장 적당하다고 하겠습니다. 그래서 오가피는 보약에도 쓰이고 외감이나 痺症에도 쓰이게 됩니다. 利水消腫의 효과가 있어서 부종을 동반한 관절통에 木果 葡萄根과 함께 배오해서 쓰이게 됩니다. 포도근도 오가피와 함께 利水消腫하고 강근골하는 작용이있어서 오가피와 대동소이한 약성으로 이해해도 됩니다.(안선생님)

단삼을 生用하면 혈전을 녹여 활혈하고(협심증, 관상동맥질환), 초하면 보혈한다.

단삼은 관상동맥을 넓혀주고 혈전을 녹이는 작용이 있습니다. 중국에서는 협심증이나 심혈관 질환에 단미로도 많이 쓴다고 합니다. 혈전을 용해하는 작용이 있습니다.(안선생님)

단삼도 마찬가지로입니다. 보혈에는 초하고 활혈에는 생으로 씁니다. 수치가 매우 중요합니다. 오미자는 생으로 쓰면 외감과 기관지 기침 등에 쓰이고 증하면 보습합니다. 오미자를 생으로 쓰면 보습하는 작용이 없고 외감과 기관지에 주로 작용됩니다.(안선생님)

태양인의 야교등은 양혈안신한다.

야교등은 태양인의 심간을 도와서 養血安神시킵니다. 산조인과 약효가 유사하나 약력은 산조인보다 약합니다.(안선생님)

소양인 보간탕에 형개들어가는 것은 다른 약과 어울려 보혈하기 때문.

소양인 보간탕에 형개가 1.5돈 들어가는 것은 理血작용때문이다. 형개가 재밌는 것이 다른 약과 어울리면 보혈작용을 강해진다. 그리고 간혈허의 주증상증의 하나가 현훈인데 형개가 현훈에 쓰이기도 한다. 만약 형개가 현훈을 치료하는 작용이 없다면 1돈정도만 썼을 것이다. 1돈 넣어보고 1.5돈 넣어보고 써보면서 비교해보면 알 수 있다. (안선생님)

와거자(상추씨)는 소양인약으로 불면에 매우 좋음. 유즙불통, 소변불리에도 굳

와거자(상추씨)가 소양인약으로 보여집니다. 산조인과 더불어 불면에 최고의 약으로 민간에서 사용되었습니다. 유즙불통 소변불리에도 응용합니다. 영천에 불면증으로 유명한 할아버지가 하시는 한약방이 있었는데 산조인초와 와거자를 위주로 썼다고 합니다. 산조인은 기름이 반들 반들하게 나오도록 초해야됩니다. (안선생님)

와거(상추)

소양인 IgA 신증후군 환자가 상추를 다려먹고 좋아지고 있습니다. 붓기가 빠지고 얼굴이 제모양으로 되어가고 있습니다. 체질음식표만 드렸는데 생것은 칼륨때문에 걱정되서 상추를 다린 물을 많이 먹었다고 합니다. (안선생님)

오미자를 생용하면 기침 등의 외감질환에 작용하고, 쪄하면 보음한다. 태음인 소갈에도 오미자는 가장 중요한 약. 소양인 소갈에는 인동등

동의보감에서는 오미자를 기침이나 외감약으로 쓰이는 것보다 補腎 補陰하는 약으로 쓰이는 경우를 상당히 강조한 것 같습니다. 신기환에 오미자가 들어가고 보음하는 역할을 합니다. 보음에는 쪄해서 사용하고 외감에는 生用합니다. 류썸의 처방 상황보음탕이나 정심보음탕의 경우도 증해서 사용하며...오미자의 보음하는 효과를 노린 것입니다. 소갈에도 오미자는 가장 중요한 약입니다. 소갈에는 끝까지 오미자를 씁니다.

소양인의 소갈에는 끝까지 인동등을 씁니다. 中消에 쓰이는 인동등지골피탕을 기억하시면 좋겠습니다. **한전** 중요, 물론 소갈의 원인은 기본적으로 음허입니다.(안선생님)

단삼도 마찬가지로 씁니다. 보혈에는 초하고 활혈에는 생으로 씁니다. 수치가 매우 중요합니다. 오미자는 생으로 썬면 외감과 기관지 기침 등에 쓰이고 증하면 보음합니다. 오미자를 생으로 썬면 보음하는 작용이 없고 외감과 기관지에 주로 작용됩니다.

파고지는 신양허로 인한 설사에 씹.

파고지가 신양허로 인한 설사에 씹니다. 육두구와 함께 썬면 이신환이 됩니다. 파고지가 설사에 신양을 보해서 지사작용이 있다는 사실을 꼭 기억해야겠습니다.(안선생님)

육종용은 체질판단이 안 된 약이다.

아직 확인이 안 된 약입니다. 육종용은 기름기가 많고 설사가 잘 나는 약이라서 변비가 있는 사람이 아니면 설사가 잘 납니다. 그래서 체질 확인이 잘 안 되는 것 같습니다. 변이 조금이라고 묻은 사람에게 썬면 바로 설사가 잘 납니다.

오공(지네)은 간질 구안와사 아관긴급 파상풍 등 풍질에 주로 사용. 민간에서는 좌섬요통에 응용

태음인 통증환자에게 전충을 써서 많은 효과를 보는데요

전충과 오공은 어떤 차이인지...오공은 어떨때 가미하면 좋을지요?

안준철

간질 구안와사 아관긴급 파상풍 등이 풍질에 주로 응용합니다. 辛溫하고 有毒합니다.
물론 민간에서는 좌삼요통 등에 사용하기도 합니다.

포도근은 산머루근

전 동양허브라는 곳에서 거래를 하고 있습니다.

현재 유통되는 포도근은 이제마 선생님께서 계실 때는 없던 것이고 산머루근이 맞다고
동양허브에 거래하는 사상 원장들이 산머루근을 요구해서
경북 어딘가에 재배하는 곳을 찾아서 유통을 시작했다고 하네요.
그래서 저도 산머루근으로 쓰기 시작했는데
포도근을 산머루 근으로 쓰면 맞는 건가요?

안준철

왕머루 뿌리로 알고 있습니다. 지방에 따라서 산머루라고 불리기도 합니다. 포도 뿌리를 쓰면
안 됩니다. 옛날 책에 한자로 포도라고 써져있으면 머루를 말합니다. 포도를 grape로 이해하
면 안 됩니다.

옥죽을 생용하면 그냥 보신하고 주증하면 신양을 보하는 성질이 강해진다(노인의 신양허쇠로
인한 요슬의 통증), 우슬을 생용하면 어혈에 작용하고 주증하면 보간신한다. 여정실도 생용하
면 청간명목하고 주증하면 보간신한다.

우슬도 주증과 일반이 있는데요, 어떤 차이점으로 이해하면 좋을까요?

충초보양탕엔 옥죽주증 당삼보신탕엔 일반옥죽. 둘다 우슬은 주증으로 되어있습니다.

감사합니다

안준철

옥죽은 등글레입니다. 시중에 황정(태음인약)과 혼용되고 있습니다. 옥죽은 보신합니다. 주증
을 하면 술의 뜨거운 성질을 받아서 신양을 보하는 성질이 더 강합니다.(팔미의 육계 부자에
해당한다고 생각하면 됩니다.) 생으로 쓰면 그냥 보신합니다. 즉 노인이라서 신양허쇠가 더 심
하고 무릎 허리 등이 더 냉한 경우에는 주증해서 쓰고 나머지 신허에는 생으로 씁니다. 즉 노
인의 신양허쇠에는 주증해서 술의 더운 기운을 더 넣어준다고 생각하면 됩니다.

우슬은 생으로 쓰면 어혈에 작용하고 주증하면 보간신합니다. 즉 자궁질환 등의 어혈에는 생
으로... 보신할 때는 주증해야 됩니다. 오미자도 보음할 때는 주증하고 외감에는 생으로 씁니
다.

여정실도 생으로 쓰면 청간명복하고 열을 사해서 변비 등에 응용합니다. 주증하면 보간신합니
다.(우슬과 같이 주증하면 보음합니다)

태양인 발계는 청미래덩굴로서 신양을 돕고 온신축노한다. 태양인 아이의 오줌싸개. 민청미래

덩굴인 토복령과는 다른 약이다.

새로쓴 사상의학에는 p449 발계와 토복령은 혼동하지 않도록 한다고 하셨습니다
청미래덩굴인 발계는 어디서 구하나요? 새롬에선 발계를 그냥 토복령으로 쓰던데요
감사합니다

안준철

발계는 청미래덩굴이고 토복령은 민청미래덩굴입니다. 우리나라에서는 민청미래덩굴인 토복령을 발계의 대용품(위품)으로 사용하고 있으나 기원식물이 완전히 다릅니다. 옴니허브에 주문하시면 진품 발계를 구하실 수 있습니다. 신앙을 두고 온신 축노합니다. 태양인 어린이의 오줌 싸게에게 쓰인다고 일단 기억하시면 좋겠습니다. 소음인의 축천환(오약 익지인)처럼 쓰이기도 합니다.

국산전호는 태양인약 아삼이고, 소양인약 전호는 중국산인 백화전호다.

소나무(태양인 약재)와 잣나무(태음인 약재)는 외모는 비슷해도 기원이 완전히 다릅니다. 국산전호는 태양인약 아삼입니다. 자화전호(중국산)와 백화전호(중국산)이 소양인약 전호입니다. 국산전호는 태양인약 아삼입니다. 원래 자화전호가 소양인약으로 가장 좋지만 현재 자화전호는 구할 수 없어서 백화전호만 씁니다. 백화전호는 자화전호보다 약효는 떨어지나 소양인약이 확실하고 현재로서는 소양인의 전호로서는 최선의 약물입니다.

산조인은 직접 뇌의 송과체에 들어가 교감신경항진을 회복, 스트레스성 소화불량 다한증 불면증 등을 치료한다. 스트레스성 소화불량, 다한증에는 초용하고 불면증에는 瀉熱 위해 生用한다. 식욕조절하므로 태음인 비만에다 활용가능. 생산조인은 간열을 사하고, 초산조인은 보혈한다. 간기울결로 인한 불면은 사열해야 하므로 생용, 노인의 불면은 혈허로 인한 것이므로 초용.

산조인이 뇌의 송과체에 직접 들어가서 교감신경 항진을 회복한다고 합니다.

소화불량(스트레스성), 다한증 등에는 초해서 사용하고 불면증에는 열을 제거하기 위해서 생으로 써야 됩니다. 다한증이나 소화불량 불면증 모두 교감신경항진이라는 관점에서 이해될 수 있습니다. 스트레스를 받으면 과식을 하게 되는데 이때도 산조인이 좋은 역할을 한다고 합니다. 태음인 비만약에 산조인 잘 써보시기 바랍니다. 근데 송과체는 뭐하는 것인가요

산조인이 송과체에 직접 들어가는 거의 유일한 약이라고 합니다. 뇌에 작용한다는 건 대단한 일입니다. 산조인 대단한 약이죠 알면 대단한 약이고 모르면 그냥 뿔대추씨가 됩니다.

비만에 마황을 써서 생사람 말릴 것이 아니고 산조인 등으로 식욕충동을 조절해야 됩니다. 그리고 이완이 되면 인물도 좋아지죠. 현대인에게 산조인을....

송과체는 요즘 해부학용어론 솔방울샘이라고 합니다. pineal gland. 멜라토닌이 주로 나오는

곳입니다. 솔방울샘이 하는 일은 어둠이 오면 fire가 되면서 멜라토닌이 나오면서 서서히 잠잘 준비를 하게 하는 곳입니다. 스트레스 받으면 이곳이 기능이 떨어지기 때문에 수면사이클에 문제가 옵니다 산조인 정말 잘 배웠습니다

안준철

생산조인은 간열을 사할 때 쓰고 초산조인은 간의 혈을 보할 때 씁니다. 엄격히 구분 됩니다. 즉 불면의 상황에서 간열이 문제면 생으로 쓰고...혈허해서 불면이면 초해서 씁니다. 노인의 불면은 대부분 혈허에서 비롯됨으로 초해서 씁니다. 간기울결의 경우는 열이 생기므로 생으로 씁니다.(피옴^^)

약재 정보 몇가지 2(여정실주증, 오미자주증하는 방법 외.....)

오늘 동성한의원 약재과장님과 또 통화를 해서 얻은 정보 몇가지 적어보겠습니다 ^^

오가피 : 옴니허브 꺼 쓰고 있다. 장백산에서 채취한 것인데 수령이 30,40년 된 나무에서 채취한 것이다. 검증이 된 약재다.

자오가피 : 예전엔 구할 수 있었는데 현재는 수입에 문제가 있어서 구할 수가 없다. 그냥 오가피로 대체하고 있다.

홍모오가피 : 가시가 잔잔하게 많이 있는 중국산 오가피다. 일반약업사에서도 구할 수 있을거다. 우리는 보현약업사에서 구해 쓴다.

사원자 : 다른 곳에서 쓰다가 옴니허브에 구해달라고 얘기를 해서 현재 옴니허브에서 구해쓰고 있다.

충위자 : 보현약업사에서 구해 쓰고 있다.

아교 : 다른 아교는 안되고 꼭 옴니허브의 아교를 써야한다. 옴니허브는 산동아교로 100% 당나귀가죽으로 만든 것이다. 다른 아교는 소가죽으로 만든것도 있고, 튀밥처럼 희게 된것은 공업용 아교로 못쓴다.

산앵두 : 구하기가 워낙 힘들고 고가여서 그냥 앵도육으로 쓰고 있다.

맥이당(보리엿) : 왕비천 하늘조청에서 구해 쓴다. 옴니허브것을 썼었는데 연해서 지금은 안쓴다. 왕비천 하늘조청은 진하고 단맛이 강하다. 소양인 애들약에는 맥이당을 자주 넣는편이다. 맛이 좋아 애들도 좋아한다.

왕비천 하늘조청 : 054-783-7837

여정실주증 : 우리는 옹기 약탕기로 찌는데 그냥 아무데나 찌면 된다.

여정실을 100%밀막걸리로 촉촉하게 버무려서 놓고 물로 찌면 된다.
보통 2시간 정도 찐다. 오미자증은 1시간에서 1시간 20분정도 찐다.

약재 정보 몇가지

며칠전 몇가지 약재에 대해서 궁금하여 동성한의원 약재과장님과 전화 통화를 했습니다.
대단한 것은 아니지만 참고가 되실까 해서 적어 봅니다.

먼저 소음인 열증처방을 써보려고 감부리와 나도근에 대해서 문의했습니다.

감부리(컴프리) : 약재에 문제가 있는것 같아서 류원장님이 사용을 보류 하셨습니다. 신장암 유발 등 몇가지 문제가 있는것 같다고 합니다.

나도근 : 옴니허브에서 나오는 도근을 쓰면 된다고 합니다.

옴니허브에 전화해보니 나도근(찰벼)은 없고 도근(벼뿌리줄기)만 있다고 하던데 그냥 그것 쓰면 된답니다.

해동피 : 책에는 음나무를 쓰면 안된다고 나와 있는데 저희 한의원에 들어오는 해동피가 음나무라고 적혀 있어서 문의해보니

수입 음나무를 쓰면 된다고 합니다. 국산 음나무는 쓰면 안된다고 합니다. 그러니까 수입 해동피를 쓰면 되는 것 같습니다.

양총피 : 동성한의원에서선 시장의 양파가게에 부탁해서 약재를 구한다고 하시면서 보현약업사에 한번 문의해보라고 하셨는데

보현약업사에 문의 해보니 도저히 단가가 안맞아서 작업을 하지 않는다고 합니다.

ㅠㅠ.

구하기가 어려울것 같습니다.

수삼 : 농협에서 구해 쓰고 있다.

저희 거래 약업사에는 수삼이 없더군요 ㅠㅠ.

여정실주증, 오미자증, 속단주초

: 모두 한의원에서 직접 수치를 하고 있다.

오미자증은 그냥 끓는물에 1시간정도 찌면 된다.

여정실주증은 술에 100% 밀막걸리를 넣고 어찌어찌해서 찐다고 하셨는데 자세히는 못 들었습니다.

동성한의원 053-755-3553

보현약업사 053-951-1150

나눔제약 1544-1233

휴먼허브 1544-2375

옴니허브 080-345-1255

주로 위의 약업사들과 거래한다고 합니다.

궁금하신 약재가 있으시면 언제든지 동성한의원 약재과장님께 문의하시면 되겠습니다.

저도 정용재 원장님 얘기 듣고 전화하니 아주 친절하게 얘기해 주시더라고요.

참고하세요 ^^

홍맥구입에 대해서

좋은나라 홍맥을 추천받았습니다. 인터넷에서 연락처를 검색해보는데, 여의치않습니다.

도움부탁드립니다.

전장훈

좋은나라 전화번호 043-533-0377/ fax043-533-0378 로 변경된 모양입니다. 한의원 가격 300g에 7000원 해주셨구요~ 무척 친절하시더군요. 감사합니다.

사상인 환약은 어떻게 만들어 쓰시나요?

외국에 나가시는 분들이 간혹 환약을 만들어서 가지고 가시려고 하는데.

그냥 체질 상관 없이 환약을 주문하면 될런지... 아니면 각 체질별로 특별히 주문을 해야 하는 지요? 태음인은 큰 상관 없을듯 보이나 태양인이나 다른 체질은 어떻게 하는게 좋을지요?

혹시 경험 있으신 분 있으시면 조언 부탁드립니다.

안준철

활석이나 석고 같은 광물질은 원칙적으로 환제로 쓰지않습니다. 꼭 써야한다면 1/2 이하로 줄여서 씁니다.

상황은 신장과 자궁질환에 중요한 약으로 쓴다. 북한산. 약업사연락처

태음인 약재 중에 상황이 아주 중요한 역할을 하는 것 같은데요

저희 약업사에 물어보니 아주 비싸네요 ㅠㅠ 자기들도 따로 구입해 와야 한다는데,

원장님들은 어떻게 구입해서 쓰시나요? 가격은 어느 정도 하나요?

정용재

상황을 신장, 자궁문제에 중요한 약으로 쓰시더라고요. 암환자에게는 항암버섯으로 유명하기도 하죠. 보현약업사에서 구매 씁니다. 국산은 너무 비싸고 중국산이라고 합니다. 2, 3만원 했던거 같네요. 류원장님이 거기서 쓰신다니 효과는 문제없어 보입니다.

김태규

보현약업사는 대구에 있나요? 죄송하지만 연락처좀 부탁드립니다 될까요?

김봉찬

저는 거래하는 약업사에 물어보니 국산 좋은거는 10만원이고 북한산(중국산)은 2만4천 3만5천 이렇게 있던데 2만4천짜리는 색이 고동색이고 다른 버섯 같더라구요 그래서 3만5천짜리 쓰고 있는데 효과 차이는 어떨려나 모르겠네요

안준철

대구의 보현약업사나 나눔제약은 북한산입니다. 1키로에 2만원으로 알고 있습니다. 국산과 약효차이는 없습니다. 서울은 3만원입니다. 맥문동도 한근에 7천원이나 씩니다. 지방이 싼거 같습니다.

김태규

감사합니다. 방금 보현약업사에 전화해서 구입했습니다. 북한산 1키로에 3만원이라네요... 류원장님이 국산은 재배라서 북한산을 써야 한다고 했답니다.

형개, 곽향, 소엽은 후하가 좋다. 산조인은 한증은 초용, 열증은 생용한다. 마황은 탕포를 안해도 약효에 문제가 없다.

1. 현재 형개, 곽향, 소엽 처럼 향이 중요하다고 생각되는 약은 약 닦이기 완료 5분전에 따로 넣습니다. 나름대로 향으로 인한 효과를 보기 위해서 입니다. 확실히 후하를 하면 약맛이 훨씬 부드럽고 좋은 것 같아요. 근데 원래 처방이 갖는 의미상에서 후하하는 게 옳은지는 잘 모르겠습니다. 조언 부탁드립니다.

2. 마황 산조인은 생것을 써야하나요? 일반적으로 이전에 저는 마황의 부작용을 줄이기 위해 탕포한것을 썼고, 산조인은 초했을 때 잠을 오게 한다고 해서 거의 초한 것을 썼습니다. 근데 처방이 목표하는 바에 어긋나지는 않은지 궁금합니다. 조언 부탁드립니다.

안준철

사상의학에서 법제 수치나 전탕방법은 후세방과 같습니다. 후세방에서 후하하면 좋은 약은 사상방에서도 마찬가지입니다. 산조인은 한증은 초해서 사용하고 열증은 생으로 쓴다고 생각하면 됩니다. 불면이나 다면의 여부와 관계가 없습니다. 마황은 6진양약입니다. 오래 묵으면 부작용도 줄고 효과도 좋아집니다. 그리고 탕포를 하는 것이 원칙이겠으나 저는 생으로 사용해도 아무런 문제를 발견하지 못했습니다.

凉血止血藥 大薊(소양인 자궁출혈, 하혈의 특효약)

소양인 자궁출혈의 특효약인 대계(영경귀)입니다. 지난 가을 대관령 삼양목장에서 저희 딸이 찍은 사진입니다. 스코틀랜드 국화라고 합니다. 잉글랜드 국화는 장미이고요. 사진정리하다가 보여드리고 싶어서...색이 보라색이고 혈약이란걸 직감할수 있습니다. 영경귀가 앞으로 많은 사람들 살릴것 같습니다. 특히 한의사를 많이 살릴걸로.....

(쌍코피에도 잘 들으니까요.)ㅋ

안준철

대계 소계없이 자궁출혈 하혈 못고칩니다. 놀라운 효과가 있습니다.

오현우

Cirsium japonicum De Candolle이 대계이고, Cephalonoplos segetum이 소계인데 둘다 국화과라서 꽃모양만으로는 구분이 힘들다고 합니다. 둘 다 우리나라에서는 흔히 엉겅퀴라고 합니다. 둘의 구분은 잎이 타원형이면서 주변에 작은 가시가 있으면서 50cm이하로 자라는게 소계, 잎이 민들레잎처럼 뾰죽뾰죽하면서 가시가 나있으면서 50~100cm로 자라는 게 대계라고 보면 쉽다고 합니다. 위에 사진에 나오는 건 키도 작고 잎도 타원형으로 보여서 소계로 보입니다. 쉽게 말하면 이름 그대로 소계는 잎의 작은 가시 작은 키, 대계는 잎의 큰 가시 큰 키로 구분하면 될 듯합니다.

윤승일

엉겅퀴 milk thistle은 간조직 세포를 stabilize시킵니다. 한방에선 양혈지혈이지만 영양학에선 간대사촉진에 아주 많이 이용됩니다. 소양인의 간에도 목단피와 함께 유용하지 않을까 많은 생각들이 듭니다. 어제 강의 아주 도움이 많이 되었습니다. 감사합니다

동충하초는 태양인의 대표적인 보약으로서 폐신을 도우므로 감기 잘 걸리는 사람에게 좋다.

선생님, 올초에 하신 강의록에 보면 동충하초가 폐를 좋게하고 감기에 좋으며 태음인 약에 들어가 있더라고요...전에 강의하실 때는 태양인 약으로 들었는데요...확인 좀 부탁드립니다. 그리고 동충하초 구하려고 하니까, 플라스틱 투명한 팩에 들어있는 몇천원 안 하는 노란색으로 보이는 것을 보여주던데요...그런 것도 효과가 있을까요? 구입할때 추천해주실만한 곳 있으시면 가르쳐주십시오. 감사합니다.

(안준철)

동충하초는 태양인의 대표적인 보약입니다. 폐신을 돕기 때문에 감기 잘 걸리는 사람에게 좋습니다. 누에 (원잠, 건잠)는 비신을 돕기 때문에 잘 못 먹는 사람에게 좋습니다. 플라스틱팩에 든 것도 효과가 있습니다. 제주도산이 좋다고 들었습니다.

계혈등은 보혈약으로 태양인 빈혈이나 산후혈증에 특효약이고, 호장근은 태음인의 습열을 사한다.

호장근은 전에 선생님께서 얼핏 언급하신 것 같은데 다시 찾으려니 못 찾겠습니다. ^^; 요즘 계혈등도 종종 사용하는 임상레들이 간혹 보이던데 어느 체질약인지 모르겠습니다. 계혈등 호장근은 어떤 의미로 사용해야 할까요??

안준철

계혈등은 보혈약인데 태양인의 빈혈이나 산후혈증에 특효약이라고 생각하시면 됩니다. 호장근은 태음인의 습열을 사하는 약입니다.

미후도는 국산참다래로서 소식작용을 하고 식물을 없앤다.

미후등과 미후도는 처방쓸 때 서로 다르게 작용한다고 보고 쓰는 건가요?

태양인 한증 위장병에 미후등식장탕이라고 하셨는데 미후도를 넣어도 같은 효과가 나나요?

안준철

미후등식장탕에는 미후등이 없고 미후도 뿐입니다. 미후도는 다래인데 국산은 참다래라고 하고 키위는 양다래라고 합니다. 소식작용을 하고 식물을 없애줍니다. 소고기 양념에 키위를 넣으면 소고기가 다 녹아버리죠. 육독 육체를 녹여서 없앨 수 있다는 것입니다.

유근피는 어느 태음인 약이고, 신이는 소음인 약이다.

소음인 아빠, 태음인 엄마 가족인데, 아빠와 큰아들이 비염이 있습니다.

아빠는 유근피(느릅나무껍질) 달인 물을 계속 달여 먹고선 아빠가 깨끗이 나았다가,

작년 말에 재발하여 왔었습니다. 큰 아이는 치료시작 후 느릅나무 달인 물을 안먹는데,

아빠는 지금도 먹는대네요. 경험적 습관이란 게 무섭죠..

유근피는 거습하는 효능때문에, 비염에 여러 한의원 원장님들이 비염 스프레이에 많이 응용하시는데요, 저도 비염 스프레이에 넣습니다.

1. 유근피는 어느 체질약일까요?

2. 신이가 태음인 약인가요? 태음인 열다한소탕이나, 갈근조위탕에 신이의 효과는 어느 정도 이신가요?

원잠의 시세 구입처, 원잠은 허로에 쓰이고, 원잠아는 신양을 도와서 발기부전에 쓴다.

먼저 전원장님께 감사드리구요 ^^

원잠 구매달라 했더니...원잠을 모르더군요...원잠아를 가져왔네요....

단군약업사...

진주 600g 에 4만6천원(빛깔이 곱더군요 망치로 깨서 넣었습니다.)

동충하초는 플라스틱 껍에 든것 45g에 3천원~ 생각보다 싸네요

전충은 600g에 8만원...(소금끼 약간 있음 허를 대 보았는데 염분이 거의 없는듯...) (5만원짜린 염분이 너무 많았음) (무염은 20만원정도... 헉스)

구인 600g에 9500원

원잠은 구하지 못했네요...

원잠아를 가져 왔는데.... 600g에 11000원이네요...

그외 잠사 와송 산장 등등도 어떻게 들어오는지 궁금합니다.
그리고 원잠 구하시는 약업사 연락처도 가르쳐주심 감사드리겠습니다.

전창환

원잠은 김태규원장님이 추천하신곳이 요겁니다 --><http://mall.eoullim.net/> 쇼핑몰에 웹상으로는 원잠제품이 안 올라와 있으니 전화해서 주문하시면 되고요... 잠사 와송 산장은 웬만한 약업사는 다 취급하더군요 산장은 무척 비쌌니다 300그램에 3-4만원 준거 같은데 확실하지는 않고요... 진주는 비싸서 진주모를 쓰는데 한근에 9500원입니다(진주모 쓰는게 잘못됐으면 지적바랍니다)

이세희

감사합니다... 약업사분이 원잠이 아니고 원잠아 라고 계속 그러시길래.... 답답하던 차였습니다. ^^

전창환

원잠은 허로에 쓰이고 원잠아는 신양을 도와서 발기부전 등에 쓴다고 선생님께서 말씀하셨습니다

안준철

원잠이라고 하면 잘 모릅니다. 누에라고 하던지 건잠이라고도 합니다. 냉동 건조된 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 꾸썩한 냄새가 납니다. 냄새가 덜나고 단면이 매끈할수록 양품입니다.

이세희

전충을 썼던 환자(항강견비통 2인, 요각통1인) 모두 효과가 양호 했습니다... 예전부터 신경통으로 침 거의 매일 맞다시피 한 환자 왈: 한약 먹으니 이리 빨리 호전되어 침은 안 맞어도 되는 줄 알았다 면서 거의 10일 만에 오셨더군요... 중간에 침 한번 맞아야겠다 싶어 오셨다고... 20만짜리 무염이 부담되면... 8만원정도 약간 들어간 거도 괜찮을거 같아서... 올려봅니다...

■ 외감 및 기관지 폐관련 질환들

태음열증의 감기는 갈근승기탕을 설사할 때까지 쓴다.

저는 태음인 열증으로 비염이 있습니다.

몸이 힘들면 하얀 콧물이 나오고 심하지 않으면 10시정도까지 잠시 안좋으면 점심때까지 있다가 없어집니다. 술먹은 다음날이나 감기 뒤끝에는 며칠씩 하루종일 안좋기도 합니다.

안선생님이 가르쳐주신 갈근조위탕 가 비파엽 포공영 백부근 승마 마황 1돈을 먹고 나면 상당히 빨리 호전되는 것을 느낄 수 있었습니다.

이번에 감기가 아주 심하게 오면서 노란 콧물과 코막힘 인통 두중통 미오한 등이 있었습니다. 갈근승기탕을 먹었습니다. 1봉지를 먹어도 별 반응이 없길래 10분뒤 1봉지 더 먹었습니다.

조금 덜한 느낌입니다. 2시간뒤 증상이 다시 원래대로 돌아가는 듯 해서 또 먹었습니다.
바로 약간 덜해지는 느낌이 있었습니다.
이런 식으로 하루에 5-6봉지를 먹으니 이틀정도만에 많이 편해지긴 했지만 코감기가 심하고
컨디션이 아주 안 좋았습니다. 3일째에 갈근승기탕을 점심식사후에 다시 2봉지를 연복했더니
배가 불편해지면서 오히려 몸이 안 좋아지는 듯 했습니다.

감기급증은 다 좋아져서 그런가보다 해서 저녁약부터는 갈근조위탕 비염약을 먹었습니다.
다음날 아침에 도로 더 안좋아졌습니다.
몸도 더 힘들고 코도 더 막히고 콧물도 노래지고 해서 다시 갈근승기탕을 먹었습니다.
이번에는 식후 1봉지씩 먹었는데 약간 불편한 느낌이 있다가 배변 욕구를 느끼고
대변을 보통 변으로 보고 나면 몸이 더 편해지는 것을 느끼면서 코도 좋아졌습니다.
그런 식으로 2일을 갈근승기탕을 더 먹고나니 80프로 이상 좋아진 것 같은데
코는 좀 남아있으면서 깨끗하지는 않은 상태입니다.
하지만 아직 설사를 하지 않았으므로 계속 갈근승기탕을 복용할 생각입니다.
느끼는 증상이 콧물 코막힘이 동일하다 하더라도
감기에서 시작된 경우는 갈근승기탕을 거의 마무리될때까지 복용해야지 좋아지는 것 같습니다
중간에 갈근승기탕 연복후 불편했던 것은 대변을 못봐서 그랬던 것 같습니다

체질별 감기약

소음인: 초기 광항정기산/ 진행되어 기침 가래 콧물 등에는 향사양위탕 가 천궁 소엽 지각
소양인: 초기 형방패독산/ 진행되면 지황백호탕
태음인: 한자 초기 마황발표탕/ 진행되면 한다열소탕
열자: 대항 2돈 들어가는 갈근승기탕

태음인 열자의 기침약으로 갈근포공영탕, 한자의 기침약은 자완상백피탕

55세의 태음인 한자 남성
감기 끝에 기침이 심하고 특히 새벽2시-4시 사이에 심해서 잠을 제대로 잘 수 없는 상황

처방:자완상백피탕,식후에 복용하고 잠자기 전에도 복용시켰습니다.

결과:이틀만에 많이 좋아졌습니다. 밤에 깨지 않고 잠을 잤습니다.

태음인 열자의 기침약은 갈근포공영탕

태음인 한자의 기침약은 자완상백피탕입니다. 매우 신속하고 효과가 좋습니다.

위의 두가지 처방을 이번 겨울에는 상비약으로 다려놔습니다.

태음인 기침은 이 두개의 처방으로...한열만 맞으면 걱정없이 해결이 잘 되는 거 같습니다.
이번 겨울에 많이 쓰게 될듯합니다.

소양인 목에 걸리는 뻑뻑한 가래, 마른 기침을 폐음허증의 지황양폐탕으로 치료하다

소양인 환자. 30대 중반. 여자

#. 주소증

燥痰(목에 걸려 있고 목이 간질하고 뻗어지지 않음)

乾咳嗽 (뻑뻑한 가래와 함께 기침이 심하고 특히 새벽에 심함. 옆에 같이 자는 사람이 깰 정도)

#. 경과

• 1주일전

: 갑자기 약간의 감기 기운

두통 (-), 발열(-), 오한(약간 으슬으슬 한 정도),

목에 가래(燥痰 뻑뻑. 음~음~ 하는 정도),

기침(처음에는 없다가 중간에 생김)

⇒ 상한으로 보고 방풍해표탕보다는 조담을 고려하여 방풍청열탕 바로 투입 3일분

☞ 결과 : 별무 효과. 가래는 계속 뻑뻑하고 기침이 낮밤으로 심함.

• 3일전

: 방풍청열탕 효과가 없어서 처방 바꿈

⇒ 양격산화탕 - 석고 치자 + 현삼 우방자 4 과루인 6 전호 2

☞ 결과 : 가래는 50% 이상 줄어들었으나 기침은 여전히 심함.

기침은 마른 기침 양상이고 낮밤으로 기침하지만 새벽과 기상 후에 심함.

환자는 가래가 줄었는데도 기침이 안 나오니 약이 전혀 효과가 없다고 드립~~ㅋ..

• 1일전 (어제^^)

: 가래는 줄었으나 계속 마른 기침을 하고 밤에 심해서 음허로 판다.

후세방의 조담과 야수에 많이 쓰는 육미 야수방이 생각남. (육미 가 천문동 패모 굴홍 4g 지모 황백 1.2~2.8g)

(소양인 환자 이지만 표치 위주로 처방하기로 함. 설사 나거나 할 때 까지 약 먹으면 나올 거로 추정..^^)

폐음허 처방인 지황양폐탕 주기로 마음 먹음.

⇒ 지황양폐탕 + 과루인 6 차전자 4 (청화열담하는 약재 가미)

* 지황양폐탕 - 숙지황 12 생지황 현삼 6 한련초 지골피 천화분 4 지모 황백 2g

• 오늘

: 밤에 한번도 기침 안하고 잠을 푹~ 잘 수 있었습. (약 어제 자기 전에 1봉 먹고 잤습.....

ㅎㄷㄷ)

아침에 기침 1~2번. 가슴도 많이 편함.

☞ 아직 다 낫지는 않았지만 약 먹으면 나올 거라고 확신합니다.

아니면 꼭 호전시켜서 결과보고 다시 할게요...ㅎㅎ

#. 고찰

: 지황양폐탕 좋네요..^^;; (다른 체질 조담에도 폐음허 처방 해보고 결과 보고 싶네요)
: 소양인은 역시 음허하군요.
: 이런 증상 초기에 열담온폐에 쓰는 '사과락과루인탕' 처방 했으면 어떨까 다음에 한 번 해 보겠슴.

사실 지황양폐탕 처방 내리기 전에 사과락과루인탕 고민했었슴.
(이런 경우 사과락과루인탕 처방 해 보신 원장님 리플로 고건 부탁드립니다)

: 역시 공부만이 살길임.
사상체질 공부 당근 기본중에 기본으로 열심히 해야 하고
변증 실력 더 키우기 위해서 동의보감 죽어라고 해야 함...

소음인 한자 천식을 향사양위탕가감 비염처방으로 호전시키다. 비염처방은 천식에도 응용가능

69세 소음인 한자 할아버지

주소증:여름에는 증상이 없고 가을 겨울에는 숨이 차고 가래가 끓는다.
이번에도 감기 끝에 숨차고 가래가 끓는다. 담배를 피우면 더 심해진다.

처방:향사양위탕에 천궁1돈 소엽1돈 지각1돈반 거담하는 진피는 2돈으로 증량.
결과:가래가 없어지고 숨차는 증상이 현저히 개선됐습니다.

고찰:태음인의 경우에도 갈근조위탕에 백부근 비파엽 포공영 각2돈 승마 황금 각1돈 마황1돈
가해서 비염과 천식이 동시에 치료 된 예가 있습니다.

태음인의 경우 천식에는 마황을 더 많이 써줘야 됩니다.(마황은 기관지를 열어주고 항알레비
염과 천식을 모두 호흡기 점막의 알레르기성 질환이라는 점에서 비염에 듣는 각 체질약이 천
식에도 듣는다는 사실을 알게 됐습니다. 그러나 소음인은 천식의 경우 거담하는 진피를 증량
하고 지각도 증량해야 됩니다. 지각도 가래를 삭힙니다.
르기 작용이 있습니다. 콧물이나 묽은 가래를 말려주기도 합니다.

환절기에 비염처방을 비염에만 쓰지 마시고 중이염이나 천식에도 잘 응용해 보시기 바랍니다.
(물론 적절한 가미가 필요합니다.)

참고로 소양인은 폐독산과 도적산으로 비염과 천식에 잘 응용해 보시기 바랍니다.
소양인은 폐독산을 쓰면 코물이 무조건 줄어듭니다. 폐독산을 감기약이라고 국한시키면 안됩
니다. 폐독산을 외감과 관련되 다양한 증상에 응용할 수 있습니다.

노인의 만성감기를 신허로 보고 치료, 효과보다(상황보음탕).

여 70세 태음인 열자

만성 감기 5년

몸살/기침으로 너무 괴롭다(양약도 잘 안 듣는다).. 정수리 열감 5년

(재채기/코막힘/가래/인통은 없음)

우측 안면마비 20년

당뇨/혈압/우울증/만성방광염...

천면(1시간 1회씩 깬다)

판콜을 하루 몇 병씩 먹고, 코데인 등 양약을 자주 먹는다.

젊어서부터 몸이 약해서 양약과 한약을 달고 살았다. 지금도 이것저것 많이 먹는다.

여러 선행 질환과 지나친 약물복용으로 전반적인 상태가 좋지 않아서

노인의 기본변증인 신허로 접근하기로 하고 상황보음탕을 투여

10일 후 기침이 한결 덜하다고 하심. 판콜을 하루 몇병에서 1병으로 줄였다고 하심.

-> 1제 더 투여

10일 후, 몸살/기침 50% 호전, 정수리열감도 호전, 소변 1시간 1회에서 2시간 1회로 줄음.

코데인 안 막고 지낼만 했다.

-> 1제 더 투여

어느 정도까지 좋아지실지 모르겠지만

노인의 기본병증은 신허라는 말이 과언이 아님을 느낄 수 있었던 임상례였습니다.

태양인의 식도성 해수를 석곡양위탕(燥傷胃[胃脘灼痛, 乾嘔, 呃逆等])가감으로.

태양인 열자 51세 여자분

늘 소화가 안 되고 오심 증상이 있으시면서 동시에 2-3일에 1회씩 대변을 보십니다

한, 열 구분이 많이 망설여졌으나 류선생님 처방을 쓰는 관계로 류선생님 기준으로 대변을 첫 기준으로 해서 열자로 보았습니다

주소증은 목이 가렵고 아프고 마른 기침(밤에 누우면 심해짐)을 하십니다 1달 이상 됐고요

잘 안 낫는 마른 기침, 밤에 심한 증상을 보고 식도성 해수로 봤습니다

6월 9일 석곡양위탕 감 석곡 백하수오 4g으로 증 백모근 8g 가 구인 8g

(양총피, 문합은 없어서 못넣었습니다)

--> 14첩 7days

6월 21일 래원

상기 증상의 80% 소실된 느낌

---> 6월 9일 처방에 가 문합4g 14첩 7days

(그 뒤로 안오셔서 최종 결과는 잘 모르겠습니다만 아마도 더 좋아지시지 않았을까요? ^^)

역류성식도염과 그로 인한 해수를 길경죽여탕가감방으로

48세 여자분 태음인 한자

6월 3일 래원시 주소증은 흉민감, 숨차는 느낌, 마른 기침(스트레스 받으면 더 심해짐), 공복 시 흉부 열감, 1년이상 되셨고 양방 치료중이라고 하셨습니다 양방에서 역류성 식도염이라 진단 받으셨고요

식도성해수 처방 : 태음조위탕 거 오미자 마황 맥문동 가 비파엽 행인 각 8g 24첩

-->약드시는 중에 기침이 안 잡힌다면 계속 드셔왔던 양약 드시면 안되냐고 문의
정 심하시면 2-3일 드셔보시되 끊으시라고 말씀드림

6월 22일 래원

흉민감, 숨차는 느낌 60%정도 호전된 느낌이고 기침은 거의 안하신다고 하심

길경죽여탕 거 오미자 원지 가 건울 12g 24첩--> 역류성 식도염 쪽으로 더 치중해서 처방을
씀

7월 13일 래원

흉민감, 숨차는 느낌 전보다 더 좋아지셨고 기침도 안하심

다만 흉중 열감이 조금 있다고 하심

(위 처방 쓰면서 밤에 도한증이 있었는데 그 증상도 같이 좋아지셨다고 하네요^^)

현재 처방 고민중인데요 6월 22일 처방에 유근피 4그램 정도 생각하고 있습니다

정말 오래가는 태음인 해수에 자완상백피탕, 갈근포공영탕

어제부터 목이 칼칼하고 기침이 나며 몸살기가 있다고

감기 초기 증상을 호소하여 갈근승기탕 2일분 드렸습니다.

2일 후 여쭙보니 계속 설사만 하고 감기는 그럭저럭 비슷한 것 같다고 합니다.

기침이 심해졌습니다. 원래 감기 걸리고 한 번 기침을 시작하면

1달을 끌 때가 많다고 애초에 시작하면 안 된다고 합니다.

일단 자완청열탕을 2일분 드렸는데 기침이 계속 심하고 하도 해서 온몸이 결립니다.

이어서 한다열소탕을 4일분 드렸습니다. 전혀 차도가 없습니다.

가래는 조금 나는 정도고 다른 증상은 거의 없으며 기침만 굉장히 심합니다.

사삼유근피탕 7일분 드렸는데 조금 나은 것 같다고 합니다.

그리고 오늘 오셨는데 잘 안 나아서 아직도 고생하시고 있습니다.

돼지고기 드시면 설사가 잦고 밀가루, 아이스크림, 기름진 음식에 탈이 잘 납니다.

변비는 한 번도 없었다고 하구요, 커피는 심계만 있다고 합니다.

상복부 가스 경험 있습니다. 땀을 내보라고 해도 자기는 원래 전혀 땀이 안 난답니다.

예전에 연자소간탕 쓴 적 있는데 그때도 별 재미는 못봤습니다.

치료가 이렇게 질질 끌고 안될 땐 정말 부끄럽고 한심스러울 수가 없네요.

부족함을 절감합니다. 이 분은 정말 무슨 치료를 해도 거의 반응이 시큰둥했었습니다.

체질부터 다시 확인해 보려고 합니다. 태음인 맞는지요?

안 선생님께서 태음인이라고 판정해 주셨습니다.

갈근포공영탕(열담증)과 자완상백피탕(담열옹폐증)을 고민하던 중
하원장님의 조언을 참작하여 한자에 쓰는 자완상백피탕을 썼습니다.

2일 정도 드시고 증상이 확연히 좋아졌습니다. 그런데 이 상태가 약 다 드실 때까지 계속 되
었습니다. 하루라도 그치는 날은 없고 목도 아팠다 안 아팠다 반복합니다.
결국 이걸로 톱 떨어지지 않는 것입니다. 80% 정도 호전된 걸로 보입니다.

다음 약을 고민 중에 테스트 삼아 갈근포공영탕을 2일분 드렸습니다.

오늘 전화해 보니 거의 좋아진 것 같다고 합니다. 드시면서 불편한건 전혀 없었습니다.

마무리는 녹용대보탕으로 할까 하는데, 변동사항 있으면 보고하겠습니다.

정리하면

한다열소탕으로 해결되지 않은 태음인 해수에

자완상백피탕이 좋은 결과를 보여주었습니다.

열자에 갈근포공영탕이 좋다는 임상례가 여럿 있었고

저 또한 좋은 결과를 보여주리라 예상합니다.

앞으로 태음인 해수에 이 두 처방을 많이 응용해 볼 생각입니다.

하만중) ^.^; 좋아지셔서 다행입니다. 한증 해수 마무리로, 보폐탕이나, // 보폐탕 중용오미자
가 호도육, 자완, 백합, 녹용(폐기종의 폐신흡손증참조)써봤는데, 이것도 둘 다 반응 좋습니다.
연세있으시거나, 평소 한번씩 허리침도 맞으셨던 분이라면, 폐기종이 아니어도, 뒤의 처방 강
추합니다. 참고해 보세요~

태음인열자 갈근포공영탕으로 오래된 기침을 치료하다.

인통 기침이 주증

1. 2/3 사삼유근피탕. 약간 나음. 기침 양상이 바싹 마르고 인통 심함.
2. 2/10 갈근포공영탕(열담증) 7일분 많이 낫다. 매우 좋아짐
3. 3/12 기관지보약을 써야 재발이 안 된다고 설득해서 백합양폐탕가 상황 여정실 상백피 노근 15일분 처방함. 만성인두염의 폐신음휴증에 근거해서 가감함. 백합양폐탕은 燥傷肺證 내원하니 제반증상이 다 좋아짐

고찰

1. 인통이 심한 기침에는 갈근포공영탕이 확실히 좋다.
2. 역시 마무리는 보약이다. 특히 나이든 사람.

입에서 시큼한 맛이 올라오고 가래없는 기침을 태음조위탕 거 오미자, 가 갈근 승마 울금 청호로 치료하다.

58세

#. 주소증 - 입에서 시큼한 맛이 계속 올라온다. (酸味)

피곤하고 목이 칼칼하면서 아프고 밤에 가래 없는 기침을 가끔 한다.

눈이 깔깔하고 안구건조증이 있다는 등으로 봐서 간신부족에 허화가 뜨는 것 같고
腸鳴 증상은 담음이 심한 것으로 보이는데,

<안준철> 태음인 한자입니다. 이때 위산을 자극하는 오미자는 대체로 빼고 씁니다

=> 태음조위탕 - 오미자 + 갈근 8 승마 울금 청호 4g

약 먹은지 이제 5일 되었습니다.

입에서 시큼한 맛 사라졌고, 기침 완전히 없어졌습니다. .. 엄청납니다..ㅎㄷㄷ...ㅋㅋ...

선생님 말씀대로 위산을 자극하는 오미자를 뺐고,

‘입에서 시큼한 맛이 계속 올라온다. (酸味)’는 역류성 식도염으로 인한 것이었고

역류성 식도염 역시 이담작용과 관계되는 것임을 알게 되었습니다.

태음조위탕으로 감기탈출 사례

5세 남아입니다. 감기한지 1주가 되었고 이제 기침만 합니다.

마른 기침이고 가끔 열이 난다고 합니다. 기상시 기침이 심하다네요.

유치원 다닌 후부터 감기를 좀 더 자주 한다고 보약을 먹이고 싶어 합니다.

최근에 입맛이 좀 떨어졌고 배 아프단 소리를 하며 대변은 하루 2, 3 번 무르게 봅니다.

태음조위탕 가 분골 처방했습니다. 작년 9월에 약 먹고 3월에 왔는데,

그 뒤로 전혀 감기도 안하고 잘 먹고 잘 지냈다고 합니다.

가끔 배아 아프단 소리는 한 번씩 했다는군요. 대변은 대체적으로 하루에 1, 2회 정도 봅니다. 봄가을로 한약 먹자고 하고 태음조위탕 가 갈근2, 승마1, 분골少許 처방했습니다.

분골은 조금만 허락했습니다.

갈근포공영탕 치험례(기침, 열사용폐, 담열용폐, 열담증)

선생님 지시로 정리해서 올립니다^.^;

[태음인 열증 53세 여자 - 감기 후 인통 해수 환자]

커피 : 불면

소화 : 윗배 가스 참, 밥맛은 있음

소변 : 평소 방광염 잦음

대변 : 1회/1일 - 변비 기왕력 없음

감기를 1달 동안 앓았는데, 여전히 기침이 낫지 않는다고 내원했었습니다.

<1차> 감기 후 기침이고 가래는 별로 없다고 해서, 일반적인 경우로 생각하고 사삼유근피탕 3일분 투여 -> 좀 낫긴 한데, 전반적으로 아직 심하다.

<2차> 문진을 좀 더 해보니, 1달동안 양약먹고 하면, 보통 목은 안 아픈시던데,

이환은 발열은 없으나 여전히 목이 많이 아프고, 잘 때 누우면 가래가 그렇그렇하고, 코 속이 바짝 마르고, 발은 기침을 연신해서..

갈근포공영탕 1주일분 투여하고, 어제 전화드렸는데, 환자분이 정말 많이 좋아지셨다고 하네요. 원래 처음엔 1주일 단위로 한번 더 드시라 했는데, 더 필요없을듯 합니다...ㅠ;;

태음인기침 묶은 가래, 사삼보폐탕가감으로 호전시켰다가 폐증발생. 이를 갈근포공영탕(행인 자완 2배증)으로 호전시키다.

남 75세, 기침 희고 약간 누런 묶은 가래, 콧물, 비색 2달. 커피반응 있음(열자).

한담요폐증으로 진단하고 사삼보폐탕 거 사삼 가 자완 관동화 2그램에다가 축농증 폐기허한처 방 사삼보폐탕거 산약 가 마황 창이자 백지 백부근 혜백 2그램 가감 20첩 30봉, 3봉 드시고 엄청 좋아짐

--> 패증 났습니다. 다음날 열나고 머리 아프고 뭐 나고...

--> 열증의 열사용폐증, 열담증 등에 쓰이는 갈근포공영탕에 행인 자완을 두배로 증량합니다. 행인 자완은 한증약인데 현재의 증상이 한증이므로 증량해서 쓰는 것입니다. 만약 사삼보폐탕 가감방으로 비록 패증은 났지만 가래가 많이 없어진 상태라면 갈근포공영탕 원방만 쓰는 것이 좋겠습니다. 묽은 가래가 심한 건 한증인데 한증이 없으면 행인 자완을 증량할 필요가 없습니다.

추위를 무지하게 타는 소양인 한증, 체력부진 맑은 콧물 제체기를 신양허로 보고 토사자보양탕, 외감고려하여 형계 방풍 시호 연교를 가해서 치료하다.

47세 여성 소양인 한증

평소에 배에 가스 많이 차고 빈혈(어지럼증,장판지 쥐내림) 심하고 허약한 체질.

주소증: 날씨가 추워지면서 추위를 견딜 수 없다. 그리고 제체기와 맑은 콧물이 대책없이 마구 쏟아진다.

신양허증에 외감이 잘 겹치는 경우로 보고 토사자보양탕에 외감과 콧물을 고려해서 형계 방풍 시호1돈 연교5푼을 썼습니다.

재진 왔는데 콧물 없어지고 추위를 안타게 됐다고 합니다.

추위 타는 증상(畏寒)은 기본적으로 신양허가 맞는 거 같습니다.(물론 혈허도 추위를 많이 탑니다.) 토사자보양탕으로 신양을 도와 추위를 몰아내고 피로감도 좋아지고

형계 방풍 시호 연교 등의 약물이 적절히 가미되어 콧물 제체기 등의 외감과 관련된 증상도 모두 없어졌습니다.

소고) 알레르기성 비염이 물론 외감과 관련되나 원기의 허약이 더 문제가 되면 원기를 보하는 처방에 외감을 막아주는 약물이 적절히 소량 가미 되어야한다는 사실을 이해하게 됐습니다.

이 경우에도 변증의 중요성을 더욱 느끼는 케이스가 되겠습니다. (신양허가 기본적으로 깔리고 그 위에 외감풍한이 콧물과 제체기를 나게 하므로 신양허증 처방에 외감과 관련된 약물도 조금 가미해야 된다는 사실을 알 수 있습니다.)

PS)구리에 사는 분인데 친구와 함께 와서 한재씩 더 지어갔습니다.ㅋ

소양인 신양허에 쓰이는 토사자보양탕으로 오토바이 많이 타서 무릎 시린 환자도 잘 해결됐습니다. 정말 좋은 처방입니다. 구자 선모가 신양을 돕습니다. 부추씨가 큰일 했네요.ㅋㅋ요즘 날씨에 추위 많이 타는 환자들에게 많이 응용하면 좋겠습니다.

소양인 한자의 신양허에는 구자 선모가 쓰이고...열자의 신양허에는 토사자 복분자가 쓰입니다. 구자 선모는 너무 뜨거워서 열자에게는 무리라고 봐야겠습니다.

(정용재)

선모는 부자나 오두와 비교될 정도로 화를 돕는 맹렬한 약으로 약간 독성이 있을 정도인데 소

양인 약이어서 좀 의외였습니다. 소양인에게도 이렇게 강력한 온보회양의 약이 있어 腎陽을 도울 수 있으니 하늘은 정말 공평한가 봅니다. 🌈

태음인한자의 감기 끝 기침을 한다열소탕 복용하고 구운 백과 수시로 먹어서 호전시침. 그러고도 잘 안 떨어지는 가래는 마황 0.5~1돈, 백과초 3돈을 가하되 그리고고도 안 되면 마황보폐탕가 백과초 관동화로 간다(가래를 뱉고 싶어도 안 뱉어지는 상황).

50세 여성

#. 주소증 - 易感冒

: 작년까지는 1년에 감기를 한 번 할까 말까였는데 이번 겨울에 들어서 감기가 3번 걸렸다.

감기가 잘 낫지 않는다. 현재도 기침이 약간 쿨럭쿨럭하고 기침할 때 맑은 가래가 나오고 가슴이 약간 아프다. 목도 아프다.

5년전 뇌수막종으로 수술한 후부터는 힘도 없고 조금만 움직여도 피곤하다.

** 이 분은 태음인 한자로 보입니다.

<태음조위탕 가 갈근 승마> or <사삼보폐탕>에 상백피 백과 정도로 생각하고 있습니다.

고견 부탁드립니다. 감사합니다.

<안준철선생님> 태음인이 확실합니다. 12:56

<하만종원장님> 태음인같습니다.

제가 먹어본 바로는, 태음인한증이라면, 오래된 가래 기침은 한다열소탕 수시복용하고,

은행은 따로 굽어서 간식(?)으로, 한번씩 왕창 먹는 게 최고였습니다~

하원장님 고견에 따라서

==> 한다열소탕

처방했으며, 체질식이 하고, 은행 볶아서 수시로 먹으라고 했습니다.

오늘 내원하셨는데 기침은 완전히 떨어지셨다고 합니다.

(역시 대단합니다..^^::)

그런데 가래가 안 떨어지신다고 하네요.

가래가 목에 계속 붙어 있고. '음 . 음' 소리를 내야하고 뱉기가 어렵고

뱉으면 멀겁기도 하지만 찢한 가래가 혼합되어 나온다고 하십니다.

이럴 경우 처방 방향을 어떻게 잡아야 할지요?

계속해서 '한다열소탕'으로 가면 될까요? 추가로 가미해 줄 약물은 어떤 것이 있을지요?

고견 부탁드립니다. 감사합니다.

안준철09.12.22. 16:18

이때는 가래를 말리기 위해서 마황을 0.5-1돈 추가로 가하고 가래가 잘 배출되게 하는 백과초(은행)3돈을 한다열소탕에 가합니다. 만약 이렇게 해도 끝이 안 나면 허증이므로 마황보폐탕에 화담하는 백과초 관동화를 가해서 씁니다. 한다열소탕 가미로도 잘 될 거 같습니다. 백과

는 기관지의 가래를 분리해서 배출이 잘 되도록 하는 작용이 있습니다. 기침하면서 가래는 뱉
싶은데 가래가 안 나올 때 쓰는 약이라고 생각하면 됩니다.

감기끝무렵의 잔기침을 사삼유근피탕으로 호전시키다-기초질문방에 올렸던 환자 경과

기초질문방에 올렸던 태음인 열증 45세 여성입니다.

3일전 감기 끝무렵의 잔기침으로 왔습니다. 가래 많진 않지만 있고(흰색), 식은땀 많이 나고
요.. 이분은 양약복용 후 열과 몸살기는 없어지고 나서 내원했습니다.

처방 : 갈근승기탕 2일분

경과 : 갈근승기탕을 먹으면 속이 메스껍고, 미식거린다. 하루치먹고 설사는 했다. 말할 때
잔기침 여전히 있다.가래 여전히 있다. <이분은 비염에 갈조가감해서 효과를 많이 보신 분입니다.>

이후 <가감갈근해기탕 가 자완 중용 행인> 달여놓은 게 있어10봉투여

-> 기침 똑 같다. 여전히 목이 간질간질하다. 약 먹고 변비되었다

사삼유근피탕 생각이 자꾸 나는데, 가래가 많진 않지만 있고, 기침이 밤에 더 심한 게 아니라
움직이면 더 심해진다 하셔서..정증은 아니라고 생각했지만...

그냥 무시하고 사삼유근피탕 10봉

--> 많이 좋아지셨다 합니다.

초기감기시 양약복용으로 인한 문제가 아니었을까 그냥 추측만 합니다.

태양인 감기 뒤끝 마른 기침을 역류성식도염으로 보아 당삼보위탕 거 현호색, 앵도육 가 아삼
구인 각 8g, 양충피 4g으로 호전시키다.

정원장 잘 지내삼?...^^.....궁금한게 있어서 이렇게 쪽지 보냅니다.

다름이 아니라 아들놈 처방 때문에...아들 태양인 한증..

감기 뒤끝에 마른 기침이 주소증인데..(밤에 심해짐. 물론 낮에도)

예전에는 오가피쌍해산 + 구인 백모근 어성초 이렇게 쓰면 들었는데 이번에는 꿈적도 안하
네...이런 경우 뭘 써야 하는감?

보통 후세방 개념으로 보면 육미야수방증 같은 건데....사상 처방에서도 이런 경우에

열증은 폐음허 한증은 폐양허로 보고 처방을 하면 되나?

류주열 선생님 같으신 경우에는 어떻게 처방을 하시는가 궁금해서리...

아니면 정원장님 같은 경우에는 뭘 처방하시는지?

난치병 전문 교수 정원장님의 고견 부탁드립니다..

<정용재 원장>

역류성 식도염으로 인한 기침으로 보입니다.

태양인 한증이면

당삼보위탕 거 현호색, 앵도육 가 아삼8g, 구인8g, 양총피4g

이렇게 씁니다. 5일 이내로 멎을 것 같은데요.^_^;

<김상인 원장 결과>

정원장님이 처방해 준 처방 아들에게 맥이고 3일 만에 기침 뚝~~~~~

정원장님 감사르.....

(정용재)

역류성 식도염으로 인한 해수는 위산의 역류로 기관지나 성대를 자극해서 생기는 기침이므로
가래가 없는 것이 특징입니다. 그리고 누우면 위산이 더 잘 역류하기 때문에 기침이 심해진다는
특징도 있구요. 기침이 오랫동안 낫지 않으면 일반적으로 역류성 식도염으로 인한 해수를
유발하지만 이 원장님은 묽은 가래가 많다는 점에서 먼저 기관지 치료부터 하는 게 좋지 않을까
생각되네요. 안됨 말고....==333

소음인 50대 여성환자, 긴 감모, 목쉼, 가래 피로 등의 증상을 소엽청열탕으로 경쾌시키다. 감
기에는 열증약을 현재 증상에 열이 있으면 한자에게 써도 된다. 다만, 증상이 호전되면 설사
함.

감기가 늘 오래 가고 목이 쉬고 기침 가래 피로 이런 고상한 사모님
처음에 곽향정기산으로 도움 받다가 만성으로 가서 향사양위탕--많은 도움주었다
명절 전에 며칠 엄청 힘들 걸 걱정하셔서 좀 더 한약을 달라고 하셔서 아래
소엽청열탕 드렸다

감기 초기 풍열범폐와 후기 폐경풍열증에..소음인 소엽청열탕
창출6 신이6 인진4 충위자4 계지4 생강4 반하4 소엽4 진피4 세신4 총백2 감초2

명절 후에 와서 하신 말씀 마지막 한약 드라마틱 하다!!!

안원장님 감사합니다~언제나 그랬듯이요

I like 소엽청열탕, 오가피청열탕 a lot!!

정용재

와, 새롭네요. 열증약이 잘 들어서 오가피청열탕을 선택해 보셨다고 하셨는데, 여긴 왜 한증약
이신가요? 황기청열탕이 아니고... 혹 이유라도..

윤승일

ㅋ 모르겠어요 오가피청열탕은 여러 번 모두 드라마틱였고요 한열구별 안했구요, 소엽은 한증 이시라 썼던 거 뿐이고 난 잘 모를 뿐이고 환자가 좋다고 하고~

안준철

감기에는 열증약을 한증에 써도 됩니다. 왜냐하면 현재의 증상이 열이므로 한증에게도 몇일은 쓸 수가 있습니다. 그러나 외감이 다 풀릴 시점에서는 한증인 사람은 설사를 하게 됩니다. 한증인 환자가 열증약을 먹고 설사가 나기 시작하면 감기가 다 나았다는 표시가 됩니다. 한증으로 의심되는 환자에게 열증약을 줄 때는 설사가 나면 감기가 확 낮게 된다고 말하고 주면 환자가 설사를 하고도 좋아합니다.

태음인기침에 갈근승기탕

갈근승기탕이 급만성해수에 잘 듣는다.

감기 후 기침이 그치지 않는 것은 풍열범폐증에 해당

사시상한 후기의 풍열범폐증에 해당합니다. 류삼 처방중에 방풍청열탕에 과루인1돈 을 가해서 씁니다.

태음인한증의 기침에는 한다열소탕이 좋고, 끈적거리는 가래 기침이 심하면 백과초를 3돈까지 사용. 만성허로성기침은 녹용대보탕

기본적으로 태음인 한증의 기침에는 한다열소탕이 잘 듣습니다. 가래가 많거나 자지러지는 기침 또는 숨이 차고 끈적한 가래가 문제가 되면 백과(은행)초해서 3돈까지 씁니다. 그래도 안되는 만성적 허로성 기침은 녹용이 3돈 들어가는 녹용대보탕을 씁니다.

소양인 감기후 오래된 기침에도 지황백호탕이 잘 듣는다.

과식 후에 가스차는 증상은 없다고 해서 열증으로 보고 양격산화탕에 석고 치자 빼고 연교 인동등 2돈반으로 올리고, 전호 과루인 황련 현삼 4g 가미해서, 20첩 100cc 45팩 썼는데요 기침에 별무효과라고 하시네요. 변만 약간 무르게 나오고, 소화 수면 대소변은 달라진 게 없습니다. 피로감은 여전하고요. 그래서 20첩으로 보름치 뽑아서 그런지, 다른 처방을 써야 할지 궁금합니다. 가르침 부탁드립니다.

(안)

감기후에 오래된 기침도 지황백호탕이 잘 듣습니다. 요즘같은 계절에 40-50첩 다려놓으면 몇일이면 다 없어집니다.원래 열증약이지만 한열에 관계없이 지황백호탕을 쓸 수 있습니다.

임신상태에서 태음인열증 감기약

5개월. 사시상한의 가감갈근해기탕 쓰려고 하는데 개안을까요.

(안)

창이자가 소독한 약입니다. 3개월까지는 쓰지 마시고요, 5개월이면 개안겠습니다.

가래 기침 천식 기관지확장증 아주머니, 열증으로 보고 갈근조위탕, 갈근조위탕은 내상약이니 외감과 관계있는 열다한소탕에 행인 상백피 백과초 마황 대황 혹은 갈근승기탕 등을 응용한다. 열이 위로 확 오르는 것은 신음허증으로 외감과 무관.

64세

#. 주소증 : 1. 기침, 가래 (현재는 미끌미끌하고 잘 뱉어지는 가래), 천식, 기관지확장증

* 작년 7월에 자궁에 혹 제거 수술 후 감기에 걸렸는데 그 때 이후로 발생한 증상

2. 부종 - 아침에 일어나면 얼굴 눈 부종

태음인인 듯 보이며, 한열이 조금 애매한데 열증으로 봐야할지요?

[안준철] 태음인이 확실합니다. 17:09

[김상인] 감사드립니다. 이제 한열의 문제가 남았습니다. 일단 열증으로 보고 치료해 보겠습니다. 18:17

갈근조위탕 원방 3일분 처방했습니다.

주소증 식욕 소화 대변 소화 약 드시기 전이랑 같습니다.

수면증 불면증이 심했는데 이제 자꾸 졸리는 느낌은 나는데 막상 자려고 하면 잠은 들지 않는다고 합니다. 부종은 아침에 조금 줄어든 느낌이다.

약을 드시고 아침 `저녁으로 머리가 아프고 무거웠다고 하시며,

가래가 잘 뱉아 졌는데, 가슴에서 가래가 딱 달라붙어서 떨어지지 않고 뱉어내려고 용을 써도 뱉어지지도 않고 가슴이 답답해서 굉장히 힘들었다고합니다.

약 드시는 첫 날은 기침도 밤에 잠을 못 이룰 정도로 기침이 심해졌는데 어제와 오늘은 괜찮았다고 하시네요. 일단 체질은 맞는 듯 합니다.

이 분의 경우는 한열이 굉장히 애매한데요, 한열을 바꾸어서 약을 쓴 것일까요?

한열을 다시 판별하려고 다시 물어봤습니다.

커피 먹고 잠안온적 한번도 없냐? ----- 없는듯 하다. 커피 오전에만 먹지 오후에는 먹지 않는다. 변비 과거력 없냐? ----- 임신 때 딱 1번 있고, 그 이후에는 하루에 1~2번씩 본다. 한열이 아니면 무엇이 문제일까요?

濕痰인데 오미자 맥문동 등으로 수렴해서 생기는 문제일까요?

치료 경험 있으신 분들 고견부탁드립니다.

감사합니다.

(안준철) 갈근조위탕은 내상약입니다. 기침에는 외감과 관련있는 열다한소탕에 행인 상백피 백과초 마황 대황 등을 응용합니다.

(김상인)

열다한소탕 + 행인 상백피 마황 대황 4 백과(초) 8g 3일분 처방했습니다.

기침이 더 심해져서 밤에 잠을 이룰 수가 없을 정도라고 합니다.

가래는 비슷하고 숨찬 것과 얼굴 붓는 것은 약간 나은듯한 기분이라고 합니다.

약 먹고 머리가 아프고 무겁다고 하며 소변은 낮에 1~2번 정도 봤었는데 3~4회 정도로 늘었다고 하고, 식욕 ` 소화 ` 대변 ` 수면은 약 먹기 전이랑 똑같고,

약을 먹으니 목이 쎼~ 하고 아프다고 합니다.

기침약을 썼는데 기침이 더 심해진 것을 명현이라고 봐야할까요?

숨찬 것과 얼굴 부종은 약간 좋아진 듯한 느낌도 있으니....아니면 한열이 바뀌었을까요?

일단 체질은 맞는 것 같습니다만...고견부탁드립니다.

[김상인] 이 분 속이 굉장히 딱 막힌듯 한데....식적해수라던지 그런 가능성은 없을까요?

[안준철] 명현현상은 존재하지 않습니다. 역대로 명현현상이란 약물의 부적합반응입니다. 사상 의학에서는 명현현상을 인정하지 않습니다. 이분은 갈근승기탕을 먼저 써보는 것이 좋겠습니다. 12:12

갈근승기탕 + 나복자 4g (3일분)

기침 ` 가래 ` 부종 ` 수면은 약간 호전되었습니다.

약 먹고 배가 살살 아프고 대변 횟수가 늘어났다고 하는데

그것은 갈근승기탕에 대황이 8g으로 많이 들어간 듯하여

평소 대변상태를 볼 때 2g 정도로 조정하면 될 듯 합니다.

지금 약 먹고 문제가 되는 것은 머리가 아프고 무거운 증상이 없었는데 약 먹고 증상이 생긴 것하고, 이번 약은 먹고 하루에 3~4회 열이 확~ 오르면서 땀이 확 났다가 열이 내린다고 합니다. 약 먹고 더 피곤하다고 하고...

어떤 약물 때문에 발생하는 것인지 궁금합니다.

자궁 수술을 해서 호르몬 대사에 문제가 있기는 합니다만 약 먹기 전에는 없던 증상인데

약 먹고 생겼다고 하니 저어 합니다. 이것도 대황의 문제인지.....

고견 부탁드립니다. 감사합니다.

(안)

열이 오르면서 땀이 나는 증상은 신음허약을 써야됩니다. 기침약과 무관한 증상입니다. 갈근승기탕은 원래 설사가 날 수 있습니다. 설사가 나면 열이 빠지는 증상입니다. 좋은 반응이라고 미리 환자에게 말했으면 컴플레인도 없습니다. 갈근승기탕을 몇일 더 쓰면 좋겠습니다.

태양인이 야간에만 마른기침할 때 오가피쌍해산 가 구인2돈, 백강잠1돈. 구인은 자음하고 지해하며 백강잠은 거풍하고 피부를 열어준다.

후세방으로 치면 야수증 (육미 가 천문동 패모 굴홍 1 지모 황백 0.3~0.7) 쓰는 증상....
폐음허로 보고 치료를 하면 될까요? 태양인이 제 아들놈이 선생님들 덕분에 피부 증상은 끝이 났는데 밤에 자다가 마른 기침을 쿨럭쿨럭 합니다. 낮에는 기침이 없습니다.

고건 부탁드립니다.

(안) 오가피쌍해산에 구인2돈 백강잠1돈 정도 가해서 써보면 좋겠습니다. 구인은 자음하고 지해작용이 있습니다. 백강잠은 거풍하고 피부를 열어줍니다.

감기가 계속되는 환자에게 태음조위탕가 갈근 승마 녹용 혹은 자완청열탕

주소증 감기 빈발.

태음한증으로, 계속 반복되는 오한, 발열, 신통, 해수 가래가 주소증입니다.(3년전부터 감기가 빈발하였음.) 그동안의 치료 내역은,

5월 12일 전신 부기, 현훈, 흉번으로 조위승청탕,

5월27일 감기 빈발, 우측 상하지통으로 조위승청탕가미.(기본을 조위승청탕으로 보았음.)

6월26일 현훈, 생목오름,수지절통으로 태음조위탕가미.(흉번 증상 없었음)

7월30일 해수 가래 부기 수지절통으로 한다열소탕가미.(감기증상이 너무 뚜렷하여)

오늘 내원하여 약 복용 중 감기로 오한 발열 신통이 심하다고 오셨습니다.

그동안 약을 드시면서 주소증은 어느 정도 잡힙니다만, 감기가 계속 발생합니다.

현증만을 본다면 한다열소탕이 기본이 될 것 같은데요.

3년간이나 반복 재발하였다니, 외감약인 한다열소탕을 계속쓰기가 부담스럽습니다.

처방에 대한 조언 부탁드립니다.

안준철

감기가 지속적이고 반복적이면 녹용을 태음조위탕에 갈근 승마 등의 청열약과 함께 쓰시면 좋겠습니다. 감기가 끝없이 재발되고 달고 사는 경우는 유주열 선생님의 폐경풍열약인 자완청열탕이 좋습니다. 기관지 피부 인후 등 폐와 관련된 부분이 동시에 좋아집니다.

(학생)

네, 태음조위탕으로도 별효를 못 본 것 같아, 자완청열탕으로 용약하겠습니다.

감기후의 가래기침, 길경죽여탕같은 담증처방이 가능할까요?--> 풍열범폐증에 해당되는 갈근 청열탕, 백부근청열탕, 자완청열탕이 적당.

최근 케이스 두경우입니다. 두분다 태음인 열증이시구요.

1. 45세 여성

3일전 감기 끝 무렵의 잔기침으로 왔습니다. 가래 많진 않지만 있고(흰색), 식은땀 많이 나고요. 이분은 양약복용 후 열과 몸살기는 없어지시고 나서 내원했습니다.

처방 : 갈근승기탕 2일분

경과 : 갈근승기탕을 먹으면 속이 메스껍고, 미식거린다. 하루치 먹고 설사는 했다. 말할 때 잔 기침 여전하다.가래 여전하다. <이분은 비염에 갈조가감해서 효과를 많이 보신 분입니다.>

2. 57세 여성

1주일전 초기 감기(인통,몸살)에 내원하셨습니다.

처방 ; 갈근승기탕 3일분

경과 : 인통, 몸살은 호전. 야간해수 생기고 심함. 통화시 목소리가 중탁해지고, 가래끓는 소리. 가래는 잘 뺏어짐

<이분은 항상 같은 패턴인데, 항상 표증이 잡히고 나면, 심한 야간해수로 넘어가십니다.>

<작년초에도 증상이 같았는데, 갈근승기탕, 갈근청열탕, 녹용대조탕등을 한달반인가 썼는데, 그닥 무효한 적이 있었습니다.::>

<간음허처방, 신음허처방은 무난하게 복용하신 분입니다.>

요즘 이래저래 항생제나 해열제투여가 많아지니, 표증의 집중도 어려워지는 것 같습니다.

두 분 다 길경죽여탕에 가감해서 처방하는 것을 1차로 생각합니다.

감기후의 가래기침.. 담증처방이 가능할까요? 양폐탕은 자유효하는 쪽으로 보고, 일단 제껴두었습니다. 한증은 한다열소면 열추 다 되는 것 같은데, 열자인 분들은 케이스가 많으니, 변증도 어렵습니다. 경험많으신 원장님들 조언도 적극 기다립니다. 감사합니다~

안준철

길경죽여탕 등은 어지럽고 메스꺼우면 심계가 생기도 소화가 잘 되지 않는 증상에 쓰입니다. 즉 이진탕과 같이 전형적인 담증에 쓰입니다. 상기의 경우는 풍열범폐증에 쓰이는 갈근청열탕 인나 백부근청열탕 자완청열탕 등이 적합해 보입니다.

태양인열증 감기로 1-2 주 이상 된 기침 가래 노인에게는 풍열범폐증의 오가피청열탕이 적당하다.

70세 남자, 몸져 누웠고 피로하고 기침(가끔 발작적) 가래 끈적
맥은 실하고 이런 경우에 오가피쌍해산 위주로 가는지요?
아니면 오장변증이나 육경변증으로 더 좋게 할 수 있는 방법이나 처방을 가르쳐주시면
감사하겠습니다. 궁금하네요

안준철

풍열범폐증으로 봐집니다. 오가피청열탕이 좋겠습니다. 이런 경우 육경변증이나 오장변증을
쓰지 않고 사시상한변증을 이용합니다.

감기와 관련한 갈근승기탕에 관한 글모음. 중요!!(태음인의 갈근조위탕, 소양인 지황백호탕, 소
음인 팔물군자탕)

태음인 감기 환자의 제일 중요한 처방 (누누히 강조를 많이 하셨죠..^^)
오늘도 다시 한 번 강조하셨는데 한줄메모장에 있어서 원포인트 레슨방으로 옮기는 겸해서
'갈근승기탕'에 대해서 임상례 올리신 분들 글 대충 모아봤습니다.
태음인 감기에 갈근승기탕이 중요하고 효과 굉장히 좋다는 것 기억 하시고 밑에 내용은 그냥
참고로 보세요.

(그래서 그런지 치험례로 많은 편이네요..^^)

■ 葛根承氣湯

☐- 갈근 16g 대황 황금 8g 길경 백지 승마 4g

☐- 通便, 攻下泄熱

☐- 태음인 열자의 大腸府證, 膀胱蓄血, 陽明府證, 少陰兼陽明證, 氣分證, 熱結氣分
內入胃腸(大腸秘結),

☐☐☐大腸實熱證

☐- 大腸府證, 膀胱蓄血 加 蒲黃

■ 안준철 [한줄 메모장] 10-3-31

태음인 감기의 경우 갈근승기탕이 확실히 잘 듣습니다.

한자 열자 모두 쓸 수 있습니다.한자는 설사를 하면서 좋아집니다.

열자도 마지막에는 설사를 좀 합니다.

설사가 나면 치료가 끝났다는 신호입니다. 특히 열이 있는 경우에는 더 그렇습니다.

소양인의 경우도 마찬가지네요. 지황백호탕이 대단히 신속합니다.

소양인의 풍열범폐증에 쓰이는 은교청열탕 등도 좋지만 요즘 금은화가 6만원이 넘습니다.

그리고 품귀현상이라네요. 천문동 홍화도 물량이 모자란다고 합니다. 참고하시기 바랍니다.

■ 감기

감기 급증의 경우에는 한열불문하고 갈근승기탕을 쓴다.

몸살 오한 발열 두통 비색 후비루 가래 기침 등의 증상에도....

한증인 경우에도 實邪가 있으면 쓸 수 있다. 설사가 나면 치료가 끝난 것이다.

초기의 오한에도 (갈근해기탕 가감방보다는) 갈근승기탕이 낫다.

갈근승기탕으로 몸이 따뜻해진다. 가래 기침 콧물 모두 해결.

심지어 천식환자의 경우, 천명음도 사라진다.

갈근승기탕에 승마 백지 갈근 등이 있어서 처음부터 피부를 열어서 표사를 다스릴 수 있는 것 같다.

태음인은 오한 발열 신통단계에서 인후통 가래 기침 등으로 까지 병이 진행된 경우까지 한열 불문하고 모두 갈근승기탕으로 해결됨.

하지만 소양인의 경우에는 오한이 있을 경우에는 (한열불문하고) 패독산을 먼저 쓰고

오한이 사라지고 나면 한열불문하고 지황백호탕을 쓴다.

오한이 있을 때 지황백호탕을 쓰면 표한이 있는 상태에서 리열을 제거해서

중기의 下陷을 가져와 감기가 더 오래 가는 것이다.

고열이 나는 어린이들이 원인불명으로 열이 나는 경우가 많다. 이럴 경우에 갈근승기탕을 사용함. 갈근승기탕은 외감약, 따라서 대변이 정상인 사람에게 쓰는 것이다. 열이 대단히 빨리 떨어짐. 설사를 하기 시작하면 그때부터 열이 다 떨어진 것으로 보면 된다.

열이 떨어지면 약을 중단하고 조리하는 방향으로 약을 쓴다.

* 갈근승기탕. 중초를 고려해서 나복자를 넣으면 더 좋다.

특히 기침에 좋다. 병이 있으면 많이 먹어도 설사를 안 한다.

감기로 인한 가래 기침 인후통 또는 한열감등.

갈근승기탕을 1-2일 쓰고 갈근조위탕에 녹용을 쓰는 것이 좋다.

외감이 완전히 정리됐으면 바로 갈근조위탕으로 가면 된다.

* 태음인 소양인의 감기 <http://cafe.daum.net/an4sang/AK2v/50>

태음인 열증에 갈근승기탕이 너무나 신속하고 탁효가 있어서 한증에도 응용을 해보았습니다.

결과는 열증과 마찬가지로 신속히 콧물 기침 오한 인후통 등이 신속히 해결되었습니다.

소증은 寒이지만 현증이 熱이라서 설사나 소화장애 같은 부작용이 전혀 없었습니다.

너무나 놀라운 사실이고요.

급증에는 현증을 우선 다스리고 소증을 나중에 다스린다는 원칙을 재삼 확인하게 되었습니다.

■ 정용재 09.10.30 17:55

갈근승기탕은 정말 발표약인가 봅니다.

인통이 있고 첨엔 근육통이 있다가 지금은 피부가 아프다고 해서

한사가 피모에 있으니 말그대로 마황발표탕을 써야하나 잠시 고민하다가 승기탕을 드렸는데 (어제), 머리가 흠뻑 젖을 정도로 땀이 많이 나면서 감기가 많이 좋아졌습니다.(태음인 열자, 1

회/4일 통변) 정말 신기하네요.^^;

■ 변재석 09.10.31 12:40

갈승, 정말 좋은 약이죠. 이 처방 써서 2-3일 내로 안 낮은 감기가 없어요.

며칠 전에도 옆집 6세 여아 기침감기를 몇 달씩 하던 것,

갈승 6봉지 주고 하루에 2봉지 먹이라고 했는데 엄마 말씀이 한 봉지 먹일 때마다 기침이 줄더니 4봉지 만에 끝나 버리더라고...

■ 태음인 열증 콧물 코막힘에 대한 약반응

김봉찬 08.05.10 16:03

저는 태음인 열증으로 비염이 있습니다.

몸이 힘들면 하얀 콧물이 나오고 심하지 않으면 10시정도까지 잠시 안좋으면 점심때까지 있다가 없어집니다. 술먹은 다음날이나 감기 뒤편에는 며칠씩 하루종일 안좋기도 합니다.

안선생님이 가르쳐주신 갈근조위탕 가 비파엽 포공영 백부근 승마 마황 1돈을 먹고 나면 상당히 빨리 호전되는 것을 느낄 수 있었습니다.

이번에 감기가 아주 심하게 오면서 노란 콧물과 코막힘 인통 두중통 미오한 등이 있었습니다. 갈근승기탕을 먹었습니다. 1봉지를 먹어도 별 반응이 없길래 10분뒤 1봉지 더 먹었습니다. 조금 덜한 느낌입니다. 2시간뒤 증상이 다시 원래대로 돌아가는 듯 해서 또 먹었습니다.

바로 약간 덜해지는 느낌이 있었습니다.

이런 식으로 하루에 5-6봉지를 먹으니 이틀정도만에 많이 편해지긴 했지만 코감기가 심하고 컨디션이 아주 안좋았습니다.

3일째에 갈근승기탕을 점심식사후에 다시 2봉지를 연복했더니 배가 불편해지면서 오히려 몸이 안좋아지는 듯 했습니다.

감기급증은 다 좋아져서 그런가보다 해서 저녁약부터는 갈근조위탕 비염약을 먹었습니다.

다음날 아침에 도로 더 안좋아졌습니다.

몸도 더 힘들고 코도 더 막히고 콧물도 노래지고 해서 다시 갈근승기탕을 먹었습니다.

이번에는 식후 1봉지씩 먹었는데 약간 불편한 느낌이 있다가 배변 욕구를 느끼고 대변을 보통 변으로 보고 나면 몸이 더 편해지는 것을 느끼면서 코도 좋아졌습니다.

그런 식으로 2일을 갈근승기탕을 더 먹고나니 80프로 이상 좋아진 것 같은데 코는 좀 남아있으면서 깨끗하지는 않은 상태입니다.

하지만 아직 설사를 하지 않았으므로 계속 갈근승기탕을 복용할 생각입니다.

느끼는 증상이 콧물 코막힘이 동일하다 하더라도

감기에서 시작된 경우는 갈근승기탕을 거의 마무리될때까지 복용해야지 좋아지는 것 같습니다. 중간에 갈근승기탕 연복후 불편했던 것은 대변을 못봐서 그랬던 것 같습니다

■ 갈근승기탕(갈근조위탕) 복용기...

전창환

제가 술을 좋아해서 장이 맛이 가서 그런지 아니면 대항에 대한 감수성이 좀 높아서 그런지 갈근조위탕도 그렇고 갈근승기탕도 그렇고 좀 예민하게 반응하는 편입니다

평소 변비가 약간 있는데 갈근조위탕 한 돈짜리를 먹으면 좋다가 약간 설사를 하다가 배가 좀 아프다가 그렇습니다. 그래서 3그램 넣은 걸로 먹곤 하는데요...

이것도 장의 상태에 따라 다른지 어떤 때는 한 돈짜리 먹어도 아무런 변화가 없을 때도 있습니다. 작년 가을부터 감기가 올 때마다 갈근승기탕을 먹어보는데요...

처음에는 두 봉지 먹고 배가 아파서 중단했습니다

좀 더 먹어봤어야하는데 배가 아프고 쓰르륵거리니 힘이 빠져서 중단을 했고요...

겨울에 다시 감기가 왔는데 이번에는 열이 높은 감기였습니다

그 때는 5봉지를 먹으니 비로소 설사가 나더군요. 그리고 감기 증상도 개선이 되었습니다

아하, 이게 열이 어떤가에 따라서, 또 내 몸의 상태에 따라서 상대적으로 반응을 하는구나 싶더군요. 그리고 이번 주...맑은 콧물 감기에 약간의 미열... 열 재보니 37.4도였습니다

월요일 낮부터 갈근승기탕을 먹기 시작했습니다. 화요일인 어제 오후까지...

어제 오후에 바빠서 점심 먹고 약을 먹는다는 걸 거의 6시가 다 돼서야 먹었는데요...

오후부터 콧물은 많이 줄더군요. 그리고 6시 저녁 먹기 전 빈속에 먹으니 속이 좀 아리더군요...사지에 힘이 쭉 빠지는 느낌...

그리고 두 시간 뒤... 설사를...자기 전에 또 한 번...

그래서 자기 전에 한 봉 더 먹고 자려고 했는데 안 먹었습니다

오늘 아침...더 이상 콧물은 안 나고 코가 약간 불편한 상태. 온몸이 찌뿌둥한, 약간 덜 나은 상태입니다. 한 80-90%정도 호전된 상태라고 할까요?(총 네팩 먹었네요...)

결론은요...변비여부가 대항의 증량에 가장 중요하지만

그 사람의 평소 섭생(술이나 음식등)으로 인해 대장의 민감도 여부가 그때그때 대항에 대한 반응에 영향이 있는 듯 하고요...

감기의 경우 아무래도 발열 상황에 비례해서 갈근승기탕의 복약 팩수가 증가하는 거 같습니다. 그리고 콧물 감기, 열감기, 기침 감기 모두 갈근승기탕이 유효했습니다.

■ <안준철> 09.09.21

전남 무안에 사는 환자가 전화를 해서 감기약을 2제를 부쳐달라고 하네요.

가족 4명이 모두 태음인인데 작년 겨울에는 갈근승기탕으로 겨울을 잘났는데...

올해는 지금부터 2제면 충분하지 않을까 싶다고 하네요.

갈근승기탕이 초기 중기 말기 감기 모두에 잘 듣는다고 합니다.

(설사가 나면 완치랍니다. 참 잘도 압니다.ㅋ) 이웃과 함께 먹어도 잘 듣는답니다.

이웃 사람도 태음인인가 봅니다. 감기만 한의원으로 와줘도 좋겠습니다.

신종 플루도 갈근승기탕으로 승산이 있지않을까요? 해열이 너무 잘되니

↳ 윤승일 09.09.21 18:59

저도 갈근승기탕 배운대로 많이 써보는데요 대부분 다 잘 해결되더라고요. 감사합니다

■ 정용재 09-11-02 [한줄메모장]

평소 늘 감기로 내원하던 태음인 열자 7세 남아인데, 엿그제 감기기가 있어 갈근승기탕 1일분 줬더니 다음날 설사하면서 감기가 많이 호전되었다고 합니다.

내원 당일 타미플루를 처방받아 복용을 같이 했는데, 오늘 검사결과 플루양성이 나왔네요.

저는 갈근승기탕의 효과라 굳건히 믿고싶습니다만...^^;

신증플루도 사상 감기처방에 준해서 치료하면 너무 잘될것 같습니다.

요즘 신증플루 한의원이 이라는데, 광고라도 좀 해야할까봐요.

↳ 안준철 16:08

온병도 정의가 여러가지입니다만 결론적으로 말하면 윙기는 전염성 질환은 모두 온병에 해당합니다. 이번 신증 플루 역시 온병에 속하게 됩니다. 동무공의 시대는 구한말 나라는 망해가고 역질이 창궐하던 시기였습니다. 수세보원 전체가 온병 또는 역질과의 싸움이라고 할 수 있습니다. 그래서 갈근승기탕은 전염성 질환에 탁월하리라 여겨집니다.

이번 기회가 우리들이 솜씨를 보여줄 때가 아닌가 싶습니다. 수세보원 처방으로..

■ 중이염 열증

갈근승기탕을 2-3일 먼저 쓰고 (열다한소탕보다) 갈근조위탕에 가미하는 것이 좋다.

진물이 많으면 마황을 증량하고 대변을 매일 못 보면 대황을 증량한다.

치료되고 나서 일년에 4번 환절기 때마다 3년간 약 먹으라고 지도한다.

■ 태음인의 중이염

글쓴이: 안준철 <http://cafe.daum.net/an4sang/AK2v/24>

태음인 열증이고 평소에 갈근조위탕에 가미해서 철마다 녹용을 지어드시던 50대의 아줌마인데.....감기만 걸리면 중이염으로 악화되서 귀가 잘 안들리고 먹먹하고 심하면 농도 나오는 환자인데 갈근승기탕 2일먹고 귀도 잘들리고 가래 기침 오한도 같이 좋아졌습니다.

그런데 감기증상이 좋아진 건 말도 하지않고 귀가 좋아진 걸 엄청 좋아하시네요.

그동안 이비인후과에서 항생제를 아무리 먹어도 귀가 잘 안들렸는데 한약 감기약으로 귀가 좋아지다니.....환자가 의아해하면서 갈근승기탕 5일치를 더지어 갔습니다.

열다한소탕이나 갈근조위탕에 가미해서 마무리 해야될 것 같습니다.

(이때 비염에 준해서 처방합니다. 그러나 시간은 더 많이 걸립니다.)

한약이 원래 양약보다 잘 듣는 것인데.... 잘 쓸 줄 몰라서.....

■ [한줄게시판] 김봉찬 08.10.20 15:03

고3 남학생이 태음인같은데 열나고 토하고 복부압통이 심해서 갈근승기탕 3일치를 줬더니 열도 안나고 대변도 시원하게 보고 좋아졌습니다.

그런데 다음날 스트레스를 조금 받았더니 바로 토하고 더부룩하다고 해서

간기범위에 쓰는 갈근화위탕 3봉지 주고

다음날 나오라고 했는데 안와서 전화해보니 하나도 안아프고 밥도 잘먹는다고 안옵니다.

상태보고 한제 지어줄렀더니 짹... 약이 너무 좋은가 봅니다

■ 갈근조위탕과 갈근승기탕과의 비교

진짜 변비가 있을 때는 갈근승기탕(감기에 걸려서 열로 인해서 대변을 못보는 급증에 쓴다)을 쓴다고 알려져 있는데, 급증에만 쓰고 일반변비에는 거의 듣지 않는다.

감기로 인한 고열과 변비에 쓰면 변비는 안 풀리고 고열만 바로 떨어졌던 사례도 있었다.

열이 떨어지고 나면 설사를 하는데, 설사를 하면 약을 중단해야할 시점이다.

갈근승기탕. 열이 날 때는 이것을 써도 설사가 안 나고 열이 내리고 나면 설사가 난다.

이때는 약을 중단해야 한다. 외감약이기 때문이다.
열이 있을 때 대항을 쓰면 열만 내리고 사하작용은 못한다.

■ 열증의 두드리기

두드리기는 비위의 병이다. 갈근조위탕에 승마 1돈만 가해서 써도 충분하다.
급증에는 갈근승기탕을 준비해 두었다가 증상이 있을 때마다 급하게 복용하는 것도 좋은 방법이다. 갈근승기탕도 위열을 사하는 처방이다.

■ 태음인 아토피 환자에 관한 질문과 대답

태음인 아토피에 열을 내리기 위해 갈근승기탕을 먼저 쓰는 경우도 있다(질문원장).
아토피 환자에게 갈근승기탕을 5일분 투여했는데 피부가 더 심해지는 경우가 있더라는 질문에 대해

→ “리열이 확실하지 않는 상태에서 승기탕을 쓰면 중기가 하함됩니다.
그러면 병이 교착상태에 빠져 회복될 기회를 잃어버립니다”

■ 열증의 여드름

<http://cafe.daum.net/an4sang/4GIU/134>

여드름의 색이 붉습니다. 붉으면 열증입니다.

갈근조위탕에는 온보하는 약물이 많다. (오미자 길경 맥문동 행인 모두 온보하는 약물이다).
온보하는 약을 쓰면서 열이 제거되기를 기대하면 안 된다.

갈근승기탕으로 먼저 사하한다.

(원방으로.....나복자는 쓰지 않는다. 나복자가 없는 경우가 열을 제거하는데 더 효율적이고
가래가 많아서 거담해야 할 경우에는 나복자를 가하는 것이 좋다.

나복자는 원래 강기거담하고 소식하는 약이다.

이는 표본완급과 관련된 것으로서 급하면 표를 다스리고 급증이 해소되고 나면 근본을 다스려야 한다는 의미이다). 그 다음에 열다한소탕으로 조리하고, 마지막으로 갈근조위탕으로 정리한다. 설사가 나더라도 물려서면 안 된다. 열증이면 설사가 나야 확 좋아진다.

■ 갈근승기탕은 태음인 변비에는 듣지 않는다.

태음인 열증이 확실합니다. 갈근승기탕은 외감약입니다.

감기에 쓰면 해열이 빨리되고 콧물 가래 기침 인후증상 등이 신속히 해결됩니다.

(감기에 갈근승기탕을 쓰면 설사가 전혀 나지 않습니다. 외감이 해결될 시점이 되면 약간씩 변이 묽어지기 시작합니다.

설사가 나면 감기가 다 나았다고 생각하면 됩니다.)

* 한 가지만 더 말씀드리면요, 갈근승기탕도 변비에 잘 안 씁니다.

고본이 빠지고 대항이 들어간 약인데 변비에 안 들어요.

제가 무척 많이 써봤는데 한 번도 성공한 적이 없어요.

그런데 변비가 전혀 없는 상황에서는 재미를 좀 봤거든요.

감기로 인한 고열이 날 때 대항을 2돈 넣어쓰니까 설사도 안 나면서 열이 푹 떨어지더라구요.

그런 식으로 해결한 예가 많아요.

특히 어린이들 경기가 나고 고열이 되서 문제가 되고 그럴 때.

고열이 날 때는 대항을 아무리 써도 설사가 안나거든요.

열을 신속히 떨어뜨렸을 뿐이라는 거죠.

변비가 있을 때는 갈근승기탕이 아니라 갈근조위탕에 대항을 증량해서 써야합니다.

■ 한줄메모장

지황백호탕 역시 소양인의 외감약입니다. 효능은 갈근승기탕과 같습니다. 전혀 변비에 듣지 않습니다.

팔물군자탕 역시 갈근승기탕이나 지황백호탕과 주치와 효능이 같습니다. 외감약입니다.

소음인의 변비에는 하기하는 목향 지각이 위주가 됩니다.

당귀나 흑호마(검은깨)를 윤장할 목적으로 쓰기도 합니다. 18:06

■ 구안와사

<안준철> 태음인 열증으로 보여집니다.

구안와사 초기에는 갈근승기탕을 씁니다.

구안와사 초기에는 외감에 준해서 표증약을 2-3일 먼저 씁니다

■ 寒熱關聯(上氣 熱感 冷感, 汗出)

1. 한열(상기, 열감, 냉감)

소양인 발시린 환자. 57세. 신양허로 보고 토사자보양탕가 목단피 1.2g(소화곤란)

#. 주소증 - 足冷 (엄청 심함. 여름에도 이불을 덮어야 될 정도)

(몸이 무겁고 에어컨 바람이 추워서 싫다)

손 ` 발 ` 얼굴이 자주 붓는다.

이 분은 태음인 열자 같습니다.

변증은 寒濕 (후세방 오적산증) 으로 보입니다.

태음인 한습에는 태음조위탕이 기본방으로 되어 있던데 이 분은 태음인이라면 열자라서 이럴 경우에는 처방구성을 갈근조위탕에다가 태음조위탕지제를 넣어서 쓰야 할지요?

고견 부탁드립니다. 감사합니다.

[안준철] 소양인 한자로 보여집니다. 10.07.05 15:41

신양허로 보고 토사자보양탕 + 목단피 1.2g (소화 불량)했습니다. 15일분 먹고 30% 호전 되었다고 합니다. 밤에 이불을 덮고 자기는 자는데 전보다는 편하다고 합니다.

몸 무거운 것도 여전하고...(몸 무거운 것이 주소증이면 腎쪽으로 접근 보다 濕쪽으로 접근하는게 빠를 것 같습니다. ^^)

부소증으로 감기 뒤 끝에 냄새를 못 맡는다는 게 있었는데

하초 데우면 혹시 냄새 맡을 수 있을까 기대 했었는데 그건 그대로라고 하네요..

이번 약에는 추가해서 좀 더 넣어달라고....ㅋㅋ

(밤에 잠 잘안오고 자주 깬다고 하네요 그것도 살짝 더 넣어달라고..ㅎㅎ)

간단한 결과 보고였습니다.

손발시리고 열이 오르며 머리에서 소리가 나는 태음인 열자 할머니. 신음양양허증으로 보고 정심보음탕가 쇄양으로 호전. 잘 못 먹고 한열 속부대끼에 갈근조위탕거 오미자 가 승마4 산약 연자육 마황2로 호전시키다.

신음양양허증으로 보고 정심보음탕가 쇄양으로 손발시림. 머리의 소리 등 제반증상 좋아짐
기력이 떨어져서 병원에 갔다 온 후 밥을 못 먹고 온몸이 추워서 떨이고 열이 확 올랐다가는
땀이 훅 나면서 추워진다. 속도 부대끼고 아프고 다리의 경골부위가 너무 시리다.

정심보음탕가 쇄양 + 산조인초 승마 4그램 했으나 추운 것이 여전하고 입맛이 너무 없고 기운이 없다는 호소. 그래서 잘 못 먹어서 그런가보다 생각해서 갈조 가감방으로 진행

갈근조위탕(대황1그램) - 오미자(속 부대끼고 아프다 해서)

+ 승마4(거습 청열 지한), 산약 연자육(보비, 보신), 마황2(지한, 춥다고 해서 표의 한기를 살짝 날리려 함) 산조인초(지한)

이상의 처방으로 추운 것도 덜 하고, 입맛도 돌고 제반증상 호전됨

태양인 한자 음허화동에 신음허 처방인 원잠보음탕가 양강 한 돈으로 good

#. 증상

제가 예전에 "음허화동"증상이 강해서(관골홍조,수족번열,심계,안충혈 등..),,

현재는 그 정도는 아니지만, 체표번열감, 안충혈, 가끔씩 심계 등의 증상을 좀 가지고 있습니다. 겉으로는 열이 뜨는 상태라 잘 때에도 이불을 몸 절반만(좌나 우측만) 덮습니다.

다 덮으면 갑갑하고, 안 덮으면 춥고..(무슨 파충류 같이) 그래서 후세방의 "자음강화탕"을 흉내내고자 신음허약에 가미해서 먹었습니다.

신기허약이나 신양허약도 어느 정도 효과가 있습니다.

그런데 한증을 잡고자하면 열증상이 심해지고 열증을 잡고자 하면 한증상이..ㅠㅠ...

그래도 신기하게도 신증약을 먹으니 소화상태가 은근히 좋아집니다.

#. 처방

양강(고량강)...하나의 힘이 대단하네요. 태양인 한자이지만 최근 신음허약인 원잠보음탕을 먹

고 있는데요, 예전에 먹을 땐 먹다가 몸이 쳐져서 얼마 못 먹었는데, 양강 한 돈을 넣으니 약의 기운이 반전되는 느낌이 들 정도로 기가 위로 들리는 느낌이 듭니다.

비릿한 원방의 맛도 다 날려버리고요...혹시 태양인 한자에게 줄 처방이 좀 무겁게 느껴지면 양강을 5푼~7푼정도 가미하는 것도 좋을 거 같다는 생각이 듭니다. 주약으로 쓸 게 아니라면 한 돈은 약맛이 너무 맛이 싸아~해요.

#. 질문과 대답

- 한자에게 신음허약을 투약하신 연유는 무엇인지요?
- 한자도 음허증이 당연히 있을 수 있다고 생각합니다 아마도 그런 경우였나봅니다.
유주열 선생님이 이런 경우 당연히 있을 수 있다고 하시면서
그런 경우 '음허증 약에 한자쪽 약을 조금 첨가하면 된다.'고 하셨다고 안선생님께 들은
기억이 납니다.
그렇다면 아주 유주열 선생님의 관점에 충실하게 잘 쓰신 셈이네요

안준철 양강이 주로 비양을 돕지만 신양을 돕는 작용도 있습니다.

정용재 신기허나 신양허약들은 별로든가 보죠?

주야바뀐 과로, 상초발열감에 독활지황탕가 인동 연교 구판 별갑 각 한 돈, 황련 치자 시호 3푼으로 good

과거 두통에 독지가감으로 무난히 치유된 소양한증 여성. 모텔장사로 밤낮을 일하면서 피로누적. 오후 세시만 되면 상초 특히 목 앞쪽으로 발적, 발열감이 생김

독지가 인동 연교 구판 별갑 각 한 돈/황련 치자 시호 3푼(25첩 45팩)으로 깨끗이 없어졌다 함.

(안)

구판은 보음하는 작용이 더 크고 별갑은 잠양하는 작용이 더 강해서 열이 위로 뚫을 때 더 잘 가라앉혀주는 역할을 합니다.

33세. 태음인 열증 남성. 목어깨 결림 상열증 언어장애 기억력장애 등에 황금청심탕가 갈근승마, 상황보음탕가 원지 석창포를 쓰다.

- #. 주소증 - 1. 목 어깨 결림 통증 (가끔 우측 상지로 저림)
2. 상열증 (심장 위쪽으로 열이 굉장히 많다)
3. 언어 장애 (아침에는 괜찮으나 오후에 체력이 저하가 되면 발생)
4. 기억력 장애..

@ 기타 - 안구 건조증 (눈 뻑뻑), 두통, 어지러움, 가끔 심장 두근거림. 인후부 따끔거림.

** 이 분은 태음인 열증으로 보이며,

스트레스가 많고 상초에 열이 많고 심계 증상 겨드랑이에 땀이 많고 설적 무태 하고 언어장애가 있는 등을 심병증으로 변증을 해서 황금청심탕 처방해 볼까 생각중입니다. 고견 부탁드립니다. 감사합니다.

ps: 그런데 주소증이 목디스크 증상이라서 약간 저어합니다만.....

저번에도 비슷한 상황에 있는 아주머니 황금청심탕 써 봤는데 그닥 재미가.....

아마도 변증이 틀리지 않았나..싶기도 하고....

제 짧은 생각으로는 상초쪽에 열을 꺼주면 어깨 목 결림도 호전이 될 것 같아서

심장 계통의 약을 써 봤는데 별로 재미가 없었네요.

병인이 스트레스 ` 화병 계통이라면 들을만도 한데.....

이런 경우에는 치법 순서(용약법?)는 어떻게 되나요?

어깨 관절약을 먼저쓰는게 옳을까요 아니면 병인에 관한 치료를 먼저하는게 옳을까요?

병인에 관한 치료를 하면 낫는다고 배웠는데

예전에 후세방 쓸 때도 근골격계 질환에 병인으로 보고 처방해도 효과가 그닥...그래서...

여쭙어 봅니다. (물론 제가 실력이 없는 부분은 논외를 하고...--::)

항상 고민스러운 부분이라서 염치불구하고 여쭙어 봅니다.

<안준철> 태음인으로 보여집니다.

==> 황금청심탕 (대황은 1g) + 갈근 8 승마 4

주소증 증 상열증상에 해당하는 두통과 어지러운 증상은 50% 정도 호전되었다고 합니다.

그런데 언어장애 (긴장되거나 스트레스를 받거나 하면 입술 주위가 마비되는 느낌이 있으면서 말을 더듬게 됨)는 여전하다고 합니다.

이 분은 정말 직접 보면 상초쪽으로 열이 올라서 불다는 느낌을 확~~ 받습니다.

그리고 어깨와 목으로 끓는 피가 올라와 물리는 느낌이 든다고 하며,

가슴이 답답하고 어떤 경우에는 가만이 있어도 심장이 두근거리다고 호소하시네요.

지난번에는 심의 문제로 보고 황금청심탕을 처방해 봤는데요.

먼가 부족한 듯 하고 상초쪽의 열을 확~~ 꺼주고 싶은데요 ‘열다한소탕’ 어떨까요?

현재 대변은 하루에 1번 꼬박꼬박은 본다고 합니다만...

아니면 간쪽의 문제로 보고 청간탕 계열로 써 보는 것은 어떨런지요?

고민스럽습니다. 여러 선후배 원장님들의 고견 부탁드립니다.

<안준철> 언어장애는 거담해야됩니다. 원지 석창포를 꼭 써야 됩니다.

간신음허증 처방에 원지 석창포를 가합니다. 석창포가 더 중요합니다. 16:34

<김상인> 넵 감사합니다. 간신음허 처방에 원지 석창포 처방해보겠습니다.

근데 질문하나 드려도 될까요...

이 사람은 젊은데다가 체중이 100kg 가까이 나가는데 보음해도 될까요?...

오히려 거습열 거담해야 되지 않을까요?

선생님께서 간신음허 처방이라고 말씀하신 연유가 궁금합니다..^^ 17:19

<안준철> 당연히 습담을 제거해야됩니다.

원지 석창포가 습담을 제거하는 약입니다. (목소리가 안나오는건 담이 원인입니다.)

언어 장애 (아침에는 괜찮으나 오후에 체력이 저하가 되면 발생)==>음허가 아닐까요? 18:01

동의보감 성음문에 십전대보탕가 원지 석창포를 언어장애에 쓰는 예가 나옵니다.

<김상인> 네 잘알겠습니다. 간신음허 처방에 원지 석창포 가해서 처방해보겠습니다..정말 감사합니다..

== 상황보음탕 + 원지 석창포 3g

오늘(09-10-21) 내원하셨습니다. 언어장애 (긴장되거나 스트레스를 받거나 하면 입술 주위가 마비되는 느낌이 있으면서 말을 더듬게 됨)는 많이 호전 되셨다고 합니다.

예전에는 피곤하지 않아도 오후가 되면 언어장애와 입술 주위 마비감이 있었는데

요즘은 많이 피곤한 날만 발생한다고 합니다.

열이 오르는 것도 호전이 되었는데 여전히 오후가 되면 열이 오른다고 합니다.

지도해주신 선생님께 감사드립니다.

등에서만 열이 오른다는 44세 여성환자. 갈근조위탕가 승마4g으로 유효. 상열감에는 양명열을瀉하는 승마가 가장 중요하다.

#. 주소증 - 등(背)에서만 열이 확 오르면서 땀이 쭉 난다. (3-4개월전)

#. 계통 문진

@ 소화 - 과식하고 탈나는 경우는 거의 없다. 소화엔 문제 거의 없다.

@ 음식반응 - 커피 잘 안 마시다가 한 번 마시면 밤에 잠을 못 잔다.

@ 생리 - 근래에 들어서 2달에 1번. 생리통 없음.

@ 기타 - 가끔 이유없이 가슴이 두근거림

@ 피부 - 앓습니다.

** 돌출된 턱으로 봐서 음인인듯 보이며, 입이 마무리가 못된 것 같아서 태음인 열증으로 보이는데 어떻습니까? 이런 대소변 소화기 상태를 가진 사람이 만약에 소음인이라면 이런 경우 한열은 한증이겠죠? 고견 부탁드립니다. 감사드립니다.

[안준철] 태음인으로 보여집니다. 08.10.25 17:00

선생님으로부터 태음인으로 진단 받았습니다.

==> 갈근조위탕 (원방) + 승마 4g (3일분) 주었습니다.

약 먹고 눈이 팽해질 정도로 피곤하고, 대변을 보기 전에 배가 많이 아프고 변은 표시나게 더 가늘어졌다고 하며 안시원하다고 합니다. 그외 다르게 불편한 사항은 별로 없었다고 합니다.

대항량을 줄여야 할까요? 아니면 소양인으로 봐야할까요?

소양인으로 보이지는 않는데.....또 이런 상열감 증상에 가미해야 될 약제는 어떤 것이 있습

니까? 고진선처 부탁드립니다. 감사합니다.

[안준철] 태음인 열증이 맞는거 같습니다.

대황은 장염대황과 당고득대황을 써야됩니다. 장염대황은 옴니허브에서 구할수 있습니다.

상열감에는 물론 양명경의 열을 사하는 승마가 가장 중요합니다. 음허가 있으면 보음하는 약류를 써야겠습니다. 대황은 이 두 가지만 써야됩니다. 08.11.03 17:34

[08-11-11] 결과 보고 드립니다.

‘갈근조위탕 + 승마 4g’ 처방에서 대황을 2g 으로 줄여서 3일분 처방했습니다.

3일분 먹었는데 열이 오르는 횟수가 많이 줄었다고 합니다.

이렇게 좋을수가....^^;; 이번 임상례를 통해서 처방에 따른 대황의 양도 중요하다는 것을 느꼈습니다.

태음인 한자 노인이 손발시려한다. 혈이 부족하면 얇은 옷을 입은 것처럼 추위를 느낀다. 보혈하는 단삼(초)이나 상심자 상황을 가한다. 노인은 무조건 음혈을 보하는 약을 먼저 생각한다.

협착증으로 다리 당김 증상과 퇴행성관절염 증상도 있고 해서

==> 건울보양탕 + 곡기생 4g 전충 홍화 1.2g + 녹용 (아드님께서 러시아에서 근무하셔서 자체적으로 가져오신 러시아 녹용^^;;) 이렇게 처방해서 드셨습니다.

드시고 다리 당김과 무릎 증상은 조금 부드러워지셨다는데 오늘은 손발시림을 많이 호소하시네요..이럴 경우 더 첨가해줄 약은 없을런지요?

건울보양탕에 쇠양 4g 들어가 있던데 쇠양의 양을 조금 높이면 될까요?

(안)

혈은 우리의 몸을 감싸고 있는 보자기와 같습니다. 혈이 부족하면 겨울에 옷을 얇게 입은 것과 같습니다. 보혈하는 단삼(초)이나 상심자 상황 등을 가할 수 있습니다. 노인은 무조건 음혈을 보하는 약을 우선 생각합니다. 녹용을 충분히 쓰는 것도 방법이 되겠습니다.

태음인 열증. 상열 있으면서 종아리 시리고 쥐가 잘 난다. 수족냉증의 문제는 신음양양허증으로 접근, 쥐내리는 증상은 간혈허증,

작년에 남편 사업실패로 화병 걸려서 침구치료하여 화병은 어느 정도 좋아졌는데 손발이 차고 상열증상이 조금 남아 있어서 후세방 온경탕먹고 손발이 조금 따뜻해져서 올 봄에 다시 온경탕 췌는데 효험이 작년보다 덜했습니다. 다시 시호계지탕을 줘서 효과 좀 봤는데 완전히 낫지는 않아서 다시 내원했습니다. 보험모집인으로 많이 걸어서 그런지 종아리 쥐나는 거는 침치료를 개선됐는데 종아리 차고 발 시린 거는 반정도밖에 개선이 안 되네요. 종아리 살이 물렁살이고 멍이 잘 드네요. 처방 부탁드립니다.

(답)

(안준철) 수족냉증이 문제면 신음양 양허증으로 접근합니다. 쥐내리는 증상은 간혈허증 가능성

이 많습니다. 다른 증상과 함께 고려해봐 야됩니다. 갱년기 증상과 동반되는지 빈혈기가 있는지가 관건이 되겠습니다.

여성들, 수승화강이 안 되는 증상. 간비불화를 먼저 고려??

젊은 여성들이 주로 많이 호소하는 증상들 같습니다. 쉽게 말하자면 상열하한인데... 손발이 차고, 스트레스성 소화불량이 많고, 생리에 문제 있고, 얼굴에 여드름 등이 나고..... 후세방적으로 이런 증상에 처방을 써 봤지만 그렇게 잘 듣는 것 같지 않았습니다. 개인적으로는...이런 증상을 가진 분들은 나중에는 수승화강이 안되어 나이가 더 먹게 되면 결국 자궁의 문제(근종, 암...등등)와 갑상선의 문제를 가져 온다고 생각합니다. 일단 체질은 불문하고 변증론적으로 볼 때 어떻게 봐야 할까요? 일단 비위도 관계가 되고 간 `신도 관계가 되고...이런 것 같구요... 일단 비위를 먼저 고치는 것이 우선이겠지만, 이런 환자들은 비위에 관한 약을 써도 금방 호전 반응은 드문 듯 합니다.

(정용재)

간비불화의 전형적인 증상 같습니다. 일단 소화기문제를 해결해놓고 다음 문제를 풀어나가는 것이 좋을 듯.

하지냉증, 발시림 한증이면 신양허증, 열증이면 신음양양허증으로 약을 쓴다.

2. 汗出

수족소소한출긴장하면 손끝이 차가워진다. 심열로 보고 청심연자탕 투여. 1제 복용후 호전반응, 2제 복용후 5개월 지난 지금까지 재발 없음.

49세 태음인한증 남성(자한), 비위습열로 변증해서 두황익이인탕(갈근 증) 가 승마 청호 사상자 부소맥 4g으로 저효.

#. 주소증 - 자한

: 4~5년 전부터 발생했는데 최근에 옷담 2번 먹고 약간 더 심한 느낌.

: 뒷머리 앞머리 목 겨드랑이 사타구니 등 전체적으로 식은땀이 줄줄 흐름.

<안준철> 태음인이 확실합니다.

이 분은 비위습열로 나름 변증을 하였습니다. (태음인 한증)

== 두황의이인탕 (갈근 8g으로 증량) + 승마 청호 사상자 부소맥 4g

땀 나는데 기본이 갈근 승마라고 하여 갈근 증량 했고 승마 추가하였으며,
청호는 이 분이 평소에 술을 즐겨하시는 관계로 넣었으며, 사상자는 사타구니 땀 때문에..
부소맥은 김봉찬 원장님 다한증 임상례 케이스에서 힌트를 얻었습니다.

15일 복용 후 환자분이 굉장히 만족할 수준으로 땀이 줄었습니다.
사타구니의 땀은 거의 없어졌고, 땀을 흘려도 후끈한 땀이 아니라 청량한 감이 든다고 합니다.
몸도 가벼워졌으며 뱃살도 약 먹고 빠졌다고 좋아합니다. 음식의 주의할 것을 티칭하였습니다.
(특히 옷담, 삼계탕, 염소고기 등등)

**71세 태음인 한자 여성의 다한증. 폐기허로 간주하고 사삼보폐탕가 부소맥 마황근 4g으로 저
효**

#. 주소증 - 뒷머리에서 수시로 흘러내는 땀

신경 쓰거나 글씨 쓸 때와 밥을 먹고 나면 땀이 너무 많이 남.

(몇 년전부터 / 도한은 없습니다)

* 골다공증약 혈압약 갑상선기능항진증약 복용 중

** 이 분은 소양인 한증으로 보입니다.

만약 소양인이 맞다면

1. 방풍보폐탕 중용 방풍 가 모려분
2. 독활지황탕 + 지모염수초 황백염수초 영지를 생각하고 있습니다.

상체쪽에서만 땀이 많이 흐르는 것으로 봐서는 1번 처방이 좋을 듯 하고,
(땀 흘리고 나면 피곤하다고 하셨으면 별 고민 없이 1번 처방으로 갔을 텐데...)
연세를 고려하면 2번 처방이 더 나은 것도 같습니다. 맥은 촌맥보다 척맥이 더 강하게 뛰
는 것 같습니다. (안되면 1번 처방 해서 결과 보고 2번 결정할 수도....^^)
고견 부탁드립니다. 감사합니다.

<안준철>태음인이 확실해 보입니다. 09.09.11 14:29

==> 사삼보폐탕 + 마황근 부소맥 4g (15일분)

결과는 조금만 걸어도 목욕을 한 듯이 뒷머리에서 땀이 줄줄 흐르던 것이 거의 없어졌고
지금은 밥 먹을 때만 약간 머리 안쪽이 훈훈한 정도라고 합니다.

지도해 주신 선생님과 사삼보폐탕 결과 발표해주신 김봉찬 원장님께 감사드립니다..^^..

태음인인줄 볼 줄 몰라서 녹용 날라 간 것이 아쉽네요..환자분이 원하셨는데..ㅋㅋ.....
앞으로는 녹용으로....^^

다한증에 류샘처방을 쓸 때, 우선 폐기허를 고려해봐야겠습니다(열자라도..^.^;;)~ 신음허보다 더 많은 것 같네요. 감사합니다!!

소양인 수장 다한증에 독활지황탕가 지모 황백 염수초, 구판 고삼 차전자 각1돈 영지2돈 2제로 저효.

소양인 한증 C/C 수장한(손바닥만 땀이 줄줄~짓무른 느낌 손가락쪽 피부도 벗겨지네요 습열?) 25세 남한 고등학교 때도 좀 있었는데 제대 후 심해졌다네요 지금 거의 7개월째~
"" 독지+황백 지모 구판 고삼 차전자 1돈 "" 정도면 될지 문의드립니다

선생님 답: 다한증 쉽지 않습니다. 지모 황백은 신열에 쓰이고 구판은 신음을 돕습니다. 고삼 차전자는 습을 보고 쓰는 약입니다. 칠정의 문제를 고려해서 심간을 다스려야 되는 경우도 많습니다. 기타 증상과 원인을 함께 고려해서 처방을 선택해야 겠습니다

.....

독지+ 황백지모 구판 고삼 차전자1돈 영지2돈 2제 복용....

손가락 피부 벗겨짐 호전,

수장한.... 24시간 그랬는데....지금은 아주 가끔 긴장했을 때 잠깐 나는 정도....

다한증 원인의 경우의 수(기허증, 위열증, 간담습열증이 대부분. 신음허도 고려해야)

비위습열로 보고 의이인삼백초탕 + 포공영 마황근 부소맥 청호 4g ++ 체질식 이렇게 처방했습니다. 15일 먹고 호전이 하나도 없습니다...이럴 경우 어떤 쪽으로 봐야 좋을 지요..

찾아보니

1. 갈근조위탕 + 승마 포공영 기타...이 방법은 비위습열 처방과 비슷한 의미로 가지 않을까요?
2. 사삼보폐탕 치험례, 사삼보폐탕이 폐기허 처방이라서 寒者 처방이지만 熱者에게 처방해서 유효했던 치험례도 있더군요..
3. 나이로 봐서 신음허 처방쪽으로 가는 방법
4. 간열로 보고 산조인 생을 쓰라는 선생님 말씀도 봤습니다. (즉 신음허 처방 + 간열 치료 약물) 등등 이 정도 인데요...경험 있으신 분들 고견 부탁드립니다.

답)

다한증은 기허증, 위열증, 간담습열증이 대부분입니다. 열증이면 위열증과 간담습열증에 해당합니다. 특히 식한은 위열로 보게됩니다. 위열과 간담습열을 제거하는데 목표를 두어야 겠습니다. 위열은 황금 승마 대항을 씁니다.

그럼 이번에는 갈근조위탕 or 청위탕 계열로 해보겠습니다.

얼굴은 위에 속하므로 위열을 사하는 승마 황금이 중요해 보입니다. 황금은 조습하면서 청열한다는 사실을 잊으면 안됩니다. 건조한 피부에는 아무리 열이 많아도 황금이 적적하지 않습니다.

일단 나이가 좀 있으시지만 상초 쪽으로 보고 양형처방인 갈근청위탕 (황금 들어있습니다) + 승마 포고영 대황 이렇게 가보겠습니다.

평소에 술 많이 드시던 분이 되어서 이담약물 넣어야겠습니다.

이중기 대변 하루에 2번 변비과거력 없으면 한자일 수도 있겠는데요? 한자라면 커피불면이 있으시니 사삼보폐탕증인데요..

소음인, 무력 도한 자한 심함. 도한이면 음허인데 신양허증에 쓰는 홍삼보양탕에 총울자를 가해서 신음양양허증으로 접근해봐야 하겠습니다.

다한, 한출 부위, 한증 상체는 폐기허, 열증 하체는 신음허가 가장 많다(유주열)

땀 흘린 후에 기운빠지는 것도 없고 해서, 비위습열로 보고, 두황의이인탕(代마황근)에 갈근 배로 하고 두시를 가해서 썼습니다. 현재 일주일 정도 드셨는데, 대소변이나 수면 등 다른 건 전과 같이 전혀 불편한 게 없는데, 땀은 여전하다고 합니다.

이건 제가 두 달 정도 드셔야 한다고 말씀해놨는데, 담에 처방 쓸 때 계속 비위습열로 보고 쓰면서 이담약 종류를 가미해야할지, 아님 폐기허나 다른 쪽으로 써야 할지 모르겠습니다.

저번에 김봉찬 원장님 사삼보폐탕가미 열흘치로 탁효 보셨다고 하셔서 폐기허가 맞나 하는 생각도 들고요...류샘 강의자료에는 한증은 폐기허하고 간기울결 있는데, 이분은 평소에 피로감은 있는데, 땀 흘린 후에 더 피로감을 나타내지 않아도 폐기허로 변증할 수 있을까요?

고견 부탁드립니다.

(의논)

류샘 강의 들어보면 옛날부터 다한증이 있었는지 몇 년 전부터 심해졌는지에 따라 예후가 많이 차이 난다고 합니다. 그 중에서도 폐기허는 빨리 낫는다고 하셨습니다. 움직일 때 확실히 땀이 심해지는지 여부도 변증 포인트가 될 것 같습니다. 상체에서 땀이 많이 나는 것은 폐기허에 조금 힘을 실어주는 것 같습니다. 류원장님께서 다한증은 프린트 변증에서 다 된다고 하셨습니다. 한증 상체는 폐기허가 가장 많고 열증 하체는 신음허가 가장 많다고도 하셨습니다.

참고로, 40대 후반 여성 대변 2일에 한번 커피불면 없음. 몇 년 전 두한증 심해져서 갱년기로 보고 상황보음탕 가 산조인초로 한제 썼다가 30프로 정도에서 호전이 없어서 마황보폐탕으로 바꿨더니 몇 첩에 탁효를 본 케이스가 있었습니다. 이분은 움직일 때, 매운 것 먹을 때 땀이 많이 났었고 평소에 땀 흘린 후는 기운 빠짐 없으나 사우나에서 땀 많이 빼면 기운 쪽 빠진다고 했었습니다

소음인 수족다한에 보중익기탕 가미방을 쓰는데 속도 더뎴.--> 당귀 천궁 백작약 등으로 음혈

을 보한다. 인삼 향기를 증량할 수 있다. 소엽에는 발한작용이 있으니 빼는 것이 좋다.

수족다한 액한 손발이 찬 것이 주소인 환자입니다. 스트레스를 받거나 몸이 힘들거나 하면 목 위로 머리 전체가 떨리는 증상이 가끔씩 발생합니다

보중익기탕 가 향부자 건강 반하 익지인 사인 1돈 으로 3제째 복용하고 있습니다
-> 전반적으로 조금씩 호전되어 땀도 줄고 손발도 조금씩 따뜻해졌습니다

처음에 4제 정도를 먹어야 된다고 해서 먹고 있는데 소음인이라서 그런지 소양인이나 태음인 보다 수족다한이 줄어드는 속도가 느린 것 같습니다. 소양인 태음인 수족다한은 2-3제정도에 서 거의 80프로 이상은 좋아졌던 것 같은데 소음인은 좀 느린 것 같습니다. 추가로 가미하거나 조절해줄 수 있는 방법이 있을까요? 조언 부탁드립니다

안준철08.05.07. 10:12

당귀 천궁 백작약 등으로 음혈을 보하면 됩니다. 그리고 인삼 향기를 증량할 수 있습니다. 소엽도 발한작용이 있습니다. 소엽을 거하는 것이 좋습니다. 물론 외감에는 빼면 안됩니다.

태양인 태음인 소양인 다한증에 가감할 약재. 소양인은 지모 황백, 태음인은 갈근 승마로 청 열 마황으로 폐기 선발, 태양인은 기허에 당삼 신경성에는 진주모 석결명 비만하거나 습열에는 초룡담, 백강잠도 피부에 작용한다.

소양인은 땀이 많거나 소변이 붉으면 지모 황백을 가하고, 태음인은 다한증에 갈근 승마로 청 열하고 마황으로 폐기를 선발시키는 것으로 알고 있습니다. 태양인은 수족다한증은 어떻게 접근을 해야 하는지 궁금합니다.

백모근으로 청열하고 칠정이 있으면 진주로 안신시키면 되는지, 또 여성초를 가해야 할지 잘 모르겠습니다....몇 돈을 가해야 하는지도 궁금합니다....

항상 친절하신 답변에 감사드리고 있으며 얼마 전 소양인 환자 수족다한증에 독활지황탕에 지모 황백 1돈 황련 치자 5푼하여 많이 좋아져서 저도 무척 신기해 한 적이 있습니다....황련 치자는 긴장하면 더 많이 땀이 난다고 해서 추가했습니다...그저 감사할 따름입니다....꾸~벅!!!

안준철

기허에는 당삼을 씹니다.(보중익기탕의 인삼 향기 같은 작용) 신경성에는 진주모 석결명 등을 씹니다. 비만하거나 습열증이 있으면 초룡담을 가해서 쓸 수 있습니다. 백강잠도 피부에 작용합니다.

태음인 열증의 수장한에 갈근조위탕 가감방. 여정실 생용하면 간열을 사하고 주증하면 보음, 산조인은 교감신경의 흥분을 억제해서 땀을 줄이고 잠을 자게한다.

태음열증 고1 여학생. 몇 년 경과 되었고 겨드랑이와 수장한으로 노트와 OMR카드가 젖는다. 갈근조위탕 중용 대황2돈 가 여정실 2돈반, 산조인 1돈반 7일분. 수장땀이 전혀 안 나고 겨드랑이 땀도 줄었으며 손발도 많이 따뜻해졌다고 함. 류선생 책의 산조인의 지한작용에 주목해서 가감.

(안)여정실은 생용하면 간열을 사한다. 주증하면 보음.

산조인은 교감신경의 흥분을 억제. 그래서 땀을 줄이고 잠을 잘 자게 한다.

■ 眼耳鼻咽喉科 질환들(비염, 각종안면질환, 두통, 현훈...)

1. 비염

체질별 비염, 중이염, 천식 처방(단위는 g)

※※ 몇 가지 특수한 케이스를 제외하고는 모두 효과가 난다.

• 소음인

<한자> 향사양위탕

<열자> 보중익기탕 (인삼 황기 6 당귀 백출 진피 자감초 4 곽향 소엽 2g)

- 가미 - (위의 두 처방) + 천궁 소엽 지각 4g

: 가래가 많으면 지각을 증량하고 반하 진피 4~8g

: 가래가 없으면 반하 진피는 줄여서 쓴다.

※(천궁 소엽 당귀 지각 각1돈 천초3푼(백출은 창출로 대체) 등을 가해야 합니다).

• 태음인

태음인 비염에는 황금 행인을 반드시 써야한다. 마황증량, 백부근 비파엽 포공영은 보통 두돈.

<한자> 태음조위탕

+ 갈근 8 승마 4

+ 백부근 포공영 비파엽 8

+ 황금 행인 4 (핵심. 비염 중이염에 정말 중요한 약물)

+ 누런 코가 많으면 길경 8g으로 증량

유근피 1.2~2.7g (유근피는 열증약. 수업시간에는 안가르쳐주셨어요^^)

+ 맑은 코가 많으면 마황 1.2g~4g 추가.

(즉 태음조위탕에 마황이 들어가 있으므로 1.5~2돈을 쓴다)

cf. 누런 코와 맑은 코에 따라서 길경 유근피 마황을 조절
+ 천식은 마황 6g

<열자> 갈근조위탕

+ 승마 4
+ 백부근 비파엽 포공영 8 (瀉肺熱)
+ 마황 2~4g (맑은 코의 정도에 따라서 / 4g까지 쓰면 간혹 태음인 열자 불면증 발생)
+ 황금 행인 4~8
(핵심. 비염 중이염에 정말 중요한 약물. 누런 코가 많으면 8g까지)
(핵심. 행인은 안이비인후 치통까지 다스립니다. 목 위의 모든 증상에 활용가능
유근피 4 (유근피 열증약이므로 누런 코양에 따라서 양 조절)
+ 변비가 염려되면 대황은 2g~4g 증량
+ (길경은 4g 더 증량)

• 소양인

<한자> 독활지황탕 + 형개연교탕 지제 (형개 4~6 연교 치자 박하 시호 2g)

<열자> 형방패독산 + 형개연교탕 지제 (형개 6~8 연교 치자 박하 시호 4g)

cf. 속이 불편하거나 위장에 문제가 있으면 형방사백산에다 형개연교탕지제를 가미한다.

• 태양인

- 태양인의 비염은 현재 연구중인데 백강잠을 잘 써야 한다.

태음인 비염처방을 다시 한번 강조함.

카페 자료실에 태음인 처방에도 있지만 태음인 비염 계통에 정말 잘 듣는 처방 다시 한 번 강조해주셨어요.

<한자>

태음조위탕 + 갈근 2 승마 1

+ (길경 증량)

+ 백부근 포공영 비파엽 1~2돈

+ 마황 3푼~1돈 추가. (즉 태음조위탕에 마황이 들어가 있으므로 1.5~2돈을 쓴다)

+ 유근피 3~7푼 (누런코가 있을 경우에만. 유근피 열증약이므로 누런 코양에 따라서 양 조절)

+ 황금 행인 (핵심. 비염 중이염에 정말 중요한 약물)

<열자>

갈근조위탕 + 승마 1돈 + (길경은 1돈 더 증량)

+ 백부근 비파엽 포공영 2돈

+ 마황 5~7푼 (맑은 코의 정도에 따라서 / 1돈 정도까지 쓰면 간혹 태음인 열자 불면증 발생)

+ 유근피 1돈 (유근피 열증약이므로 누런 코양에 따라서 양 조절)

+ 변비가 염려되면 대황은 5푼-1돈 증량

+ 황금 행인

(핵심. 행인이 더 중요 / 행인은 안이비인후 치통까지 다스립니다. 목 위의 모든 증상에 활용가능)

아프신 몸으로 정말 고생하셨습니다. (- -) (- _)

그동안 강의해주신 선생님께 다시 한 번 감사드립니다.

태음인 비염, 비염으로 인한 불면에 태음조위가감방. 황금이 빠지면 듣지 않고, 행인을 가하면 더욱 좋다.

처방은 태음한자로 판단하고 태음조위 加 비파엽 포공영 백부근 황금 1 갈근 2 승마 1 보름 복용하였습니다. 학생이 약 복용 후 일주 후에 첫 마디가 잠을 너무 잘 잤다. 코는 반정도 좋아진 거 같다. 본인은 상당히 만족하였습니다. 3개월 치료 약속하였기에 처음부터 욕심 내지 않았지만 환자 만족도가 좋아 저도 상당히 기분이 좋았습니다.

보름 후 상부 열을 좀 더 꺼보자 싶어 태음조위 加 비파엽 포공영 백부근 2돈 황금 1 갈근 2 승마 1 녹용 1 잠은 여전히 잘 자고 코는 더 좋아졌으며 한눈에 보기에 안색이 맑아 졌습니다.^

(안) 황금이 빠지면 듣지 않습니다. 행인을 가하면 더욱 좋습니다.

신경 쓰면 잘 체하고 가스차는 태음인 한증의 비염여성에게 연자소간탕가 창이자 황금 자완 백지 각1돈, 마황 녹용 반돈을 써서 유효하다(간비불화).

29세 기혼 여자. 비염과 후비루로 내원했습니다. 감기 걸리면 비염이 심해지며 누런코에서 초록코까지 나온다고 합니다. 고2부터 비염이 있었다고 합니다. 감기에 자주 걸리며 생리시면 거의 감기에 걸린다고 합니다.

피로가 심하고 냉이 많으며 신경쓰면 잘 체하고 가스가 잘 잡니다. 대변은 매일 한번 보고 간혹 설사합니다. 태음인 한자로 보고 태음조위탕 가미방을 쓰려고 했으나

간비불화증 또한 확연하여 연자소간탕에 가감해 보려고 마음 먹었습니다.
연자소간탕 가 창이자, 황금, 자완, 백지 1돈, 마황, 녹용 0.5돈 처방했습니다.
10일 지나서 전화해보니 속이 편해졌고 코도 많이 편하고 피곤이 덜하다고
효과를 많이 보는 것 같다고 말씀하셨습니다.

태음인 열자의 천식, 알레르기성 비염을 갈근조위가감방으로 현저하게 좋아지게 하다.

1.49세 태음인 열자

2.현병력: 알레르기성 비염으로 시작해서 현재 7년째 천식으로 인해서 흡입기를 쓰고 있는 상태. 흡입기가 없으면 안 되는 상태, 목소리도 갈라지고 쉰 목소리, 콧물은 불시에 뚝뚝 떨어짐. 쉼쉼소리가 나는 목소리. 잘 아시듯이 흡입기로 마시는 약은 스테로이드입니다. 환자 본인도 스테로이드의 문제점을 잘 알고 계셨습니다.

3.처방: 갈근조위탕가 백부근 비파엽 포공영 2돈씩 황금 승마1돈 씩 마황7푼

4.결과 오늘 5일째 복용중에 전화왔는데 평소에 흡입기를 하루에 2-3회 썼는데 한번도 안썼다고 합니다.

5.그런데 전화가 와서 하는 말이 숨쉬기는 편해지고 있는데 다른 한의원은 전부 자기를 소음인이라고 하는데 왜 내가 태음인이냐? 따지네요.ㅋ

체질에 신경 쓰지마시고 병만 나오면 되지않느냐고 했더니...맞습니다.

이데로 가면 얼마 안 먹어서 완치될 거 같습니다.

잘 고쳐주고도 자기는 소음인이라고 우기면서 피곤하게 하네요.ㅋ

6.고찰:천식과 비염은 뿌리가 같아서 같은 처방으로 동시에 좋아질 수 있습니다.

그리고 체질은 쉽게 알려주면 안 될 거 같습니다.

태음인 열자의 축농증에 맑은 코 寒氣 참고해서 寒者處方 자완청열탕으로 좋은 효과를 보다.

언니는 태양인으로 확진하였습니다. 동생이 축농증이 심하다고 왔습니다.

둘째 만삭 즈음에 코감기가 걸려 이후 축농증이 발생, 지금껏 여러 치료를 받았으나
마무리가 안 되고 자꾸 재발해서 내원했습니다.

눈 사이가 멀어 첫 느낌은 태음인이었는데 이것 저것 살펴보니 태양인 같습니다.

피부두께는 보통이고 사우나하면 기운 쳐집니다. 커피도 매일 1, 2잔씩 먹는데
불편한 적이 없었다고 합니다.

작년 가을부터 축농증이 생겼는데, 희한하게도 그때부터 소고기만 먹으면

소화가 안 되고 불편해졌다고 합니다. 그리고 그때부터 변비도 심해져서 한 1년 고생했습니

다. 지금은 대변은 매일 한 번씩 정상적으로 보고 가스가 가끔 잘 차며 입이 종종 마릅니다.
아프고 나서 신경이 예민해져서 짜증이 늘었습니다.
태양인으로 보면 될까요? 즐거운 주말 보내세요~~
(저는 또 논문 속으로...-.一)

작년 6월에 내원하신 분입니다.

이 분 초진에 잠사청열탕을 2일분 드렸는데, 치통, 관골통 등의 안면통이 많이 없어진 느낌이 든다고 했습니다. 체질이 틀려도 청열약이라 일단 염증은 가라앉히는 것 같습니다.

처음에 백모근청폐탕, 창이자청폐탕, 마황보폐탕가감을 썼는데
축농증이 거의 좋아지다 다시 나빠지다 그저그렇다를 반복했습니다.

다음으로 의이인청폐탕을 써드리니 이번 약은 1봉 먹을 때마다 좋아지는 걸 느낀다고 하시더
군요. 효과가 너무 좋아 만족하시는데 마무리가 안 되서 안타까워했습니다.
누런코가 조금씩 나오고, 밤에는 조금씩 막히는 정도였습니다.
기타 통증이나 불쾌감은 다 사라졌습니다. 이후 같은 약을 두 제 더 쓰고
그래도 마무리가 안되서 갈근조위비염가미방을 썼는데 이 경우는 잠깐이라도 좋아지는 느낌을
못 받았다고 합니다.

그런데 그 와중에 한 번은 자완청열탕을 2일치 같이 넣어드렸는데
이걸 먹을때 너무 좋은 느낌을 받았다고 합니다. 이 약 먹으면 이젠 끝나겠구나 하는 생각이
들더랍니다. 그래서 얼른 자완청열탕을 1제 달여드렸습니다.
그게 작년 12월말경이었는데, 2월초에 전화드려보니 이젠 아무렇지도 않다고 합니다.
오늘 다시 통화했는데 올 겨울은 너무 잘 보냈다고 합니다.
코는 이제 전혀 불편한 느낌이 없고 더구나 예전보다 감기도 거의 안하고
감기가 잠깐 오더라도 보내주신 약(갈근승기탕) 먹으면 바로 떨어지고...
남편도 깜짝 놀라더라는.....오늘은 3일전부터 코감기가 왔는데
맑은 코만 자꾸 나오고 아직 한기가 든다고 하셔서 다시 자완청열탕 처방했습니다.
자완청열탕이 아름다운 결과를 내주어 글 올려봅니다.

ps) 이 분 축농증 생길 즈음 소고기 드시면 계속 탈이 났는데
오늘 물어보니 요즘은 자주 먹는데 아무 문제 없다고 합니다.
많이 드시라고 했습니다.^.^;

한번 정리해보면,

1. 체질이 틀린 처방도 변증이 유사하면 잠깐 효과를 내줄 수도 있다.
2. 자완청열탕이 한증약이나 열자에게 매우 유용한 결과를 보여주기도 한다.
3. 건강이 무너져 불균형이 심해지면 태음인이 일시적으로 소고기에 탈이 날 수도 있다.

이상 예외에만 눈이 반짝반짝하는 소음인이 보고드렸습니다.
예외는 예외일 뿐 따라하지 말자.ㅋ

태양인 비염에 오가피쌍해산가감방, 미후등식장탕 가감방으로 효과를 보다.

만43세 여환. 알러지성 비염(10년이상)

비색, 비양, 안양, 전두통, 이감모, 두중, 후비루, 비건, 비통

피부소양감, 관절통, 우울증. 비염 가족력

오래전부터 여러 질환으로 양방 치료받았으나 양약 부작용(부종, 팔저림 등등)이 심했음
(간 물혹, 췌장수치가 높음, disc수술(10년 전), 자궁적출(2년전), 신경통, 관절통, 유방종괴(2년전), 기관지염 등) 치료를 하면 침이나 약이 몸에서 어떻게 작용하는지 느낄 수 있으시답니다.(?)

소화 :소식해야 편함

대변: 1일 1회.

소변: 9-10회/ 1일

다한출(몸이 안좋으면 더함.), 수족빙냉(현재는 덥고 가려움). 추위잘탐.

과일,생선 선호. 밀가루, 튀긴음식, 돼지고기-> 속거북, 소화불량.

인삼(홍삼)->피부발진, 소양감.

커피 -> 가래가 안 삭아짐, 물을 많이 마심

한약복약-> 양방약에 비해서 부작용은 덜함

피부발진소양, 오한전율등의 부작용이 있었음

소량 복용하면 부작용은 없으나 증상 호전이 더디고 정량을 복용하면 부작용이 나타남

<치료 경과>

08.08.07

1.오가피쌍해산+백강잠 8g,와송4g,어성초8g,백모근8(3회/1일 120cc 7일분)

약부작용도 없고 코증상도 호전됨

피부소양감 호전/ 늘어났던 소변양이 일정해짐/ 소화불량은 큰 차도가 없음/ 소화불량 시 두통동반

08.08.14

오가피쌍해산 +백강잠 8g, 와송4g, 어성초8g백모근12g 현호색3g(8일분)

복약 후 부작용은 없었음/ 코증상은 없음

소화불량은 호전/ 두통은 호전되었으나 여증(복약 안하면 심해짐, 소화가 안될 때 신경을 많이 쓸 때 발증) / 고관절통, 요통

08.08. 23

미후등식장탕 + 백강잠 8g, 와송4g, 어성초8 g백모근12g 현호색3g

08. 09. 06

부작용 없이 편하게 복약, 지난번 약보다 약효가 더 나음
소화 호전, 두통 호전되었으나 여증
약효가 지속되는 시간이 김

약효가 신속하고 증상 완화가 빨라 마약처럼 중독될까봐 걱정이라 하시네요.
요즘 힘든 일이 많았는데 말끔히 가시는 오전입니다.^^

*복약 후 부작용 없이 증상이 좋아진 건 거의 처음이라시며 울먹이셨습니다. --
(감정표현이 노골적이고 즉각적이십니다.)

소음인에게 향사양위탕가 천궁 소엽 지각 당귀 각 한 돈으로 저효를 보다. 황기추가하고 맑은
콧물 심하면 천초를 3~5푼 추가

49세 환자분이십니다.
주소증은 오래 된 비염(멀건 콧물과 재채기, 눈 가려움)이고, 요통과 오른쪽 상박통이 겸해 있
습니다. 소음인입니다.

소화--음식 양은 보통사람보다 많이 먹음. 많이 먹어도 문제 없고 가스 차는 것 없음.
맥--무신한데 약간 굵은 편임.
피부--상박의 피부 매우 얇음.
싸우나--땀 빼고나면 약간 기운 빠짐.

위의 환자에게 향사양위탕 가 천궁, 소엽, 지각, 당귀 각 1돈 15일분을 투여한 결과 환자표현
으로는 절반이 좋아졌다고 함. 그런데 처음에 같이 있었던 마른 기침 증상은 왜 안 좋아지나
고 호소함.

안준철 08.05.29. 11:30
황기를 가할수 있습니다.황기는 衛氣를 조절하고 生肌작용을 합니다. 맑은 콧물이 심하면 천
초를 3-5푼 가할수 있습니다.

소음인의 비염을 향사양위탕가감방으로 역시 효과를 보다.

증상--10년 이상 심한 비염. 아침에 일어나서부터 하루 종일 콧물, 재채기, 눈 가려움으로 시
달림. 강남의 유명하다는 이비인후과 등 여러 병원을 다니다가 비염은 불치병이라고 생각하고
치료를 포기하고 증상이 심해질 때마다 지르텍을 복용. 지르텍 복용 초기에는 잘 듣더니 나중
에는 복용량을 늘리지 않으면 효과가 없었음. 그러던 중 아는 사람의 소개로 한약을 써 보기
로 함.

처방--형상, 맥, 피부두께, 싸우나, 음식 반응 등을 보아 소음인 한증으로 판단하고
향사양위탕 가 천궁, 소엽, 지각, 당귀 각 1돈 15일분 투여.

결과--아침부터 저녁까지 콧물은 거의 안 나오고 약간 근질거리는 정도. 환자 자신의 표현에
의하면 절반 이상은 나은 것 같다고 함. 오늘 래원하여 위의 처방대로 다시 투약.

태음인의 축농증에 갈근조위탕가감방 활용

태음인열자에 쓰이는 비염 축농증 처방을 써보시기 바랍니다. 갈근조위탕가 황금 승마 각1돈 백부근 비파엽 포공영 각2돈 마황 7푼입니다. 농이 심하면 마황을 늘여서 쓰고 농이 적으면 마황을 줄여서 씁니다. 황금이 빠지면 효과가 없습니다. 황금은 조습청열합니다. 콧물을 말리면서 염증을 없앤다고 생각하면 됩니다.

상안검 부종, 불문향취 비색 후비루 등의 증상에 일단 위축성비염으로 보고 맥문동양폐탕가 상황 비파엽 포공영 승마 상엽으로 효과를 보다. 상안검부종은 면부풍열로 보고 갈근조위탕에 승마를 가해서 시도해본다(승마위풍탕개념)

태음인 열증이고 40세 여자환자입니다. 주소증은 1년 전부터 상안검이 부어서 가라앉지 않고 냄새를 맡지 못하고 후비루와 코막힘이 있는 환자입니다. 불문향취는 이비인후과에서 후각신경이 죽었다고 진단받고 치료해봤으나 전혀 호전이 없었다고 합니다

상안검부종은 3개월전에 삼성의료원에서 혈관부종 진단받고 쪽 치료했으나 역시 전혀 호전이 없었습니다. 충혈이 자주 되는데 눈이 아프거나 피로한 건 잘 모르겠다고 하고 두통 현훈 등은 전혀 없었습니다

다른 변증거리가 없어서 위축성비염에서 폐음허로 보고 맥문동양폐탕 가 상황 비파엽 포공영 승마 상엽 처방했습니다. 2제 복용 후 안검에는 거의 변화가 보이지 않는데 냄새를 맡을 수 있게 되었다고 합니다. 아직 완벽하진 않지만 냄새를 맡을 수 있고 코막힘도 거의 없는데 후비루는 아직 남아있다고 합니다. 하지만 가장 큰 주소증이었던 안검부종에 변화가 없어서 여쭙습니다. 상안검부종도 위축성비염과 같이 폐음허 처방으로 호전이 될 수 있을까요? 아니면 다른 처방으로 바꿔야 할까요?

(안)

일반적으로 상안검은 비위경의 풍열로 접근합니다. 상안검은 비병이고 하안검은 위병으로 보기도합니다.전신의 부종은 습이고 면부의 부종은 풍열로 가게됩니다. 후세방으로 승마위풍탕, 사향산 등을 생각하면 좋겠습니다. 상안검 부종은 갈근조위탕에 승마를 가해서 쓰면 됩니다.

태음인의 맑은 코 흐르고 재채기 하는 비염, 혈뇨에 갈근조위가감

40세 사업하는 남성입니다. 과로가 많으나 술은 안 마신다고 합니다.
 만성피로가 심하고 비염이 20년 되었다고 합니다. 밥 먹을 때 맑은 코가 흐른다고 합니다.
 찬 기운을 쐬면 재채기가 심하게 난다고 하네요. 대변이 무르고 설사가 잦아
 갈근조위탕 用 대황 5푼 加 비파, 포공, 백부, 승마, 황금, 마황 1돈, 녹용 5푼 썼습니다.
 잘 못 챙겨서 하루 한 봉씩 먹었는데도 좋았다고 하네요.
 전립선염이 있어 과로하면 혈뇨가 가끔 생긴다고 합니다. 워낙 심해서라고 하시는데, 비염이
 비슷하다니 뭐이런.....이리 썼는데도 코가 안마르다니..마황, 황금, 행인을 5푼씩 올려볼

소음인 비염 세가지 처방 질문입니다(향사양위탕가감, 소엽청열탕, 계지반하생강탕가감)

- 1) 소음인 한증 비염 축농증-향사양위탕 가 천궁 소엽 황기 당귀 지각
- 2) 새로 쓴 사상의학의 폐경풍열로 인한 비색 해수 등에 소음인 한자 소엽청열탕
- 3) 혹은 한담요폐로 인한 해수 담희박 맑은 가래 등 콧물-계지반하생강탕 가 세신

어떻게 진단하고 세 가지를 적재적소 처방하면 더욱 유용할지 가르쳐주세요

- 3)은 만성 알러지비염 기관지염이지만 증상이 한증인 경우에 쓸 거 같구요
- 2)는 같은 만성 비염 기관지염이지만 증상이 열증이 많을 때 쓸거 같구요(비록 소증이 한증이
지만)
- 1)은 주로 한증이 소증이지만 열증인 경우에도 비염이나 기관지염에 두루 다 쓸수 있을거 같
은데요

좀 더 설명해주시면 감사하겠습니다

안준철09.02.09. 13:20

저는 향사양위탕을 외감병의 범주에서 파악합니다. 그래서 비염같은 외감병 후유증에 효과를 발휘합니다. 물론 콧물이나 가래 등을 봐서는 지각을 가합니다. 발산력을 높이기 위해서 천궁을 가합니다. 배농생기 작용을 위해서 황기를 가합니다. 황기는 衛氣를 도와주기도 합니다. 소엽청열탕은 한자의 폐경풍열약입니다. 한자의 약이기는 하지만 외감을 전제로 열증약이 많이 가미됐습니다.

계지반하생강탕은 원래의 처방 목적이 감기가 아니고 가래(痰)이 목표가 됩니다. 그러므로 계지반하생강탕은 가래 구역 오심 등의 담증을 전제로 합니다. 감기에는 잘 쓰지 않습니다.

갈근조위가감방, 자완청열탕, 백부근청열탕으로 효과 안 나는 태음인비염, 아토피에 의이인청폐탕을 고려한다.

이거머 태음인이 아닐 수 없을 것 같은데.....비염이 10살 전에 생겼구요,

아침에 맑은 코가 심하게 흐릅니다. 낮에도 심하게 흐릅니다.
11세쯤부터 아토피가 생겼고 15세쯤부터 얼굴까지 번졌습니다.
일어날 때 많이 가렵지만 요즘은 시도 때도 없이 가렵습니다.

누런 냉도 많고 음부소양증도 있네요. 감기 자주 걸리고 더위를 많이 탑니다.
입이 자주 마르고 소화도 잘 안됩니다. 대변은 3일에 2회 정도 보는 것 같다고 합니다.
보통 좀 된 느낌인데, 가끔 설사를 합니다. 커피는 안먹어서 모릅니다. 열증으로 보고
갈근조위탕 가 비파, 포공, 백부, 승마, 황금 1돈, 마황, 대황 0.5돈 썼습니다.
별 차이가 없습니다. 혹 한증인가 하고 자완청열탕 썼습니다.
똑같습니다. 미안하다 열증인가 하고 백부근청열탕 썼습니다.
똑같습니다. 이 정도 했으면 비염이라도 호전되리라 생각했는데
전혀 꿈쩍하지 않으니 좀 당황스럽네요. 조언부탁드립니다~
(안)
태음인이 확실합니다. 의이인청폐탕이 좋을거 같습니다

2. 眩暈

태음인 어지럼증을 갈근조위탕가 천마 조구등 백질려 각4, 녹각2g으로 치료하다. 대황은 이
담, 이뇨작용을 동시에 하면서 식적, 담음, 어혈, 부종, 생리통, 오심, 현훈 등을 모두 치료한
다.

57세, 여. 10월 중순 내원.
1달 전부터 어지러움증이 생겼다고 합니다. 기상시에엔 조금 덜하나 하루 종일 어지러움증이 느
껴진다고 하네요. 흔들흔들하답니다. 고개를 돌릴 때마다 어지럽습니다. 어지러울 때는 잘 토
하기도 합니다. 근데 비슷한 시기에 체기도 같이 생겼습니다.
밥 먹으면 불안하고 죽을 먹어야 편하며 소화가 안 될 때는 토하기도 한다고 합니다.
변비는 한 번도 없었으나 커피에 불면경험이 있습니다.
담음으로 인한 현훈으로 변증하고 가감길경죽여탕을 썼습니다.
속은 편해져서 밥 먹어도 아무 문제가 없을 정도가 되었는데
어지러움증은 전혀 차도가 없습니다.

갈 길이 막막하여 이용양 원장님께 배운 현훈방을 한 번 써봤습니다.
역시 별 변화가 없습니다. 먹으면 좀 더 어지럽다고 합니다.ㅜㅜ
속은 편합니다. 역시 명방은 명의가 써야 명방인가 봅니다.^^;

어디로 가야할지 몰라 고민하는데 아직도 아주 가끔 체한 듯한 느낌이 들고 그럴 때면 더 어
지럽다고 합니다. 갈근조위탕 가 천마, 조구등, 백질려4g 녹각2g 처방했습니다.

보름 지나 오늘 확인해 보니 증상이 거의 없어졌습니다.

속도 아주 편합니다. 이상 간략한 임상기였습니다. 감사합니다^^

(안)

훌륭하십니다. 식적과 담음이 있었던 거 같습니다.

대황은 식적 담음 어혈에 모두 쓰입니다. 이담 이뇨작용도 있습니다.(대황은 황달 변비 부종에도 특효약이 됩니다.) 대황은 기원이 어떤 걸 쓰셨습니까? 당고특대황? 장엽대황? 구입처는 언제쯤 어느 약업사인가요? 요즘 대황이 상당히 문제입니다.

근래 나눔에서 공급받은 탕구트대황입니다~

참고로 갈근조위탕은 식적에 주로 작용하지만 열증의 담음 어혈에도 잘 듣습니다.

예를 들면 갈근조위탕을 식적을 목표로 썼는데...식적은 물론이고 생리통 부종 오심 현훈 등이 함께 좋아시는 경우가 많습니다. 이 모두가 대황의 약효로 인한 덕이며 대황 일미만 쓰면 공벌하는 작용이 너무 강하므로 온보하는 오미자 라복자(라복자도 생으로 쓰면 기관기 등의 담을 제거합니다. 초하면 비위에 작용합니다.) 등과 함께 쓰입니다.

참으로 명방인데 요즘 대황이 이상해서 문제를 좀 일으킵니다.

대황은 확실한 이뇨작용을 가지고 있어서 소변량을 현저히 증가시킵니다. 그래서 부종에도 탁월합니다. 이담작용이 있는 약은 지용성물질을 대사합니다. 이뇨작용이 있는 약물은 수용성 물질을 대사시킵니다. 대황은 이담 이뇨작용이 모두 있어서 지용성 물질과 수용성 물질을 모두 대사합니다. 즉 소변으로 수용성물질을 해독하고 대변으로 지용성 물질을 해독할 수 있습니다. 정말로 엄청난 효능의 약입니다. 동서고금 유럽 아라비아 페르시아 등지에서도 널리 오랜 역사동안 쓰여진 탁월하고 안전한 약미입니다.

대황의 부작용(side effect)는 참으로 많습니다. 생각지도 않았던 생리통이 낮고...환자가 말도 안한 두통이 좋아지고...기대하지 않은 소변불리 소변빈삭도 없어집니다. 사상의학에 있어서 부작용은 negative적인 의미가 아니라 positive적인 의미입니다. 생각지도 않은 부수적인 좋은 효과를 말합니다.새해에도 무수한 좋은 부작용(부수적 좋은 작용)을 만나기를 기대해 봅니다. 같은 약물을 무수히 쓰게 되면 생각지도 못한 기효를 발견하게 됩니다.

교과서에도 없고 기존의 본초서에도 없는 기효를 발견하게 됩니다. 이렇게 물성을 알아가는 게 임상의 묘미이고...개개의 물성을 모르고는 아무리 macro한 큰 이치를 파악하고 있다고해도 문제를 해결할 수 있는 능력은 생기지 않습니다.(체질을 알아도 약성을 모르면 문제를 해결할 수 없다는 뜻입니다)

우리들에게 물성의 파악이라는건 본초의 약성을 잘 아는걸 말합니다.

우리모두가 2011년은 detail에 강해지고 물성의 이해도를 높이는 한해가 되기를 기원해 봅니다. 꿈은 이루어진다 !

노인현훈을 신음허로 보고 상황보음탕가 산약

현훈 6개월, 대변 2일에 1회, 신음허증으로 보고 상황보음탕가 산약 한돈 20첩 30봉

하루만에 어지럼증 없어짐

72세 태음인 할머니의 현훈증을 위장상태가 안 좋음에도 불구하고 신음허로 간주, 정심보음탕 가 감국 천마 조구등 각2g 처방해서 유효

#. 주소증 - 1. 현훈

: MRI 진단상 뇌혈관이 약간 좁아져서 그렇다고 함 (신경외과 약 복용중)

: 아침에 일어나면 가장 많이 어지러움

2. 요추 협착증으로 인한 하지 저림 통증 쑤심

(협착증 수술 10년 전. 흐리면 더 심함. 밤보다 낮에 더 아픔)

** 이 분은 태음인 열증으로 보입니다.

그리고 현훈은 이명과 난청 증상이 있는 것으로 봐서 메니에르 같기도 합니다.

그래서 신음부족증으로 나뉘 변증하고 정심보음탕 가 감국 천마 석창포 정도 처방하려고 합니다. 그런데 할머니 위장 상태가 약간 걱정 되기도 합니다.

노인들의 경우 소도지제 `보비지제로 안 되는 소화 장애는 신허약을 쓰는 경우로 봐서 오히려 더 잘 될 수도 있다고 생각하지만 약간 걱정도 되네요...

[안준철] 태음인으로 보여집니다. 체질에 맞으면 소화장애는 걱정 안 해도 됩니다

신음부족 현훈으로 보고

==> 정심보음탕 + 감국 천마 석창포 2g

이렇게 처방했습니다.

현재 현훈증 거의 소실입니다. 역시 노인분들은 여러 가지 증상이 나타나지만 기본적으로 보 신보정지제 처방이 맞나봅니다.

74세. 태음인 여성. 양방 다이어트 치료 후 발생한 현훈증에 신양허로 간주, 연자보양탕 가 천마 원지 석창포로 유효하다.

#. 주소증 - 현훈 (이석으로 발병했다고 양방에서 진단. 앉았다 일어서면 어지러움)

(어지러울 때 메스꺼움이나 구토는 없음)

* 발병동기 - 이 노인분이 무슨 맘이 들었는지 다이어트 한다고

양방 다이어트 약 복용하고 (15일정도), 복부에 다이어트 주사 맞은 후에 발생했다고 합니다.

** 이 분은 태음인 한증으로 보입니다.

선생님께서 이분 두 따님은 태음인으로 판단해 주셨습니다. (아래 사진 참고)

이 분 어지러운 것은 신허인 듯 보입니다.

조위승청탕 가 천마 정도 쓰려다가 노인분들 어지러운 것은 예전 경험에도 신허랑 연관이 많아서 방향이 조금 틀린 듯하여 여쭙어 봅니다..^^ (그럼 한증이라서 신양허약을 써야 하나

요?) 처방과 변증에 대한 고견 부탁드립니다. 감사합니다.

<안준철> 태음인이 확실합니다. 09.09.16 20:06

<김상인> 감사합니다....태음인으로 치료해보겠습니다.

처방 방향은 어떻게 해야 될지 고민해 봐야겠습니다.

두통에 준해서 처방해도 될 것도 같고...한증이라서 신양허 처방쓰기는 저어합니다만....^^

ㄴ <안준철> 한증이면 신양허 처방이 적절해 보입니다.

양약의 damage로 원기가 손상된걸로 보는것이 맞겠습니다. 09.09.17 12:17

선생님의 지도대로 연세가 많으셔서 음형처방인 <연자보양탕에다가 천마 원지 석창포 2g> 처방했습니다. 거기다가 체질식까지 겸했습니다. 오늘 내원하셨는데 100% 깨끗하지는 않은데 많이 좋아지셔다고 합니다.

소화기 문제와 신허문제가 공존하는 태음인 현훈. 먼저 갈근조위탕으로 위장을 다스리고 다음에 신허를 다스리는 약을 장복한다.

- * 어지러울 때 메스거리고 토하고 싶은 증상은? → 없다. (담음 제외)
- * 스트레스 받을 때나 짜증 날 때 심하여 지나요? → 아니다. (간병 제외)
- * 소화 잘 되시나요? → 소화가 잘 되지 않고 자꾸 트림이 나고 껌껌 땀다 (오래되었음)
- * 무릎 아프시고 허리 아프신가요? → 허리 무릎 시큰댄다 (나일로 봐서 신허 가능성 있음)
- * 기타? → 귀가 자꾸 간지럽다 (신허), 정신이 자꾸 깜빡깜빡한다 (정부족)

상초쪽으로 땀이 굉장히 많이 난다.

남들은 다 춥다고 하는데 땀을 줄줄 흘려 남들이 쳐다볼 정도다.

여러 가지 질문 중에 이 분의 경우에는 소화기 문제와 신허 문제가 같이 가지고 있는 것 같습니다. 이럴 경우에는 소화기 문제를 먼저 해결을 하는 게 나을까요 (이른바 식적 현훈)

아니면 신허 문제를 먼저 해결하는 게 나을까요? 노인분들 신허로 인해서 소화 안 되시는 분들도 많다고 알고는 있습니다만..이른 바 명문화쇠 맞나요?..^^)

물론 무난하게 ‘갈근조위탕 + 산약 연자육 8 + 천마 감국’ 이렇게 갈수도 있습니다만...

항상 다른 노인분들도 고민되던 부분이라서 검사 검사 여쭙어 봅니다.

(안준철)

노인들의 경우 항상 신허가 있어서 보신하는 약은 평생 먹어도 좋습니다. 그러나 위장병은 증세가 있을 때만 씁니다. 그래서 위약을 먼저 써서 위를 고치고 보신하는 약을 장복한다고 생각하면 됩니다. 만약 증상이 가벼우면 미리 준비해둔 갈근조위탕 등을 3-4일 미리 쓰고 신허를 다스립니다.

태음인 메니에르 증후군(거담하는 약물이 많이 들어가있는 청심연자탕이 적당하다)

수개월전 갑자기 오른쪽 이통증이 생겼는데 이후 조금 호전되어 바람소리같은 이명과 난청이 있는 상태입니다. 그런데 그 뒤로 현훈이 심해지고 (2회 기절하시기도) 입맛이 없고 잘 체하며 속이 울렁거립니다. 대변도 묽어져서 하루 1, 2, 3회까지 보신다네요. 메니에르 증후군이 아닌 가 사료됩니다. 당뇨약과 알러지로 인한 가려움증 약을 거의 20년 가까이 드시고 있습니다. 두통, 피로가 심하나 심장증상은 없네요.
 예전 같으면 승청탕을 처방했을듯한데 커피 불면이 있어 열증으로 보입니다.
 메니에르에 반하백출천마탕이 특효란 말을 들었는데, 태음인약은 천마밖에 없네요.a
 거담하는 청심을 쓸지 갈조에 가감을 할지 고민됩니다.

하만종08.07.07. 18:00

후세방으론 자음건비탕을 잘쓰시는 원장님을 본 적이 있습니다. 이 또한 특효합니다.

안준철08.07.07. 18:59

현훈은 거담하는 약이 많이 들어가는 청심연자탕이 좋겠습니다. 위가 나빠서 중기를 보해야될 상황이면 갈근조위탕으로...

박주연

소양인 한분 이명 두통 있으셨던 분 류주열교수님 책에 있는 보간탕 계열 썼더니 한재 다 드시기 전에 소리 줄었다고 하시는 분 계셨어요~~ 숙지 16g 구기자 8g 구판 4g 등등 으로 되어 있는 처방 이드라구요~~

태음인 한자 사경증을 조위승청탕가 천마로 치료하다(권투선수)

태음인 한증 49세 남자

과거 권투선수출신으로 머리에 충격을 많이 받아서 사경증으로 10년전에 래원
 99년도에 조위승청탕에 천마1돈을 가해서 5제 연복 그동안 연락이 없었는데....오늘 보약을 드시겠다고 10년 만에 진료실에 들어오는데 고개를 똑바로 세우고 들어오십니다.
 전국에 침 잘 놓는 집은 다 찾아 다니면서 침을 무지하게 많이 맞았으나 조위승청탕 가미방으로 목이 굳어진 것이 눈 녹듯이 녹아버리는 느낌이 있던 후로 사경이 없어지고 고개가 바로섰다고 합니다. 10년 전의 실력으로 천마를 가했다는 것이 참 잘 했다는 생각이 듭니다.
 천마는 BBB를 뚫고 뇌로 진입해서 뇌순환을 개선합니다.
 10년 전 임상결과를 오늘 알게됐습니다. 재미있는 케이스라서 올려봤습니다.

태음인 열증 뇌좌상으로 인한 어지럼증과 시야 불투명 말 어눌해짐--> 중풍의 초기증으로 보아 간양화풍으로 봐야한다.

27세 남자. 군대에서 축구하다가 공을 머리에 맞고 넘어지면서 뒤쪽으로 두부 손상 받으셨다고 하심. 병원에 입원 하셔서 mri, ct 상에 출혈은 없다고 하심, 뇌좌상, 경추 염좌, 다발성 타박상, 진단 받으심. BP 128/ 66.....3주 정도 입원 하셔서 7월 10일에 퇴원하심
 7월 17일 금일 한의원 방문

- c/c 1. 어지럼증 걸을 때 휘청거림, 눈감고 서 있을 때 오른쪽으로 휘청거림 본인은 전체적으로 어지럽다고 함
2. 시야 불투명, 시력 1.2에서 0.5로 떨어 지셨다고함
3. 汗多
4. 말 어눌함, 초기에는 혀가 굳는 느낌 동반 했다고 하심

대변 3~4일에 한번 보시고 커피 불면 있으시고 해서 태음인 열증으로 진단했습니다.
 사진 찍으려고 했으나 찍는 등 마는 등 하시고 심하게 짜증내시며 불쾌해 하셔서 찍으려다 중도에 좌절당했습니다. ㅏ.ㅏ 체질은 어느 정도 감이 오는 데 처방을 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 두부 손상으로 봐서 어혈제 중심으로 써야 하는 건가요...??
 아님 석창포 같은 거담 시키는 약물 위주로 가야 하는 걸까요...??
 초보 한의사 문의 드립니다. 미리 감사 드립니다. ^^

안준철

뇌의 출혈이 없어도 어지럽고 휘청거리고 언어에 문제가 있으면 중풍의 초기증과 같습니다. 열증이면 간양화풍으로 봐야 됩니다. ==>넵!! 선생님^^ 보간탕 계열로 해보겠습니다. 감사드립니다

3. 코피

코피(소음인에 지유초, 태음인에 측백엽, 포황)

소음인 출혈성질환에 지유초가 가장 잘 듣는다. 태음인 지혈제에는 측백엽, 포황이 있다.

태음인한증 9세 여아의 코피 어지럼증 소화곤란 등의 증상에 태음조위탕가감방
 태음조위탕가 산약 연자육 각2돈, 갈근 승마 녹용 각1돈으로 좋아지다.

태음인 한증 소아의 코피를 태음조위탕가 갈근8 승마4 연자육6 측백엽(초)4g으로 호전시키다.
 연자육이 지혈작용에 좋다.

#. 10살 여자

#. 주소증 - 코피를 많이 쏟는다. 지혈하는데 20분~30분 정도 걸리고 일주일에 4회 정도

#. 대변 - 하루에 1번, 3~5분 내에 본다. 어릴 때부터 변비였던 적 한 번도 없다.보통 변

#. 감기 - 일년에 10번 이상 감기를 하고 주로 목이 아프거나 붓고 기침이 가래도 있다.

태음인인 듯 하나 입이 작은 것과 음식 반응과 진료실에서 하는 행동 시시비비를 가리는 성향 등이 걸립니다. 이런 경우 한열은 어떻게 되는지요? 애매합니다. 태음인으로 보면 한증, 소양인으로 보아도 한증 이렇습니까? 지도 부탁드립니다. 감사드립니다.

안준철

태음인이 확실합니다. 태음인의 경우 대변을 건너는 날이 없고(변비의 기왕력이 없음) 현재도 하루한번 이상 대변을 보고 빨리 보고 굳지 않으면 한증으로 봐도 좋습니다. 08.07.14 11:09
연자육이 지혈작용에 좋습니다.

--> 태음조위탕 + 갈근 8g 승마 4g 연자육 6g 측백엽(초) 4g

1제 먹고 완전히 코피 없어졌습니다. 다만 중간에 치킨 먹고 한 번 코피 터진 적 있다고 합니다. 역시 음식과 양생의 중요성을 다시 한 번 가르쳐 준 케이스였습니다.

4. 頭痛, 顔面痛

찬바람 쐬면 머리가 시리면서 두통 생기는 증상을 風寒으로 보고 가감갈근해기탕으로 해결하다.

47세 태음인 열자 여성

주소증:1.이상하게 조금만 찬바람을 쐬이면 머리가 시려서 견딜 수 없고 두통까지 생긴다.

통증이 너무 심각하다. 집안에서도 털모자를 쓰고 생활한다.

2. 무릎도 시려온다.

변증및 처방:이 정도로 시리다면 혈한증으로 보고 홍화통맥탕 15일 복용

결과:아무런 효과도 없다. 컴플레인 호소ㅠㅠ

다시 풍한증으로 변증해서 태음인 열자의 풍한에 쓰이는 가감갈근해기탕을 5일분 다시 처방

결과:머리의 모자를 벗고 생활할 수 있게 됐다. 시린증상 현저히 개선

고찰:차고 시리다고 무조건 혈한으로 볼 것이 아니고 찬바람을 쐬이면 더 심하다는 건 풍한증이라는 평범한 결론에 도달했습니다. 환자가 너무 좋아합니다. 여러 병원을 다닌 거 같습니다. 이런 건 정말 한약이 잘 듣는다고 싶습니다.

*** 진료부를 자세히 들여다보니 찬바람 쐬이면 두통 머리시림과 기침도 좀 난다고 적혀있습니다.(기침까지 있으면 더 확실히 풍한이 맞는 거지요) 처음에 실패하고 많은 교훈을 얻었습니다.

태음인 한자 안면신경통을 외감풍한으로 변증, 류씨한다열소탕처방으로 著效

태음인 한자입니다. 음형인지 양형인지는 커피 반응이 명확치 않아서 불분명합니다.
주소증은 좌측 관골부 통증과 시림입니다. 발병동기는 5일전에 집에 문을 열어놓고 잔 후에
발생했다고 합니다. 찬 바람을 쐬면 더 시림과 통증이 심해진다고 호소하십니다.
(예전에도 안면신경통으로 고생하신 분이 되셔서 놀라서 금방 오셨네요)
외감풍한으로 변증하였고 삼차신경통(안면신경통)을 참고 하였습니다.
상체쪽 증상이어서 양형처방인 류씨한다열소탕을 선택하고, 오공 전충 0.5g을 가했습니다. (몇
달 전에 위장 수술하신 분이어서 과량쓰면 위장장애가 걱정이 돼서 0.5g만)

그리고 온탕욕 계속 하라고 티칭했습니다. 약 드신지는 이틀 되었고 침은 5일째시네요.
현재 시린 증상은 없어졌고 찬 바람 쐬면 아픈 통증은 50% 가량 좋아지셨다고 합니다.
감기와 같은 것이라서 약 안 먹어도 호전 되었겠죠?...^^;; (물론 약 먹어서 더 호전 속도가 빨
랐을 거구요..) 이상 결과 보고 드리구요.....^^;;
궁금한 점이 있습니다. 이 분은 한자셨지만 열자의 경우에는 어떻게 방향을 잡아야 할지요?
변증은 외감풍한인데....그냥 외감 풍열로 보고 처방해도 될까요?
(처방할 때 한자라서 반가웠다는...ㅋㅋ)

풍한속폐 열자 처방 있잖아요? 가감갈근해기탕이든가...요거 잘듣는다는데...^^;;

**짜증 많이 내는 안면마비감환자를 간양상항으로 해석, 백자양간탕 거 산약 가 황금 천마 조구
등 백질려 처방해서 저효.**

63세 태음인 열증 여자환자입니다.
주소 : 우측안면마비감 및 안면경련(1년전부터 조금씩, 최근에 심해짐)
차증 : 두통약간, 이명가끔
커피불면
침치료 예닐곱번 정도에 차도가 없어, 약 권유
변증 중에 "요즘 이상하게 짜증이 잘난다.." 해서
백자양간탕 거 산약 가 황금, 천마, 조구등, 백질려(25첩 45팩)
자제분들이 홍삼자주 갖다준다해서, 다른사람 다 주라 강조했습니다(간양상항가감).
....침 맞으려 안 옵니다. 약만 한번 더 지어갔습니다. 감사합니다.끝입니다~

**61세. 태음여성 두통. 가슴답답 우울감 약간의 한열왕래 있으면서 소화상태 안 좋은 것을 간
비불화로 간주, 연자소간탕을 써서 두통 가슴답답 우울감 등의 증상이 소실되다.**

주소 두통(앞에 아팠다 옆에, 어떤 때는 정수리 화끈거릴 때도, 머리가 무겁게 느껴짐 많이 아
플 때는 끈으로 싸매고 싶다, 간혹 소화불량과 같이 올 때도 있다)
가슴답답, 우울, 추웠다 더웠다 약간 있음.

현병력 골다공증 심함.

수면 요즘 들어 밤에 잠 못 들 때가 자주 있다. 말뚱말뚱하다.

일단 대변 고려해서 한증으로 봤습니다.

첨엔 두통있을 때 소화불량도 같이 있는 경우가 있다고 해서 담음으로 인한 두통이 아닌가 했는데, 소화상태와 상관없이 두통이 올 때도 많고, 오심이나 구역감은 없다고 해서 배제 했습니다. 가슴답답함이나 우울감, 약간의 한열왕래가 있어서 기울로 보고 간과 관련이 있다고 생각하고, 소화상태가 좋지 않은데 식욕은 양호하다고하여 간비불화로 찍었습니다^^

그래서 연자소간탕을 원방그대로 처방했습니다. (20첩 120cc 30팩)

1제 드시고, 두통, 가슴답답, 우울감, 약간의 한열왕래 등 주소증이 모두 소실되었습니다.

그리고 더불어 소화도 잘 되시고, 소변 횟수가 줄고 야간소변도 1회로 줄었다고 합니다.

다만 잠이 못드는 건 여전하다고 하시네요. 연자소간탕 1제더 드시고, 골다공증 치료해보기로 했습니다. 감사합니다^^

태양인 안면경련 환자, 온갖 간 관련, 신양허 관련 처방 써 보았으나 아무런 반응도 보이지 않다.

산후요통으로 작년에 약 2제 써드렸던 분입니다. 한증으로 보고 썼으나 별효과는 없었습니다. 올 초에 과하게 신경을 쓴 후 1달간 불면증이 생긴 와중 감기에 걸리면서 우측 안하경련이 발생했습니다. 양약을 3, 4달 드시면서 없어졌는데, 4월말 다시 3, 4일 정도 잠을 못 주무시면서 재발했습니다. 같은 양약을 썼는데 이번에는 듣지 않는다고 합니다.

스트레스가 많고 스트레스에 더 심해졌습니다. 지금은 스트레스가 거의 없다고 합니다. 잠도 잘 주무시고 심계 등의 증상도 없습니다. 소화 잘되고 대변도 하루 한번씩 뽏니다.

간기울결로 보고 현호색소간탕 1제,

이후 風邪中面部絡脈으로 보고 야교등백강잠탕 가 백강잠1돈 썼습니다.

역시나 별효과 없습니다. 한 번도 좋아지게 해드린 적이 없어서 전투력 제로입니다. --:: 아무리 치료해도 전혀 여하간의 리액션이 없습니다. 한약에 길들여지지 않는 강철같은 몸을 타고나셨나 봅니다. 이 분 다녀가시면 인생이 막 허무해질라고 합니다. ㅏㅏ

우측 눈아래 계속 경련이 생기고 다크써클도 좀 진해졌으며 안면의 피로감도 느낍니다. 조언 부탁드립니다.ㅏㅏ

안준철 신경을 많이 쓰고 몸이 많이 상했으면 허증으로 봐야될 거 같습니다. 다크써클까지 생겼으면 신양허에 해당합니다.

신양허로 보고 충초보양탕 썼습니다. 똑같습니다.

평소 뒷목과 tmj에 만성적인 동통이 있고 두통, 안구 충혈도 잦습니다.

예전 공무원 하실 때 스트레스로 이를 악물고 사셨답니다. 지금은 스트레스가 전혀 없다고 합니다. 맥은 弦하게 느껴지지 않습니다.

간에서 해결볼 수밖에 없다는 생각이 들어 **간비불화**에 쓰는 당삼소간탕을 썼습니다.

당삼소간탕은 간기울결의 허증맥일때 쓰기도 합니다.

간기울결의 실증맥에 쓰는 현호색소간탕과 이 처방에서만 유일하게 조금 좋다는 표현을 하셨습니다. 쪼오금...더이상 방법을 찾기 어려워 찬 약을 좀더 적극적으로 써보고자

간음허에 쓰는 미후도 양간탕을 줬습니다.

이 약 받고서 가족끼리 휴가를 다녀왔습니다. 휴가가서는 평소 안 먹던 커피와 술(반잔쯤)을 오히려 먹었는데, 그 며칠 동안 좋아지더라고요. 눈 시림도 많이 좋아졌습니다.

휴가 끝나고 며칠 지나니 예전처럼 돌아가는데 그래도 예전보다는 좀 나은 것 같은 느낌이 듭니다. 간 약을 아무리 써도 휴가 한번 가는 것만 못하니 몸둘 바를 모르겠습니다.

이 때 그냥 포기하려고 했는데 마지막이다 생각하고 **간화상염**에 쓰는 용담청간탕을 처방했습니다. 똑같습니다. 똑같다는 말은 좋다 싫다가 전혀 없다는 뜻입니다.

이기 약인지 물인지 표시도 없더라는 말입니다. 니 왔나 소리도 안하더라 이 말입니다. ㅏㅏ

오늘 또 오셨길래, 윤원장님 한의원으로 보냈습니다. 잘 부탁드립니다. ㅏㅏ

ps) 오늘 맥을 보니 細脈이 확연하나 數하지는 않습니다.

간혈허증이 아닌가 짐작되지만 일반적인 혈허의 소견은 없습니다.

태음인 한증의 구안와사에 태음조위탕 가 갈근8, 승마, 백지, 천마, 조구등4, 전충1로 효과를 보다, 안면신경마비는 경추 혹은 상위흉추에 봉독을 활용한다.

06년 11월에 발생한 구안와사로 경희대한방병원에서 오래 치료,

07년 9월 8일 제가 처음 진료했습니다. 오래된 여드름이 턱 주변에 많고

소화불량, 대변후중, 피곤을 늘 호소한 환자입니다. 위경련 경력 2회.

초진에 쌍해산 가미 처방. 소화가 호전되고 얼굴에 굳은 부분이 풀리는듯한 느낌이 든다.

1. 쌍해산 가 백모근 8, 백강잠 6, 도인 4

2. 상동 가 어성초 4

3. 2번에 와송 6, 어성초4 추가

소화, 대변, 피곤이 개선되었습니다.

얼굴은 별로 차이가 없습니다.

11월 경 본 카페에 글을 올려 체질 문의. 태음인 열증으로 판단되어

갈근조위탕 가 승마4 처방. 약을 먹으면 속이 뒤집어지는 느낌이 나서 먹기가 너무 힘들다.
더 피곤해지고 자다가 소변도 한번씩 더 본다고..

태음인에서 답을 찾을 수밖에 없다고 직감, 이후 7제를 갈조에만 이리저리 가감했습니다.
한 번도 통쾌한 느낌이 든 적이 없고 소화, 대변, 피곤 등을 계속 호소하셨습니다.

그러던 어느날, 태음조위탕 가 갈근8, 승마, 백지, 천마, 조구등4, 전충1
복약 후 호전 양상을 보였고 대변은 여전히 이틀에 한 번 가늘고 후중기가 있어
대황 3푼 추가. 소화가 더 잘되고 가스도 많이 나온다.
놀라운 건 이 즈음 갑자기 여드름이 확연히 줄어들었습니다.

아, 한증이셨구나 ! 확신이 들어 용을 권하니 과거 경희대 교수님께서
용은 먹으면 안 된다고 해서 꺼리고 있다고. 상동 가 삼백초4, 분골2

저녁에 약 받아 1팩 드시고 어지러움이 심하고 구토, 허한.
익일 아침 다시 시도했으나 반 팩 먹다가 구토. 병원 검사에 위경련 진단.
저도 도무지 이해가 안 되서 괴로웠습니다. 상한 녹용이 아닌데 어찌 이런 일이...
고심 끝에 녹용에 체했다고밖에 이해가 안되서...심리적 저항선을 깨기 위해 EFT를 시술,
곧이어 한약을 한 팩 먹게 했습니다. 잘 먹었구요, 이틀 전부터 본격적으로 먹고 있는데
위장에 부담이 없고 드신 이후부터 피곤이 줄어드는 것 같다고 말씀하십니다.
저로선 참 이것저것 고생하고 많은 생각을 하게 한 케이스입니다.
시간이 많이 지난 와사를 시작하고 싶지 않았지만 환자가 적극적이셔서 치료한 게 여기까지
왔네요. 큰 줄기는 잡은 것 같으니 이제 처방을 다듬는데 주력을 해볼까 합니다.
혹시 조언해 주실 부분 있으면 부탁드립니다.

안준철08.08.09. 17:06
EFT가 뭔가요? 구안와사 오래 된 건 경추에 봉독쓰면 됩니다. 그래도 깨끗이 안 되면 상위흉
추에...구안와사가 경추병인거 같습니다.

박주연08.08.09. 23:33
류주열 교수님 책에 보면 구안와사, 오사 중에 풍에서 갈근해기탕에 천마 선택 그리고 더 있
어나...?? 여하튼 그렇게 가감한 처방을 본 듯합니다.

구안와사초기에는 외감에 준해서 표증약인 갈근승기탕을 2~3일 먼저 쓴다.

구안와사는 거의 한약으로 안 되는 듯.

오래된(2년) 구안와사는 한약으로는 거의 되지 않는 것 같습니다. 경추에 봉독 쓰는 것이 거의
유일한 방법인 것 같습니다.

태양인의 두통과 변증의 원칙에 대해(태양인의 담음두통에는 담음을 없애주는 미후도 적소두 백모근 문합 백강잠 양총피 교맥 모과 등을 응용한다)

변증은 병의 원인과 이유를 따져서 어떤 처방을 쓸 것인가 생각해 보는 것입니다. 무슨 처방을 쓸까? 생각해 보는 것이 변증입니다. 사실은 머리 곳에서 발끝까지의 증상을 다 찾아봐야 됩니다. 그리고 맥진이나 설진 등의 일정한 수준이 없이는 제대로 된 변증은 없습니다.

좌측 안와통이 있다면 이것이 외감인지 내상인지를 먼저 가려야 될 것입니다. 외감에 해당하고 풍에 해당하는 증상이 많이 있으면 거풍하는 약을 써야 할 것입니다. 내상이면 어떤 장부의 책임인지를 가리면 오장변증이 됩니다. 담음이나 어혈이 원인이면 음양기혈 진액 변증에 해당합니다. 상한론의 첫 조문은 맥부두항강통이오한으로 시작합니다. 이때 변증의 대전제는 맥부입니다. 이것으로 외감이라는 말도 됩니다. 동의보감에서도 이 처방을 쓸 것인가? 저 처방을 쓸 것인가? 감별의 기본은 맥입니다. 맥과증을 대조해서 사증종맥 또는 종증사맥합니다. 맥과 증을 대조하고 상호 모순 없이 맥과 증이 존재할 때 올바른 변증이 가능합니다.

이분은 증상으로는 담음이 원인으로 보여집니다. 태양인은 담음을 없애는 미후도 적소두 백모근 문합 백강잠 양총피 교맥 모과등을 응용합니다.

■ 기타(매핵기, 중이염, 인후 구강관련질환들....)

태음인 열자 양형의 매핵기의 원인을 역류성식도염으로 보고 간위울열증으로 해석, 갈근화위탕가감방으로 저효.

51세. 주부. 식당에서 일하다가 현재 전업 주부 (조선족인 것 같아요 말투가)

#. 주소증

- 목이 뭔가 끼여서 답답하다. 목에 뭐가 걸린 것 같고 뺄어지지 않는다. 가래는 없다.

(전형적인 매핵기 증상입니다)

: 이비인후과 검사 (정상), 내시경 (정상), 갑상선 검사 (이상 없음)

: 환자는 답답해서 죽고 검사에는 이상없고 내과 가니 역류성 식도염이라도 한 달치 양약 주더랍니다. 당근 그 계통인 줄 알았지만 환자가 좋아하는 것은 '화병'이라는 단어더군요.

살살 물어봤습니다.

뭐가 괴롭히는가요? 저희 아저씨가요.

아저씨가 어떤대요? 매일 술 먹구요 (ㅏㅏ) 사람이 콩해가지고 잔소리 엄청 심해요.

언제부터 그랬어요? 제가 중국에서 살다가 이 아저씨 두 번째 부인으로 왔는데요

살면서 잔소리가 심해졌어요... 전 성격이 걸걸 화통한편인데 잔소리 때문에 미치겠어요..

#. 계통 문진

얼굴에 열이 확확 올라와요. 심계(+) 불안(+)

이분은 체질은 태음인 열자 양형으로 보고 변증은 간위울열증으로 봤습니다.

=> 갈근화위탕 (유근피 비파염 6g으로 증량) + 패모 황금 4g + 산조인(생) 4g.....스트레스와 기울 해소를 위해서 가미

위와 같이 처방하고 아저씨한테 가서 내가 이렇게 이렇게 아프니까 병원에서 협조하라고 했다고 큰 소리 좀 치라고 했습니다..^^;; 오늘 왔습니다.

#. 목에 걸리는 증상

- 50% 호전. 목 전체에 걸려 있었는데 목 뒤로 간 느낌이 난다.

목에 걸리는 느낌이 밥 먹고 나면 더하고, 밥 안먹으면 더 시원해진다.

목이 자주 타는 느낌이고 물이 자주 먹고 싶다. 입이 쓰거나 마르지는 않다.

목에서 자주 냄새가 난다.

#. 식욕이 엄청 땡겼는데 약 먹고 배가 별로 안고파요.

#. 머리카락은 여전히 많이 빠진다고 합니다.

#. 소화는 그럭저럭 되고 대변은 잘 본다고 하고 소변도 시원하다고 합니다.

#. 상열감 없어졌습니다. 얼굴이 붉었는데 붉은 기운도 많이 없습니다.

무엇보다도 피부에 오돌도돌하게 나는 것이 없어져서 좋아합니다.

설건 설통 농설에 사삼양심탕 거 호박 가 여정실 저실자 상심자 지부자 1봉. 혀가 헐거나 구내염 등은 모두 심화가 원인. 열증이면 심음허나 심화항염에 해당. 음허하면 여정실 주증, 혈허하면 단삼으로 보혈한다.

가끔 오셔서 침 맞으시던 73세 할머니

설건 설통 농설 5년

음식무미, 소화 과식 안 해서 양호 전에 가끔 체함

대변 1일 1회 똥글똥글, 소변 자주

추위타고 더위 안탐. 감기 잘걸리고 기침 잘함

오후커피 불면

태음인 열자로 봄, 혀가 마른 거니까 심음허+ 연세가 있으시니까 신음허 쪽으로 봄

사삼양심탕 거 호박 가 여정자 저실자 상심자 지부자 1돈 20첩 30봉 1일 3회

1제 드시고 오셨는데 본인 느낌에 30% 정도 좋아졌다고 하시네요.

좀 더 좋아지면 올릴라다가 안 오실지도 모르니 잇기 전에 올려봅니다.

이상 허접 임상례였습니다. 아직 한의원에 디카가 없어서 사진은 못찍었습니다. 죄송합니다.

휴대폰 들이대기도 그래서...

[안준철](#) 09.12.08. 18:28

혀가 헐거나 구내염 등은 거의 심화가 원인입니다. 열증이면 심음허나 심화항염에 해당합니

다. 잘 변증하신 것 같습니다. 음허하면 여정실 주증으로.. 혈허하면 단삼으로 보혈합니다.(혈허하면 심계가 생깁니다.)

태음인 입이 쓰고 가끔 허끝이 얼얼한 환자분에게 갈근조위탕가 산약 연자육 각2, 승마1로 구고, 혀 얼얼이 거의 없어지다. .

만61세 남성, 2001년 뇌경색. 현재후유증은 없음.
중풍 염려되어 mri 혈액검사하였으나 별무이상.
식욕 보통 소화 보통, 커피불면은 없음.
대변 거의 매일 보지만 변비성향, 변비약 복용,
소변 2시간당1회, 야간3-4회 봤으나, 전립선약 먹고 1-2회로 줄었음
싸우나 거의안함. 땀빼고 기운빠지진 않음.

태음인 열증으로 보이는데, 확인차 올립니다.
이분 갈조에 산약 연자육 2 황금승마 1 가미해서 써도 될까요?

안준철

코가 발달한 태음인으로 보여집니다.(열증) 소화력이 약하면 황금은 주의해서 써야 됩니다. 위열을 사해서 식욕부진이나 복통도 발생될 수 있습니다.

이분한테 갈조에 산약 연자육 각2 승마1 처방했습니다.
입이 쓴 것은 없어졌고, 혀가 얼얼한 것도 거의 없어졌습니다.(밤에 틀니 뺏을 때 2-30분정도 얼얼) 그런데 이분이 많이 예민하셔서 그런지, 약을 먹고 얼굴에 열감이 1시간 반 정도 있다고 호소하십니다. 승마 때문인 거 같은데, 제가 보기엔 넘어가도 되는 증상인데, 계속 컴플레인을 하십니다. 거 해결하려면 황금을 가해야 할까요? 황금은 예전에 다른 분한테서 싸이드 난적이 있어서 조심스럽네요. 가뜰이나 예민하신 분이이라...경험 있으신 분들 가르침 부탁드립니다

소양인 한자 중이염에 형방패독산 가 지모 치자 박하 연교 황련 석고 등을 쓰다.

10년 이상 된 중이염~ CC 귀속이 가렵고 쭈시고 아프다 침 삼키려고 해도 아프다 고막 터지는 소리도 난다. 멍~하기도하고 예전에 물이차서 10년 이비인후과 치료무효.... 다른 한의원에서 한약으로 조금호전... 감기 후 또다시 재발 괴롭다. 소양인 한증 53세 여환입니다. 처방 조언부탁 드립니다. 소화불량 대변1일 2~3회 무른편(설사 잦음)

선생님: 임상결과방에서 중이염 검색해보세요. 만성이면 독활지황탕에 가미하는 방법도 있습니다. 진주종도 잘 치료된 예가 있습니다.

葺원장: 안선생님 처방 중에 골라 써보시면 될 듯 한데요. 형방패독산 加 지모2돈, 치자, 박

하, 연교, 황련, 석고1돈

감기증상도 같이 치료해달라 해서... 패독산 까지모 연교 황련 인동 박하 석고 1돈
2제 복용중.... 진료중 아프다고 귀를 만지는 게 없어짐 아직 가려움 약간 남음
2번째 약 지을 때.... 첫 번 째 그대로 지어달라고 함. 감사합니다.

--> 그러나 결과가 아름답지 못하게 끝났다고....

소음인의 인후통에는 삼계팔물탕과 독삼관계이중탕을 써야 한다.

참고로 소음인 열증의 인통에 삼계팔물탕으로 효과를 보다.

(안) 한증 인통은 독삼관계이중탕입니다. 삼계팔물탕과 독삼관계이중탕이 없으면 소음인 인후
통은 해결안됩니다. 항생제에도 반응하지 않습니다.

태음인 이명에 갈근조위탕가 승마 대황 황금 석창포 각 한 돈으로 유효하다.

대변은 이틀에 1회 보는데 힘이 많이 들고 후중이 심합니다.
식후비만 있습니다. 아저씨가 술을 많이 드셔서 스트레스가 많은 것 같아요.
그럴 때면 두통이 잘 생기고 이후로 이명도 생겼습니다.
드디어 또 만나네, 이명. 아주머니의 증언에 의하면 생선은 괜찮은데 육류를 먹으면 소변이
탁해진답니다. 그래도 목욕은 태음인 같죠?

갈근조위탕 가 승마, 대황 1돈, 녹용, 감국 5푼 썼습니다.

아니나 다를까 아무 차도가 없었습니다. --;;

안되겠다 싶어 몰래 공부를 좀 했습니다.ㅋㅋ;;

갈근조위탕 가 승마, 대황, 황금, 석창포 1돈 썼습니다.

이명처방에 황금, 석창포를 주요하게 쓰는 처방이 많더군요.

그래서 고심끝에..ㅋㅋ...

그런데 이 처방 한 1주 드시고 이명증이 많이 좋아진 것 같다고 하셨습니다.

이명처방해서 좋아진 것 같다는 말은 처음 들어봐서

부끄럽지만 신기해서 올려봅니다. ^^;; 이 분도 한 제 더 드시라니깐 안 오시네...--;

**태음인 비문증. 비문증은 정부족이므로 보신, 보정하는 약물을 쓴다. 태음인에게 감국이 도움
이 된다.**

동의보감에서 비문증은 정부족으로 봅니다. 보신, 보정하는 약물을 씁니다. 감국이 도움이 됩
니다. 감국은 간에 작용해서 거풍하면서 장복하면 보음합니다. 비문증은 약을 장복해야 하고

음식을 가려야 하고 잠을 충분히 자야 합니다. 최소한 7~8시간

태음인 안구건조 및 눈물과다에 상황보음탕 가 산조인 백자인으로 약간의 效. 상열감과 이명이 그대로. 백질려 염초 조구등 염초 등 거풍하는 약을 검토한다. 극침도 좋음

상황보음탕가 산조인 백자인으로 눈 까끌거리는 것은 덜 한데, 눈물은 여전히 많이 난다. 상열감 호전. 이명은 그대로.

--> 백질려 염초, 조구등 염초등 거풍하는 약을 가해보세요. 극침도 좋습니다. 결막염, 아폴로 눈병, 안구건조, 안피로, 눈 가려움증에 다 듣는다.

소양인의 목의 이물감은 독활지황탕만으로도 호전가능. 결명자로 변을 통하게 해준다.

변비가 있으면 결명자를 써서 변을 통하게 해주고 목의 이물감이 주소증이라면 독활지황탕만으로도 좋아질 수 있습니다.

목소리가 쉬는 것은 腎病이다. 한증이면 신양허증에 해당

목소리의 문은 肺이고 목소리의 뿌리는 腎입니다. 신허하면 목소리가 잘 쉬고 허쓰키하게 됩니다. 한증이면 신양허증에 해당합니다.

태음인 열증의 돌발성 난청에 간음허, 간양상향을 고려.

현훈, 사지저림, 복진시 압통, 소화기증상

(안) 열증이면 간음허증을 지나 간양상향에 해당됩니다.

태음인열증 인후통에 갈근승기탕

설사가 나고 나면 열이 다 빠졌다고 생각하면 된다. 대항으로 리열이 다 제거되면 인후통은 낫는다.

소양인의 피로 이명. 신음허로 보고 구판보음탕 가 지모 황백 한 돈. 열이 위로 뜨면 별갑도 쓴다.

주소: 피로, 이명, 얼굴에 자주 열이 오르고 손발이 뜨거움, 양기저하

신음허에 쓰는 구판보음탕에 지모 황백 한 돈씩 가해서 써보면 좋겠습니다. 동물성 약재가 들어가야 신속합니다. 열이 위로 뜨면 별갑도 씁니다.

딸국질은 하기 해울 청열. 태음조위탕가 갈근 승마 울금 청호 대항.

딸국질은 기가 내려가지 못하고 역상해서 생기는 문제라고 생각됩니다. 하기하고 해울 청열하

면 좋겠습니다. 태음조위탕에 갈근 승마 울금 청호를 가해서 쓰면 좋겠습니다. 대항도 3푼 정도 가하면 이담 청열 하기합니다

소양인 여자의 이명. 열증 53세. 신허이므로 보간신하는 약을 쓴다. 지골피, 구기자, 산수유활용.

여자환자의 이명은 신허가 가장 많습니다. 특히 갱년기 이후의 이명은 신허가 더욱 많습니다. 보간신하는 약을 써야겠습니다. 간신허에는 지골피 구기자 산수유를 응용합니다

■ 소화기질환(위장, 대장 질환들...)

1. 위장, 소장 및 식욕부진 관련

소양인 속쓰림 위산통 치료에 모려분(열자), 오적골(한자)

- 소양인

속이 쓰리면 여하튼 제산제를 투여해야 한다. 제산제는 칼슘이 최고다.

소양인 약 중에 제산제 제일 좋은 것은 오적골과 모려분이다.

오적골은 성질이 따뜻하므로 소양인 寒者에게는 2돈까지 쓰고, 모려분은 5分 정도 같이 사용한다. (위장에 염증이 같이 발생하니까 모려분을 같이 넣어 염증을 살짝 꺼준다)

모려분은 성질이 차므로 소양인 熱者에게 2돈까지, 오적골은 5分~1돈까지 사용한다.

cf. 태양인 : 진주모

위열과 위음허의 감별

<선생님 말씀>

★ 脾病과 胃病의 구분 - 복통 유무

★ 胃熱과 胃陰虛

* 위열 - 배가 자주 고프면 위장증상이 나타남

* 위음허는 밥 먹기 싫은데 공복에 쓰리거나 아프고 먹으면 편해짐. 식욕항진은 없음.

----- 아래 정리 참고 -----

** cf** 아래 표는 제가 만들었습니다. 내용 중에 오류나 잘못된 부분은 전적으로 제 책임입니다.

虛證					實證				
변증	특징 증상	설명	원문		변증	특징 증상	설명	원문	
① 寒者 胃氣虛證	위가 은근히 아프고 살살 만져주면 통증이 덜하고 허증이라 음식 먹으면 증상이 덜 아픔 (공복에 vs 실증은 더 아픔 음식 생각이 없고 토하고 트림	기허증 + 위장증상 * 위장 증상은 반드시 속이 아파야 한다. 은근하거나, 쓰러지거나, 우리하거나, 아리거나, 화끈하거나... vs 비병 - 아픈 증상 없음	[胃脘隱痛(按之痛減), 不思飲食, 嘔吐呃逆, 消化不良, 食入即吐, 痛有定時, 喜熱喜按, 少氣懶言, 語聲低微, 面色萎黃, 舌質淡, 苔薄白, 脈虛弱]		③ 胃寒證	위가 갑자기 심하게 아프다 실증이면서 냉통 손도 못대게 아파다. 따뜻하게 하면 좀 낫다. 구토가 반드시 있고, 얼건 물을 포함 추위 타고 손발 차고	돌발상황이고 급하고 격렬하게 온다. 월 잘못먹어서 급하게.. * 참고 임상례 http://cafe.daum.net/an4sang/JuyY/45	[胃脘冷痛, 嘔吐呃逆, 嘔吐清水, 喜熱食, 面白少華, 畏寒怕冷, 手足冷, 脘痛拒按, 舌質淡, 苔白, 脈遲緩或弦緩]	
	태음인-태음조위탕거마황가산약흑사당, 건울보위탕 소양인-맥아보위탕 태양인-당삼보위탕 소음인-황기보위탕	태음인-마황정통탕 或 태음조위탕가해백, 유씨태음조위탕 소양인-맥아보위탕가독활선모 태양인-교맥관장탕 소음인-이씨곽향정기산				속이 화끈거리면서 아프다. 따갑다. 쓰리다. 음식을 많이 먹는다. 자주 배가 고프다. 입냄새가 나고 변비 음식 먹으면 한 번씩 구토. 변열 목마르고...	※ 속이 아프다. 쓰리다. 화끈거리다... 등등 그러면 寒者면 위기허증 熱者면 허증이 면 위음허 실증 이면 위열	[胃脘灼痛, 多食善飢, 口臭, 便秘, 牙齦腫痛出血, 食入即吐, 渴喜冷飲, 吞酸, 身熱, 煩渴, 舌質紅, 苔]	
② 熱者 胃陰虛證	위가 아프고 배는 고포데 먹고 싶지 않고 목이 건조하고, 변비 열이 한번씩 오르고 설질이 매끈 (심하면 경면설)	위장증상은 위기허증과 같은데 寒者면 위기허증이 되고, 熱者면 위음허증	[食慾不振, 食少, 胃脘虛痞, 胃脘疼痛, 乾嘔, 飢而不食, 口乾咽燥, 大便秘結, 尋煩潮熱, 舌質光紅無苔(鏡面]		④ 胃熱證				

			舌), 舌紅 少苔, 舌 乾少津, 脈細數]				黃厚, 脈 洪大或 滑數]
		태음인-맥문동양위탕, 백합양이탕 소양인-생지황양위탕 태양인-석곡양이탕 소음인-작약양비탕				태음인-갈근청위탕, 유근피청위탕或건울 청위탕 소양인-황련청장탕 태양인-미후도청위탕 소음인-인진청위탕	

위장도 감기걸린다.(태음조위탕에 마황이 들어가는 이유, 생냉지물에 상한 경우)

날씨가 차서 피부가 냉해지면 외감병에 걸리게 됩니다.

이때는 피부를 열어주는 해표약을 씁니다.

음식을 차게 먹어도 위가 차져서 위점막을 닫아버리게 됩니다.(生冷之物에 상했다는 말이 바로 이것입니다. 위가 감기걸렸다고 생각해도 됩니다. 요즘에는 아이스크림 찬맥주 등이 여기에 해당합니다.) 생냉지물에 상한 경우에 쓰는 처방은 후세방에서 인삼양위탕 불환금정기산 곽향정기산 등의 표리를 겸치하는 약을 씁니다. 즉 표에서는 해표하면서 陽明裏腑에서는 따뜻하게 합니다. 이것은 傷寒陰症과도 관계됩니다.(외감이지만 열이 없고 오히려 차가워지는 상황을 상한음증이라고 함). 태음조위탕에서 건울은 소음인의 백출처럼 조습하고 의이인은 소양인의 백복령처럼 건비이수합니다.

그런데 마황은 외감약이 분명한데 왜 위장약에 들어가게 되었을까? 이런 의문에 봉착하게 됩니다. 생냉지물에 상한 胃를 다스리기 위해서 태음인에게는 곽향 소엽보다 마황이 훨씬 더 효율적입니다.(즉 감기걸려서 표면을 막아버린 위를 풀어주는데 마황이 태음인에게는 가장 좋은 약미가 됩니다.) 만약 생냉지물에 상하지 않고 과식으로 인한 위장병이면 마황이 필요없어 보입니다.(이때는 위장이 감기걸린 것이 아니고 음식의 양이 지나치게 많아서 문제가 되므로 해표작용이 필요없는 신곡 등과 같은 소도지제가 들어가야 됩니다.)

태음조위탕의 주치증에 퇴각무력이라는 말이 나오는데 이것에 대해서도 살펴보겠습니다.

생냉지물이나 식적에 의해서 비위에 한습이 머무르게 되고 이것은 시간이 지남에 따라서 한습이 습열로 변하게 됩니다. 습열은 아래로 내려와서 다리에 퇴각무력을 이르게 됩니다.(동의보감에서 濕熱成痿라고 하였습니다.)

밥이나 술을 많이 먹게 되면 비위에서 습열이 발생되고 그것이 下注해서 퇴각무력을 이르게 됩니다. 동무 이재마는 후학들이 동의보감은 기본으로 다 이해한다는 전제하에서 STORY를 전개하고 있습니다.

소음인열자의 식욕부진에 십이미관중탕으로 효과를 보다.

식욕부진이 심하면 열자의 경우도 관중탕으로 효과가 난다(적백하수오 양강을 거하고 인삼을 가한다). 일단 식욕부진을 해결하고 다른 증상을 배려하도록...

소음인 위장장애에 백출건비탕

스트레스 태음인 변비 부종 현훈 알려지성비염 복부가스에 산조인소간탕가 대황 목통 삼백초 행인 패모 갈근으로 저효.

- 남편 자식에게 화가 많이 난다.
- 복부비만 항강
- 심한 변비, 얼굴부종
- 현훈, 누워있으면 천정이 빙빙 돈다.
- ** 산조인소간탕가 대황 목통 삼백초 행인 패모 갈근으로 제반증상 호전. 가스 빠지고 대변 좋아지고 얼굴의 부종 소실...항강 있어서 갈근, 목이 답답하고 알려지성 비염있어서 패모 행인 가함

태음인 한자의 酒傷에 태음조위탕가 대황5푼, 갈근 울금 청호로 탁효

태음인 한자 술꾼들에게 태음조위탕에 대황 5푼 가서 썼는데 속이 그렇게 편하고 술도 잘 깬다고 합니다. 검붉은 피부도 좋아지고 간수치도 정상으로 떨어지네요.

(갈근 울금 청호와 함께 가했습니다.)

대황이 식적 담음 어혈을 다 해결하는 정말 명약입니다

이용양 원장님으로 부터 동의보감을 배워보셔서 잘 아시겠지만 뱃속의 문제는 전부 식적 담음 어혈입니다. 이 3가지가 해결되면 끝입니다. 식적 담음 어혈 특히 오래된 병은 더 그렇습니다. 오래되면 모두 어혈을 끼고 담음이 생깁니다.

식적도 마찬가지입니다. 매우 매우 완전 중요(안준철)

태음인 역류성 식도염에 길경죽여탕가감방으로 탁효.

흉통 심함. 위허기역증으로 변증 길경죽여탕 거 오미자 원지 가 건울3돈/산약 유근피 백령을 추가로 가함. 야채 이파리 음식 먹으면 통증생겼지만 2주 복용하고 나서는 매우 좋아짐.

복통, 미식, 혈변에 燥傷胃에 쓰는 백합양위탕가 백령(지통, 지혈작용)

1. 67세 여자할머니 복통 속이 미식거리고 껌껌대고 대변에 혈변이 나온다
2. 백합양위탕가 백령 보름치로 속 많이 편해지고 대변 정상 되었다 함. 오심구역이 심하고

통증이 있어서 위병증으로 봄. 위음허증. 백렴은 지통 지혈 작용.
3. 백합양위탕은 燥傷胃

태양인 설사, 역류성식도염을 류씨미후도식장탕으로 급한 설사를 먼저 잡다

25세 대학생

#. 주소증 - 1. 설사 (하루에 3~5번. 1개월전)
2. 역류성 식도염 (올초부터 위가 좋지 않아서 속이 쓰리고 신물이 자주 올라옴)

<안준철> 체형으로 봐서 태양인이 맞는 것 같습니다.

설사의 원인을 찾아서 원인을 해결한다고 생각해야 되겠습니다.

설사가 급한 병입니다. 역류성 식도염은 치료시간이 더 많이 걸리고 음식도 더 오래 가려야 됩니다. 일반적으로 태양인이면 류씨미후도식장탕이 태음병 설사에 잘 듣습니다.

류씨미후도식장탕 원방 그대로 처방했습니다.

물론 철저히게 제질식 시켰습니다. 대학생인데 도시락 싸 다니라구 했어요...ㅋㅋ.....

약 복용 4일째인데 설사 한 번도 없고 약간 묽은 변 수준으로 호전 되었습니다.

현재는 하루에 2번 정도 음식물이 올라오는 증상만 있다고 합니다.

소음인 위하수 위무력 만성설사에 백출건비탕으로 저효. 백출건비탕의 핵심은 계내금. 계내금은 위액분비촉진, 위무력, 위 연동운동 촉진의 최고의 약이다.

소음인 한증 68세 여성

평소에 소화불량과 만성설사로 몇 십 년째 제대로 못 드시고 체중이 30KG 정도 되시는 여자 분입니다. 과거에 12미관중탕을 여러 번 썼었습니다. 12미관중탕은 소화에는 도움이 되지만 항상 속쓰림이 문제였습니다.(소화는 잘되나 속 쓰린 부작용이 발생)

하수오와 양강이 태양인약으로 밝혀지고 난 후에 하수오와 양강을 빼고 써보았습시다만 속쓰림은 덜하지만 만족스럽지 못했습니다.

이번에는 위무력과 위하수를 비기허증으로 보고 백출건비탕을 썼습니다.

이번에는 정말로 좋다는 말이 나오는군요. 음식을 마음껏 드실 수 있다고 합니다. 그리고 설사도 없어졌다고 합니다.(현재 8제째 복용 중) 체중도 회복되고 있습니다.

백출건비탕의 핵심은 계내금(초)에 있습니다.

계내금은 위액분비촉진 위무력 위의 연동운동 촉진에 최고의 약입니다.(윤원장님께서 AK에서 말씀하시는 위산부족증에 최고의 약입니다.) 원래 치아가 없는 동물의 내장은 소화력이 탁월하다고 합니다.

계내금의 효능

1. 위액분비촉진, 위액의 산도를 증가시킨다.
2. 위 운동능력 강화
3. 담석 및 신장 요로결석의 배출과 치료(후세방에서 금전초 울금과 함께 쓴다. 금전초 울금 계내금 이 세가지를 三金湯이라고도 함)

소음인 위무력에는 계내금(초)이 최고의 약입니다. 계내금은 위무력의 성약입니다.

속쓰림에 계내금을 쓰지 않아야 하는지 궁금합니다. (위 산도를 높이니)

--> 안준철


쓰리거나 아픈 통증 위주면 비병증이 아니고 위병증입니다. 위병증 중에서 한증이면서 음식이 들어가면 편해진다고 하면 허증입니다. 이때는 계내금을 쓸 수 있습니다. 이 경우는 위산이 부족해서 소화가 안 돼서 속쓰림이 발생하는 경우라고 이해하시면 됩니다.

열증은 위산부족증이 없다고 생각하면 됩니다. 그래서 한증에 해당하는 비기허 위기허에 계내금을 씁니다. 열증의 비음허나 위음허에는 쓰이지 않는다고 생각하면 됩니다. 즉 한증에만 쓰입니다. 동물성 약제가 강력합니다. 동물성 약제에 관심을 더 가져야될것 같습니다. 녹각 녹용 구판 별갑 아교주 계내금 전충 오공...

태음인 담즙역류성 위염(분노의 역류)에 갈근조위탕으로 저효.

위액이 산성인 반면 담즙은 알칼리성입니다. 십이지장에서 담즙이 분비되는데 이게 위로 역류되어 위염을 일으키는 것이 담즙 역류성 위염(Bile reflux gastritis)입니다.


위의 구조를 자세히 살펴보면 다음과 같습니다.



이 그림에서 보듯이 위는 아래위로 강한 근육층에 의해 꼭 조여져 있죠.

식도하부 괄약부(lower esophageal sphincter)는 위의 내용물이 식도로 역류되지 못하게 막아주며 여기 문제가 생겼을 때 역류성 식도염이 됩니다.

유문 괄약부(pyloric sphincter)는 십이지장 이하의 내용물이 위로 역류되지 못하도록 막아줍니다. 그런데 어떤 원인에 의해 유문 괄약부가 꼭 닫혀있지 못하고 열려있다면 십이지장의 내용물이 위로 역류가 됩니다.



담즙 역류(bile reflux)에 대한 모식도

실제로 담즙역류의 사진을 보면 위 안에 녹색으로 번져있음을 볼 수 있어요.



이러한 담즙 역류의 원인에 대해서 양방에서는 여러가지 설이 있으나 아직 정확하게는 밝혀져 있지 않은 것으로 보입니다.

<동의보감>에도 담즙역류와 비슷한 병리가 있는데, 담이 결단하지 못하고 성급하게 성질을 내면 기가 거슬러 올라가 담즙이 위로 넘쳐난다고 합니다. 이때 구고증이 흔히 발생합니다. 담즙은 엄청 쓰잖아요. 熊膽, 안 드셔보셨으면 말씀을 마세요~ 臥薪嘗膽도 담즙에 관한 고사성어이죠.ㅋ

한방에서 간담(건담아님다^^;;)의 병리는 늘 위로 치받는 게 문제가 되죠. 성질 곱게 쓰면 위로 치받칠 일 없습니다.

사상의학적으로 이해해보면 태음인이 노심초사하고 성질을 불뚝불뚝 내면 담즙 역시 분노의 역류를 하게 됩니다. 이외 잘못된 음식과 섭생 또한 유문부를 악화시켜 담즙 역류의 빌미를 제공하는 것으로 생각됩니다.

평소 생선, 회, 돼지, 생야채를 드시면 설사하신다는 태음인 여환이 담즙역류성 위염 진단을 받고 와서 갈근조위탕을 처방했는데 굉장히 좋다고 합니다.

음식에 민감한 편이나 커피는 전혀 위장장애가 생기지 않는다고도 하네요.

이처럼 담즙역류성 위염에 갈근조위탕이 매우 양호한 효과를 발휘하여 이에 보고하는 바입니다.ㅋ

<결론>

1. 담즙역류는 분노의 역류이다.
2. 식이섭생이 매우 중요하다.
3. 태음인 담즙역류성 위염에 갈근조위탕이 유효하다.

(윤승일 원장)

정원장님이 양한방 통합타이틀 치르시네요 이제는 ㅋㅋ. 사족을 붙이자면 위산의 부족이 오히려 이런 문제를 일으킨다는 것도 꼭 기억해두세요. 영양학적으로 B6와 아연 부족이 담즙분노의 역류도 일으키고요 이 두 가지 영양소 부족하면 위산도 잘 안 나오면서 담즙이 땀땀역할을 할려고 기를 씁니다요 ...

안준철09.04.06. 15:26

성질이 나서 찹찹거릴때 기관지가 열리는건 예외라고 생각하면 되나요? 공격적인 상태는 산소가 많이 필요해서 아무래도 열려야 맞겠죠?

윤승일

기관지로 가는 혈관은 열 받고 교감흥분하면 좁혀지지만 기관지는 오히려 넓어집니다요. 그래서 천식일 때 코에다 뿌리는 것들이 다 스테로이드로 교감흥분시켜 기관지 확장시킵니다

비염있는 태음인 한자 소화불량, 복냉에 태음조위탕가감방, 의이인건비탕 가 길경 마황 녹용

14세 태음인 여자입니다. 소화가 잘 안되고 손발이 차고 추위를 탄다고 합니다.
가끔 미식거리고 복통도 있고 멀미도 하며 배가 찬 느낌도 자주 있습니다.
후비루가 늘 느껴집니다. 태음조위탕증으로 보고 태음조위탕 가 갈근8g, 승마4g, 녹용2g 처방했습니다. 상기증상과 간혹 있던 면적 증상도 없어졌습니다. 코는 비슷한 것 같다고 합니다.
류썸 처방을 써보고 싶어 만성비염의 비기허증으로 보고
의이인건비탕 가 길경, 마황 2g, 녹용1,2g 써봤습니다.
속도 편하고 잘 지내고 뒤로만 넘어가던 코가 좀 뻗어지는 느낌이라고 합니다.

이후 친구 때문에 스트레스 받고 때마침 조개국을 먹고 설사를 하면서
다시 초기증상이 좀 나타났습니다. 태음조위탕 가 갈근, 승마 처방했습니다.
곧 회복될 것으로 생각합니다.

소음인 위암환자의 장관출혈로 인한 대변흑색 빈혈 어지럼증, 수혈에 간헐히 처방인 당귀보간탕 가 홍삼1돈으로 제반증상 호전례, 위장관내 출혈로 인한 빈혈에는 비불통혈 처방이 better

85세 할아버지. 소음열증, 고혈압 부정맥약 장기 복용. 2년 전부터 대변흑색 빈혈로 혈관이형성증 및 장관출혈 진단받음. 뇌경색치료제 아스피린이 원인일 가능성. 어지럼증. 한 달에 한 번씩 수혈. 위암1기 진단.
소음인의 간헐히 처방 당귀보간탕 가 홍삼 1돈.
--> 어지럼증완화, 빈혈개선. 몇 개월간 수혈 받은 적 없고 수치상으로도 정상으로 나옴. 변비개선.
(안) 위장관내 출혈로 인한 빈혈에는 비불통혈 처방이 더 좋습니다.

역류성식도염, 소화기장애, 수족 붓는 증상에 갈근조위탕가 유근피 승마. 소화는 좋아졌으나 설사 복통 수족부기가 해결되지 않다--> 한증으로 보고 태음조위탕 증 의이인5돈으로(去皮 안하고), 가 갈근 승마(후증), 삼백초(이수삼습)

41세 태음인여성

1. 스트레스로 인한 소화기 장애 (시댁과 아들 스트레스 엄청)
역류성 식도염도 있어서 공복에 속이 쓰리다. (양약 먹다가 현재는 중단)
2. 수면 중에 아랫배가 뻥뻥해지면서, 소변이 마려우면서 깨는데 가면 안시원하다.
손발도 붓는 느낌.
(날קות이 심함/ 밤에 많이 아픔)
통증이 만성적이고 피곤하고 기운이 없고 손발이 열이 나고 입과 목이 건조하다.
쉽게 피곤하고 기운이 없고 화가 나고 가슴이 답답하고.

태음인 열자로 보고

= 갈근조위탕 (대황은 1.2g) + 유근피 승마4g (체질식 + 하루에 당근2개)
처방했습니다. 약을 먹고 목에 뭐가 걸리는 느낌은 없어졌고 소화는 잘 된다고 합니다.
그런데 약을 먹는 중간에 계속 배가 살살 아팠으며 설사를 계속 했다고 합니다.

그런데 밤에 소변 보는 증상과 손발 아침에 많이 붓는 증상은 호전이 없다고 합니다.

濕 = 食積' 뭐 이렇게 보고 위장을 해결하면 끝날 것 같은 증상이 호전이 없으니 당황스럽네요. 체질은 태음인이 맞는 거 같은데 변증이 틀린 것인가요?

야간 소변과 수족 부종을 해결하려면腎병증으로 보고 약을 써야 할까요?

(아님 간을 쪽인가요?...한열왕래 구고 인건 짜증 증상 별로 없습니다)

주소로 호소하는 증상 중에 허리 목 아픈 것도 있습니다.

--> 안선생

대항 반응이나 대변 상태로 봐서 한증으로 보는 것이 좋겠습니다. 한증도 장이 나빠지면 대변을 오래 보고 후증이 있을 수 있습니다. 한증의 부종은 역시 의이인이 가장 중요합니다.(만약 태음조위탕을 쓴다면 대변후중 때문에 갈근 승마를 가해서 양명경의 열을 내립니다. 그리고 의이인을 5돈으로 증량합니다.) 이수삼습하는 삼백초도 함께 쓰는 것이 좋겠습니다. 이때 의이인은 피가 있는 상태로 씁니다. 거피한 의이인은 이수작용이 약합니다. 모든 약물은 껍질(피)에 이뇨작용이 많습니다. 복령피 대복피 상백피 지골피....사령오피산을 생각하면 좋겠습니다. 그래서 비만 부종 등에는 의이인을 반드시 껍질이 있는 상태로 씁니다. 위장병등 다른 경우에도 껍질이 있는 상태로 써도 아무 문제 없습니다. 결론은 의이인은 거피하지 않은 걸 그냥 쓰면 됩니다.

태음인이 쌀막걸리 먹고 생긴 미칠듯한 구갈은 음허로 해석해서 보간신하는 약을 끝까지 쓴다. 오미자는 蒸해서 2배로 구갈이 없어질 때까지 쓴다. 청열하는 청호를 가할 수 있다. 술은 음혈을 모손한다.

갈근조위탕 가 황금, 죽여, 노근, 비파엽 한 돈씩 가해서 45팩(25첩) 복용시켰습니다. 수시로 드시는 물은 허깨나무만 끓인 물로 드시게 했구요. 약 드시는 동안 불편한 것은 없었고, 대변도 거의 변화없으셨다 합니다. 짝끔 좋아지셨다 하는데, 성에는 많이 안 차시는 듯 하구요. 처방에 변화가 필요할 듯한데, 목통, 유근피, 삼백초등을 추가해서 쓰는 것과 해독탕을 처방하는 것 등이 우선 떠오릅니다. 어떤 식으로 접근하는게 좋을까요?

답)

술은 음혈을 모손합니다. 결과적으로 음허해졌습니다. 특히 태음인인 쌀막걸리를 많이 먹었으면 말할 것도 없겠습니다. 당뇨병 검사상 정상으로 나와도 이 상태는 소갈에 준해서 약을 씁니다. 보간신하는 약을 끝까지 씁니다. 이때 오미자(증,보음한다.)가 가장 중요한데 2배로 증량해서 씁니다. 구갈이 없어질 때까지 오미자를 씁니다. 청열하는 청호를 가할 수 있습니다.

태양인 식후 체한 느낌. 구역질, 이체. 양치 때의 구역질을 류씨미후도식장탕과 교맥관장탕으로 다스린다. 구역의 원인은 담음인데 비위의 약으로 담음은 저절로 없어진다(교맥관장탕).

소화장애. (미란성 위염), 밥 먹고 나면 항상 체한 느낌이고 구역질이 올라오는 느낌. 자주 체함. 양치질할 때 구역질. 이 분은 태양인 한증으로 보여 미후도식장탕 쓰려고 생각 중입니다.

<안준철> 태양인으로 보여집니다. 미후도 식장탕은 열증약입니다. 류씨미후도식장탕이나 교맥

관장탕이 더 적절해 보입니다.

(학생) 이 분에게 류씨미호도식장탕 가 곡아 현호색 4g 해서 한 달 반 정도 처방하였습니다.

(곡아 현호색은 소간산에서 힌트를 얻어서 간기를 다스려 준다는 생각으로 첨가했습니다)

물론 체질식도 같이 검했습니다. 밖에서 식사를 많이 사먹는 관계로 100% 체질식은 불가능했지만 그 중에서도 골라 먹게 티칭하였습니다. 현재 70% 정도 호전이 되었습니다.

지금 제일 불편한 증상은 아침에 양치질을 할 때 자꾸 구역질이 올라온다고 합니다.

이걸 어떻게 변증하고 첨가해야 될 약은 어떤 것이 있을까요?

아니면 처음에 선생님이 지도해 주신 처방 중 하나인 교맥관장탕으로 바꾸어야 할까요?

(안)

구역의 원인은 주로 담음입니다. 담화가 원인인 경우도 있습니다.(이때는 청열약을 가합니다.

사심탕의 경우가 이것입니다) 담음의 원인은 비위의 허약입니다. 비위의 약을 잘 쓰면 담음은 저절로 없어집니다. 교맥은 하기하는 작용도 있습니다. 교맥관장탕이 적절해 보입니다.

스트레스로 인한 식욕부진은 간비불화. 속쓰림이나 위의 통증이 있으면 위음허.

위의 통증이나 속쓰림이 없으면 비음허증이 맞습니다(속쓰림이나 위의 통증이 있으면 위음허증입니다). 스트레스로 인한 식욕부진이니 간비불화를 고려하는 좋겠습니다.

(간)비, (간)위는 복통이나 속쓰림으로 판단하는데 한 가지 더 팁이 있다면 (간)비는 변이 무르고 (간)위는 변이 단단한 경향이 있다는 것입니다.

태음인한증 위용종은 위한증. 炒用 의이인이 용종에 특효.

한증이면 우선 위한증에 쓰는 약을 써 봐도 되겠습니다. 용종에 의이인이 특효약입니다. 의이인을 꼭 써야됩니다.(초해서)

갈근조위탕으로 미식거리면 비음허증.

(안) 미식거리는 것은 비음허증입니다.

많이 먹지 못해 핏 어지럽고 갇박거리면 기운없으면 저혈압. 간혈허약으로 빈혈기를 회복하고 다음에 비위병증을 본다. 일단 피가 회복됨.

15년전 자궁수술, 갱년기로 갱년기약 복용중. 3년만에 내원. 많이 먹지 못해 핏 어지럽고 갇박갇박 기운 없음. 한열왕래. 저혈압

(안) 간혈허약을 먼저 쓰시고 빈혈기가 회복되면 그 다음 약을 생각하며 됩니다(비위병증). 피가 가야 뭔가 회복됩니다.

[소음인] 한증 구역 오심 흉민. 두드러기 비염증상(십이미관중탕 거 적백하수오 양강 지실 가 지각 한 돈, 인삼 황기. 속쓰림 심하면 오령지 加)

한증 비염 처방을 써서 효과 본 사람 인데요. 소화가 잘 안되고, 밥 먹으면 오심 구역감이 느껴지고, 가슴도 답답하다고 합니다. (양방에서는 역류성 식도염) 가끔 두드러기도 나고요. 오심 구역 흉민 등은 비염처방으로 반응이 없는데, 관중탕에다 지각 ... 등을 가미해야 할까요? 가르침 부탁드립니다^^

안준철

12미 관중탕에 지실을 빼고 지각을 1돈 쓰시고 인삼 황기를 가해야합니다. 이때는 황기가 가장 중요합니다. (생기작용,새살을 돋게합니다.) 속쓰림이 심하면 오령지를 초해서 쓰기도 합니다. 후세방 수점산==>(현호색 몰약 초과 오령지)과 관련지어 생각하면 됩니다. 적백하수오 양강은 태양인 약이므로 거합니다.

酒傷은 食傷에 준한다. 식상의 습열, 담음 등과 같은 방식으로 접근.

저도 술을 참 좋아하지만...^^;; 주변에도 술 자주 드시는 분 많으신 듯 합니다. 예전에 후세방 쓸 때는 보통 이런 분들 보중익기탕 중주방, 갈화해성탕, 방풍통성산, 대금음자 등등 이렇게 써 왔는데요, 체질적으로는 어떻게 변증을 해야 하고 처방을 해야 하는지요? 새로 쓴 사상의학책에 간경습열증 있던데 간경습열에 준해서 처방을 하면 되는지요? 문득 아침에 출근하다가 생각나서 고견 여쭙어 봅니다.

안준철

주상은 식상에 준합니다. 식상의 습열 담음 등과 같은 방식으로 접근합니다.

김상인

넵...감사합니다. 아무래도 간경습열은 용담사간탕증을 말하는 것이겠죠..^^;;

위병과 비병의 구분의 판단기준. 쓰리거나 아프면 위병, 더부룩하거나 소화 안되거나 기운이 쳐지면 비병. 비병 중에서 비양허증과 한습곤비증에는 통증이 있는데 이 경우는 따뜻하게 하면 통증이 경감된다.

39세된 태양인 여자환자분입니다

주소증이 심와부가 통증이 심하고 오심, 답답한 증상입니다

하나 더 추가하자면 최근에 변비가 심해서 3-4일씩 못 보신 적도 있다고 하십니다

전체적으로 기운이 없고 쉬 피로해지시고요...

심와부 통증이 오면 양방 병원 가서 처치를 해야 할 정도로 심하게 온다고 합니다

통증 양상을 물어보니 쓰리면서 아픈 게 아니라 그냥 심하게 아프다고 합니다

이런 경우(酸痛이나 氣吞酸이 없는 경우)에도 肝氣犯胃로 볼 수 있나요? 평소 스트레스는 좀 받으신다고 합니다. 胃氣虛로 보기에는 통증 양상이 좀 강해보여서요...

아니면 다른 적절한 변증이 있을까요?

(요즘 새로 쓴 사상의학에서 처방을 골라서 종종 써보는데요 변증하는게 만만치 않네요 선생님!! 빨리 강의해주세요^^)

윤승일

영양학적으로요 당근 스트레스 부신장애 틀림없습니다. 호흡이 잘 안 되는 거고요 위산부족일 가능성 더 높고요 확실히 할려면 헬리콥터균 피검사 확인해야 하는데 있을 가능성 높습니다. 그렇다고 우리의 치료가 바뀌는 거 아니고요. 소양인인 경우 알로가 좋은데 태양인은 모가 조을지 몰것네요. 잠 일찍자고 술 담배 커피 콜라 사이다 탄수화물 피하면 일단 도움되요

안준철

이 정도로 통증의 강도가 강하면 위한증으로 봅니다. 미식거리고 구역감이 동반되는 것이 특징입니다. 비위는 한냉이 극심하면 그만큼 통증도 커진다고 생각하시면 됩니다. 태양인의 경우 교맥관장탕이 위한증에 해당하는 처방입니다. 위양을 도와야 하는 경우라고 생각하면 됩니다. (양강으로 위한을 몰아냅니다.)

위한증은 윤승일 원장님이 말씀하시는 위산부족과 일맥상통한다고 여겨집니다. 소양인 한증의 경우 위산부족으로 복부에 가스가 많이 차게 되는데....이때 위산을 분비시키고 위한을 몰아내는 독활지황탕을 쓰게 됩니다. 결국 독활지황탕도 위한을 몰아내는 처방이 됩니다. (독활이 한습을 몰아낸다는 점을 잘 이해해야 되겠습니다.)

상대적으로 열증은 위한증이 생기지 않습니다. 즉 열증은 위산부족이 없고 오히려 위산이 지나친 위열증이 나타나서 속이 화끈거리고...식욕이 항진되면서 허기가 잘 지는 증상이 발생합니다. 여기에서도 소증의 한열이 중요하다는 사실을 알 수 있습니다.

간기범위와 구분점은 간기범위는 신경 쓰면 더 아프고 신경쓰지 않으면 통증이 완화된다는 사실입니다.(스트레스가 통증의 유발인자가 됩니다. 통증이 수시로 왔다갔다 합니다.) 이에 반해서 위한증은 스트레스와 무관하고 음식의 생냉지물에 의해서 돌발적이고 급작스러우면서 구역 구토가 동반되면서 손도 대지 못하는 상황입니다.(拒按)

전창환

잘 알겠습니다 이제는 잘 구분이 됩니다^^ 늦은 시간 조언 주신 안선생님 감사합니다!! 윤원장님도 정말 감사합니다!! 부신스트레스장애로도 컨셉을 잡아보겠습니다

안준철

한기가 성할수록 통증이 심하다는 사실을 꼭 기억해야 됩니다.寒勝即痛!

대체로 위병은 통증이 있고 비병은 통증이 없지만 비양허증이나 한습곤비증의 경우에는 통증이 있게 되는데 배를 따뜻하게 해주면 통증이 줄어드는 특징을 가지고 있습니다. 대체로 비병은 더부룩한 상태 무기력한 소화불량의 상태이고 통증은 없습니다.(예외로 비양허증과 한습곤비증은 통증이 있습니다. 이것이 바로 따뜻하게 해주면 없어지는 통증입니다.) 이에 반해 위병

은 쓰리다 아프다 등 통증이 있습니다.

위병은 무조건 아프다고 생각하시고 비병은 통증은 없고 소화불량, 더부룩한 증상, 식후도 포감, 식욕부진, 사지근권이 위주라고 생각하시면 됩니다. 통증이 있는 증상은 비병이 아니고 위병인데 단 한가지 예외의 경우는 배를 따뜻하게 해주면 통증이 약해지는 경우입니다.==>비양허 또는 한습곤비증이라는 사실을 이해하시면 됩니다.(비가 냉해지거나 한습의 침습을 받은 경우입니다. 寒勝即痛) 비병증에서 통증이 나타나는 경우는 한으로 인한 경우뿐입니다.

※ 배가 고플 때 속이 더 쓰리다. 밥을 먹으면 속이 덜 쓰리다. 밥을 먹으면 덜 아프다. 밥을 먹으면 더 아프다.==> 전부 위증상입니다. 왜냐하면 통증이 있기 때문입니다. ※ 쓰리거나 아프지 않고 소화가 안 된다. 쓰리거나 아프지 않고 밥 먹은 후에 졸린다. 쓰리거나 아프지 않고 밥먹기 싫다.==>비증상입니다. 위증상이 아닙니다.

하만종

선생님, '위열병' 같은 경우는 아프다고 표현하는 경우가 없다고 봐야 하는지요? 아님 아플 수는 있되, '위한증'과 병증상 감별점은 어떻게 잡아야 하는지요? (소증의 한열감별이 애매한 경우가 있어 여쭙어 봅니다.)

안준철

위열증은 소증이 열증에만 나타나고....위한증은 소증이 한증인 경우에만 나타나므로 소증의 한열을 가리면 구분에 문제가 되지 않습니다. 만약 소증의 한열이 애매하고 증상으로도 구분이 어렵다면 다음과 같은 요령이 있습니다.

위열증은 식욕항진이 가장 큰 특징입니다. 그리고 속이 화끈거린다. 위 구강 항문의 작열감...즉 속이 화끈거린다는 증상이 있을 수 있습니다. 허기가 잘 지면서 탄산(쓴물이 올라옴) 등의 증상이 있어서 속이 쓰릴 수 있다고 봅니다. 속 쓰린 것도 통증이고 위병증입니다. 그리고 열증이라서 구갈 음냉 구취 변비 설질홍 등이 동반됩니다.

위한증의 가장 큰 특징은 물론 소증이 한증이고 오심 구토가 반듯이 동반합니다. 통증의 강도가 너무 강해서 손대지 못할 정도로 아프게 됩니다. 돌발적이고 실증성 통증입니다. 수족이 싸늘해지고 식은땀이 흐르면서 응급실로 가야할 정도의 급증입니다.(오심구토가 반듯이 동반된다는 사실이 위한증의 핵심입니다.)

2. 대장관련질환

1) 변비

변비의 원인별 체질별 처방정리

오늘 변비 정리는 오늘 한줄메모장에 글 올리신 윤승일 원장님 글을 계기로 이루어졌습니다.

선생님 덕분에 오늘 변비에 대해서 공부 좀 했습니다...^^....

변증	증상	치법	치방			
			태음인	소양인	태양인	소음인
實熱 변비	대변이 마르고 굳으며, 소변이 적거나 붉고, 배가 창만해지고 아프다. 입안이 마르고 입에서 악취가 난다. 설질이 붉고 설태는 黃膩하다.	清熱 潤腸	갈근양비탕 가 대황 사삼양비탕 가 대황	천화분양비탕 중용 석고	석곡양비탕 용 연 조 미 후 도 16g 석곡 4g	작약양비탕 가 후박 빈랑
氣滯 변비	대변이 굳고 잘 배출되지 않으며 트림이 나고 옆구리와 배가 창만해지고 음식량이 감소된다. 설태는 白膩하다.	順氣 導滯	갈근소간탕 가 대황 선조인소간탕 가 대황	시호소간탕 가 석고	현호색소간탕 중용 적하수오 가 도인	향부자소간탕 가 복향 빈랑
氣虛 변비	대변 보는 것이 곤란하나 대변이 그다지 굳지는 않다. 얼굴이 희끄무레하고 정신이 피곤하고 기운 없고 숨차다. 설질이 淡하다.	益氣 健脾	의이인건비탕 용 의이인초 4g 가 호도육	홍맥건비탕 가 숙지황	교맥건비탕 거 백편두 모 과 용 교맥 12g	황기보위탕 거 계지 중용 황기
血虛 변비	대변이 굳고 얼굴색이 창백하고 윤기가 없고 어지럽고 心悸 설질은 淡하다.	養血 潤燥	단삼보간탕 가 마자인 승마 대호아 2g	생지황보간탕 거 택사 복령 가 과루인	백모근보가탕 가 도인泥 (泥 -갈아서)	당귀보간탕 가 지실 빈랑
陽虛 변비	대변 보는 것이 곤란하고 소변이 맑고 많으며 사지가 차고 배가 아픈데 따뜻하게 하면 덜하다. (*변비 - 頭燥尾滑)	溫陽 通便	호도육보신탕 거 산약 가 쇄양 마자인 승마	토사자보양탕 중용 숙지황	충초보양탕 가 회우슬 8g	홍삼보양탕 거 부자 건강 중용 당귀 가 지실
식이 요법			푸른 주스 (자두) 함초	결명자 동규자 (소량 사용 / 노인 금지)	현미 번데기	사과 참깨

역쉬! 정리 잘 하셨습니다. ㅋ소음인의 변비에는 흑호마(참깨)를 가해서 쓰기도 합니다. 평소 식이용법에 응용해도 됩니다. 사과도 소음인 변비에 도움됩니다.

함초가 태음인 변비개선

안준철

함초 - 태음인. 환으로 많이 먹음. 당뇨수치도 내림. **변비 개선**. (다시마는 일시적인 변비 개선이나 함초의 경우는 지속력이 있음) 함초는 남해안에서 주로 생산됩니다. 바닷물이 빠지고 난 후에 수확 합니다

정용재

독한 변비 환자 한 분 계신데, 배 먹고 나선 매일 잘 보신답니다.

이 분은 푸룬이고 다시마환이고 청국장이고 전혀 안 듣데요.

함초, 푸룬, 배 중에 하나 선택하시라고 하세요.ㅋ

하만중

아, 그렇군요. 서양자두랑 둘 중에 선택하시라 하면 되겠네요~ 감사합니다.

소양인 변비나 대변이 안 시원할 때 동규자차를 권할만하다.

물론 체질식은 하고 있습니다만...결명자를 차로 달여서 계속 먹으라고 할까요?

ㄴ 안준철 09.12.04 14:31

동규자차!!! 동규자가 소양인약입니다. 동규자차는 설사를 주의해야되는 사하제입니다. 소량에서 시작합니다.

소양인의 변비에는 신음허로 접근한다. 변비로 인한 하복부의 가스는 寒者라는 판단의 근거가 되지 못한다. 식사직후 30분 혹은 1시간후 상복부가 불러와야 한증.

변비가 있는 소양인 열증 할머니. 평소에 배에 가스가 잘 차는지 확인하는데..가스가 잘 찬다고 해서 쉽게 소양인 한증 신양허에 쓰이는 토사자보양탕 가미방을 썼습니다.

3일분을 드시고 나서 맥홍삭 피부가림증 불면이 생기고 변비가 더 심해졌습니다.

오늘 자세히 다시 살펴보았습니다. 변비로 인한 하복부의 가스 차는 걸 말하는 거였습니다.

70살이 넘고 귀도 어둡고 문진의 의도를 잘 파악 못해서 서로 의사소통이 잘 안된 거 였습니다. 한증의 상복부 가스는 식사 직후보다 30분이나 1시간 정도 후에 상복부가 더 불러오는 증상입니다. 변비가 있는 소양인은 더욱 주의해야 되겠습니다. 신음허약으로 새로 다려야 됩니다

신양허의 토사자보양탕으로 발시림, 변비, 골다공증, 요슬통이 좋아지다.

신장이 좋아지면 골다공증도 없어지나요?

발이 여름에도 시리고 무릎 허리가 아픈 할머니에게 신양허에 쓰이는 토사자보양탕을 썼더니 주소증도 좋아지고 **변비도 해결되고** 골다공증이 심했는데 골밀도가 완전 정상이라고 합니다.

부신기능이 좋아지면 칼슘흡수 능력이 증가되는가 싶습니다.

아드레날 콤플렉스도 순전히 보신하는 약인데 장복하면 골다공증이 좋아지는지요?

상당히 재미있는 케이스라서 윤원장님께 여쭙봅니다.骨屬腎~~

소양인환자의 변비에 독활지황탕가감방으로 가도 되냐는 질문에 대하여--> 한증이고 소변이

시원찮으면 신양허증. 결명자는 간열을 사하고 윤장시켜 배변을 좋게 한다. 동규자는 사하작용이 있어 노인에게는 곤란

• 이세희 09.01.06 12:38

82세 남환 소양인 한자 CC 변비(3~4일 1회) 과거에 전립선 소변이 시원치 않았다 지금은 심하진 않다.... 독지 +인동 연교2돈 황련 치자1 동규자 결명자2 정도 괜찮을까요

↳ 안준철 09.01.06 16:38

한증이고 소변이 시원하지 않으면 신양허로 봐집니다.

그리고 결명자는 간열을 사하고 윤장 시켜서 배변을 좋게 합니다.

지절통이 있으면 연교가 좋겠습니다.

동규자는 사하작용이 있어서 노인에게 곤란합니다.

소양인 간기울결 간화상황에서의 변비에 독활지황탕 가 결명자3돈으로 쉽게 해결되다.

• 권현우 08.10.25 09:38

소양인 변비에 대해 질문드립니다.

전에 선생님께서 소양인 변비에 인동 연교로 부족하다. 차라리 결명자를 쓰는 게 낫다라고 열핏 들은 것 같습니다. 소양인 한증 아가씨가 얼굴의 화농성 여드름으로 왔는데 대변도 2일에 한번보고 소화도 잘 안 되고 해서 독지에 인동 연교 4그램 시호 박하 치자 황련 각2그램 썼었는데 소화 약간 좋아졌을 뿐 대변이고 여드름도 조금밖에 안 좋아졌네요.

이제는 변비에 인동연교를 아예 쓰지 말고 결명자만 넣어야 할까요? 용량은 얼마쯤으로 잡으시는지요? 혹은 결명자가 더 잘 우러나게 갈아서 쓰면 어떨까요? 소양인 한증의 여드름에는 처방을 어떻게 구성하시는지요?

↳ 안준철 08.10.25 12:21

결명자는 간과 관련된 변비에 잘 듣습니다.

평소 독활지황탕을 쓰던 소양인의 악성 변비가 결명자 3돈으로 쉽게 해결되네요.

그동안 황련 치자 연교 등의 청열약을 아무리 가해도 호전은 보이지만 깨끗이 해결되지 않던 변비가 결명자를 쓰니까 설사에 가까운 변을 보게 됩니다.

변이 너무 묽어서 하루에 2개만 먹으면 안 되냐고 전화가 왔습니다.

이 변비는 심화가 문제가 아니라 간화가 원인이었다는 걸 말하고 있습니다.(간기울결)

이분의 변비의 원인은 남편의 사업실패로 인한 간기울결이 원인이었습니다. 심화가 아니었습니다. 물론 불면 등의 심화 증상도 겸하고 있기는 합니다만..... 참조하시기 바랍니다. 간화를 사하는 결명자

태양인 혈허변비에 백모근보간탕가 도인3돈으로 대박내다. 태양인 변비에 현미만으로도 도움이 된다. 변대기도 굿. 다른 체질의 보간탕도 변비에 좋을 듯.

• 윤승일 10-03-10 15:08

태양인 변비 - 혈허 변비로 두 케이스 있었습니다.

한 30대 아가씨 원장님 가르쳐 주신대로 백모근보간탕에 도인3돈 수년 만에 대박였답니다.

연로하신 어르신 태양인 변비 역시 백모근보간탕에 도인3돈 두 첵 먹는데 설사가 찢찢나서 더 이상 못드시고 계시답니다. 태음인 단삼보간탕 소양인 생지황보간탕 소음인 당귀보간탕 또한 변비 좋으리라고 기대해보면서 안원장님 감사합니다~

↳ 안준철 15:46

현비 번데기도 좋다고 꼭 알려드리세요. 설사까지는 드문 경우 같습니다.

노인에게는 윤장하는 도인 3돈이 좀 많아 보이기도 합니다. 후세방 도인승기탕을 함께 생각하시면 더 좋겠습니다. 태양인은 현미만 먹어도 변비 잘 해결되네요.

상당히 심한 변비였는데 쌀 70%에 현미 30% 정도만 ?어서 밥을 했는데 완전히 해결되네요. 번데기 안 먹고도...ㅋ

자두가 변비에 좋다.

plum(생 자두), prune (말린 자두)

태음인 변비에 좋다는 말씀에 도움 많이 받습니다. 영양학적 참고사항입니다.

페놀(PHENOL)이 들어있는 프룬과 플럼은 항산화제 능력이 강한데 그걸 측정하는 것이 ORAC으로 과일중 가장 높은 수치입니다. 활성산소 잡아먹는 능력이 탁월하기에 염증이나 스트레스 등을 억제하는 효과 강합니다.

자두속 포타슘(바나나에도 많이 들어있음)은 당연히 심혈관과 골격에 도움을 주며 특히 혈압을 낮춘다. 원래 플럼은 당분이 제일 적은 과일이기 때문에 혈당조절 못하는 스트레스 환자들에게 권하는 과일로서 당조절에도 도움을 준다

플럼의 화이버(INSOLUBLE)는 대장에서 짧은 지방산인 butyric acid, propionic acid를 발생시켜(장내 좋은 박테리아 자극하면 거기서 이 플럼 속 화이버를 자극시켜서) 장의 연동운동, 배변효과, 장정화에 탁월하다.

장내 가장 중요한 짧은지방산 short chain fatty acid가 butyric acid인데 이것이 부족한 경우가 상당히 많습니다. 많은 환자에게서, 이게 부족하면 배 아프고 속이 더부룩하고 변비 설사 등등 문제가 오면서 신경정신장애도 많이 옵니다. 자폐 환자들 소변 유기산 검사를 해보면 뷰티릭산도 알게 되는데 대부분 모자랍니다. 결국 장이 안좋으면 뇌가 안좋다는 결과가 나옵니다. 옥살레이트가 좀 있어서 칼슘 잡아먹기 때문에 신장결석인 경우 조심할 것.

태음인 약이라고 하시니 태음인 열증에 훌륭한 것 같습니다. 아주 감사드립니다 땡쓰!

(안)

윤승일 원장님의 글입니다. 너무 중요한 내용입니다. 꼭 알아야되는 내용입니다. 태음인 변비는 자두 하나로도 어느 정도 해결됩니다.

소양인 열증의 변비. 쥐 나는데 천화분양비탕가 구기자

구고 구건 대변이 토끼똥처럼 매우 불편. 팔다리 쥐 남
천화분양비탕 가 구기자(쥐나는데 도움되라고)
--> 변 잘 보고 구건 구고 덜 하며, 쥐도 덜 남.
천화분양비탕은 비음허, 대장진휴증에 해당

심한 변비에 사삼양비탕가감방 활용(燥傷大腸證, 大腸津虧證)

53세 태음인열증 여자. 대변을 언제 봤는지도 모르겠다 말할 정도로 심한 변비
갈근조위탕으로 변화 없음.
사삼양비탕거 용안육 가 당고특대황2돈 감국 포공영 보름치. 사하작용에 초점을 두고자 용안
육 거하고 감국 포공영은 이담작용 위해 가함.
사삼양비탕은 燥傷大腸證, 大腸津虧證

변비가 있는 노인환자에게는 신음허에 쓰이는 보음탕에 대황을 가미한다.

태음인이 대변을 매일 못 보면 외감과 내상을 불문하고 대황을 쓸 수 있습니다. 대황을 외감
에 쓰면 신속히 열을 내립니다. 내상에 대황을 쓰면 식적 담음 어혈에 듣습니다. 대변을 매일
못 보는 태음인 노인에게 신음허에 쓰이는 보음탕에 대황을 흔히 가미 합니다. 변을 매일 보
게 해줘야 됩니다.

태음인변비에는 윤장하는 마자인(추말). 양명경의 열을 사하는 승마 대황을 가할 수 있다.

갈근조위탕의 대황으로도 변이 시원치 않은 경우에는 행인 마자인 해송자 등으로 윤장.
(안)이 경우에는 무조건 대황으로 사하시키는 것보다는 행인 마자인 해송자(잣) 등으로 윤장하
는 것이 좋습니다. 특히 행인은 윤장하면서 살균작용까지 있어서 여드름에 효과적입니다.

창백하고 월경량 적으면 혈허변비로 당귀보간탕가 지실 빈랑 각 1돈(소음인)
관중탕을 먹고 식욕항진이나 속쓰림이 없었으면 일단 소음인으로 볼 수 있습니다. 혈색이 창
백하고 빈혈기가 있고 월경량이 적으면 혈허 변비입니다. 류샘 처방중에 당귀보간탕으로 보혈
합니다.(지실 빈랑을 1돈씩 가해서 하기 시킵니다.)

소음인의 변비에는 하기하는 목향 지각이 위주가 됩니다. 당귀나 흑호마(검은깨)를 윤장할
목적으로 쓰기도 합니다.

2) 설사

헛배불러하는 소양인의 복통 설사에 형방지황탕가 목단피로 著效

소양인 한자 72세의 할아버지.

주소증: 여름철만 되면 배가 아프고 설사한다. 배에 가스도 많이 찬다.

처방: 형방지황탕가 목단피 1돈(설사만 하면 형방지황원방을 쓰지만 복통과 헛배 부른 증상이 있어서 독활지황탕의 목단피를 끌어와 가미했습니다. 목단피는 식월에 쓰이는 약입니다.

결과: 대만족입니다. 복통 설사 헛배 부른 증상 모두 소실됐습니다. 오늘 한재 더 지어갔습니다.

고찰: 특별히 어려운 케이스는 아니지만 환자의 만족도가 너무 높아서 평범한 임상예를 올려 봤습니다. 수세보원의 신한 복통 설사 그대로입니다.

형방지황탕은 최고의 명방입니다. 숙지황 산수유로 보음하면서 설사를 멎게하는 소양인에게 완벽에 가까운 처방입니다.

구토 설사 등의 증상을 보이는 태음인 열설에 갈근라복자탕으로 저효(소양인은 열자 저령차전자탕, 한자는 활석고삼탕, 소음인의 경우, 태음병에 쓰이는 백하오이중탕 혹은 백하오부자이중탕 활용가능)

유명한 영화배우 여자입니다. 오랜 스트레스와 피로 상태에서 식사가 왔습니다

체중 몇킬로 빠지고요. 안원장님 여쭙어봤더니 바로 갈근나복자탕 가르쳐 주셨습니다

이틀 후에 90% 쾌차해서 이분은 저에게 증말증말 감사합니다 란 말을 연발하셨습니다

증말 감사합니다 안원장님~

자세한 처방 설명도 좀 해주세요~다른 체질이 이런 경우에도 좀 부탁드립니다 ㅋㅋ

(안)

수세보원에 나오는 갈근라복자탕은 熱泄에 쓰이는 처방입니다. 과거에 어린이들의 로타바이러스 등으로 인한 설사에 탁월한 효과가 있었습니다. 물론 어느 정도 열이 동반되는 경우에 쓰입니다. 소양인 같으면 열자는 저령차전자탕...한자는 활석고삼탕을 쓸 상황입니다. 소음인이 라면 태음병에 쓰이는 백하오이중탕이나 백하오부자이중탕입니다.

설사하는 치매할머니를 대장허한증의 연자육양비탕 5일분으로 설사를 멈추게 하다

태음인이 대소변 정액 등의 아래로 새면 연자육입니다.

위의 할머니의 불면-담미심규증(창포천마탕) 처방례

위의 치매 할머니 연자육양장탕에 이어, 심비양허 처방 연자양혈탕10일치 투여한 후, 태음인 담미심규증처방 <창포천마탕 보름치> 처방했습니다.

죽력액은 할머니가 깜빡깜빡하시니까, 뺐구요..

어쨌든 오늘 오셨는데, 요즘은 밤에 잠을 좀 주무신다하네요.

밤이면 밤마다 '할머니의 어머니'가 나타났었는데, 요즘은 얼굴본지 오래됐다 하십니다.

여전히 울증기미는 보이십니다. 항상 10대때 사셨던 이야기하며, '친구없다..' '난 남들이랑 싸우기 싫다..' 등등 할매특유의 반복적 코멘트 계속 있으십니다.. 어지럼증 호소도 계속 있으십니다. 어떤 날은 좀 들하다 하셨다가, 심하게 어지럽다고 호소하실 때 있습니다.

현재 설사는 거의 안하시는 것은 유지되시구요. 창포천마탕먹고 나서는 양약수면제 드신 적 없습니다. 어쨌든 치매환자의 불면증에 담미심규처방 적용가능한 것 같습니다~

속이 안 좋으면 화장실 가기 전에 대변을 지리고 방구를 꾸면 변이 나오는 12세 남아 열자. 장염대황을 1/2이하로 줄여 쓴다.

- 과거에 변비가 심했으므로 태음인 열자로 보는 것이 맞겠습니다. 다만 지금은 한증을 나타내고 있어서 열자에게 한이 협했다고 봐야겠습니다. 갈근조위탕이 태음인 열자에게 한이 협한 경우에 쓰이는 처방입니다. 즉 길경 행인 오미자 라복자 등은 한증약입니다. 이 경우에 대황은 1/2이하로 줄여서 쓰는 게 좋겠습니다. 장이 좋아져서 변이 단단해지고 한 번에 많은 대변을 보면 문제가 해결될 것 같습니다. 이때는 사하작용이 많은 당고특대황을 쓰면 안 되겠습니다. 소화기에 작용하고 이담작용이 강한 장염대황이 적절합니다.

태음인과민성대장증상에 대해(술을 많이 먹어서 냄새가 지독한 것은 장위습열, 새벽설사가 위주가 되고 몸이 차면 신양허증, 태음병으로 보고 태음조위탕 쓰는 것이 일반적. 내용물이 없어서 변을 못 보는 것은 변비가 아니다)

나올 게 없는 건데 변비라 보기엔 무리가 있지 않을까요? 대장습열은 전형적인 궤양성 대장염 증상으로 습열의 특징은 한마디로 지저분한 것이라고 하셨습니다. 대장에 염증이 심해 진물, 딱지, 혈고 엉망인 경우입니다. 한증이고 심한 염증소견이 아니면 대장허한이 바람직해보이는 데요. 장이 꼬들꼬들해지죠. ㅋ

(안) 설사병은 기본적으로 육경으로 보면 태음병이고 위기영혈로 보면 기분병입니다. 술을 많이 먹는다가나 해서 냄새가 지독한 변을 보면 장위습열에 해당합니다. 그러나 그런 경우는 드물어 보입니다. 설사 후 대변을 몇 일 못 봤다고 해서 열증이라고 할 수는 없습니다. 내용물이 없어서 변을 못 보는 건 변비가 아닙니다. 이 경우 한증으로 보는 것이 맞을 거 같습니다. 식후도포감이 심하면 비기허증이 됩니다. 새벽설사가 위주가 되고 몸이 차면 신양허증으로 볼 수도 있습니다. 이 경우 태음병으로 보고 태음조위탕을 쓰는 것이 가장 일반적입니다.

태음인열증의 비위습열증의 설사에는 저근백피가 가장 중요. 혈변에도 중요함.

헛바늘이 돋고 허가 부은듯한 증상이면 열증이 확실합니다. 장부검병에서 비위습열증으로 보여집니다(황금의이인탕가 청호,유근피청위탕가 청호) 허약자의 경우는 건울청위탕이 더 좋겠습니다. 태음인 열증의 설사에는 저근백피가 가장 중요합니다. 혈변(장출혈)에도 중요합니다. 저근백피에는 삼장작용이 있다.

태음인설사에는 삼장작용 있는 저근백피 한 돈을 가한다.

20일전 장어를 먹고 설사를 지속함. 갈근조위탕, 의이인건비탕으로도 설사가 개선되지 않음.
--> 삼장작용이 있는 저근백피를 한돈 가해서 사용해 보세요.

태양인 설사

설사는 육경에서 태음병, 위기영혈변증으로는 기본병에 속합니다. 우선 체질부터 확인해야겠습니다. 유씨미후등식장탕을 써보면 좋겠습니다

태음인 열증의 설사. 장기간의 스트레스가 원인이라면 비위나 장에 초점을 맞추면 무조건 빗나간다. 칠정이 원인이라면 간기울결 중 오매소간탕 검토(오매가 설사를 치료). 간비불화, 간기범위, 간음허 등을 고려한다.

이 분은 태음인 열증이 틀림없습니다. 관련증상 변증법으로 변증을 하면 해결이 안 됩니다. 관련증상변증법보다 우선하는 것이 병인변증법입니다. 즉 병의 원인을 보고 변증해서 치법과 처방을 결정하는 변증방법입니다. 장기간의 스트레스가 원인이라면 비위나 장에 포인트를 맞추면 무조건 빗나가게 됩니다. 이분도 칠정이 원인 이라고 보고 간기울결 처방중 오매소간탕을 응용해보시기 바랍니다. 연자소간탕과 오매소간탕 중에서 설사와 관련된 하초의 문제는 오매소간탕입니다. 신경 쓰면 소화 안 되는지 확인해보면 좋겠습니다.==>간비불화입니다.

참고로 신경 쓰면 소화 안 되면 간비불화이고 신경쓰면 더하고 배가 아프면 간기범위입니다. 즉 복통이 없이 소화가 안 되면 간비불화이고 복통이 있는 경우는 비병이 아니고 위병이므로 간기범위로 변증합니다.

간비불화나 간기범위는 모두 한증약이나 열증약이 가미되어있습니다. 그래서 일정 수준 이상 좋아지거나 변비의 양상을 나타내면 간음허약(열증약)으로 마무리해야 됩니다.

이 환자에게 설사가 잘 발생되는 원인을 찾는 것이 핵심이 되겠습니다. 갈근조위탕은 식적의 경우에 가장 잘 듣습니다.

3. 간담질환(황달, 간염...)

태음인 한자 간경화로 인한 심한 복수, 황달에 간담습열에 쓰는 울금청담탕 가 의이인5돈으로
저효. 대황을 초하면 이뇨작용이 강해진다. 이담작용 약물이 중요. 포공영, 소양인은 고삼 치
자 동규자 대계 활석 차전자, 치자와 대계가 중요.

태음인 한자. 65세 할머니

간경화로 인한 복수가 차서 배가 임신부 정도로 부른 상태로 래원

처방: 태음인의 간담습열에 쓰이는 울금청담탕에 복수를 뺄 목적으로 의이인을 5돈 가했습니
다.(태음인 한자인데 원방에 대황이 들어있어서 지나친 설사가 염려서되서 의이인을 많이 썼
습니다.)

울금청담탕:울금 유근피2돈 갈근 포공영1돈반 대황 황금 라복자초 청호 각1돈 가 의이인 5돈

결과:한달 만에 체중이 정상으로 돌아오고 복수가 거의 2/3정도 사라진 상태.

복수가 차서 숨도 잘 못쉬었는데 숨을 편하게 쉬고 잠도 잘 주무신다고 합니다.

물론 피로감이나나 황달도 많이 줄었습니다. 대변이 엄청나게 많이 나오고 대변량과 횟수 모
두 많았습니다. 소변량도 많이 늘었습니다.

이번에는 대황을 초해서 썼습니다.(대황을 초하면 이뇨작용이 강력해 집니다.)

대황의 이담작용에 주목해 주세요. 대황의 이뇨작용에도 주목해 주세요.(이뇨작용을 목표로 할
때는 초해서 사용합니다.) 한약아니면 간경화 간염 못고칩니다.

임상례 감사합니다^^ 다른 체질 같으면 담열증에 준해서 쓰면 될까요?

(안)

동의보감에서 大小便 不通過 中滿이 가장 급증입니다. 우선 대소변을 통해주고 이담작용 이수
작용이 있는 약을 써야됩니다.(포공영은 이담작용과 이뇨작용이 동시에 있습니다.) 소양인 같
으면 고삼 치자 동규자 대계 활석 차전자 등을 생각해 볼 수 있습니다. 이중에서 가장 핵심은
이담작용이 뛰어난 치자와 대계가 되겠습니다. 동규자는 사하약입니다. 고삼은 이뇨작용이 있
습니다. 일단 무조건 대소변으로 빼낸다고 생각하면 됩니다.

태음인 황달에 대황 청호 울금 등을 활용한다.

간경화로 인한 복수에 갈근조위탕이 좋다. 설사나면서 부종 빠짐. 류주열선생처방으로는 울금
청담탕(간담습열, 간담울열처방)

간보호 복수에 대황이 가장 좋습니다. 갈근조위탕을 드리고 설사날 수 있다고 미리 말씀드리
고 설사가 나면 부기가 빠진다고 말씀드리면 되겠습니다. 갈근조위탕은 대변 소변 양쪽을 다
통해줍니다. 류샘 처방중에는 울금청담탕이 좋겠습니다

담낭염(담석)으로 인한 극심한 통증은 간경습열약으로 보고 처방하면 좋아진다.

담석이 3개가 있고, 담낭에 염증이 생겨서 극심한 통증에 시달리고 있다고 합니다.
소화가 잘 안되어 이상하게 생각하고 있다가 배가 너무 아파서 병원에 갔는데
담석이 3개가 있고, 담낭에 염증이 생겼다고 해서 주사 맞고 계시다는데요...
병원에서는 담낭을 제거하자고 한대네요...실질적으로 담석이 문제라면 수술을 하는 것이 좋을
지...아니면 한약을 써볼수 있을지 고민입니다.

안준철

증상이 극심한 산통이라고 봐집니다. 간경습열약을 쓸수있습니다.
양약 진통제로도 통증이 잡히지 않던 환자가 간경습열약으로 간단히 통증이 회복된 증례가 있
습니다. 물론 돌은 어떻게 되었는지 모릅니다만...

태음인 울금청담탕은 간, 담, 췌의 염증에만 써야 하나요?--> 황달이나 간염에 유효

지난 동의보감 시간에 습열증의 중요성에 대해서 잘 배웠습니다.
류 선생님도 중초(비위)습열증이나 하초(대장, 방광)습열증에 대한 처방 및
간담의 습열에 대한 처방을 창방하셔서 사상하시는 분들이 편하게 사용할 수 있게 하셨습니다.
특히 간담습열증은 안 선생님이 강조하시는 현대적 리담작용과 밀접해서
현대의 다양한 성인병과 만성질환의 중요한 변증이 된다고 할 수 있습니다.

류 선생님은 각 체질의 간담습열증에 한자는 소간탕, 열자는 청간탕에 습열약을 가감하여 응
용하시는데요. 태음인 열자의 예를 들어보면 다음과 같습니다.

갈근청간탕 (양형)

갈근, 황금, 백질려(염수초) 8, 맥문동, 괴화, 조구등, 청호, 저실자 4, 대황2
간화상염증, 간경습열증, 담열증, 기폐증, 습음증후 습열재간담.

간경습열증 가 목통

습음증후 습열재간담 가 목통

담열증 거 조구등, 저실자 가 포공영

하초초청간탕 (음형)

갈근, 여정실 8, 백질려(염수초), 하초초, 황금, 조구등, 산조인, 감국 4, 괴화, 상엽2

간경습열증 가 삼백초, 목통

습음증후 습열재간담 가 삼백초, 목통

담열증 가 청호

그런데 태음인 처방집 가장 마지막에 울금청담탕이란 처방이 있거든요.

요게 조금 묘한 처방 같아 궁금증이 생겨 질문 올려요.

울금청담탕

울금, 유근피 8, 갈근, 포공영 6, 대황, 황금, 나복자(초), 청호 4g

소설간담, 개울리담, 청리습열.

간담습열증 간담울열증, 췌담울열증.

앞선 약들과 다르게 간담, 췌담이라고 명시되어 있고 작용 또한 간담을 소설한다고 직접적으로 이야기하고 있네요. 더 특이한건 타 체질에는 이런 작용의 처방이 없고 오직 태음인에게 유일하다는 겁니다. 강의시간에 잠깐 언급하신 바로는 류 선생님이 하도 약을 massive 하게 오래 복용하시다 췌장염(?)이 생겨서 심하게 고생하시다가 만들어서 먹고 병 고친 처방이라고 하셨습니다. 이외에 이 처방은 변증강의는 물론 병증강의에 치료처방으로는 전혀 나오지 않습니다.

이담작용과 항염증 작용이 강한 약재를 위주로 사용해서 간이나 췌장의 직접적인 염증이나 손상을 회복시키는 처방이라고 생각되는데요, 꼭 이 때만 써야하는지 아니면 처방증을 어떻게 확장시켜 생각할 수 있을지 궁금하네요. 혹 이 처방 써보신 분 있으면 어떠셨는지도 궁금하구요.

안준철

황달이나 간염에도 효과가 있었습니다. 이런 문제도 전부 중초습열에 속합니다.

정용재

네 감사합니다. 류선생님 처방 중 비위습열, 간담습열은 중초습열이고, 대장습열, 방광습열, 간경습열은 하초습열로 기억해 두겠습니다.^^

■심장질환(고혈압, 중풍, 갑상선, 당뇨..)

태음인 심간혈허증. 빈혈, 어지럽고 피로 불면 심계 불안. 간혈허증에 심계가 있어서 심간혈허증으로 변증. 단삼보간탕가 백자인1돈(심계고려)--> 40첩 복용으로 정상.

58세 태음인 열자 여성

혈액검사상 빈혈수치7 (12 이상이 정상)

주소증:어지럽고 피로하고 잠이 안온다. 가슴도 뛰고 불안하다.

변증:간혈허증에 심계가 있어서 심간혈허증으로 변증

처방:간혈허증에 쓰는 단삼보간탕에 심혈허가 있어서 백자인1돈 증량

결과:40첩 복용후 피로감 심계 불면 빈혈수치 모두 정상으로 돌아왔습니다.

양방의 혈액검사 수치도 중요하네요. 그리고 한약이 정직하게 작용하네요.

혈전, 고지혈증, 관상동맥 질환에 은행잎, 소양인은 택사가 좋다.

- 은행의 푸른잎이 효과 좋다. (가을의 노란 잎은 효과가 없다)

- 소양인은 택사가 제일 좋다. (거담작용 - 滑脈) 한자는 1돈까지, 열자는 2돈이상까지 가능하다.

소양인 심장병과 태음인 심장병의 한열별 처방 및 가감법, 치료대강(중요)

* 태음인의 심장병은 열증은 청심연자탕에 갈근 승마 대황 등을 가미하고 한증은 조위승청탕에 산약 백자인 등을 가미합니다.

* 소양인의 심장병은 열증은 사백산에 황련 치자 연교 등을 가미하고 한증은 형방지황탕에 황련 치자 연교 등을 가미합니다.

여기에서 우리가 알아야 할것은 태음인은 피부가 부텢고 발산력이 없어서 수분과 담음이 잘 정체되는 체질이란 사실입니다.

그래서 태음인의 심장병은 거담 거습이 위주가 됩니다. (산약 연자육도 보신하고 수분의 배출을 도와줘서 담음의 발생근원을 차단합니다.)

맥문동 천문동 원육 원지 석창포 백자인 산조인 등의 약미가 모두 거담하거나 심음을 돕습니다. 소양인의 심장병은 모두 화열의 결과이므로 청열하는 방법으로 갈 수 밖에 없습니다.

똑같은 증상의 심장병이라도 습담이 잘 쌓이는 태음인은 거담위주로 치료하고 화열이 주로 발생하는 소양인은 청열시켜야 된다는 말입니다.

심장병 뿐만 아니라 모든 질환이 마찬가지입니다.

태음인은 거담 위주 소양인은 청열 위주입니다. 소양인은 청열하면 거담이 되고 태음인은 거담하면 청열이 됩니다. 어떤 것이 더 근본적인 출발점이 되는가를 파악하는것이 관건이라 하겠습니다. 소양인의 담음치료에서 거담약이 없다고 걱정할 필요가 없습니다. (청열하면 거담됩니다. 열생담)

이세희

그래서 지황백호탕이 오랜기침을 멎게 하는군요 끊임없는 가래 기침이 지속적인 염증상황....이란 생각이 전부터 들었습니다..

질문있습니다) 소양인한증 심장병 기본방은 왜 형지가 되나요? 설사가 없더라도...심장병 있다면 독지보다 형지가 나은가요? 아님 태음조위탕 보다 조위승청탕이 상부로 작용해서 심장병에

쓰인다는 것 처럼 형지가 상부로 작용하는지요?

안준철

아직도 독활지황탕과 형방지황탕의 차이를 정확히 이해를 못하고 있습니다. 두 처방의 작용스펙트럼이 다릅니다. 표병약은 패독산 리병약은 독활지황탕 표리 겸치하는 약은 형방지황탕입니다. 강의를 안 들어서 병위의 개념이 없어서 이렇게 됩니다.

정용재

좋은 말씀 감사합니다. 사상방이 심장병에 탁월하다는 사실은 널리 알릴 가치가 있다고 생각됩니다. 이쪽으로 임상논문을 한 번 써보려고 준비 중입니다만.... 나중에 조언 좀 부탁드립니다~ ^^;;

김봉찬

감사합니다 지금 소양인 심장병에 형방사백산 가 황련 치자 연교를 쓰고 있는데 피로감도 덜하고 가슴 두근거림도 좀 줄어들었다고 합니다 눈이 피곤하고 무거운 게 없어지지 않는다고 해서 말씀해주신 영지 2돈을 넣어서 쓰려고 합니다

소양인 빈맥 부정맥 기외수축으로 수술 권유받은 환자를 혈허로 보고 숙지황보간탕!!

43세 여성. 소양인 한증

심실기외수축으로 빈맥과 부정맥이 있는 상태에서 대학병원에서 베타차단제로 빈맥은 좋아졌으나 부정맥과 심한 저혈압으로 무기력 허탈 안면창백을 호소하는 환자.

기외수축이라는 것이 뭐냐하면 심장에서 전기가 두군데서 발생되서 빈맥과 부정맥이 생기는 병입니다.

베타차단제 같은 약으로 좋아지기는 하지만 베타차단제를 사용하면 혈압이 더 떨어져서 또 문제를 일으키는 상황입니다. 그래서 잘못된 전기가 발생되는 곳을 대퇴정맥을 통해 도자를 넣어서 심장에 도달시켜 전기가 발생되는 부위를 고주파로 소각해버리는 수술을 하게 됩니다.

이 환자도 전기가 발생되는 부위를 전기로 태워버리는 수술을 권유받았습니다.

수술에 대한 두려움과 수백만원하는 수술비도 부담스러워 하던 차에 본원에 래원하였습니다.

보기에도 안면이 창백하고 빈혈이 심하며 생리량이 매우 적은 혈허증을 가지고 있었습니다.

맥은 세삭 또는 색맥에 가까웠습니다. 맥을 통해서 알게된 사실은 몸에 진액이 말라간다는 사실이었습니

다. 그래서 류샘 처방중에서 소양인 한증 혈허증에 쓰이는 숙지황보간탕(간혈허, 심간혈허)에 복령을 1돈 더 추가해서 썼습니다.(복령보심탕-심기허 심혈허의 의미)

한약한제를 먹고 오늘 다시 래원했는데 한약 복용이후 빈맥과 부정맥이 한 번도 없었다고 합니다. 여기에서 느낀 건 심장병이라고 해서 심병증으로 가면 안 된다는 사실입니다.

색맥에 혈허가 현저하면 보혈만 해줘도 심장이 안정된다는 사실을 이해하게 되었습니다.

환자에게도 피가 모자라서 심장이 헛바퀴를 돌고 있으니 피가 생기는 약을 쓴다고 설명했습니다. 사상의학 정말 끝내주지 않습니까??

수술 안 해서 좋고 입원도 안 하고...비용도 너무 싸게 먹히고...빈혈도 좋아지고...피로는 물론 좋아지고...수면도 좋아지고...

혈허를 나타내는 세삭맥이나 색맥을 이해하지 못했으면 혈허증으로 약을 쓰지 못하고 심장약만 찾고 있었을 것입니다. 맥의 중요성도 함께 느끼는 케이스입니다.

태음인 심계, 후두통, 불면을 심기허로 보고 연자보심탕을 쓰다.

53세 태음인 여성입니다. 심계와 후두통이 심하고 불면 등이 있습니다. 사는 게 재미없다고 합니다. 속쓰림이 있고 신물도 자주 올라옵니다. 대변은 하루 두번보기도 하고 이틀에 1번 보기도 하고 불규칙합니다. 초진시 사삼유근피탕을 2일분 처방했습니다. 속쓰림이 좋아졌다고 합니다. 심기허로 보고 류썸 연자보심탕을 처방했습니다. 심계나 한숨 쉬는 게 좋아진다고 합니다. 사는 게 재밌냐고 하니 대답을 회피합니다.;; 뭐 좀 치험례가 다 그저 그렇네요. 죄송합니다. --;;

태양인 심계 심허 환자를 심혈허로 보고 당삼보심탕거 옥촉칠 가 계혈등 백하수오로 효과를 보다. 다음에 체중을 늘리기 위해 태음병약 처방예정(류씨미후도식장탕). 체중회복에 태음병 처방이 좋다. 태양인의 심간병증에는 문어로 보혈.

원래 말랐는데, 지난 1년간 체중이 5킬로 정도 빠졌다고 합니다. 신경을 많이 써서. 그 뒤로 불안하고 가슴이 두근거리고, 쉼~한? 느낌이 있어서 자다가고 가슴에 베게 같은걸 놓는다고 합니다. 커피는 거의 안 마시지만 불면은 없고, 대변은 하루 1회 보지만 거른 적도 있었습니다. 맥은 유신한 것 같은데...우측은 현세 좌측도 우측보단 굵지만 현맥성향입니다. 입맛은 정상이고, 소화는 잘 안됩니다. 고기종류는 별 불편함이 없고, 라면은 속이 불편. 죽 종류 먹으면 속이 쓰림.

땀내는 건 남들만큼 건디고 음식 반응은 찹쌀은 생목 오르는 느낌이 있고 오렌지쥬스는 속이 아픈 건 아닌데 속이 약간 쓰리다?(표현을 정확하게 못하시네요)는 느낌이 있다, 등 푸른 생선 고등어나 콩치 먹으면 트럼 많이 나고 속이 불편하고 물 많이 먹어도 속이 불편하고 쓰린?느낌이 있다고 합니다.

안준철

소양인 아니면 태양인입니다. 목이 가늘고 길면서 어깨가 넓고 앞뒤가 얇아서 태양인으로 보여집니다. 머리도 커보입니다.

==> 한증 심혈허로 보고 <당삼보심탕(거 옥촉칠)가 계혈등 백하수오> 처방했습니다.

지금 2제째 드시고 계신데, 아직 좀 남아있지만 증상이 많이 완화가 되었습니다.

감사드립니다. 이분이 심장증상이 좀 괜찮아지면 원래 체중으로 회복되길(살찌길) 원하시는데 요. 이런 경우(식욕은 예전과 비슷하고 식사량도 비슷한데, 소화가 잘 안됨. 신경 많이 쓰면서 체중에 조금씩 바졌을때), 심비양허쪽으로 약을 써야 할지, 간 쪽으로 봐야할지 고민입니다. 고견 부탁드립니다.

(안준철)

심장증상이 다 없어질 때까지 심장약을 쓰시고 그 이후에 류씨미후도식장탕 등으로 비위를 따뜻하게 해서 잘 먹고 체중도 회복될 수 있게 해주면 좋겠습니다.

류씨미후도식장탕이 태음병에 쓰이는 약인데 소음인의 이중탕 정도에 해당합니다.

태음병약을 쓰는 것이 체중회복에 가장 좋습니다. 설사하는 사람은 설사도 멎고 식욕도 좋아 집니다. 한달이면 5kg 정도 체중이 회복됩니다. 태양인 한증에 쓰는 류씨미후도식장탕 정말 명방입니다.

태양인의 심간병증에는 문어를 먹게 해서 보혈해주면 가장 좋습니다. 빈혈이나 혈허로 인한 심계가 현저히 회복됩니다. 태양인의 혈허 빈혈 월경량 감소에 문어 강추합니다. 문어가 한우보다 좀 비쌉니다. 비싼 게 흠이네요. 문어는 원래 보혈약입니다.

동물성 약재가 확실히 빠릅니다. 소양인은 구판 별갑, 소음인은 아교주, 태음인은 녹각 녹용 등등입니다. 특히 관절질환에 동물성약재를 교로해서 사용하면 확실히 빠릅니다. 튼튼마디 한의원 이 관절염에 동물성 약재를 교로 만들어서 재미 좀 보나봅니다. 근데 체질을 모르고 마구잡이로 쓰는 거 같습니다.ㅋ

소양인고혈압. 대체로 신음허로 본다. 형방사백산가 인동 연교 목통 황련 치자 지모 황백을 쓸 수도. 소양인은 치자 황련만 달여 먹어도 효과가 있다.

안선생님께서서는 형방사백산에 인동 연교를 가하되, 목통 황련 치자 지모 황백 등을 가미할 수 있다고 말씀하셨던 것으로 기억합니다. 안선생님께서 말씀하신 바에 의하면 남자의 고혈압은 신음허로 접근할 수 있다고 말씀하신 적이 있네요.

--> 소양인은 치자 황련만 달여 먹어도 효과가 있습니다. 물론 잠이 오고 힘이 빠지는 부작용이 있기는 합니다.

태음인열증의 고혈압 처방. 고혈압은 한약으로 완치곤란. 이수 거담하는 방향으로.

전에 선생님이 가르쳐주신 청심연자탕가 갈근8 승마4 목통8과, 갈근조위가감방, 간음허증에서 고민하고 있습니다.

--> 고혈압은 한약으로 완치가 곤란합니다. 체중을 줄이고 이수, 거담하는 방향으로 가시기 바랍니다. 원지, 석창포도 모두 거담하는 류에 속합니다.

소양인한증 만성변비 갑상선기능저하증 우울증 있는데 다이어트 원함. 신양허증 처방에 결명자를 3돈 이상 가해서 대변을 통해줘야 한다. 우울한 증상도 정부족이다.

<윤승일>

소양인한증 여성 50세 갑상선기능저하 만성변비 우울증입니다

체중이 53킬로에서 40킬로 후반대로라도 감량을 원하시는데요

어떤 컨셉으로 접근하면 도움이 될지 고견주세요

<안준철> 10:31

일단 신양허증 처방에 결명자를 3돈 이상 가해서 대변을 통해줘야 되겠습니다.

우울한 증상도 신허증 또는 정부족증입니다.

애들은 우울하지 않습니다. 애들은 뭘해도 즐겁습니다.ㅋ

<유태영>

갑상선기능 저하증의 변증은 기본적으로 기체에 의한 간열(한자) or 간화(열자)로 보고

나머지 변증은 상황에 따라 구사하는 게 좋습니다. 그래서 시호소간탕 가 차전자 대맥근 과루인 증량. 수술(위)이나 몸 전체의 기운에 영향을 주는 병명(갑상선등)에는 무엇보다 그 증상 중심으로 변증하는 게 좋음. 소화 되고 속이 편하면서 기분도 좋아짐. 살도 빠짐.

갑상선질환. 한열불문하고 기능저하, 항진 다 온다. 대체로 음허를 기본으로 해서 기음양허증으로 접근한다.

한열을 불문하고 갑상선 기능저하도 오고...기능항진도 옵니다. 열증의 경우 음허는 기본으로 깔고 있다고 생각하시고...기음양허증으로 접근합니다. 즉 음허에 비기허가 겹친상태로 이해하면 됩니다. 위의 경우도 음식 맛을 못느끼는 증상은 비와 관계됩니다

태음인당뇨 54세 남자. 갈근조위탕이 식적과 이열을 다스릴 수 있어서 당뇨에 좋다. 포공영상지등이 혈당강하에 탁월하다. 뽕나무줄기. 주식이 가장 중요한데, 쌀밥이 가장 해롭고 밀 수수 울무 등을 먹어야 한다.

당뇨, 족부괴사, 우측하지 시리고 아프다. 식당일로 저녁 10시에 퇴근 병원 당뇨약만 복용하고 작년4월까지의 한약과 일주일에 일회 침으로 관리를 하였음. 당뇨 악화로 엄지발가락 괴사되어 엄지부분은 피는 나오나 감각이 거의 없음. 병원에서 응급처치로 약 바르고 붕대로 감음. 피곤해서 당뇨관리가 거의 안 됨

갈조에 승마1.5 황금1 포공영1 마황1 쇠양1 조각자1전충1 ...가감이 넘 많은가요?

상담 부탁드립니다.

(안선생)

태음인 열증 당뇨병에 갈근조위탕을 쓰면 상당히 효과가 좋습니다. 식적과 裏熱을 제거할 수 있기 때문입니다. 식적이 없어지고 대변만 잘 통해줘도 혈당이 거의 정상치에 이르는 경우를 많이 보게 됩니다. 태음인의 혈당강하에는 포공영 상지 등이 가장 효과가 좋습니다. 요즘 유통되는 상지는 대부분 개량종인데 토종 뽕나무는 입이 좁고 작습니다. 이 토종 뽕나무의 줄기는 저혈당이 염려될 정도로 혈당 강하 효과가 좋습니다. 체중을 줄이고 음식을 가려서 먹어야

됩니다. 주식이 가장 중요한데..결국 쌀밥이 가장 해롭고 밀 수수 율무 등을 먹어야 됩니다.
음식을 가려서 먹게되면 체중도 저절로 줄어듭니다.

당뇨같은 소모성질환에는 신허증이 가장 많다.

갑상선기능항진, 심간병증의 가능성도 생각해야(정신적인 원인)

일단 간병증 가능성이 가장 많습니다. 보음하고 청열해야 되겠습니다. 간양상향도 간음을 보하고 청열하는 치법입니다. 어차피 변증이라는건 이병이 왜 왔을까? 생각해 보는 것입니다. 특히 심간병증은 원인을 먼저 생각해 봐야 됩니다.

88세 할머니의 심간혈허증(변비 현훈 손저림 슬관절 발의 통증 갈증 심계 불면)

변비 현훈 손저림 슬관절 발의 통증 갈증 심계 불면

(안)

기본적으로 혈허증입니다. 음식을 잘 섭취하지 못하고 어지럽고 빈혈기가 보이면 간혈허약을 쓰는 것이 좋습니다. 심계 불면이 있어서 심간혈허증입니다. 손저림 현훈 심계 모두 혈허증상입니다.

(안)

심간혈허증이 맞는 것 같습니다. 혈허증이 다 없어지고 나면 다음 처방으로 가야 하겠습니다. 다음은 간음허증으로 쓰면 되겠습니다.

실제적인 빈혈양상이 확인되면 간혈허증(얼굴에 핏기없고, 손톱색 없고 월경량 적거나 색이 묽다)

[안준철] 태음인 열증입니다. 간혈허증은 실질적 빈혈이나 얼굴에 핏기가 없고 손톱도 색이 붙지 않고 하얗고 월경량이 적거나 색이 묽은 증상을 확인해야됩니다.

심간혈허의 증상. 혈허에 심장증상 있으면 심간혈허.

88세 할머니, 변비, 현훈, 손저림, 무릎 발의 통증, 갈증 심계, 불면, 침질질 흐름, 땀 별로.

--> 백자양심탕 1제, 입이 안 마르고 기운이 나는 등 제반증상은 좋아졌는데 아직 변비, 잠자는 것, 입 실룩거림, 손저림 호소. 어떤 약을 써야 할까요.

(안) 기본적으로 혈허입니다. 음식을 잘 섭취하지 못하고 빈혈기를 보이면 간혈허약을 쓰는 것이 가장 좋습니다. 심계, 불면이 있어서 심간혈허증입니다. 손저림 현훈 불면 모두 혈허입니다.

소양인의 심병치료. 열증이면 심허, 한증이면 기허 혹은 양허. 심병은 심계, 불면, 소변적색, 한출 등을 확인해야 한다. 같은 불면이라도 담병에는 이런 증상이 없다. .

그 후 1달 정도 후부터 손에 열이 나고 몸무게가 2kg감소.
그 무렵 스트레스를 많이 받고 안 좋은 일이 있었음.

땀-흐르지는 않지만 더워서 좀 남.6개월전부터 심해짐.
가슴-자주 두근거림.
얼굴 열-자주 올라옴.
주소증은 심음허증과 유사하다고 생각이 됩니다.
한증에 맞는 증상을 찾기가 어려운데...
심음허에 처방되는 지황양심탕을 처방해도 될런지...고견을 부탁드립니다.

안준철

이 경우 한열이 좀 문제인데 방귀가 잦다고 해서 한증이라고 할 수는 없습니다. 한증은 상복부의 가스가 잘 생기면지가 관건이 되겠습니다. 만약 열증이라면 심음허증을 고려할 수 있습니다. 한증은 음허증이 아니고 기허증이나 양허로 갑니다. 심병증으로 치료하려면 불면이나 소변이 붉은 증상이 동반되면 심병증으로 확인해도 되겠습니다.
심병은 소변과 땀에 변화를 줍니다. 그리고 불면이 어느 정도 동반된다고 생각해야 됩니다. 심변증하면 바로 소변색과 땀을 확인해주세요. 참고로 담병증은 같은 불면이라도 소변과 땀에 변화를 주지 않습니다. 만약 식욕항진이 있다면 위열증으로 봐야됩니다

태음인 한증 중풍에는 조위승청탕에 산약 백자인으로 심음을 돕고, 감국으로 거풍할 수 있다. 초기에는 승기탕을 써서 사하시킨 후 조리할 수 있다.

예전에 부산 있을 땐 응급 중풍환자가 심심찮게 왔었는데, 올라오고 나선 처음 보는 것 같습니다. 어제부터 어둔, 좌상하지마비가 왔습니다. 평소 고혈압, 당뇨약을 드셨던 분이구요, 과거 머리에 땀이 쏟아진다고 해서 태음조위탕 가 갈근,승마, 대황 써서 호전되었던 분입니다. 다만 복약 중 가려움증이 조금 생긴다고 호소했어요.
오자마자 재보니 170 / 90 정도 되네요. 병원으로 그냥 보낼까 잠깐 생각도 들었는데.....--
침놓고 마침 한의원에 있던 청심연자탕 한 봉 드시게 하고 1시간 누워계신 뒤 재보니 120 / 80 이 되었습니다. 오늘 대변은 평소처럼 보셨다고 합니다.

일단 절대 안정을 하시라고 주의해서 보냈는데, 차후 처방을 어떻게 써야할지 문의드립니다.
용케 청심을 드셨으나 한증약으로 빨리 돌려야 될 것 같은데요.
73세 할머니, 약간 뚱뚱한 편이십니다.

안준철

한증의 중풍에는 조위승청탕에 가미하는 것이 좋겠습니다. 산약 백자인 등을 써서 심음을 돕고 감국으로 거풍할 수 있습니다. 초기에는 승기탕을 써서 사하를 시킨 후 조리할 수 있습니다

다.

정용재08.04.28. 16:25

승기탕을 먼저 줄까하다가 변을 잘 보셨다니깐 언뜻 손이 안 가더라구요. 감사합니다. 신중히 치료해 보겠습니다.(..)

■신, 방광질환(소변관련, 성기능, 부종관련질환들...)

소변관련질환

소음인열증의 전립선 비대증으로 인한 소변 빈삭을 신음양양허증으로 보고 백작약보음탕가 포 부자5푼 15일분으로 저효를 내다.

1.체질: 소음인 열자(69세)

2.주소증: 전립선 비대증으로 소변 빈삭과 불면증 그리고 극심한 피로감.요슬산통

3.변증: 식성이 매우 좋고 위장이 좋은 소음인 열증이어서 우선 신음허증으로 변증하고 소변 불리는 양허증으로 보고 신음양양허증으로 변증 했습니다.

4.처방:소음인 신음허에 쓰이는 백작보음탕에 포부자5푼 가했습니다.(나도근은 없고 감부리는 신장의 독성이 우려되서 빼고 썼습니다.[백작약 아교 충울자 수삼(대인삼) 사원자 부자) 6개의 약미를 썼습니다.

5.결과:15일을 드시고 오늘 다시 왔습니다. 결과는 소변양이 상당히 많아지고 소변의 빈도는 1/2로 줄었다고 합니다.

야간뇨도 많이 줄어서 3-4회에서 1-2회로 줄었다고 합니다.

불면증도 좋아지고 피로감도 함께 좋아졌습니다.

6.고찰:확실히 부자가 소변을 잘 나오게 하는 약이 틀림없습니다.

노인은 음허로 불면이 오는 것이 맞습니다.

열증은 보음을 하되 양허증이 있으면 음양양양허로 가야됩니다.(보음탕에 보양약을 가 합니다.)

이 할아버지 소변이 얼마나 안 나오냐 하면 화장실에서 소변 나오라고 통사정을 하는데...한겨울에 고드름에서 물 녹아나오듯이 한방울 한방울 어렵게 봤다고 합니다. 소변양도 늘고 시원해지고 할아버지께서 아주 기뻐하시네요. 여성의 뇨실금 남성 배뇨장애는고령화 사회에서 관심을 가질 분야입니다.

태음인 소변불금, 소변빈삭을 태음조위탕가 갈근 승마 산약 연자육, 신기불고의 연자보양탕 거 쇄양 가 산약 차례로 처방하였으나 치료실패. 열증, 방광습열증의 양형으로 보아 천문동

도적산을 처방하여 저효를 끌어내다. 소변빈삭에서 간신음허도 고려한다.

67세

- #. 주소증 - 1. 너무 잦은 소변으로 불편함. (2~3일전부터) 한 시간에 2~3번 갈 정도이고....
배뇨통은 없음. 소변색은 淸長 (시원하고 소변양이 많다)
환자분 생각에는 너무 최근 2~3일 전에 무리하여 생긴 것 같다고 함.
2. 가만히 있는데도 눈이 감길 정도로 피곤함.
실제로 보면 두 눈이 처지고 감길 정도로 되어 있음.

@ 대변 - 하루에 2~3번. 5분 이내. 보통 변.

@ 입맛이 없고 소화곤란

** 이 분은 일단 태음인 한증으로 보입니다.

변증을 나름대로 하자면 기허인 것으로 보입니다.

(굳이 후세방적으로 보면 보중익기탕 합 축천환? 삼기탕? 등등...)

류샘 자료집을 찾아보니 <요도증후군 / 민감성 방광증> '비신희허증' 이라고 있으며,

'氣陷'에도 해당되는 것 같습니다.

(물론 안선생님의 태음조위탕 가미방 처방례도 있군요..^^)

치료 경험 있으신 선후배님들 고견 부탁드립니다. 감사합니다.

<안준철> 태음인이 확실합니다. 16:55

이 분을 선생님께서 태음인으로 판정해주셔서....태음인 한증으로 보고

=>태음조위탕 가 갈근 8 승마 산약 연자육 4g 처방했습니다.

약 복용 1주일 후 소변은 한 시간에 2~3번이던 것이 한 시간이나 한 시간반에 1번 정도로 줄었으나 갱년기 때 열이 오르는 것처럼 새벽에 열이 확~ 확~ 올라서 참을 수가 없다고 호소하였습니다. 처방을 바꾸어서 '신기불고'로 변증하고 연자보양탕 거 췌양 가 산약 8g으로 처방하였습니다. 그게 저번 주 토요일이었는데, 환자분이 오늘 전화가 오셨네요..

토요일 저녁에 약 1봉을 먹고 잤는데 새벽 5시쯤에 열이 너무나 많이 나서

(환자 표현에 의하면 '고열') 약 복용을 중단하였으나, 몸에 계속 열감이 있었고, 몸에 열이 나서 그런지 소변도 다시 한 시간에 2~3회 정도로 늘었다. 그래서 약 복용을 2일 정도 중단한 후 다시 한 봉을 먹었는데 열감이 다시 심해졌고, 소변도 다시 심해져서 도저히 안 되어 양약을 처방을 받고 복용 하니 열도 식고 다시 소변도 원래처럼 2~3시간에 1번 정도로 줄었다.

이렇게 말씀하셨습니다. 간단히 '약 먹고 몸에 엄청난 열이 오르고, 소변 횟수가 늘어나서 불편하다.'입니다. 그래서 약을 바꾸어서 처방을 해 주어야 할 것 같습니다.

태음인은 확실한 것 같은데 이 정도 되면 열증으로 봐야 할지요?

어디에서 제가 실수를 한 것일까요? 처방에 대한 고견 부탁드립니다. 어떤 처방이 좋을까요?

<안준철> 이때는 대소변 상태나 소화 상태를 확인하고 ...한열이 맞는지를 판단합니다.
대변횟수가 줄었으면 열증입니다. 간신음허증 가능성이 가장 많습니다.

환자에게 대변과 소화 상태를 물으니 대변은 그대로 하루에 2~3번 보고 보통 변이다.
소화도 달라진 것 없다...그래서 대변 횟수가 줄지 않아서 열증은 아닌 것으로 생각되어 다시
선생님께 문의를 드렸습니다. 선생님께서 허증약을 처방했는데 상태가 좋아지지 않고 더 심해
졌으므로 실증약(천문동도적산 or 유근피도적산-방광습열증)으로 처방을 바꾸어 보라고 지도
해 주셨습니다. 그래서 환자 맥을 보니 '촌 >척'으로 뛰는 것 같아서 '천문동도적산'을 처방하
였습니다.

(천문동 8 등심 호장근 목통 포공영 포항 지부자 진교 4g)

천문동도적산을 이틀 먹고 와서 하는 말이 '많이 편해졌다. 열이 확~ 오르는 것이 아침에만
약간 있었고, 열이 오르지 않으니 소변을 2~3시간만에 1번 정도꼴로 본다.'라고 말씀하시네요.
그래서 계속 복용 시켰습니다. (이틀분약으로 그렇게 고생하던 소변이...--;;...사상 처방 엄청
납니다..사상의학 만세..!!!...ㅋㅋㅋ.)

이 환자의 경우 처음에 배뇨통이나 배뇨시 간지러움 등 실증 증상이 보이지 않았고,
(양방의 소변 검사상에도 아무런 이상이 없었습니다) 나이가 많은 점을 고려해서 허증 처방으
로 갔었는데 결과가 좋지 않았습니다. 이런 경우 실증으로 볼 수 있는 변증 포인트는 어떤 것
들이 있을 수 있는가 여러 선후배 원장님들께 고견 여쭙어 봅니다.
지도해 주신 선생님께 다시 한 번 감사 드립니다.

**태음인의 소변불리에서 목통의 사용. 심소장의 열을 소변으로 빼내는 작용을 한다. 심계, 불면
확인하고 쓴다.**

목통은 심 소장 열을 소변을 통해서 빼내는 역할을 합니다. 심계나 불면 등의 증상이 없으면
사용하지 않는 것이 좋겠습니다. 소변이 지나치게 빠져나가서 변이 더 굳어집니다.

**노인의 소변빈삭은 허리 무릎상태, 기억력, 어지럼증 등을 확인해서 신허증을 확인한다. 신음
양양허증으로 접근해서 황금 등심 목통 등의 심화를 사하는 약을 가해주는 것도 고려한다.**

태음인 열자소변빈삭. 나이는 67세.

---> 안준철, 무릎 허리가 시리고 아프고 기억력도 약해지고 어지럼증 등이 동반하면 신허증
입니다. 신음양양허증으로 접근하고 황금 등심 목통 등의 심화를 사하는 약을 가해주는 것도
소변빈삭에 도움이 됩니다.

태음인 낭습증의 경우 어떻게 처방 구성을 해야 할까요? 처방과 가감법

강의록을 찾아보니 태음인 열증의 경우 연자회생탕이나 갈근조위탕에 산약 연자육 사상자를
가미하면 될 거 같고요, 태음인 한증의 경우는 태음조위탕에 갈근 승마 사상자 이렇게 가미하

면 될 거 같은데요, 참고할 사항이 더 있을까요?

안준철0

심계가 있거나 심장 증상을检하면 황금과 목통을 써서 심화를 사하면 낭습에 더욱 효과적일 수 있습니다

2. 성기능관련질환

발기 부전, 정력 감퇴 - 40세 이전이면 많이 써먹어서 신이 망가진 것으로서 신정부족, 4을 넘었으면 신음허 혹은 신양허, 40대보다 나이가 더 들어 허리 무릎 시리고 기억력까지 현저하게 떨어지는 경우라면 신음양양허에 해당. 정신적인 문제도 고려한다(심신불교, 간비불화..등)

불임부부인데요. 여자는 다낭성난소 증후군인데 다윗쪽으로 한약 쓰고해서 주기는 조금 식 잡혀 가는데... 남자가 밤일이 생각이 없어서 거의 애기 만들기가 힘들다고 하네요.

어제 환자분 전화로 남자 기운 나는 탕약 원하는데...남성 발기부전 탕약은 신정부족인가요??

스트레스면 간음허화항 인거겠쥬?? 만약 한자면....??

신양허 쪽인가요?? 딱히 그쪽 보양을 잘 써본 적이 없어서....

전에 정자 검사 시 한번은 너무 적고 한번은 정상이고 그랬다네요

정자 생성도 적은 것 같으면 신정부족인건가요?? 이쪽인가... 저쪽인가... 혹시 보는 관점이 계시면 알려주세요~~~

안준철

환자의 나이는 어느 정도 인가요? 우선 한열을 먼저 가려야 됩니다.

한자는 신양허증으로 열자는 신음허증으로 변증하는 것이 기본이고...

이 상태가 오래지속 됐으면 신음양양허로 변증합니다.

즉 열자의 경우 신음허에서 출발하지만 오래되서 노인이 되면 양허증도 겸하게 됩니다.

(즉 열자라도 늙으면 몸이 차지게 됩니다.)

신정부족증은 몸을 지나치게 써 먹어서 생긴 신허증을 말합니다.

(신정부족은 후천적으로 과로 입방과다 등으로 발생된다고 생각하면 됩니다.)

만약 태음인이라면 녹용을 써야됩니다

결론적으로 신정부족은 후천적으로 너무 써먹어서 신이 망가진 경우라고 생각하면 됩니다.

신음허나 신양허는 주로 40대가 넘은 경우라고 생각해도 무리가 없습니다.

신음양양허는 40대보다 더 나이 들어 허리무릎이 시리고 기억력까지 현저히 떨어지는 경우라고 생각해도 됩니다. (즉 brain 기능이 맛이 간 상태라고 생각하면 좋겠습니다.)

이것은 윤승일 원장님께서 말씀하시는 brain 기능과 같은 의미입니다.)

40세 이전이면 신정부족으로 접근하는 게 가장 무난해 보입니다.

ㄴ 하만종 12:19

역시 한열이 중요한 거 같아요.

열자인 경우에 쇠양이 들어가니(신양허처방), 과도하게 발기한다는 경우가 있었어요^.^;;

저같은 경우는 정액이 방울방울 떨어진다하면 腎에 초점을 두고요(신음허, 신양허, 신정부족, 신음양양허), 그런게 아니면 심리적인 문제가 있는지 체크합니다.(심신불교) 선생님 말씀대로, 태음인은 녹용 쓰면 확실히 더 좋다 합니다. 비아그라 같은 게 아니니, 즉효를 보는 게 아니라 고 얘기해줘야 되요

태음인 성기능저하를 연자회생탕가감방으로 개선시키다(김주선생처방), 처방있음.

태음인 열자, 71년생 남. 2008년 9월20일 초진 내원.

당시 가슴 부위 통증, 심계가 심하고 통증이 있으며 호흡도중 갑자기 숨이 멎는듯한 통증도 있다 하여 치료했습니다. 4, 5년 되었으며 더우면 더 심하다고 하시더군요.

대변을 2, 3일에 1회 보신다 하여 청심연자탕 가 대황2돈, 녹용 약간 쓰고 아주 많이 좋아지셨습니다.

올해 3월 내원하셔서 확인해보니 잠도 잘 자고 심계도 약간만 간혹 나타나는 정도였습니다. 그런데 성기능 문제로 상담을 좀 원하셔서 들어보니 발기가 7, 80% 정도밖에 안된다고 합니다. 정액의 양도 줄었으며 조루 증상도 있다고 합니다. 벌써 4, 5년 정도 되셨다는데 과거에 입방을 많이 하고 컴퓨터를 오래 쓴 이후 생긴듯하다 하더군요.

류 선생님이 알려주신 처방이 있고 안 선생님이 강조하신 남가새도 있지만 일단 김주 선생님 처방인 연자회생탕을 썼습니다.

연자회생탕 가 갈근2돈, 대황1돈, 녹용 0.5돈

한 제 드시고 반 정도는 좋아진 것 같다고 좋아하셨습니다.

상동 가 녹용 0.5돈 다시 처방했습니다. 오늘 오셔서 물어보니 거의 다 좋아지셨다고 합니다. 발기의 강직도가 아주 좋고 정액도 많이 늘었습니다. 그런데 생각지도 않게 임신이 되셨다고 하네요. 사모님은 43세입니다.(태양인)^*::

그간 전혀 그런 적이 없으므로 정말이지 생각도 못했다고 합니다.

그런데 안타깝게 2주전 유산이 되셨다고 같이 오셨네요. 산후조리약 처방해 드렸습니다.

당연한 결과겠지만 정자의 상태도 매우 좋아진 것으로 판단됩니다.

10년 전 부원장 시절, 60 넘으신 택시기사 후덕한 그러나 음흉한(ㅋ) 태음인 아저씨 발기가 안 된다고 이 처방을 해드렸는데 1제 드시고 너무 만족해 하셨던 짜릿한 기억이 있어서 다시 써봤는데 역시 명방인 것 같습니다.ㅋ

연자육이 군약인데 5돈이나 들어갑니다. 신만 보강하는 것보다 심을 같이 고려한 연자육이 성기능 장애에 매우 중요한 역할을 하지 않았나 생각해 봅니다.

남성 성기능 저하에 많이 활용해 볼 수 있으리라 생각합니다. 감사합니다~

연자육5돈, 맥문동3돈, 건울, 산약2돈, 의이인, 나복자, 오미자, 길경, 여정실, 사상자, 쇄양1돈
: 1. 治 腎氣無力症(무정자증, 발기불능으로 인한 불임 등), 조루증, 자궁脫. 2. 위완부계한성

신기무력증에 이용한다. 3. 간수열증에는 去 건을, 오미자 加 대황(소화불능시 加 갈근 2~5돈.) (단 탈음에는 건을을 1돈 써야 좋다.) 기타 가감법은 생략합니다.^^

3. 부종.

족변열을 동반하는 소양인부종을 신음(양)허 처방 가감방으로 치료한 3 케이스 정리해서 몇 케이스 올립니다.

1. 만 36세 여자/ 소양인열자

주소증 : 부종, 두통, 화병(조혼으로 인한 고3딸 있음)

과거 부으면 한번씩 사백산 지어가신 분입니다.

매번 사백산 드시면 한동안 괜찮다가, 때 되면 '그거 달라'는 이른바 '사백인'이었습니다.

올해 4월에도 사백산을 한번 지어가셨는데,이번에 부기가 빠지지 않고, 따님때문에 흥부답답함과 족열감이 해소가 되지 않았습니다.

처방을 <구판보음탕 가 지모 황백 5푼/ 치자 1돈>했습니다.

부종이 현저히 감소하고 족열감해소되었습니다. 체중도 감소되었습니다.

흥부답답함은 덜 감소되어, 어제 내원하였습니다.

구판보음탕에 심장쪽을 보는 약을 가하여 처방할 생각입니다.

2. 만 32세 여자/ 소양인열자

주소증 : 요각통, 전반적 부종, 족열감

과거 탈영실정으로(어머니상 당함) 여정자보간탕(체질잘못봄)->생지황보간탕으로 호전된적있는 앞양방의원 간호사입니다.

최근 환자가 하루 100명씩 넘게 봐서(170명 뭐 이렇다네요.;; 너무 차이가 많이 나요ㅋㅋ) 과로로 인한 주소증으로 내원했습니다.

<구판보음탕거산수유 가 생지황, 대계, 금은화, 지모, 황백>

처방하여 부종 현저히 감소되고, 역시 족열감 해소되었습니다. 뭐, 그래도 환자 많이 보면 다리 쭈시고 하는데, 많이 좋아졌다 합니다.

3. 68세 남자/ 소양인 한자

주소증 : 단백뇨, 당뇨, 부종

1년여에 걸쳐

1. 독지 가 인동, 연교, 구판,별감

2. 독지 가 인동, 연교, 구기자, 영지
3. 산수유보신탕
4. 토사자보양탕 가 저령, 차전자

처방하였었습니다. 앞에 세재도 그럭저럭 들었지만, 한번씩 부종심하면, 양방가서 약타서 드시고 했습니다. 마지막 처방에서 부종이 가장 현저히 감소되었고, 소변에서 냄새도 훨씬 들난다 합니다.

세분 모두 한약복용시(구판보음탕-토사자보양탕)드릴때, 속쓰리다했습니다. 식전에 드시라 티칭한 후 괜찮았습니다. 감사합니다~

노인의 소화기장애 없는 부종은 신허다. 종아리, 발의 부기를 연자보양탕원방으로 치료.

80세.

#. 주소증 - 하지부종 (양측 종아리 발목 발 전체까지) 2개월 전. 항상 부어 있다.

하지 부종이 생긴 후 대변 보러 더 자주 가는 것 같다.

** 이 분은 태음인 한자로 보이며, 신양허로 변증 추정합니다.

[안준철] 태음인으로 보여집니다.

=> 연자보양탕 원방..3일 복용했습니다.

(연자8, 여정실주증6, 상심자6, 오미자증4, 속단주초4, 호도육4, 건률4, 쇠양4, 지부자4)

하지부종 50% 이상 호전되었습니다. 역시 노인분들 소화기 장애 없는 하지 부종은 신허인 모양입니다. 지도해주신 안준철 선생님과 도움 주신 이용양 선생님께 감사합니다.

p.s) 여담으로 아들이 ENT 의사라서 절대로 한약 안 먹는다는 할아버지입니다.

양약으로 도저히 안 나아서 한약 먹기는 먹었는데 속으로 이렇게 효과가 빨리 날 수가 있나 놀라면서도 겉으로는 한약 효과 인정 안하려는 투로 이야기 하네요...^^;;

뭐 자기가 밤마다 발을 높이 올려 놓고 자서 빨리 빠졌다나....헐~~~ㅋㅋ.....

세상 참 재미있습니다. 즐긴하세요. 평범한 결과보고였습니다.

(안)

이용양 원장님의 동의보감 강의 때 항상 강조하던 말씀 "부종에도 마지막에는 육미지황탕을 써야한다."이라는 말이 생각나는 대목입니다. 사실 이런 걸 잘 처리해야 되겠습니다. 실력도 빨리 늘고 환자들에게 신뢰도 얻게 될 거 같습니다. 이노제로 안 되는 걸 보신해서 해결한다는 지극히 당연하지만 멋진 결과입니다. 멋지십니다. 연자보양탕 원방이라 더 멋지네요.

(이용양)

멋져요. 역시 부종의 마지막은 신허.....ㅎㅎㅎ 김원장님 멋져부러!!!!

소양인 IgA 신증을 선인장(백년초)로 정상에 가깝게 호전시키다. 씨앗이 더 효과적.

소양인 IgA 신증후군 환자가 부종이 너무 심해서 하루에도 체중변화가 7-8KG 정도 였는데...

소양인이라는 걸 알려드리고 음식 가리고 제주도에서 선인장(백년초)를 집중적으로 많이 먹었는데...거의 정상에 가깝게 회복이 되고 있습니다. 백년초는 잎보다 씨앗이 더 효과가 강하고 잘 듣는다고 합니다.

백년초잎이 맞습니다.ㅋㅋ 이분은 양방병원에서도 포기한 상태였고 한약도 겁내고 해서 민간 요법을 하겠다고 해서 체질에 맞는 질경이(차전자) 상추씨(와거자) 등을 권해줬는데...백년초가 확실한 효과를 보이고 씨앗은 3배 정도 더 좋았다고 합니다. 맛도 매우 순하다고 합니다. 단 백뇨가 많이 줄어서 양약을 끊고도 별 문제없이 살아가고 있습니다. 선인장 알로에 등이 소양인에게 정말 도움 많이 됩니다. 투석을 하거나 목숨을 잃을 상황이었었는데 정말 다행입니다.

갑상선암 수술, 방사선 치료 후 발생한 임파부종에 신허수범개념으로 시도해보다.

99년 자궁암이 발생하여 자궁 적출 수술을 받았으며 00년 갑상선암이 생겨 갑상선을 적출했습니다. 이때 주위의 임파선까지 같이 절제했습니다.

당시 방사선 치료를 받으셨다는데, 이때부터 위에 보시듯 임파 부종이 생겼습니다.

임파선은 림프절(lymph node)의 다른 이름으로 림프구로 채워져 있는 강남콩 모양의 작은 결절로 몸의 어디에나 위치하는 우리 몸의 방어체계입니다.

그래서 갑상선에 암이 생기면 근처 림프절에도 암세포가 있을 확률이 높아 같이 절제해 버린답니다. 림프절은 체액을 거르는 체와 같은 역할을 한다는데, 이것 적출하든지 방사선을 쬔어 기능을 상실한 결과 위에 보는 것 같은 임파 부종이 생긴다고 합니다.

(검색 좀 했습니다.^^::)

임파 부종은 순환되지 않고 고여있는 물과 같아서 세균의 공격을 쉬 받아 고열 등의 위험한 경우가 생길 수도 있다고 합니다. 이 분이 평소 찜질방을 좋아하시는데 하루는 찜질을 하는데 선풍하더니 그날로 열이 오르고 다리가 두 배는 더 팽팽 부어 고생을 하던 중, 따님이 내원하여 애길 들어보니 하루 두 번씩 변을 보던 분이 이틀만에 변을 보고 음식량도 줄었다 하여 식체로 보고 일단 갈근조위탕을 1일치 드렸습니다.

(원래 이런 경우 일반적으로 항생제를 먼저 쓰는 것이 좋다고 합니다.)

이튿날 증세가 호전되고 약이 잘 맞는 거 같다고 하며 약 문의를 하시길래 써보자고 했습니다. 이제마는 태음인 위험병 중 복창부종병을 말했는데, 고민한 결과 열자의 부종병에 쓰는 갈근제조탕을 투여하게 되었습니다. 약을 드시기 시작할 즈음 열이나 부종은 어느 정도 진정이 되었고 약도 아무 문제없이 다 드셨습니다.

혹시 드라마틱하게 쏙 빠지는건 아닐까 살짝 기대를 했었는데, 물론 그러지는 않으셨네요.^^; 가족들은 예전보다 좀 더 빠진 거 같다고 하는데 본인은 잘 모르겠다고 하십니다.

위 사진은 오늘 찍은 건데요, 증상이 아침 되면 쏙 빠지고 시간 지나면 다시 붓습니다.

누워서 다리를 올려두면 조금씩 빠집니다. 00년 당시 암치료로 유명하다는 제선을 방문하여

권 쌤에게 토양으로 진단받아 지금도 토양체질로 알고 있으시지만 그건 아닌것 같습니다.^^;

처방을 다시 그대로 쓸지 류 선생님의 수습범람을 써볼지 고민 중입니다.

혹시 임파부종에 관해 다른 조언도 좀 부탁드립니다. 처음 치료해 보는 거라 헤메는데요, 조금이라도 도움이 되실 방법을 찾고 있습니다.

(정)류 선생님 처방 중 신허수범약 썼습니다. "씩"에 희망을 걸어봅니다. 좋은 소식 있으면 결과 올리겠습니다.^^;


감기 달고 지내는 태음인 寒者 6세 아이의 선천성 음낭수종을 자완청열탕가 녹용으로 감기 줄이고 수종을 치료하다.

아버지는 태음인으로 확인했구요, 어머니도 소양인 같아 보이시기도 해서 확인차 올립니다. 그래도 아들은 태음인으로 보이네요.^^a

아들이 선천성 음낭수종으로 병원에서 수술을 해야 한다고 했습니다.

저한테 고추 보여주기 싫다고 울고불고 난리 났습니다.;;;

자료를 찾아보니 그림 제일 끝에 보이는 교통성 음낭수종인 것 같네요.



소아에서 발생하는 음낭수종은 거의 교통성 음낭수종이며 탈장낭이 막히지 않아 복강내로부터 물(복수)이 계속 내려오기 때문에 발생하는데, 아침에는 음낭수종의 크기가 작고, 오후에는 크게 되는 경우가 많다고 합니다. 이러한 교통성 음낭수종은 매우 흔한 질환이며 미숙아에서 많고 남아에서 많으며 우측에 많이 발생하나 양측성인 경우도 있고 일측성으로 수술을 하고 난 후 반대측에서 발현되는 경우도 있네요.

때로는 생후에는 정상이었으나 감기나 장염 등을 앓고 난 후 발생하는 경우도 있습니다. 자연적으로 막히면서 없어지는 경우가 많으므로 대개 크기가 작은 경우에는 2세, 큰 경우에는 1세 정도까지 기다려 수술을 한다고 하네요. 또한 만약 그 크기가 작거나 혹은 변화가 없거나

일시적으로 갑자기 생겼다면 몇 달간 기다려본 후 그 크기의 변화여부를 보아가며 수술의 여부를 결정하게 된다고 합니다. 어릴 때부터 조금씩 의심이 되기는 했는데, 석 달 전쯤에 많이 부은 걸 발견했으며 오른쪽 불알이 부었더군요. 애는 6살입니다.

감기를 달고 살아서 그냥 생각에 폐경풍열약 써도 될 것 같고 조습하는 약을 써도 될 것 같아 치료해보자고 했습니다. 자연적으로 낫기도 한다니 참 다행이네요.ㅋ

소화, 대소변 다 좋구요, 음식 특이반응 없고 감기(인통 위주)와 코피가 자주 생깁니다.
태음인으로 보면 될까요?

자완청열탕 가 녹용 2g 처방했습니다.

복약한지 5일 정도 되고 그간 3번 정도 다녀갔는데, 올 때마다 감기기가 줄어들고 음낭 수종도 계속 줄어갑니다. 눈으로 확연히 차이가 날 정도입니다. 일주 안에 끝날 것 같습니다. 사진을 못 찍은 게 아쉽군요. 너무 일찍 끝나서 아쉽고....^^; 감사드립니다.^^

대황이 이담작용, 식적을 풀어서 부종을 치료한다.

대황이 이담작용을 합니다. 반진과 부종을 해결합니다. 부종은 대부분 식적이 원인입니다. 특히 여성은 더 그렇습니다.

신부전으로 인한 부종, 천식, 탈력감에 대한 변증은 어떻게 접근해야할까요?

태음인. 10년 이상 신부전이 있는데 투석은 안 함. 전신 부종과 비만이 심하시고 천식. 최근에 따님 시집보내면서 스트레스와 상실감이 겹치면서 기력이 떨어졌다고 함. 열증.

한증은 신양허, 신허수범 등등으로 접근할 수 있을거 같은데 열증은 신음허로 접근해야할지 아니면 어떻게 접근해야할지 모르겠습니다

(답)

신장 질환자가 전근(장딴지의 쥐내림) 시력저하 등이 동반되면 간병증으로 변증합니다. 그리고 허리 무릎이 잘 아프고 기억력이 현저히 떨어지고 어지럼증(여성이 더 심함)이 동반하면 신병증으로 접근합니다.

신장에서 배설이 잘 안되면 장딴지에 쥐가 내리는 경우가 많습니다.(쥐내리는 증상을 보고 간병으로 변증합니다.) 신부전이나 당뇨병 등의 병에서 많은 경우 간병증으로 변증됩니다. 전체적으로 크게 살펴서 변증합니다. 젊은 사람은 간병증이 더 많고 나이가 들수록 신병증이 더 많아 집니다.

(학생)

간병증으로 변증할 수도 있군요...정말 감사합니다^^ 그런데 '열증'인 경우 신병증을 보면 신음허증, 신음양양허증 두 가지로 변증할 수가 있는데 부종이 언급된 부분이 신음양양허증에 족부부종 한 부분밖에 없어서 이렇게 신부전을 깔고 계신 분은 어떻게 변증을 해야 하나 고민된 거였습니다 간병증까지 고려해서 처방하겠습니다 감사합니다^^

(답)

자다가 쥐내려서 주물러야 되고 잠을 깨는 정도면 간병증으로 보는것이 맞습니다.

태음인 열증의 부종

태음인 중 손,발, 얼굴 등이 붓는 분들이 많습니다. 이럴 경우 보통 산약, 연자육을 2돈 정도 가해 치료를 하면 되는지요? 아니면 위장의 문제로 보고 원방만 써보는게 더 좋을까요?

상기 환자도 만성적인 피로와 몸이 붓는 걸 주소로 내원했는데, 산약, 연자육을 쓸지 말지 살짝 고민이 되네요. 부종약으로 목통, 제조가 생각나기도 하는데 이것까지는 아닌것 같고... 위장은 조금 불편한 정도이고 수면, 심계 등은 정상입니다.

[안준철](#) 08.04.21. 17:19

목통을 심 소장 관계이서 쓰이는 약입니다.(심화를 소장을 통해서 빼주는 역할을 합니다.) 제조는 간경화나 간암 등의 질환에서 복수가 찼을때 쓰이는 약입니다. 젊은 여성은 식적으로 인한 부종이 가장 많습니다. 물론 음허증이 보이거나 심허가 보이면 산약 연자육을 가할수 있습니다.

더운 곳만 가면 붓다는 경우 어떻게 봐야 할까요?? 화열로 봐야 합니다. 황련, 치자, 연교를 활용합니다.

2006년 4월 유방암 수술하시고 그해 7월까지 항암치료를 받으셨던 분입니다.

성정은 급하시고 처음 한재를 소양인 한자로 보고 형방지황탕 가 목통 2돈 (목통이 태음인 약이라고 하시는데 딱히 생각나는 것이 없어서 응용했습니다.)

지금은 전체 붓는 것은 양호 한데 더운데 가면 붓는다고 하십니다.

치자.... 성정이 급하셔서 스트레스로 발생 한건가..??

황련.... 본래의 열로 봐야 하는가...??

시호... 스트레스로 인한열..?? 어혈...??

더운데 가면 붓는 다는 것에 대한 병리관 적용을 잘 못하겠어서 글을 올립니다.

안준철

목통이 소양인약이 아닌걸 알면서 쓰면 안 됩니다. 처음에는 약효가 있지만 점점 약효가 줄어들어 듭니다. 더운 데에서 더 붓는 건 화열로 인한 것입니다. 황련 치자 연교를 쓰면 됩니다. 체질에 맞지 않는 약은 약효를 오히려 줄어줄게 합니다.

■ 부인과질환(생리불순, 갱년기장애....등)

태음인열증의 갱년기증후군. 상열감. 무력감, 손가락의 통증

청심연자탕가 승마 4그램으로 속효

태음인 다낭성난소 증후군. 8개월째 무월경. 탈모 습진 심한 변비 등을 어혈저체증으로 해석, 단삼대황탕가 조각자 천패모 전충을 가해서 1년만에 생리를 하다.

한의원 직원 한 분(29세 미혼)이 생리가 8개월째 계속 없어서 산부인과에 갔더니 검사결과 다낭성 난소 증후군이라고 했습니다. 그래서 저번 달에 태음인 열증 무월경 기혈양허증으로 보고 단삼양혈탕을 한재 지어줬더니 먹고 잠을 자꾸 깼었는데 좋아지고, 변비가 심했는데 좀 좋아졌다고 하고 컨디션도 좀 좋아졌지만 생리에는 별 반응이 없다고 했습니다.

그런데, 한 십일전 본인이 모주기 검사를 해보더니 자기가 정수리 탈모가 진행되고 있다고 약침이랑 침을 좀 놔 달라해서 침을 놓는데, 오른쪽 무릎에 콩알모양의 빨간 습진이 많이 나 있어서 뭐냐고 했더니, 5월부터 생겼는데 피부과에서는 태선이라고 했다고 너무 너무 가렵다고 했습니다. 그래서, 탈모, 무월경, 수면불안, 습진 등의 증상을 어혈저체증으로 보고 단삼대황탕에 조각자, 천패모, 전충을 가해서 약을 지어줬는데, 하루 2회 5일 복용하고 1년 만에 생리를 하고 있습니다.

신경 많이 쓰면서 천면 심계 현기증 수반하는 월경과다를 간비불화로 판단, 연자소간탕가 단삼 녹각교를 처방해서 생리량을 줄이다.

45세 여성. 원래 생리량이 많아 불편했는데, 근래 들어서는 갈수록 심해져서 활동하기 무서울 정도라고 합니다. 요즘은 색도 어둡고 덩이도 많이 나온다고 합니다.

생리가 끝나고 나서는 현기증이 생겨 회복이 잘 안된다고 합니다.

최근 검사해보니 유착증이 조금 있다고 하고 1cm 폴립이 있어 요건 수술했다고 합니다.

요즘 딸을 시집보내느라 신경을 써서 천면, 심계가 좀 있었다고 하네요.

변비는 한 번도 없었으나 요즘 들어 저녁에 커피를 마시면 조금 못자는 것 같다고 말씀합니다. 간비불화로 판단하여 연자소간탕 가 단삼, 녹각교 0.5돈 처방했습니다.

드신지 열흘이 지나 확인해보니 그간 잠을 안 깨고 잘 주무셨고 지금 생리 중인데 양도 덩이도 많이 줄었다고 합니다. 지난번 비해 2/3 가량 준 것 같다고 하네요.

자궁은 간과 긴밀한 관계가 있다고 하는데 연자소간탕이 자궁에도 참 좋은 것 같습니다.

태음인열자의 생리전증후군(유방통, 부종 몸살, 신통)을 가감단삼대황탕가 주증대황으로 증상 소실(안)

주소증: 31세 태음인 열자 미혼 여성 생리통 생리전 증후군(유방통 부종 몸살 身痛)

변비가 있어서 대변을 3-4일에 한 번 씩 본다.

여드름이 많이 나고 얼굴색이 검어 보이고 생리혈에 덩어리가 많고 색이 검다고 해서 어혈로 변증했습니다.

처방: 가감단삼대황탕가 대황주증 4그램(주증대황은 어혈에 작용합니다. 태음인은 밀막걸리로 주증합니다.) *가감단삼대황탕: 단삼8그램 호장근 패장6그램 포황 백질여 길경 홍화 녹각교 각 4그램

결과: 한 달 복용 후에 왔는데 생리통 생리전 증후군이 모두 없어졌습니다. 유방통 신통 부종....특히 아침에 잘 붓는데 붓기도 없어졌다고 좋아합니다.(된장국만 먹어도 잘 붓는데 뭘 먹어도 붓지 않는다고 함)

고찰: 요즘은 생리통에 실패가 별로 없었습니다. 과거에는 성공보다 실패가 더 많았습니다. 복강내 어혈약은 정말 쉽게 잘 듣는 것 같습니다. 백질여가 골반내의 혈류를 증가시킨다는 사실을 꼭 이해하고 있어야 되겠습니다.

태음인 열자의 임신정심보음탕가감, 연자양혈탕 가감을 활용하다.

시험관아기 임신시도에 상황생화탕을 썼으나 별 무효. 관원부위 왕뜸이 도움되다.

44세, 여. 10년 7월 내원. 속이 많이 거북하고 신경쓰면 체하고 속이 울렁거리거나 신물이 넘어오기도 합니다. 대변은 3, 4일에 1번 가늘고 불쾌하게 봅니다. 치질이 있습니다. 피곤이 많고 깊이 못자며 아침에 뻣뻣한 느낌이 듭니다. 생리는 정상인데 생리통이 있습니다. 3년전 결혼했는데 2년전부터 시험관 아기를 시도했으며 3번 해서 3번 실패하고 이번이 4번째입니다. 작년엔 자연임신된 적이 있는데 역시 유산되었습니다. 자궁 왼쪽에 선근종이 있다고 합니다. 카페 친구에게 들었다며 이번 시험관할 땐 한방치료를 병행해 보고자 내원했습니다. 초진에 태음인 열자로 진단하고 구절초, 익모초, 인진쑥 등을 먹길래 끊으라고 했습니다.

침엔 침은 트라우마가 있어 못 맞겠다. 그저 체질만 알고 싶다고 하시면서 반항하시길래 일단 EFT 1회 시전 후 시침했습니다.^^;

이후 뜬치료를 해보시길 권해 드렸고 1주에 5회 정도 관원에 왕뜸을 했으며 1주에 1회 정도만 침을 놔드렸습니다.

뜸한지 1달이 못되어 변이 수월해졌고 아랫배가 따뜻해 졌으며 몸이 훈훈해져서 열이 난다고

합니다. 계속적인 식이 티칭 결과 아주 잘 실천하셨고 2달 지나서는 모든 게 베스트 컨디션이 되었습니다. 정말 아무런 불편이 없고 컨디션이 너무 좋다고 합니다. 대변은 매일 보고 속은 너무 편하고 몸 따뜻하고...

나이도 있으시고 여러 번 임신 실패경험이 있어 중간중간 EFT를 해드렸습니다.

드디어 10월 중순에 난자를 채취하고 수정시켜 20일에 이식을 했습니다.
그런데 안타깝게도 11월 10일경 착상 실패했습니다. 또 EFT 해드렸습니다..ㅠ

다음날 오셔서 자연임신을 시도해보고 싶다고 한약에 대해 물어봐서
3달 정도 권해드렸고 하겠다고 하셔서 바로 상황생화탕 처방했습니다.
하루 정도 먹고 생리가 터져서 3일 후 끝났는데 문제는 3일 후부터 다시 생리통처럼 아랫배가 아파서 잠을 거의 못 잔다고 합니다.

주변에 전문가한테 확인해보니 시험관 아기를 하면 워낙 홀몬제를 많이 써서
생리도 다른 때랑 다른 경우가 많다고 생리혈이 덜 빠져서 그럴 것이라는 조언을 받았습니다.

그런데 이 분 담날 와서 하는 말씀이 한약을 먹으면 심한데 안 먹으니까 그렇게 컨디션이 좋을 수가 없습니다. 지금은 전혀 안 아프다고 합니다. 그래서 그럼 반 팩만 드셔보시라 했는데 담날 와서 또 아랫배가 아프다고 호소합니다.

생화탕의 매력에 푹 빠져있던 저로서는;; 굉장히 의아한 반응이지만 이분이 컨디션이 너무 좋은 나머지...;;어혈이 전무한 상태인가 생각할 수밖에 없었습니다.

당신은 어혈이 없으니 바로 임신보강약을 쓰면 되겠다. 한 제 새이브했으니 이 얼마나 좋은 일이나며 드립..ㅠ 담약을 뭘 써야할지 고민 중 갈근조위탕 3봉 드렸는데 오늘 만면의 미소를 띄며 이약 먹으니 너무 좋다는군요. 몸이 아주 가볍고 땀도 전신에 축축할 정도로 나고 소변도 아주 시원하게 자주 보게 된다고 합니다.
갈근조위탕을 임신약으로 처방해 드려야 될 것 같습니다.^^;

이분 보면서 느낀 건

1. 하복 왕뜸이 아랫배 답히는 덴 참 좋다.
변비있는 분들이나 아랫배 찬 여자분들은 정말 잘 들었습니다.
2. 유산 후 생화탕이 부작용 나는 드문 경우가 있구나.
집사람은 생화탕 1년이나 먹었는데... 너무 좋아서...^^;

간단한 임상보고 였습니다.
이상입니다.^^;

착상실패도 유산의 개념으로 보고 산후, 유산후 조리에 쓰는 생화탕 드린거예요. 이 약이 오

래된 산후병에도 놀라운 효과를 몇 번 보여줬는데요, 10년 된 산후병에도 신기하게 듣더군요.
개인적으로 참 명방이라고 생각합니다.^^;

소양인 간혈허증(빈혈)으로 인한 수면장애 생리전후복통 무기력 전근 전신마목감 등을 빈혈에
쓰는 간혈허증의 생지황보간탕으로 호전시키다. 빈혈은 간혈허증으로 접근.

여자 미혼 29세 소양인 열자

주소증:1.전근==>피가 모자라면 근육이 혈의 자양을 받지 못한다. 혈이 부족하면 쥐가 내린다.

2.불면==>혈허면 불면이 된다.

3.생리전후 복통 하복부 불편감==>혈허면 생리전후에 더 불편해진다.(생리전후에 혈허
가 더 심해진다.)

4.전신 마목감(전신이 뻣뻣함)==>혈허면 몸이 부드러워지 못하다.

5.피로감 무기력==>혈허면 안색이 창백하고 무기력할 수 있다.

처방:소양인 열자 간혈허증(빈혈)에 쓰이는 생지황보간탕을 썼습니다.(15일간)

결과:모든 증상이 다 좋아졌다고 엄마를 모시고 약지으러 왔습니다.

고찰:환자는 전근(쥐내림)을 주소증으로 찾아왔으나 동의보감의 혈허증을 잘 숙지하고 있다가
일일이 혈허증을 확인하고 1석4-5조를 한 경우입니다.

즉 보혈하면 전근 수면장애 생리전후의 복통(혈허성 하복통) 근육의 뻣뻣함 등을 한꺼번에 해
결할 수 있습니다.

동의보감 공부가 더 중요하게 느껴집니다.

(혈허면 불면이다. 혈허면 쥐가 내린다. 혈허면 생리전후에 하복통이 생긴다. 혈허면 몸이 부
드러워지 못하다.등등은 외워둬야 겠습니다.)

생리전 증후군(부종 하복통 유방창통 식욕항진). 비신양허로 보고 교맥견비탕가 발계, 음양곽
동충하초 여성초를 가했으나 별 무효. 스트레스가 많다는 호소에 따라 현호색소간탕가 용담초
1돈으로 제반증상 소실. 태음인의 대항 소양인의 황련처럼, 태양인에게는 용담초가 중요하다.

태양인 한자 여성 42세

직업:공무원

주소증:생리 1주일 전부터 생리가 끝날 때까지 다리가 심하게 붓는다.

유방이 부어오르고 유두가 아프다.

아랫배가 불편하다.(생리 끝날 때까지)

불면과 함께 식욕항진도 함께 생겨서 과식하고 위가 탈이 난다.

처방1:비위가 상당히 허약하고 추위를 많이 타서 비신양허로 보고 교맥견비탕에 신양을 돕는
발계 음양곽 동충하초를 가하고 거습하는 여성초 비해 30일 복용

결과: 피로감과 소화장애 등은 매우 좋아졌으나 주소증은 호전안됨==>결과적으로 실패

처방2: 스트레스가 많다는 환자의 호소를 따라서 현호색소간탕에 간담열을 내리는 용담초 1돈
가해서 1개월간 복용

결과: 약은 무지하게 쓰지만 부종 유방통 식욕향진 하복통 생리통 불면 등 생리전 증후군의
모든 증상소실==>환자가 100%만족한다고 합니다.

고찰: 용담초가 진교와 더불어 용담과 식물입니다. 물론 이담작용 강하고 조습청열합니다.

태음인에게 대항이 중요하듯 태양인에게 화끈한 효과를 기대하려면 초룡담을 많이 써야
겠습니다.(약맛은 매우 씹니다.)

그리고 용담초는 간담의 습열에 작용해서 거습하고 청열조습하고 건비작용이 있어서 습
이 보이지 않을 때는 매우 주의해야 됩니다.

태음인의 대항,소양인의 황련 ,태양인의 용담초는 가장 강력하고 잘 듣는 약입니다. 양약 못
지않게 신속하고 효과가 빠릅니다.대항 황련 용담초는 BIG3입니다

태음열자의 생리통에 가감단삼대항탕 가감방 3례. 생리통제거 효과가 대단히 탁월하다.

태음인 열자 여자 4인에게 가감단삼대항탕가감방을 썼을때
그 중 3인에게 생리통 감소 효과는 먹는 즉시 나타났던 것 같습니다.
1인은 연락두절 ㅋㅋ

이OO 만 14세 여 생리통이 생리기간 1주일 내내 지속되었었는데 1월에 약복용 후 4월에 다시
왔을 때 까지 생리통은 전혀 없었다고 합니다. 청국장 냄새 난다고 불만 했지만 생리통이 없
어서 OK 처방은 냉이 많다고 해서 원방 + 삼백초 포공영 4g으로 했습니다.

이OO 만 18세 여

굉장히 마르고 피부더 건조하고 거칠고 예민하고 체력도 약한 여학생.

생리통도 심하고 손발도 차고 변비도 심해서 아침에 화장실에서 가스가 폭발하고 손발 부르르
떨리고 속도 더부룩

가감단삼대항탕 + 대항 여정실 주증 상심자 쇄양

1개월후 약 다시 복용할 때 생리통이 없어지고 대변도 나아지고 손발 떨리고 한것도 덜해짐.

-> 이후 상황보음탕에 단삼 대항 홍화 녹각교 등을 가미해서 체력도 많이 좋아졌다고 합니다.

신OO 만 16세 여

편두통. 생리통. 변비(2-3일에 1번) 불면. 어깨 뒷목 빠근. 현훈. 계속 졸림.

가감단삼대항탕 + 여정실주증 산조인 상심자 백자인 4g

-> 약을 잘 안챙겨 먹어서 1제를 2개월 이상 먹었는데도 동안 생리통 없어지고 두통 완화

-> 약떨어지고 다시 생리통 시작

-> 가감단삼대황탕원방 + 삼백초 포공영 대황 / 투여 2봉먹고 생리통 사라짐.

가감이 좀 깔끔하지 못해서 일관성이 없었지만 일단 가감단삼대황탕의 생리통 제거 효과는 뛰어난 것 같습니다. 하지만 패장이 들어간 약을 쓰면 청국장냄새가 한의원을 진동해서 슬프니다TT

좋은 임상례 감사합니다 ^^ 패장 쓸 때마다 냄새가 고역이었는데 저는 패장을 물에 30분 정도 담가 두었다가 달인 이후로는 냄새가 반 이하로 줄어들었습니다. 참고하세요 ^^

황대하에 연자소간가미방(간비불화, 간경습열, 간기울결, 습열재간담 등에 활용)임상2례

류 선생님께서는 간경습열증에 여러 증상이 나오지만
고환종창열통이나 대하황취 하나만 보고 써도 된다고 하셨습니다.

1. 69년생 여. 160cm, 60kg

태음인 한자로 대변을 하루 1, 2, 3회까지 보면 아랫배가 차고 소변이 시원치 않습니다.

피곤이 심하고 오후 되면 붓습니다. 냉이 많고 황색이며 음부소양증도 있습니다.

생리통도 있습니다.

주소증은 왼쪽 아랫배 부분이 불편하다는 것입니다. 오래되었고 있다 없다 반복됩니다.

간경습열증으로 보고 연자소간탕 가 포공영, 청호, 지부자 1돈 처방했습니다.

1제 드시고 냉이 완전히 없어졌고 아랫배 빠근한 것도 거의 없어졌습니다.

이어서 복약하시길 권했으나 1달 뒤 전화하셔서 요즘 냉이 조금 비치고 아직 왼쪽 하복이 찢찢한듯 아프다고 합니다. 같은 처방을 해드렸습니다.

2. 79년생. 여. 169cm, 81kg.

태음인 한자로 대변은 하루 2회씩 무르게 봅니다. 소화는 잘되나 시댁만 가면 아랫배에 가스가 찬다고 합니다. 한 해에 2명을 출산했는데 이후 빨리 지치고 화가 잘 나며 전두통이 자주 있습니다. 출산 2년 후부터는 생리가 빨라지며 생리통이 심해졌습니다.

색이 어둡고 덩이가 많으며 피곤하면 더 검어집니다. 양도 많습니다.

냉이 많고 황색이며 음부소양증도 있습니다.

간경습열증과 어혈증이 동반된 것으로 보고 연자소간탕 가 포공영, 청호, 지부자, 단삼, 녹각 1돈을 처방했습니다.

5일 드신 후 오셨는데,

약을 처음 먹는 3일동안은 덩이진게 쏟아지면서 냉이 펄펄 나오더라고요.

그 뒤로 냉이 굉장히 좋아졌습니다. 이젠 패드는 하지 않고 그저 조금 묻는 정도라고 합니다.

염증으로 인한 생성물이 빠지고 염증이 아물면서 잘 호전되고 있는 거라고 설명드렸습니다.

덜 피곤하고 화내는 횡수도 줄었습니다.

약 드신 후 아직 생리를 안했는데 유효한 효과를 거둘 것으로 기대합니다.

이상 태음인 한자의 황태하에 간경습열증으로 보고 처방하여

매우 유효한 효과를 거두어 보고드립니다~

간율이 문제되는 부인과에도 연자소간탕이 아주 유용한 처방임을 확인할 수 있었습니다.

감사합니다.^^

황금의이인탕가 대항 삼백초로 심한 생리통도 덜해지다.

생리통 심한 여성의 비만약으로 황금의이인탕(비위습열)가 대항 삼백초 각 4그램.

이것으로 생리통이 거의 없어짐.

건울보양탕 임신성공례 정용재 원장님

1. 건울보양탕 드시고 임신된 후 유산된 임상례, 다시 건울보양탕 드렸는데 오늘 다시 임신 확인했습니다. 막 애기집이 생겼다고 합니다. 상동처방했습니다. 건울보양탕 완소인데요.^^;

2. 임신 4주된 분이 어제 급복통, 하혈이 심해 밤새 고생하다 들르셔서 맥을 보니 확연히 緊細하네요. 자궁이 냉해지고 혈이 부족한 매우 안 좋은 상태로 보입니다.

그냥 보낼까 하다가 맥을 봤는데 신기하네요.(윗분은 활기차고 풍족한 맥의 느낌이었어요)

애가 어떠냐길래 확률적으로 말씀드릴 순 있어도 확정적으로 말씀드릴 수 없다고 검사 다녀오시고 조리하시라고 말씀드리고 하복에 뜸만 해드렸습니다. 재밌는 사례가 연타로 생겨 올려보아요~

건울보양탕; 음양양허증 방광허한증 신양허증 신기불고증 신기허증 신한요통
등에 가감해서 활용

윤승일 원장님의 임신치험례. 태음인 열자는 상황보음탕가 어혈약가감, 소양인 한자에게는 토사자보양탕 어혈약 가감방으로 임신 성공하다.

case1) 태음인 열자

태음인열자 30대 중반 임신원해서 상황보음탕에 어혈약 가감방 한 달만에 영양제 femguard+balance와 ovexP를 함께 복용시켰더니 바로 임신되서 정확히 해결을 해드렸네요. 이분은 이전에는 갈조탕+어혈약에 영양제로 첫 임신 했었습니다. 안원장님 감사합니다.

case2) 소양인 한자

저희 병원실장 또한 소양인한자 토사자보양탕 어혈약 가감방에 영양제 했더니 바로 임신됐습니다. 최근에 불임클리닉 안사상의학과 영양학이 만나면 대박입니다~감사합니다 안원장님

태음인 열증 만성 골반염을 어혈로 보고 가감단삼대황탕가 백렴, 조구등. 냉대하가 심하면 습열형으로 접근한다.

20대 후반의 태음인 열증 여성입니다.

1.증상:아랫배가 수시로 아프고 땀기고 음부가 아래로 처지는 느낌.(냉은 없다.)

만성골반염으로 수차례 입원해서 고단위 항생제를 몇일간 수액으로 넣었으나 효과가 없었고 수년간의 만성 골반염으로 인해서 심신이 피폐해진 상태로 본원에 래원.(만성골반염으로 인한 우울증 증세도 함께 있었습니다.)

2.처방:태음인 열증 복강내 어혈에 쓰이는 가감단삼대황탕에 기체혈어를 풀어주는 백렴 조구 등을 가했습니다.

가감단삼대황탕:단삼2돈 호장근 패장 각2돈 포황 백질여 길경 홍화 녹각 각 1돈

3.결과:2주를 복용하고 나서야 약효가 나기시작하더랍니다.

지금 한달째 복용중인데 증상이 소실됐다고 합니다.

그래도 재발의 우려가 있고 완치를 위해서 1개월 더 약을 쓰고 향후 3-4개월 음주금지 6개월 정도 음식 가려먹기로 했습니다. 골반염이 오래되면 우울증과 P.S가 됩니다. (여자는 자궁이 안 좋으면 정신도 불안정해집니다.)

과거에도 골반염을 치료 성공한 케이스가 있으나 이 환자는 음식과 생활지침을 너무나 잘 지켜서 1개월 만에 증상이 소실된 상태입니다.

일반적으로 2-3개월 걸린다고 해야됩니다.(1개월에 치료된다고 하면 우리가 곤란해 집니다.)

양방에서 잘 치료가 안되는 이런 질환들이 앞으로 우리 한의사들에게는 황금시장으로 부상 할 것입니다. 만약 이분이 냉대하가 심했으면 습열형으로 치료했어야 했습니다. 냉이 없어서 복강내 어혈약으로 치료했습니다.

사삼유근피탕으로 가래없는 식도성기침 해결하고 건울보양탕으로 임신, 배 따뜻해지고 손발의 냉기도 줄다.

첨엔 태양인인줄 알았는데 성격이 너무 우뚝하고 뚱뚱하네요.

누우면 어깨도 좌악 펼쳐져 있어 맘에 들었는데.....태음인인가봐요?

잔 기침이 낫지 않아 소문듣고 왔답니다.ㅋㅋ 전 기침환자 고쳐준 기억이 없는데....;

목이 간질간질하고 가래가 거의 없는 류썸 말씀하신 식도성 기침인가 봅니다.

변비는 없었고 커피는 잘 안 먹는데 먹으면 더 졸린듯 하다고.....;

상추, 수박, 회, 조개 등 대부분 음식에 문제 없습니다.

피부 두껍고 사우나 가벼우나 조금 처집니다. 이거 머 쓰다 보니 뚱한 태음인이네요. -.a

근데 식장탕 하루치 먹고 와선 왜 짝매 나온 거 같다는 거지....

정말 뚱한 태음인이 맞나 봅니다. 그렇죠?

사삼유근피탕은 역류성 식도염으로 인한 해수에 특효방이라고
류주열 선생님이 소개하신 처방입니다. 가래가 거의 없는 것이 특징이죠.
약 드시는 중 거의 기침이 소실되었습니다. 소화도 아주 잘된다고 좋아하시네요.

주위에선 살 빠지는 약 먹냐고..살도 빠지더라고요.

약 안 먹고 일주쯤 됐는데, 다시 기침이 좀 생겼습니다.
계속 먹으면 톱 떨어질 것 같습니다. 이 분 그 뒤로 기침 조금 생길만 하면 오셔서
3제 더 드시고 기침에서 완전히 쾌유되었습니다.
일러드린 체질식도 어느 정도 잘 하셔서 컨디션이 전반적으로 좋았습니다.

2010년 1월 어느덧 결혼하여 아이를 갖고자 한약을 먹으러 왔습니다.
손발이 찬지 오래되었고 최근에는 배가 좀 차다고 합니다. 예전에 생리통이 심했으나 지금은
괜찮습니다. 맘도 편하고 몸도 편한 상태입니다.

건울보양탕 드시는 중 임신이 되었습니다. 배도 따뜻해지고 손발도 냉기가 많이 줄었다고 했
습니다. 그런데 회사에서 강행군을 좀 하는 바람에 유산이 되었다고 하시네요.
이후 배가 다시 차지고 허리도 조금 아파졌습니다. 다시 건울보양탕 처방해 드렸습니다.

**소화곤란, 변비가 심하면서 생리불순 수족냉, 하지의 심한 통증. 갈근조위탕(대황8)가 승마 포
공영4g으로 호전시키다. 대소변불통과 中滿을 선결하는 것이 치료의 대원칙.**

만 17세. 고 3 올라감.

#. 주소증

1) 고3인데 하루 종일 책상에 앉아 있다 보니, 다리가 피가 쏠리는 느낌으로 붓고 터질 것
같다. 최근에는 그게 심해져서 반점 같은 것이 생겼다.

(실제로 마치 명 들듯이 손톱 반 정도 크기만한 반점들이 종아리에 보입니다)

2) 생리불순

중2때 초경을 시작했는데 처음에도 1년 정도 불규칙했다.

중3때부터 월경이 나오지 않았고 나오겠지 싶어서 그냥 두었는데 계속 나오지 않아서
작년 여름에 산부인과에 내원해서 검사하고 (검사상 별거없음) 양약 먹으니

1번 생리 후 다시 현재까지 월경이 나오지 않는다.

@ 대변 - 변비가 굉장히 심하다.

1주일에 1번 정도 대변 봤는데 청국장 먹고 그나마 3일에 1번 정도 본다.

** 이 분은 보통 젊은 여성들이 아프면 가지고 있는 증상을 다 가지고 있네요.

소화 안 되고 변비 있고 생리 안 좋고 손발차고...--::

이럴 경우 처방은 보통 어떤 방향으로 잡아야 하나요?

생리불순은 뭐 초경부터 좋지 않았으니 간신부족 간울혈어검신허증으로 쓰면 될 것도 같은데

다리 붓고 아픈 증상은 소화기 장애일까요? 그럼 태음인이면 갈조에 대황 많이 넣고 쓰면 될까요? 일반적으로 젊은 여성분들 한의원에 많이 오시는 유형인데 치료 경험 있으신 분 안 계시나요 고견 부탁드립니다. 감사합니다.

<안준철> 태음인이 확실해 보입니다

<김태규> 태음인 열증 여자분들 중에 변비심하고 자궁 약한 분들... 제 개인적으로는 갈근 조위탕에 대황 적당히 증량하고 연자육 산약 상황 2돈씩 가해서 좋은 효과 본 적이 아주 많았습니다... 생리는 다음에 할 때까지 기다려야 하니까 경과 관찰이 힘든데 이런 경우 대부분 냉이 많이 나오는 경우가 많으니 냉이 줄어들면 자궁 좋아지고 있다고 설명 드립니다. 참고만 하세요

=> 갈근조위탕 (대황은 8g) + 승마 포공영 4g

현재 치료 중인데 다리쪽 통증은 많이 호전되었습니다.

며칠 전에 이용양 원장님 동의보감 강의 중에 '치료의 대원칙은 大小便 不通過 中滿이다.'

라는 말씀을 듣고 나서 보니 대변 불통을 해결 해주니까 하초쪽에 흐름이 개선 된 것 같습니다. 어쨌던 통증은 없어졌고 부종은 줄어들고 있으며 무엇보다도 환자 보호자가 자기 딸 매일 대변 본다고 좋아한다고 합니다.

생리가 없는 것은 그대로이고, 전에는 생리통이 없었는데 생리 때가 오니까 자꾸 아랫배가 아프다는 것 보니 무슨 징조가 있기는 있는 모양입니다. 다리 통증 치료가 끝나고 나면 무월경 치료해야겠습니다. 도움 주신 선생님께 감사드립니다...^^;;

20년 된 만성대하(질염), 45세, 신음허로 보고 정심보음탕가 살충 양혈 지혈하는 괴화, 천문동 목통으로 증상 거의 소실. 은행(백과)초를 같이 먹게하다. 은행초에 지대작용이 있다.

45세 태음인 열증 여성. 20 여년 전에 딸을 임신한 상태에서 면역의 약화와 함께 가림증과 함께 냉대하 발생. (원래 임신 중에는 면역이 약해져서 칸디다균 등에 감염이 잘 됩니다. 이때의 증상은 주로 분필가루 같은 뿌연색의 대하가 발생합니다.)

20여년째 냉대하로 일 년에 절반은 항생제 주사를 맞고 항생제를 복용하고 별 방법으로 치료를 다 했으나 요즘은 더 심해져서 항생제조차도 듣지 않는다.

이로 인해서 전신적 건강은 물론이고 정신적으로도 우울하고 피폐한 상태였습니다.

1.첫번째 처방=>냉의 양이 너무 많아서 실증성 습열로 보고 유근피도적산 썼습니다. 결과는 실패였습니다.

2.두번째 처방=>갱년기 증상도 동반되고 체력의 저하가 너무 심해서 신음허증에 쓰는 정심보음탕에 살충 양혈 지혈하는 괴화를 가하고 천문동 목통을 가했습니다.

결과는 놀라울 정도였습니다. 거의 증상이 없어졌습니다. 한재 20 여일째 정심보음탕 가미방을 드리고 계시는데 증상이 소실됐다고 합니다. 항생제 없이 그 심한 염증이 완치된 예라고

하겠습니다.

섭생과 주의사항: 철저한 체질식과 완치 후에도 3개월 이상 체질식을 권했습니다.

그리고 대하를 멎게 하는 은행을 볶아서 아침 저녁 10알씩 드시게 했습니다.

이 분은 지나치게 청결 의식이 강해서 뒤통을 하루에 두번 한다고 말씀하셔서 뒤통을 금지시켰습니다. 뒤통을 자주하면 질 내의 산도 유지에 나쁘고 유익한 세균이 증식할 기회가 없어진다고 말씀드렸습니다. 그리고 완치시까지 과일을 금하게 했습니다.(곰팡이는 당을 먹고 자랍니다, AK윤원장님의 가르침)

소고: 첫번째 약의 실패의 원인은 아무리 증상이 심해도 병의 근본적인 원인을 다스려야 된다는 사실을 알게됐습니다. (원래 병세가 급하면 표를 먼저 다스리지만 이분은 항생제로 인한 체력저하가 너무나 큰 상태였습니다.) 그리고 음식이나 섭생의 중요성을 다시 한번 느끼는 순간이었습니다. 지금까지 체질도 알고 병의 원인도 잘 알고 치료방침도 있었으나 처방이 없어서 해결이 안 되던 질환들이 류샘 처방으로 속속 해결되고 있습니다

(안) 은행초가 지대작용(대하를 멎게하는 작용) 있습니다. 그리고 어린이의 야뇨증에도 쓰이는데 잠 잘 때 헛 땀을 흘리는 폐기허의 증상을 보이면 행인과 함께 백과초를 씹니다.

와우, 변증의 힘이 새삼 놀랐습니다. 은행두요. 은행효과 지대루다~^^;;

소양인 열증여성 갱년기 장애. 갱년기장애는 무조건 신허. 열증음허에 쓰이는 구판보음탕까지도 황백 염초 별갑1돈으로 증상 소실. 구판은 보음하는 작용이 강하고 별갑은 잠양해서 퇴열하는 작용이 강하다.

55세 변비가 좀 있는 소양인 열증 갱년기 장애 환자

얼굴이 화끈거리고 잠이 오지 않고 우울해 하는 것이 주소증이었습니다.

남편과 함께 왔었는데 진찰 중에 눈물을 보이기도 하시면서 정서적 불안정을 나타내고 있었습니다. 갱년기 장애는 무조건 신허입니다.(한증은 신양허...열증은 신음허)

소양인 열증 음허에 쓰이는 구판보음탕에 지모염초 황백염초 별갑1돈씩 가해서 썼습니다.

2봉지 복용후 얼굴의 상열감이 사라졌다고 합니다.

한약이 너무 잘 들어서 영업에 지장이 좀 되는것 같습니다.ㅋ

구판은 보음하는 작용이 강하고 별갑은 보음하지만 퇴열(열을 물리침)하는 작용이 더 강합니다.

이렇게 잘 듣는 한약을 왜 온국민이 외면하는지 모르겠습니다.

류샘 처방 너무 잘 듣습니다. 원망스러울 정도로...2재는 쓰고 나아야 되는데 2봉지에 증상소실...아 기대하던 바를 넘어서도 좀 당황스럽습다.ㅋ

구판은 보음하는 작용이 강하고 별갑은 잠양해서 퇴열하는 작용이 강하다는 사실을 꼭 기억해야겠습니다. 한련초는 성질이 너무 차서 설사를 잘 하는 사람은 조심해서 써야됩니다만 이분은 변비라서 안심하고 사용했습니다.

지모 황백은 생용하면 실화를 사하고...염초하면 허화를 사합니다. 즉 이 분은 갱년기로 인한 허약에서 출발한 허열이라서 염초한 것을 사용했습니다. 지모 황백은 동의보감 진액문에서 정기탕으로 나옵니다. 즉 열로 인해서 정기가 땀으로 새나가는 것을 막아줍니다. 동의보감은 처방이 어느 편에 실려있느냐가 저자 허준선생님의 의도가 드러나는 부분입니다.

산후풍(출산 1개월반 후 각종 부종, 어지러움, 소변불편, 불면, 관절통)에 연자생화탕으로 저효

29세. 가정 주부, 태음인

==> 연자생화탕 (의이인 12 연자육 8 상황 녹각 포항 속단 홍화 4 호장근 목통 2) 15일분 [09-03-20] 오늘 내원하셨습니다.

제반 증상이 호전되었다고 합니다.

부종은 없어졌고, 어지러움도 없어졌으며, 소변은 시원하고, 잠은 아주 잘 잔다고 합니다.

다만 허리쪽 통증과 발목쪽 통증이 남아 있다고 하고 침 치료를 권했으나 아프다고 안맞고 간답니다..^^.. 일단 약 먹어 보고 안 나오면 다시 오라고 티칭했습니다.

너무 FM적인 임상례였네요...쉬웠죠...변증이 따로 없으니...--::

태음인 한증 산후풍에 연자생화탕...

11세 여아 원발성 生理痛, 태음열증. 간혈허로 보고 단삼보간탕처방. 저효.

#. 주소증 : 생리통 (원발성 / 초경한지 3개월),

태음인 단삼보간탕(간혈허) 처방했습니다. 생리할 때 생리통 없어졌다고 합니다.

원발성 생리통을 특별하게 스트레스가 심하지 않아 보여 자궁 발육 부전 (허증) 쪽으로 보고 補하는 처방을 사용해 봤습니다. 결과에 행복합니다. 선생님께 감사드립니다.

태음인 희발월경, 부종 미륵골통, 여드름을 열다한소탕가감방으로 치료하다.

주소증 : 희발월경(3개월주기) 및 월경량 과소/ 부종 및 미륵골통

올해 3월 20일에 내원한 태음인열증 21세 여환입니다.

상기주소증으로 내원했었습니다. 문진해보니, 희발월경이지만 3개월주기로 일정하고, 생리혈에 덩어리가 있으며, 생리통시 좌측편으로만 소복통이 있고, 3년전 희발월경이 될 무렵부터 **안면 중 우측관골부만 특징적으로 여드름이 다발(거의 이부분만 집중적으로)**하여,

<열다한소탕 가 대황 1돈반, 조각자 1돈, 포공영 1돈> 30첩 45봉하여 처방한 후, 3개월 후 내원하라 티칭하였습니다.

전일 환자분 내원하여 상담결과.

1. 생리 - 복용후 5일후에 하혈(생리시 복용중단권유)/ 4월말과 5월말에 각각 생리하였습니다 / 아직 양은 적습니다.
2. 생리통 - 4월말 생리시에는, 생리전부터 우측 소복부 통증이 생리시작시까지 지속되었습니다. 환자는 처음 있는 일이라 하였습니다.
3. 우측관골부여드름 - 저는 첫내원시의 상태가 기억이 잘 나지 않으나, 환자분은 만족해 하였습니다. 갯수와 크기가 전반적으로 감소하였다 하였습니다.
4. 부종 및 두통은 소실되었습니다.
5. 대변은 약 먹는 동안은 매일 보았으나, 약 먹지 않자 다시 매일 못 본다 하였습니다.(첫내원당시 1회/ 2일)

<상방 가 단삼 1돈> 30첩 45봉하여 처방하고, 3개월 후 다시 오라 하였습니다.

상기 환자의 경우 저 개인적으로는 조각자의 '뚫는 힘'에 주목하고 있습니다..^.^;

여성월경문제와 여드름이 짝을 이룬 케이스라 글 올려보았습니다. 안선생님께 감사드립니다~^.^

생리전증후군을 간병으로 보고 백자양간탕 혹은 상자양간탕에 조구등 백질려 감국, 대황 포황 호장근 단삼 홍화 등을 가한다. 호장근은 담음과 어혈을 동시에 다스린다.

간증상으로 보여집니다. 열자라서 간음허에 쓰이는 백자양간탕이나 상자양간탕에 조구등 백질려 감국, 생리통을 보고 대황 포황 호장근 단삼 홍화 등을 가할 수 있습니다. 오심이 있고 생리와 관계된 질환은 호장근이 탁월합니다. 호장근은 담음과 어혈을 동시에 다스릴 수 있기 때문입니다.

갱년기증상은 신음허로 변증합니다.

태음인 열증의 생리통에는 가감단삼대황탕이 있다(처방내용있음).

생리통에 쓰는 가감단삼대황탕이 따로 있습니다.

가감단삼대황탕-태음인열자의 월경통 기체혈어증

<단삼 8그램, 호장근 6그램, 패장 6그램, 포황 4그램, 백질여 4그램, 길경 4그램, 홍화 4그램, 녹각 4그램> 단삼대황탕과 조금 다릅니다

생리량이 적은 것도 간혈허에 속한다.

한열이 不明한 장기간의 산후허로, 갈근조위탕으로 한열을 가린후 보신하는 약을 장복한다.

태음인 한열을 갈근조위탕으로 확실하게 확인한 후 보신하는 약을 장복한다. 갈근조위탕으로 설사하지 않거나 설사하더라도 대변이 시원하면 열증이다. 헛땀이 심하게 많으면 음허일 수 있고 음허에 기허가 겹쳤을 수도 있다(열자의 경우). 대항은 식적 담음 어혈을 다 몰아낼 수 있다. 대소변량이 늘면서 어혈증상도 한꺼번에 해결된다. 이담, 이뇨작용이 있고 간보호작용도 매우 뛰어나다. 절대 무리가 되지 않는다.

태음인 열자의 자궁근종 수술 후 하복부 통증 및 하혈증상을 어혈로 보고 상황생화탕을 기본으로 가감하려 함. 태음인의 활혈지혈에는 포황초가 가장 적합, 어혈에 대항주증을 쓴다. 밀막걸리 사용.

자연유산과 동시에 자궁근종 수술을 하고 난 후 하복부 통증 및 불쾌감 하혈이 조금씩 비추는 증상을 주소증으로 호소하고 있습니다. 어혈로 보고 <상황생화탕> 을 기본으로 가감하려고 합니다. 일단 '단삼' 정도를 가할 생각입니다. 하혈증상에 '승마 포공영'은 어떨까요?

답)

태음인의 활혈지혈을 목표로 하면 포황초가 가장 적합합니다. 검게 초해야 지혈작용이 있습니다. 태음인의 어혈에는 대항주증을 씁니다. 이때 술은 쌀막걸리는 안됩니다. 밀막걸리를 이용해야 됩니다. 포천 이동막걸리 검색해서 택배로 주문하면 됩니다. 물론 태양인약의 주증은 쌀막걸리로 합니다. (김상인) 감사합니다. 포황초흑 하고 대항주증 해서 쓰겠습니다.

태음인 열자. 출산하면서 포를 상한 주부의 경우 어떻게 처방에 접근을 해야 할까요?

--> 산후허로증이 있으면 산후조리에 준해 생화탕을 응용하고, 요슬통, 현훈있으면 신허에 해당되므로 보음탕을 쓴다. 오미자는 축뇨작용.

동의보감 소변문에 부인이 해산으로 포를 상하여 소변을 불금하고~ 이런 부분이 나오는데요. 오늘 오신 환자분이 딱 그 케이스입니다. 10월 말에 자연분만으로 출산을 하셨는데 자궁 내에 피가 고여 있어서 출산 후에 다시 한 번 긁어내셨다고 합니다. 또 회음 열상도 심하셨다합니다. 그러고서 소변을 2시간에 한 번 정도 보시는데 어느 순간에 참을 수가 없어서 흘리는 경우가 많다고 하십니다. 출산하시고 거의 두 달이 다 돼가는데도 그러신다고 합니다. 이런 경우 일단 산후 조리 개념으로 생화탕류나 신허로 접근해서 상황(정심)보음탕이 먼저 생각이 나는데요. 이런 경우에 사상의학적으로 효율적으로 치료해드릴 방법이 있을까요?

(답)머리카락이 빠지는 등의 산후허로증이 여전히 있으면 산후조리에 준해서 생화탕을 응용합니다. 허리 무릎이 잘 아프고 어지러운 증상이 동반되면 신허에 해당하므로 보음탕을 씁니다. 오미자가 축뇨하는 작용을 합니다.

태음인 열증, 갱년기장애. 일단 신음허로 시작해서 나머지증상 잡아나간다.

49세 여성. 부정맥 흉통. 밤기침 심. 전중통. 불면 무력 피로, 추위 타고 손에 쥐가 잘 남. 허

가 마르고 화끈거림 구건. 다한 도한. 93년도 자궁적출 수술함.

(안)

나이와 증상으로 보아 갱년기증후군에 해당. 신음허증으로 보입니다. 신음허증으로 대세는 잡을 수 있을 것입니다. 다음에 남은 증상을 잡아나가면 됩니다. 부정맥도 신음을 보하면 좋아 집니다.

태음인한증의 임신오저(6주경과)처방 있음.

임신오조중 비위허약형

- 가장 흔함. 손가락 놓다가 화장실가서 꽤팍(tv드라마에서 흔히 보는 경우들)///

* 양형; 태음조위탕 거 마황 맥문동 가 비파엽 죽여 혹가 녹용

* 음형; 건울보위탕 가 비파엽 죽여 혹가 녹용

<류샘강의프린트중발췌했습니다>

(안준철) 임신오조나 구역에는 淸熱化痰하는 죽여가 가장 중요합니다. 비파엽은 위에 작용해서 止嘔작용이 있습니다.

태음인 49세 갱년기장애, 상열감..한열왕래, 두면부다한

--> 간신음허증으로 보고 상황보음탕 혹은 정심보음탕 가 산조인초

<백자양간탕 거 산약 가 황금 천마 조구등 백질려> 처방했습니다.(20첩 120cc 30팩)

♣ 백자양간탕은 간양상항, 간양화풍에 사용

하루2번씩 열흘정도 드셨는데, 자꾸 춥다고하시네요

상열감 한열왕래나 두면부 汗出은 그대로 라고 합니다.

대신 소화는 전보다 잘되고, 대소변도 횟수는 그대로이지만, 전보다 시원하게 분다고 합니다. 수면은 여전하고요. 자꾸 추워서 약이 안 맞아서 그런 거 아니냐고 오셨는데, 소화나 대소변이 괜찮은 걸로 봐서 약은 잘 맞다고 말씀드렸습니다.

(안)

간신음허증으로 해보시기 바랍니다. 상황보음탕가 산조인초 또는 정심보음탕가 산조인초

갱년기증후군은 거의 신허증이다(신음허 혹은 신양허). 당뇨같은 소모성질환도 신허증이 가장 많다.

나일로 봐서 폐경기의 갱년기 증후군과 관련이 있다고 봐야겠습니다. 열증이라서 신음허증에 해당됩니다.(한증이면 신양허증입니다.) 폐경기의 갱년기증상은 거의가 신허증입니다. 당뇨병 같은 소모성 질환도 신허증이 가장 많습니다.

통증이 심해서 실증인 태양인의 생리통에 도인백모근탕가 양강(기체혈어)

통증이 강하면 실증이고... 통증이 은은하면서 따뜻하게 해주면 통증이 줄어들면 허증입니다. 이분은 통증이 많이 심해서 실증에 속합니다. 기체혈어를 다스리는 처방을 써야겠습니다. (도인백모근탕) 위가 약해서 양강을 0.5-1돈 가해야 합니다.

태음열증. 스트레스 받고 생리량 줄어서 간혈허의 단삼보혈탕

가끔 상열, 구고, 현훈 두통, 가끔 유방통. 간혈허에 쓰는 단삼보혈탕 써보세요.

51세 태음인 열증의 갱년기피로, 갈근조위탕가감으로 실패하다. 산약 연자육은 소변 대변 정액 등이 아래로 썰 때 쓴다. 변비에는 오히려 역작용한다.

주소증 : 갱년기, 피로, 슬통, 손목통, 두증, 안침.

현재 51세.

소화-계속 먹고나면 트림을 함.

대변-그냥저냥.3일/1회.5일/1회.

커피반응-예전에는 있었음.손발이 떨리고..

갈근조위탕 (대황 1돈반) (가) 승마 위령선 조각자 1돈, 홍화 5푼, 산약 연자육 1돈
20첩 30포 하루 2회 복용.

=>

3일간 복용하고 많이 부으신다고 합니다. 소화도 좀 불편하시다고 하고..

5일동안 대변은 2회 보셨다고 하네요...원래 변비가 있으시긴 한데 부종은 심하지 않으셨는데 요..

=> 약을 다시 처방을 해야할지...그냥 복용시킬지 고민입니다. 고견을 부탁드립니다

(답)

위령선은 온열한 약성입니다. 열증에 주의해야 됩니다. 연자육은 수렴하는 작용을 합니다. 연자육은 소변 대변 정액 등이 아래로 썰때 씁니다. 변비에는 오히려 역작용을 합니다.

--> 감사합니다. 차라리 원방을 쓰는 편이 나을뿐 했네요.. 소중한 가르침에 항상 감사드립니다.

태음인 열증 산후풍에는 어떤 처방이 좋습니까? 오래되지 않았으면 생화탕, 오래 된 경우라면 신음양양허나 간음허증, 혹은 간혈허증으로 본다. 관절이 두루 시리면 간병증으로, 요슬위주가 되면 신병증으로 간주한다.

태음인 열증이시구요, 애기 놓고 나서 등전체가 특히 많이 시리고, 관절도 시린다는데 어떤 처방이 좋습니까?

출산한지는 한 8개월 지났습니다. (올해 1월에 출산했습니다)

조언 부탁드립니다. 감사합니다.

(안준철)

산후 얼마나 지났는지요? 오래된 경우가 아니면 태음인 생화탕을 쓰면 될 거 같습니다. 오래된 경우면 신음양양허나 간음허증 또는 간혈허증으로 봐야겠습니다. 어지럼증이 있는지? 맥이 세삭한지? 면색이 위황한지 등이 관건이 됩니다. 어차피 맥진이 안 되면 완벽한 변증은 없다고 생각합니다.

김상인

산후 한 8개월 정도 되었습니다. (올해 1월에 출산했습니다) 그럼 생화탕이 좋을까요? 아니면 신음양양허약이나 간음허약 또는 간혈허증약이 좋습니까? 새벽에 시린 증상이 심해진다고 해서 일단 허증으로 보고 신음양양허증약 (태음인 열자 정심보음탕 가 녹용 쏘양)으로 처방 고려하고 있습니다.

안준철

관절이 두루 시리면 간병증으로.... 허리 무릎이 위주가 되면 신병증으로 접근합니다.

갱년기장애는 신허, 열증은 신음을 보하는 처방에 보양하는 약을 가하고, 한증은 신양을 보하는 처방에 보음하는 처방을 가하므로, 같은 음양양허라도 한열에 따라 처방이 달라진다. 별갑은 소양인의 녹용에 해당할만큼 좋다.

한증은 양허가 먼저오고 나중에 음허가 옵니다. 조열은 음허입니다. 즉, 양허가 있는 상태에서 음허까지 생기게 됩니다. 소양인 한증의 음양양허증에 해당합니다. 구판은 잠양시키고 간신을 돕습니다. 별갑은 비간신에 속합니다. 별갑은 소양인의 녹용이라 할만큼 좋습니다. 구판 강추합니다.

참고로 열증은 음허가 먼저오고 음허가 잇는 상태에서 양허까지 겹치게 됩니다. 음양양허가 됩니다. 열증은 보음하는 처방에 보양하는 약을 가합니다. 한증의 음양양허는 보양하는 처방에 보음하는 약미를 가합니다. 그래서 같은 음양양허라도 한열에 따라 처방이 달라집니다.

다이어트하고 나서 6개월째 생리 끊긴 한증 태음인, 간혈이 모자라서 끊긴 것이다. 원인을 생각한다. 신경을 많이 켜면 간기울결이나 간화상염, 불면이 심했으면 심화로 본다. 음식을 제대로 먹지 않아서 빈혈증상이 있거나 손톱이 잘 부서지거나 근육의 전근 시력저하 등을 호소하면 간혈을 도와야한다.

커피 먹고 잠 안 온 적이 한 번도 없고 두 달전 한달 동안 다이어트 한다고 밥을 아침만 먹었을 때 이외에는 변비가 단 한 번도 없었고 금방 보고 시원하게 봤다고 해서 태음인 한증으로 보고 있습니다(맞겠죠? ^^)

초경부터 생리이상은 없었고 생리통도 없었는데 2년 전부터 가끔씩 걸려서 2개월에 한 번씩 하더니 6개월 전부터는 생리를 한 번도 안했다고 합니다 통증이나 불편감도 전혀 없는 상태입니다. 식욕저하나 복통은 없는데 눌러보니 압통도 있고 가스도 많이 차있는 상태이고 대변은

요근래 1일 2-3회 시원치 않게 보는데 아랫배도 좀 불러 있습니다. 잠은 잘 자는데 자고 일어나도 피곤하다고 하고요.

태음조위탕 가 갈근2돈 승마 황금 대황 포황 1돈 생각해보고 있긴 한데요
더 좋은 방법이 있을까요? 조언 부탁드립니다

안준철

다이어트 후유증은 간혈이 모손되서 생리가 끊어진 상태입니다. 혈허증입니다. 간혈허증 처방을 써야됩니다.

김봉찬

생리가 끊어진지는 6개월이 되었고요 다이어트는 살이 썩어서 생리가 끊어진 거라고 개인적으로 생각하고 2개월 전에 한달 동안 했었는데 2-3키로정도 빠지고 생리에는 변화가 전혀 없었다고 합니다 산부인과는 기분이 좀 그래서 안 갔다고 하고요

안준철

이런 경우에는 증상보다 원인을 생각해서 치료하는 것이 원칙입니다. 신경을 많이 썼으면 간기울결이나 간화상염 불면이 심했으면 심화로 봅니다. 음식을 제대로 먹지 않아서 빈혈증상이 있거나 손톱이 잘 부서지거나 근육의 전근 시력저하 등을 호소하면 간혈을 도와야합니다.

태음인 출산후 심한 하혈로 인한 소변불리, 과다출혈에는 비불통혈 처방

태음인 열증입니다. 출산을 하면서 아기머리가 커서 질구가 손상이 좀 되어서 하혈을 조금 많이 했다고 합니다. 그 외에는 애기도 건강하고 다 좋은데 일주일이 지난 지금까지 소변을 보지 못해서 도뇨를 했다고 합니다. 이런 때에는 어떤 식으로 처방을 구성해야 할까요?

조언 부탁드립니다

(안준철)

과다출혈에는 비불통혈 처방을 사용합니다.

생리통에 흉요추 연접부의 협착혈치료를

안준철

생리통은 심간과 관련된 경우가 가장 많고 척추에 이상이 있으면 약이 잘 듣지 않습니다. 이때는 흉추와 요추의 연접부의 협착혈에 침을 놓거나 봉독을 사용하면 아주 좋습니다.

태음인 6개월간 經閉, 혈병은 혈장기인 심간을 다스려야 한다. 갈근조위탕에 산약 연자육 황금(심화) 승마 포공영(간열)을 가해본다.

42세 여환입니다. 6개월 전부터 생리가 안 나와 상담하게 되었습니다.

부인과에서는 폐경이라 하고, 내과에서는 아직 아니라고 하는데,

조금 서운해 하는 눈치라 한 번 해보자고 했습니다.

전에도 증치방으로 이런 경우에 유효한 경우가 있어 시도해 보았지요.

태음인 열증이어서 갈근조위탕 가 산약 연자육 포황 홍화 가 녹용.
복용후 별 무효과네요. 42세면 이르지만 생리적 폐경기 이긴 한데,
여지가 있을까요? 조언 부탁드립니다.

안준철

혈병은 혈장기인 심간을 다스려야됩니다. 산약 연자육 황금(심화) 승마 포공영(간열)을 가해서
써보는 것이 좋겠습니다.

소음인 한증의 갱년기 증상에는 무슨 처방씀니까? 무조건 신허. 열자는 신음허증, 한자는 신
기허증. 신양허증으로 접근하지 않는다.열을 더하기 때문이다.홍삼보양탕에 건강 부자는 뺀다.

열증은 향부자팔물탕 쓴다고 되어 있는데 한증에는 어떻게 쓰는지요?

안준철 11.11.26. 12:49

갱년기 증상은 무조건 신허입니다. 열자는 신음허증으로 한자는 신기허증으로 접근합니다. 한
자는 신양허증으로 접근하지 않습니다. 신양허증의 처방은 열을 더하기 때문입니다.
홍삼보양탕에 건강 부자는 빼고 씁니다

소음인 아가씨의 생리가 멈추지 않는데 대한 접근방법. 원인별 기본처방과 가감법정리.

안준철 09.01.06. 16:31

지유(초) 아교주 건강(초후), 이 세 가지 약물이 소음인의 지혈약입니다. 허리가 잘 아프면 파
고지를 가합니다. 수족이 냉하고 추위를 잘 타면 신양허증입니다. 스트레스성은 향부자가 주
약입니다. 설질이 암갈색의 어혈증을 보이며 검은 덩어리가 많으면 어혈로 보고 생화탕류에
지혈약을 가합니다. 비위가 허약하고 월경색이 연하면 비기허에 쓰이는 백출건비탕에 당귀 천
궁 그리고 지혈약을 가합니다.

■소아과질환

2년간 항생제 달고 있는 소아에 자완청열탕 치험례

08년생 남아입니다. 늘 감기를 달고 산다고 합니다. 2년 넘게 항생제를 복용해 왔고
한번 먹으면 3달 쉬지 않고 먹이는 일이 흔하다고 합니다. 1달간 한약을 복용할 것을 권했습
니다. 폐경풍열에 쓰는 자완청열탕에 녹용 2g을 넣어서 처방했습니다.

10일 이후에 전화하니 증상이 완전히 소실되었습니다. 20일 정도 지나도 코 한방울 나지 않
는다고 합니다. 약을 1제 더 이어 먹기를 권하니 한약을 많이 먹으면 간에 부담을 주는거 아
니냐고 쉬었다 먹었으면 합니다. 조용히 타일렸습니다.

태음인 소아 야뇨 치험례- 간비불화증의 연자소간탕 가 쇠양 녹각교 호도

03년생, 여아, 초1. 2010년 5월20일 내원. 밤에 오줌을 싸지 2년이 되었다고 합니다. 매일 싸기도 하고 주 2, 3회 이상은 싸입니다. 예전엔 자다 깨우면 못 깬으나 지금은 스스로 긴장하고 자서 비몽사몽 일어난다고 합니다. 그래서인지 낮에 많이 피곤해하고 3, 4시간은 꼭 낮잠을 잔다고 하네요. 성격이 팍팍거리는 게 있고 악을 잘 쓴다고 합니다. 계기가 있을텐데라고 여쭙보니 점잖은 오빠와 비교되면서 스트레스를 받고 2년전 쯤 엄마에게 호되게 꾸지람을 받은 이후 그런다고 합니다. 소화는 잘 되는데 하복이 자주 거북하고 최근엔 차다고 합니다. 대변은 하루 1, 2번 보고 거른 적은 없었습니다. 기존에 야뇨증은 잘 치료하기가 꽤 까다롭다고 생각했고 특히 정신적인 문제와 관련되면 더욱 힘들다고 느꼈습니다. 류 선생님은 활기차고 자는데 깨우기가 힘들면 心虛腎失約證이고 기운이 없고 깨우면 잘 깨면 肺脾氣虛證이라고 하셨습니다.

저는 일단 간비불화증으로 판단하고
연자소간탕에 補腎陽하는 쇠양, 녹각교, 호도육 4g을 썼습니다.

약을 먹고 5일 뒤부터 야뇨증이 없어졌다고 합니다. 자다가 조금만이라도 지리면 아침에 꼭 팬티를 벗어놓는다고 하는데 그런 적이 한 번도 없었다고 하네요. 그리고 예전엔 자다 깨우면 거의 끌려가다시피 하며 소변을 댔는데 지금은 알아서 깨서 화장실 다녀온다고 합니다.

류 선생님 처방을 활용하여 야뇨증에 적용해 봤는데
결과가 매우 만족스러워 보고드립니다. 감사합니다.^^

야뇨치료의 대강(처방의 대강은 자료에 있음). 신장 방광을 보강하는 약을 먹이면서 생선, 고기, DHA영양제를 먹이면 신속하게 좋아진다.

혼내면 더 심해진다. 마음 편하게 해주고 이완시켜줘야 한다. 부모가 엄하거나 사이가 안 좋으면 심해진다. 신장이나 방광을 보해주는 약을 쓰면서 아이의 스트레스 경감해주고 두뇌기능을 향상시키는 약을 가미하는 것이 이상적이다, 영양제로는 오메가3 DHA EPA를 같이 줘야 한다. 뇌세포막을 보호해야 한다. 생선과 고기를 많이 먹게하면서 오메가3를 복용하면 야뇨는 대단히 빨리 좋아진다. 방광만 보면 안 된다.

9개월 태음인 아이의 야경증-황금청심탕가감방으로(心肝火熾證)

소아야경증 心肝火熾證의 황금청심탕 거 대항 용 황금 단삼4 가 백질려 염수초 조구등 2첩을

40cc 8팩으로 뽑아 복용시킴. 매우 잘 잠.

--> 김상인. 애기들은 신경계 발달에서 만 2세까지 야제증이 많이 있습니다. 그때까지 꾸준히 관리해야 한다고 말해주는 것이 좋겠습니다. 한의사 선생들은 경과를 너무 짧게 이야기하는 경향이 있습니다. 병원에서는 1~2년은 그냥 쉽게 쉽게 이야기합니다.!

심하게 나대는 태음인 한증 아이에게 조위승청탕가 원지 산조인 석창포로 정신안정

정신안정에는 원지 석창포 산조인을 씁니다. 조위승청탕이 좋겠습니다.

소아 식욕부진-한자는 비기허증의 건비탕류, 열자는 비음허증의 양비탕류

과거 글에서 소아 식욕부진에 '팔물탕 가 삼릉 봉출'을 쓴다고 하셔서, 체질 감별이 어려운 소아가 오면 간혹 쓰고 있는데, 반응이 좋은 것 같습니다. 감사드립니다. 체질별 한자 아이들이 오면, 대개 건비탕류로 좋은 효과를 보는 것 같습니다. 만약 열자라면 어떻게 접근해야 하는지요. 성인이면서 열자라면 식욕부진은 별로 없지만, 소아의 경우는 꽤 되는 것 같습니다. 이럴 경우 양비탕류를 쓸 지, 그냥 건비탕류를 쓸지, 양비탕에 건비 약재를 가미할지 고민이 좀 됩니다. 지난 번 식욕부진 할아버지 임상례와 같이 열자라 해도 한자의 약을 일정 기간 쓰는 것이 좋을런지요.... 간혹, 감기 때문에 형방패독산 먹었는데, 그 약 먹고 애들이 밥을 잘 먹는다는 얘기를 듣기도 하는데, 그런 거 보면 식욕부진의 치료가 그렇게 간단하지도 않은 것 같습니다. 고견을 부탁드립니다.

안준철

식욕부진은 한자는 비기허증에 쓰는 건비탕류를 쓰고...열자는 비음허증에 쓰는 양비탕류가 기본이 됩니다. 열자에게 한자의 처방을 일시적으로 응용할 수 있습니다만 식용향진이라는 부작용을 이용한 편법입니다. 물론 체질과 한열을 정확히 알고 편법을 동원하는 건 상관이 없습니다. 양약을 많이 먹었거나 아토피가 있거나 감기나 비염을 달고 사는 어린이의 경우에는 폐경 풍열로 보고 청열탕을 쓰는 게 좋습니다. 아토피증상과 호흡기증상 그리고 식욕부진을 동시에 해결할 수 있습니다.

아이들의 성장 치료의 大綱- 체질에 맞는 육식이 중요

보통 아프지 않은 초등학교 정도의 아이들 키가 작은 경우에...

후세방은 보중익기탕류나 육미류를 많이 쓰는데요,

체질 처방으로는 어떨지요? 보비제와 보신제를 크게 감별해서 쓰면 될까요?

경험 있으신 원장님들 고견 부탁드립니다. 감사합니다.

정용재

류선생님 강의 중에 말씀하시길, 잘 먹지 않는 아이, 병을 자주 앓는 아이, 잠을 잘 못자는 아이, 너무 많이 움직이는 아이, 비만 등은 이 증상에 대한 치료를 하면 된다고 하구요, 별증상이 없다면 한자는 신기허, 열자는 신음허 약을 쓴다고 합니다. 류쌤의 경우는 3개월에 1제씩 1년간 치료하신답니다.

안준철

체질에 맞는 음식을 많이 먹여야 됩니다.(소음인은 닭백숙, 소양인은 돼지고기, 태음인은 소고기와 유유, 태양인은 생선과 조개류) 적절한 운동이 필요하고요, 관절운동이 많은 요가 등도 도움이 됩니다. 스트레스 줄여주고 저녁에 일찍 잠자야됩니다.

ADHD 변증의 대강-신음허, 간기울결, 거담하거나 기혈허약을 보하면서 안신지제, 청열제를 활용한다. 精不足 風熱 痰火가 핵심

주의력결핍 과잉행동장애-신경학쪽에선 6가지로 구별하고 있습니다

아래 1번과 2번은 전전두엽(prefrontal lobe)의 저하가 분명합니다

1) 전형적인 행동장애: 쉬지 않고 충동적이며 흥분하며 주의가 산만하고 집중이 안 되며 말썽을 피워서 부모 속을 많이 썩이는 스타일, 타이로신 영양제와 고단백 위주의 식단이 도움이 된다. 신양부족/간양상향?

2) 주의력 부족한 ADHD: 집중이 안 되고 무관심하고 통명스럽다. 물건을 잘 잃어버리고 기억력이 약하고 지루해하며 늘 피로해 하며 꾸물거리기 일쑤다. 일을 잘 처리하지 못하고 실수투성이며 일하기를 싫어한다. 타이로신 영양제와 고단백 위주의 식단이 도움이 된다.

신양부족?

3) 과잉집중 ADHD: 집중을 너무 지나치게 하다 보니 한쪽으로 지나치게 빠져서 골몰이 생각하고 행동하기 때문에 빠져 나오기가 힘들다. 중독증이나 강박증에 많이 있으며 대상회(anterior cingulate gyrus)가 지나치게 흥분하고 있는 것이다.

성요한풀, 트립토판 등의 영양제와 복합탄수화물 위주의 식단이 도움을 준다.

??

4) 측두엽 ADHD: 조급하고 감정의 변화가 크며 학습장애와 기억력 장애가 있다. 과거 두개골에 손상이 있던 가능성이 높으며 치료가 쉽지 않다. 집중이 안 되면서 폭력적이면서 자살충동도 있다. 레시틴과 가바(GABA), 은행잎 등이 필요하며 고단백식단이 필요하다.

감정의 변화-심리정신까지 영향미치고 심하면 간질병까지도 오는 거 같습니다

담화요심? 담탁? 간담?

5) 변연계 ADHD: 부정적이며 감정의 변화가 크고 우울하고 슬프며 활력이 없고 삶에 의욕이 없다. 전전두엽의 기능이 저하되어 있는 경우이며 반대로 변연계는 지나치게 활성화되어 있다. 고단백 저탄수화물 식단과 종합영양제와 전두엽기능을 활성화시키는 영양제, 카니틴, 오메가3 지방산 등이 필요하다.

신허/간양상향?

6) “불길의 고리” ADHD: 심한 분노, 충동질, 고집스러우면서 감정의 기복이 심하며 말을 많이 하면서 빨리한다. 공포와 불안감이 함께 있다. 고단백 저탄수화물식단과 오메가 3 지방산과

가바(GABA)가 필요하다. 간화상염? 담화요심?

- * 주의가 집중이 안되고 산만하고 처지고 허리무릎 발 아프고 애가 활달하지 않다 기억력 약하다-신양허/신음허
- * 집중력만 문제가 아니고 더 나아가서 흥분하고 가만있지 못하고 잠도 잘 안자고 머리는 괜 찮고 할 때는-간양상항?
- * 더 나아가서 심리신경 정신까지 영향미쳐서 인지나 사회성 부족에 불안초조 감정 등등까지 오면 -심담? 담화 등으로 ?

어떻게 보면 좋을지 가르쳐주세요 감사합니다

안준철

열증이면 신음허증약에 안신지제(태음인은 원지 석창포 백자인/ 소양인은 백복신 모려분/ 태 양인은 진주 야교등/ 소음인은 합환피 향부자)를 가합니다. 열이 뜨면 청열약을 가합니다.태음 인은 황금, 소양인은 지모 황백, 태약인은 백모근, 소음인은 백작약,인삼,대조.

한증은 소간하는 간기울결증 처방에 안신지제를 가합니다. 이때는 한증이라서 청열약을 함부 로 가하지 않습니다. 그리고 간기울결증 처방에는 한증에 맞는 청열약이 들어있습니다.

미식거리고 어지럽고 가래가 많고 간질 비슷한 양상을 나타내면 거담하는 온담탕류(담울담요 증)에 안신지제를 씁니다.

마지막으로 기혈허약형입니다. 혈색이 없고 창백하며 무력한 경우입니다. 심비허약을 도와줍 니다. 비기를 도와서 잘 먹게 해주고 간혈을 도와서 혈색이 좋아지게 합니다.

한마디로 말하면 精不足 風熱 痰火로 요약될 수 있습니다.

윤승일

소증이 열증인 경우에는 오장육부에서도 대부분 열증 스타일로 나오나요? 아니면 열증소증이 라도 오장육부 변증에서 한증으로도 나오는지요? 감사합니다 좋은 내용말씀

안준철

간기울결의 경우는 소증이 한증이라도 이미 간기울결로 인해서 내생열이 있다고 간주합니다. 그리고 앞으로 열이 더 발생될 것으로 예측합니다. 그래서 열증약 정도는 아니지만 어느 정도 한량한 약미로 처방이 구성되어 있습니다.

소증이 열증이라도 현재의 증상은 설사 외한 면색창백 등의 한증이 있을 수 있습니다. 소증이 한증이라고 면적 구갈 심번 등의 열적인 증상이 있을 수 있습니다. 후새방은 현증만 따져서 처방하지만 사상의학에서는 타고난 소증을 중시해서 현재 열증이 나타나도 소증이 한증이면 함부로 청열약을 쓰지 않습니다. 물론 한증이라도 급증이면 한량한 약으로 사하시키는 경우도 있습니다만 제한적으로 사용하는 방법입니다.

윤승일

네 잘 알겠습니다. 가령 담화울결이나 신음허 등의 열증도 소증이 한증인 경우도 있을 수 있

단 말씀이네요 감사합니다

안준철

아닙니다. 신음하는 소증이 열증이라걸 기본 전제로 합니다. 한증이 신허증상이면 신양허입니다. 신음허가 아닙니다. 만약 한증이 신음허가 있다면 양허가 매우 오래 진행되어 타고난 양허+음허 즉 소증의 양허와 현증의 음허가 공존하는 상황입니다. 이것을 음양양허라고 부릅니다.

소아의 비위상태를 어떻게 판단해야 할까요?

보통 자주 배가 아프거나 체하고 그런 뚜렷한 증후가 있는 아이들은 비위허약으로 볼 수 있는데, 별로 탈이 많이 나는 스타일은 아니지만 입이 짧고 많이 먹지 않는 아이들의 경우 역시 비위허약으로 볼 수 있을지요? 요즘엔 군것질을 많이 해서 밥을 잘 안 먹는 아이들이 있긴 하지만.. 살이 찌고 마르고로 구별하시는지...조언 부탁드립니다..

안준철

음식량이 적으면 비위의 허약으로 볼 수 있습니다. 태음인 소양인은 한열과 식사량이 무관합니다. 태양인 소음인은 식사량이 적으면서 입이 까다롭고 잘 먹지 않으면 한증으로 봐도 무방합니다.

소아성장부진, 한자에게는 신기허, 열자에게는 신음허약을 쓴다.

■신경정신과

소양인 스트레스, 예민, 불면 및 소화불량. 혈허 음허 심화 모두 불면의 원인이 된다. 형방지 황탕 가 목단피 황련 치자를 각 한 돈씩 가해 써본다.

소양인 여성분으로 주소증은 불면 및 소화불량입니다.

조금만 신경쓰면 몇 시간씩 누운채로 잠을 못 주무시고

평소에는 보통 1시간 정도는 뒤척이고 4~5시간만 주무시면 잠에서 깨신다고 하십니다.

평소 스트레스를 자주 받으셨고 예민한 편이십니다. 짜증보다는 불안한 쪽이고 잘 놀라십니다. 소화는 명치부위가 자주 더부룩하고 평소에도 명치부위를 스스로 눌러보면 답답하고 트림이 나온다고 하십니다.

대변은 약간 변비고 특별히 추위를 많이 타지는 않지만 아랫배는 오래전부터 냉하십니다.

구갈, 구고 증상은 없습니다. 그리고 얼굴에 관골부위가 붉은 편으로 특히 저녁에 더 붉다고

하십니다. 소양인 한자로 보고 불면을 심허로 보고 심기허나 심혈허로 판단되서 복령보심탕에 숙지황 구기자를 가미해야할지, 소화도 잘 안되셔서 찾아보니 심비양허증에 복신보심탕 가 구기자로 해야할지 잘 모르겠습니다. 조언 부탁드립니다.

안준철 11.12.02. 11:37

혈허나 음허가 있으면 불면이 됩니다. 심화도 불면의 원인이 됩니다. 이분은 형방지황탕에 목단피 황련 치자를 1돈씩 가해서 쓰면 좋겠습니다.

태음인 불안장애에 연자양혈탕(심비기혈양허)

몇 년 전 사위의 죽음으로 불안장애 발생. 신경정신과 처방 1일 3회.

증상: 불안 초조 설사 惡人 惡食 현훈

도드라지게, 불안이 심하면 설사를 많이 하고, 소변도 지린다고 해서 심비양허로 변증하고 연자양혈탕 처방함. 신경정신과 처방 복용량 줄고, 불안 진정됨. 설사 줄고..

평소에는 불안장애에 주로 양심탕/청심탕만 쓰다가 심비양허증상이 있어서 증상이 있어서 양혈탕으로 효과 봄.

이를 가는 초등학생... 연자소간탕(간기울결, 간비불화, 기체증...)

13세 남, 아주 활동적이고 건강한 편. 스포츠 만능. 대변 1일 1~2회 무른편

전에 장염이 왔을 때 안선생님께서 태음인으로 진단해주셔서 태음조위탕 가 갈근 승마 2봉으로 좋아졌던 적이 있었음. 보호자가 밤에 이를 많이 간다고 처방요청

초등학교 입학전부터 이를 갈았으며(그때는 약하게) 점점 더 심해짐.

간기울결 쪽으로 보고, 전에 정용재원장님의 연자소간탕 케이스가 떠올라서 연자소간탕(조구 등 2g -> 4g) 10첩을 투여함

복용 첫날부터 이를 갈지 않고 20일이 지난 지금까지 괜찮다고 함

체질진단해주신 선생님과 좋은 임상례 올려주셨던 정원장님께 감사드립니다.

태음인 한자 49세남 불면, 안면홍조. 연자소간탕, 산소인소간탕(간기울결)

불면 6개월. 얼굴 상열감. 낮에도 홍조 열감이 나면서 땀, 연자소간탕 한제로 수면 4시간 산조인소간탕가 목통 삼백초 청호로 잠 5~6시간 잠.

소양인 스트레스로 인한 간비불화에 토사자소간탕으로 저효.

하복에 가스가 많이 잡니다. 대변은 하루에 3, 4번씩 보고요. 상복가스도 있었고

변비도 있었습니다. 화나 짜증이 심합니다. 조개구이, 회 먹고 탈난 적 있고 오리도 안 좋았는데 소고기, 돼지고기는 괜찮았네요. 수박은 냄새가 역해 안 먹는다고 합니다. 피부는 보통이구요, 눈은 찢었습니다.

친척인데, 화, 짜증이 심하고 불안, 초조도 있으며 기복이 심하다고 합니다. 회사로 스트레스 많습니다. 스트레스 받으면 변이 물러지고 후두통이 생깁니다.

토사자소간탕(간비불화) 1제 복용 후 대변은 여전히 3, 4번씩 보는데
장이 부글부글 끓는 증상은 많이 좋아졌습니다. 짜증이 많이 수그러드나 아직 있다고 합니다.
잠은 좀 자게 되었습니다. 식후 급체감이 많았는데 약 먹으면서 급체도 없어졌습니다.
3제 정도 먹으라고 했는데, 1제 더 먹고 연락이 없네요.
dc도 마이 해줬는데.....다 좋아졌을 꺼라고 위안해 봅니다.;

2. 45세, 여

남편 따라 독일에서 14년째 생활하고 있습니다. 잠깐 귀국해서 들렀습니다.
소화는 종일 불편하고 가스가 심하며 조금만 신경 써도 가스가 더 차고 설사기가 생깁니다.
등이 결리는 느낌도 심합니다. 위장 문제로 보입니다. 잠을 깊이 못자고 신경쓰면 더
못잡니다. 피로가 심하고 두통증세가 자주 있습니다.
누런 냉이 많으며 생리통이 있습니다. 자궁근종도 있다고 합니다.
한국 들어오면서 등이 좀 편해졌고 속도 조금 편해졌습니다.
전형적인 간비불화증으로 보고 토사자소간탕 처방했습니다.
1주쯤 경과보니 전혀 위화감이 없고 속도 편해지고 등도 좋아졌습니다.
다시 독일로 가셔서 오래 관찰하지 못했지만 토사자소간탕을 3제 정도 쓰면 거의 다
좋아지실거라 생각합니다. 아쉽다....OTL
암튼 소양인 토사자소간탕도 참 좋은 처방이라는 느낌을 갖게 한 케이스라 초라하지만
올려봅니다.

태양인 당삼소간탕은 여러 차례 투약해봤으나 아직 긍정적인 변화를 관찰한 예는 없습니다.
소음인 간비불화 처방도 마찬가지입니다. 특히 소음인 간비불화 처방은 향사양위탕인데,
개인적으로 조금 아쉽다는 생각이 듭니다.

태양인, 소음인 간비불화 경험레 있으면 좀 올려주세요~

(참고)

소음인 간비불화에 향사양위탕은 개인적으로 미워하는 처방입니다 효과본 적 없고 의료사고를
부른 처방입니다 ㅠㅠ 그래서 그 이후로 간기울결에 쓰는 향부자소간탕에 수증가감해서 씁니
다 효과 괜찮습니다

**소양인의 우울증. 스트레스. 소화곤란. 한증을 아침에 독활지황탕, 저녁에 황련청심탕쓰다가
토사자소간탕, 독활지황탕가 황련 치자 각 2그램으로 증상 거의 소실됨.**

아침에 독활지황탕, 저녁에 황련청심탕(심화항성, 담화요심...) 복용토록 함.
속도 편해지고 우울증 자살충동 덜해짐. 울렁거림과 어지럼증도 있어 담화처방인
가감복령과루인탕을 썼으나 속이 부글거린다고 호소. 토사자소간탕으로 바꾸니 소화도

잘 되고 속 편하다 함. 머리 멍한 느낌 불안 초조
독활지황탕가 황련 지차 각 2그램, 다음부터는 증상이 거의 안정됨

연자소간탕(간비불화 간기울결 기체증...) 임상 2례, 스트레스 많은 아이의 야뇨증, 수험생에게 쓰다.

류 선생님 처방을 계속 쓰다보니 좀 더 정이 가고 자주 쓰는 처방이 생기게 됩니다.
연자소간탕이 그 중 하나인데요, 환자들이 만면에 웃음을 머금고 오는 경우가 종종 있습니다.
간단하게 2case만 정리해 봤습니다.

case 1) 03년생 남아(09, 9월 내원)

부모님들이 다 일하시며 할머니가 키우는데 부모들이 늦게 귀가하다보니 자연히 애들도 늦게 잡니다. 오줌을 자주 싸고 밥을 안 먹는다고 데리고 왔습니다.

땀을 많이 흘리구요, 조금만 뛰놀아도 비오듯 땀이 나네요.

야뇨증은 생긴지 1년 넘었습니다. 대변은 하루에 한 번 굵게 봅니다.

연자소간탕에 녹용 조금 넣었습니다. 반제 먹고 입맛이 좋아져서 살찌고 키 크고

오줌도 거의 안 싸고 할머니는 물론 부모님도 너무 좋아하시네요.

그간 밥 잘 먹고 잘 지냈는데 초등 입학하고는 또 밥을 좀 덜 먹는다고네요.

땀은 요즘도 많이 흘린답니다. 다시 연자소간탕 처방했습니다.

case 2) 94년생 여

09년 초부터 비염약 3제 먹고 호전되었습니다. 종종 복통이 있고 가끔 메스꺼리기도 합니다.

애가 전교 짱 먹는 애인데 중3이라도 학업량이 엄청난 것 같습니다.

연자소간탕 원방 처방했습니다. 이거 먹고 밥도 잘 먹고 배도 전혀 안 아프고 암튼

컨디션이 한동안 굉장히 좋았더랍니다.

이후 공부하느라 힘들면 한 번씩 복약하고 있으며 먹을 때마다 좋은 결과를 보여줍니다.

연자소간탕을 공진단처럼 만들어도 수험생, 고시생 등등 많이 활용해 볼 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 연자소간탕 많이 써 보세요.^^;

화병으로 마음의 병이 심하면 황금청심탕 고려할 것.

태음인 열자 불면증을 정심보음탕가감방으로(신정부족). 노인에게는 補精

61세 남자. 공무원 정년 퇴임 후 현재 경비하고 있음.

#. 주소증

1. 평생 술을 많이 드시다가 최근 술을 끊고 난 후 힘이 없고, 가슴이 답답하고, 입맛이 없고
우울증, 잘 자지 못하고, 새벽에 한 번 깨면 날밤 샘. 꿈이 많음. 잠이 잘 깨고, 머리 항상 무

겁다. (대부분 남자들이 평생 술 먹다가 술 끊은 후 술 생각나고 세상살 맛 안 나고 뭐 그런 데 동반하시는 증상 같습니다)

2. 25년전 방바닥에 미끄러져 엉덩방아 찍은 후에 이제까지 치료 아무것도 안하고 놔두었는데 오른쪽 다리가 저리고 마르는 증상이 있고 목은 앞으로 숙이기 힘들고 오른쪽 팔과 손으로 저리고 감각이 이상하시다는 증상입니다.

(아무래도 디스크 계통이신듯 합니다. MRI 검사 해보라고는 했습니다)

(사진에서 보듯이 목을 항상 숙이고 있습니다. 당겨서. 다리도 당겨서 약간 숙이는 모습)

@ 기타 - 가슴이 답답하고 불안하다. 양측 귀가 울린다.

=> 정심보음탕 + 산조인(생) 4g + 감국 대황 2 g 울금 청호 4g (利膽. 解酒毒)

약 먹고 새벽에 깨지 않고 잘 잔다고 합니다. 평균수면시간이 4시간에서 7시간 정도로 늘었습니다. 확실히 자고 나니 머리도 약간 맑아졌다고 하네요.

(경비일을 해서 이틀에 한 번씩 날밤 새야 해서 경과를 계속 지켜봐야 되겠습니다만..)

역시 노인은 補精입니다...ㅎㅎ...

엄마에게 욕하는 젊은 여성에게 열다한소탕(증 대황3돈으로)으로 저효

24세 태음열증 여성. 고등학교 때부터 엄마에게 욕하고 때리고....의사와 대화불능
조울증에 상부열감 수시로 오고 헛통, 사실상 거의 자지 않고 대변은 일주일에 이삼회
진료시 계속 손 떨고 있고 수족냉

열다한소탕가 대황3돈(30첩/45팩 하루에 세봉 복용) 한 달 간 투여.
복용기간 중에 엄마 따라 교회 다니라 말함.

그 이후로 많이 좋아져서 2개월전에 좋은 남편 만나 임신 2개월
욕설 폭력적인 행동 없어짐

**소양인열증, 불안장애 불면증 수전증 약물의존증을 심음허로 해석, 지황양심탕 가
구기자 1돈 추가, 지모 황백 염수초로 저효를 보다.**

42세의 소양인 열증 남자(과거에 사백산으로 여러 번 약을 쓴적이 있음)

주소증) 4억정도의 돈(전재산)이 걸린 소송으로 불안하고 꿈이 많고 잠을 못 이룸.

불안하고 손을 떨고 증상이 있을 때마다 양약을 먹어야 견딜 수 있음(신경 안정제를
정신과에서 수개월 복용 후 래원)

변증) 심게 불안 정충에 불면 그리고 땀이 많고 소변도 진하게 보는 편이어서 심음허증으로
변증했습니다.

처방) 소양인 열자 심음허증에 쓰이는 지황양심탕에 구기자를 1돈 추가(허화를 끝 목적으로 지모 황백염초를 1돈씩 가하고 심간혈을 보충할 목적으로 구기자를 1돈 더 가합니다.)

결과) 1일2팩 1개월 복용 후 양약을 끊고 회사로 복귀해서 정상적 사회생활 가능하게 됨.
지금도 가끔 잠을 깨는 경우가 있어서 한 번 더 약을 원해서 같은 처방으로 복용 중임.

고찰) 상기의 환자는 전 재산이 걸린 소송건으로 인한 스트레스로 손이 떨려서 사회생활이 불가능하고 불안 초조 불면에 안정제에 의지해서 생활하고 알콜에 대한 의존성도 높아서 술이 없으면 잠을 이루지 못하는 환자였습니다. 심음허로 인한 수전증 불면 불안장애 그리고 약물에 대한 의존성을 지황양심탕으로 해결한 경우입니다. 약물과 알콜에 의존하고 사회생활이 잘 안 될 수 있는 케이스였습니다. 변증의 중요성을 다시 한 번 느끼게 하는 케이스였습니다. 본인의 말로는 독한 마음먹고 양약을 끊었다고 하지만 한의 도움이 없었으면 양약의 의존성을 극복하지 못했을 것입니다. 체질약물과 류샘 처방의 우수성을 보여주는 경우입니다.

충격 후 다리 힘 풀릴 때 황금청심탕(간양상향)으로 유효, 태음남성. 정신적인 문제가 갑작스럽고 급격하면 심으로....장기적이고 누적된 문제라면 간으로 책임을 돌린다. 이 경우는 급격하고 갑작스러운 경우.

증상은 다음과 같습니다. 어떻게 변증해야 할지 난감하네요.

체질은 태음인으로 보고 있습니다.

심으로 봐야할 것 같은데.....다리 문제는 어떻게 봐야할까요? 도움 부탁드립니다~

1. 1달 전쯤 속 썩이는 아들 때문에 정신적으로 큰 충격을 받으셨는데,
그 후로 가슴이 한번씩 탁하고 멈추면서 막히는 것 같은 느낌이 자주 든다.
2. 역시 1달 전쯤 아들 때문에 큰 충격 받으신 이후로 양 다리 정강이 밑으로 찌릿찌릿하며 발목에 힘이 없고 갑자기 주저앉고 싶은 느낌이 자주 든다.
3. 대변은 매일 1회씩 아침에 보고, 변은 평범한 모양.
4. 소화는 잘 됨.
5. 하루 소주 3병, 담배 3일에 2갑.

(원) 청심연자탕을 1제 쓰고 올린 글입니다. 전혀 차도가 없습니다.09.07.20 11:29

침쏘) 크게 충격받은 것이 병인이 되면 심, 담으로 봅니다. 평소 유순한 사람이었다면 심이고 성깔이 좀 있었다 싶으면 담으로 보는 경향이 많다고 하셨습니다. 심병은 한 순간에 큰 충격을 받는 것입니다. 지속적인 근심걱정도 심장으로 보구요. 병인만으로 좀 아리까리하면 증상을 보시되... 뭔가 반발하려는 속성(승질을 팍 내거나... 확~ 뒤집어엎어버리고 싶은 충동이 보인 다거나 짜증이 심하게 나거나 등등)이 있으면 간으로 봅니다. 심장은 그렇지 않죠. 그래도 헛갈리면 얼굴을 봐서 참고 합니다. 이마에 '짜증'이라고 써놨다면 간... 유순해 보이면 심.... 그래서 심병증으로 결정하셨으면 한열을 나누시면 되겠네요

윗글의 내용상 열자보다는 한자에 가까와 보이니.... 심기허 쪽 처방이 어떨까요.... 참고만 하

세요.09.07.18 11:57

(원) 도움말씀 감사드립니다. 이 분 대구에 계신 강력계 형사이십니다. 성질 좀 내게 생기셨고, 술 때문인지 얼굴이 불그스레 합니다. 담병으로 보고 치료해 보겠습니다.^^

* 비전강기탕의 방해는 다음과 같습니다. 治上氣 及氣不升降 頭目昏眩 腰脚無力 상기로 하지 무력할 때 사용할 수 있죠. 또 중풍전조증약인 유평탕 장복도 필요할 듯 합니다.

(원) 도움말씀 감사합니다. 인간이 가질 수 있는 모든 증상이 이미 한의서에 다 기재되어 있는 것 같아요.^^09.07.20 11:33

청심연자탕이 전혀 차도가 없어서 변증을 고민하던 중 침쑤님의 조언을 참고하여 황금청심탕을 처방했습니다. 약을 다 드셔갈 때쯤부터 드라마틱하게 좋아지셨다고 합니다.

저는 황금청심탕으로 참 재미를 많이 보는 것 같습니다.ㅋ

얼마 전에 화, 짜증이 너무 나고 우울하며 자살충동을 자주 느끼는 40대 아줌마에게 황금청심탕을 처방해서도 좋은 효과를 거둔 적이 있습니다. 이 처방 보면 참 사람을 살리는 명방이라는 느낌이 많이 듭니다.^^;

오늘 한 제 더 부탁하셔서 같은 약으로 처방했습니다. 감사합니다.^^

(안) 정신적인 문제가 갑작스럽고 급격하면 심으로....장기적이고 누적된 문제라면 간으로 책임을 돌립니다. 이 경우는 급격하고 갑작스러운 경우라고 여겨집니다.

태음인여성, 간기울결 연자소간탕 먹고 착해진 임상례

26세 태음인 한자. 오른쪽 발목이 불편하다고 내원했습니다.

1년 정도 지났는데, 걸으면 붓고 아프며 피아노 페달을 밟으면 더 심해진다고 합니다.

피아노 선생님인데 어려서부터 부모님께 이끌려 피아노를 치고

지금은 피아노 학원에서 애들을 가르칩니다. 같이 온 엄마가 약 먹기를 권하나

딸은 끝까지 시큰둥하다가 마지못해 약을 신청하고 갔습니다.

커피는 안 마시고 변비가 없었던 것 같다고 하여 첫날은 한열이 애매해 갈근조위탕 하루치 처방했습니다. 다음날 약 먹고 설사를 했다고 하더군요.

매사가 짜증나고 짜증이 생기면 답답해지고 심계, 구미감퇴, 천면이 생깁니다.

피아노도 하기 싫어 죽겠답니다. 약을 받아가면서 약 먹으면 성격 좋아지고 착해진다고

얘기를 했습니다. 3일 정도 복약하고 오늘 왔는데, 첫마디가 성격이 좋아진 것 같다고 합니다.ㅋ 피곤도 개고 맘도 편해진다고 하네요.

하루 피아노 강습을 6시간 하는데 예전엔 2시간만 하면 집에 가고 싶고

애들 보기 짜증나고 했는데 약 먹으면서 매일 한 시간씩 늘어났답니다.

약 끝나면 다시 못되지나길래 계속 먹으면 된다고 했습니다.^^;;

간기울결 처방은 참 빨리 듣기도 하고 심성을 바꿔주는 좋은 처방인 것 같습니다.

약은 연자소간탕 처방했습니다. 좋은 처방은 많은데 쓸 사람이 없군하.ㅠㅠ

태음인 사삼양심탕 처방례(심혈허, 심음허)

피곤하고 스트레스가 심하다는 39세의 여성 급식 조리사입니다.

요즘 가슴이 먹먹하고 우울하며 집에 돌아오면 하염없이 눈물이 많이 흐른다고 합니다.

아침에 일어나면 경골부위가 많이 붓습니다. 요즘 속이 좀 불편하고 변도 좀 후중기가 있습니다. 간혹 구건이 있고 보통 자다가 2, 3번 깹니다.

일단 위장 문제부터 해결하고 주소를 해결하기 위해 먼저 사삼양비탕(비음허증, 대장진휴증) 3일치를 드렸습니다. 3일 뒤에 전화해보니 속이 편해졌고 잘 잤다고 하시더군요.

태음인 심음허로 판단하고 이어서 사삼양심탕을 처방했습니다.(加 葶)

약 다 드시고 전화해보니 모든 것이 다 편해졌다고 합니다.

자다가 깨지도 않고 일어나면 개운하며 부종도 심하게 붓지는 않는다고 합니다.

입맛이 좋아져서 음식량이 늘었다고도 하시네요. 근데 잠을 너무 많이 자서 걱정이시랍니다.

됐다고 했습니다.ㅋ 사실 아직 청심에 손이 더 가서 사삼양심탕은 처음 써봤는데 기대이상의 좋은 효과를 보여주었습니다. 감사합니다.(^^)

태음인 당뇨 고혈압 불면증 할머니, 신음허의 상황보음탕가 산조인 녹용으로 잠 잘 자고, 혈당수치도 개선되다. 노인은 간신부족을 도와야 한다.

67세 태음인 열증 할머니. 10여년 전에 아들 문제로 충격받은 후에 당뇨병 발생

고혈압은 양약으로 잘 조절되나 당뇨는 음식량이나 운동상태에 따라서 오리락 내리락거리는 상태. 지난 1월에는 혈압 조절도 잘 안되고 특히 불면으로 고생하는 상태에서 래원함.

불면이 심해서 새벽 2-3시 까지 잠들지 못하고 라디오를 밤새워 듣고 새벽에 잠이 좀들었다가 2-3시간이면 다시 잠을 깨고 낮에도 멍하고 잠은 자고 싶은데 누우면 잠들지 못하는 상태.

** 주소증:잠을 못자면 혈당은 300 전후를 오르내리고 혈압도 평소보다 높아진다.

동의보감에 음혈이 부족하면 잠을 이룰 수 없다는 말이 나옵니다.(나이가 들수록 음혈은 더욱 더 모손되므로 잠을 더 못자게 된다. 잠을 잘 잔다는 것은 그만큼 젊고 음혈이 유여하다는 의미입니다.)

태음인 열증에 쓰이는 류삼 처방중에 신음허에 쓰는 상황보음탕에 산조인초 1돈만 가했습니다.(이렇게 산조인초 1돈만 가하면 간신음허증에 쓰입니다.즉 산조인은 귀경이 간경이고 보음하는 성질을 간으로 끌고 가게 됩니다.)

예전에는 불면증이 심하면 산조인을 증량하고 청열하는 방법을 썼는데 지금은 음혈을 돕는 것이 기본이 되고 그 보음하는 성질을 심간으로 인경하는 것이 훨씬 더 효율적이라는 걸 알기때문에 산조인을 많이 쓰지 않습니다.(인솔자,인경약은 많으면 오히려 좋지 않습니다.)

치료결과: 한약을 복용하는 날부터 잠을 너무 많이 자서 할아버지가 걱정하셨다고 합니다.(왕년에 산조인을 2-3돈 쓰는 것보다 효과가 월등히 빠르고 강력했습니다.)

공복시 혈당이 90 정도로 혈압과 혈당은 정상으로 돌아왔습니다. 잠만 잘 자면 혈압과 혈당이 잘 조절된다고 합니다. 수일 전에 다시 불면이 조금 생기고 당뇨약을 먹는데도 혈당 조절이 잘 안된다고 래원했습니다. 지난번 그 약으로 똑같이 지어달라고 하시면서 약효가 한철밖에 안가는 것 같다고 말씀하시네요. 그래서 일 년에 4번 환절기마다 한재씩 드시라고 티칭했습니다. (원래 보약은 4립에 씹니다. 입춘 입하 입추 입동)

여기에서 우리가 알아야 할것은 노인은 음허해서 청열약을 쓰는것보다 보음 보혈약을 위주로 해야 한다는 것입니다. 만약 이분이 빈혈이 심한 혈허증이 주증상이었으면 보혈약에 산조인을 가했을것입니다.

산조인을 많이 쓴다고 잠을 잘 자는 것이 아니라...원인을 제거하는 약에 산조인이 가해져야 제대로 문제가 해결된다는 사실입니다. 산조인을 생으로 쓰면 간열을 사하고 초해서 쓰면 불면 다한증등에 듭니다.(교감신경 항진에 쓰인다는 말입니다.)

우리의 선조들이 경험한 생로병사에 관한 견해는 이 시대에도 여전히 유효하고 잘 되살려야 되겠습니다. 산조인을 많이 써야 효과가 잘 나는 것이 아니고 원인을 해결하는 처방에 산조인은 인경약으로 소량만으로도 충분하다는 걸 이해하게 되었습니다. 결국은 정확한 변증(원인 규명)이 관건이 되겠습니다. 산조인초 1돈이 절묘하지 않습니까?

신음허에 상황보음탕이랑 정심보음탕 두개 있는데, 이건 어떻게 구별해서 쓰시는지요?

안준철

관맥이 촌맥쪽으로 더 강하게 느껴지면 앞의 처방을...관맥이 척맥쪽으로 더 강하게 느껴지면 뒤의 처방을 습니다. 뒤의 처방이 음허가 더 심하거나 열이 더 많은 경우에 씁니다. 그래서 뒤의 처방이 보신하는 약이 더 보강되고 청열약이 살짝 더 가미된 경우가 많습니다.

소양인의 간신을 보하는 약은 신음허증에 쓰이는 구판보음탕이 됩니다.

노인들은 모든 증상을 다 치료한 후에 보음 보혈 보정하는 약으로 마무리해야 됩니다. (후세방 같으면 육미지황탕이나 사륙탕) 잠 잘 때 음혈이 보충되므로 산조인을 보간하는 약으로 보는것은 정말 탁월한 견해라고 생각합니다. 잠잘 때 혈이 만들어집니다.

태음인의 변비 불면 상열에 갈근양비탕, 상황보음탕가 녹용, 쇠양

눈 사이가 멀고 눈두덩이 두터우며 어깨가 처지고 다리도 길어 태음인으로 보입니다.

대학교 땀 50kg까지 나갔다는데 직장 가서 스트레스 받은 후로 살이 많이 빠졌습니다.

맥도 현맥이 잡히네요. 밥도 잘 먹고 고기도 잘 먹고 다만 계를 먹으면 탈이 난다고 합니다.

우유도 안 좋고 나머지는 괜찮습니다. 식후 가스가 있고 대변은 5~7일에 한 번 봅니다.

변을 한 번 보면 500g 정도 준다고...--;

가끔 체하고요, 수족냉 심하고 특히 밤만 되면 손발 빠고 온몸에 열이 납니다.
천면, 불면 경향이며 예민합니다.(간음허) 도한도 있네요.
이런 증상은 유산 후에 서서히 진행된듯 합니다. 한 번 씩 어지럽습니다.
생리통이 2, 3일째 심한데 생리가 어느 정도 나오면 더 심해진다고 합니다.(혈허)
비음허, 간신음허 등이 보이는데 어떤 변증이 적합할까요?

태양인 같다고 진단해주셨습니다. 내원 첫날 나름 태음인으로 판단하고
비음허 처방인 갈근양비탕(비음허, 대장진휴)을 2일분 드렸습니다.
이틀 후 전화드리니 약을 드시고 속이 편하고 잠을 잘 잤다고 하십니다.
다른 증상은 비슷했습니다. 머리를 쥐어뜯으며 고민을 거듭한 끝에
일단 갈근양비탕(가 용)을 반제 보내드렸습니다.
변은 좀더 잘 보는 것 같다가 못 보기도 하시고 도한이 이불이 젖는 정도였는데 이제는 흘렀
구나 느끼는 정도라고 합니다. 입맛 없고 저녁에 열나고 손발 찬 건 비슷합니다.
별다른 부작용은 관찰되지 않았습니니다.
왜 손발이 찬데 저녁만 되면 몸이 뜨끈뜨끈 열이 날까 고민하다 신음양허 처방인 상황보음탕
(가 용, 쇠양) 반 제 드렸습니다. 거의 비슷합니다. 변은 이제 이틀에 한 번 꼴로 보신다고 하
네요. 열의 균형만 좀 맞춰주면 될 것 같은데...맘 같아선 비양허나 심비양허를 쓰고 싶는데
변비가 있으시니.....--;

일단 태음인으로 보고 좀더 지켜보겠습니다. 감사합니다.(..)
지금 봐도 입술이 들린 모양이나 옆에서 봤을 때의 턱모양은 태양인 같습니다. 코끝도 약하고
눈빛도 좀 강해보입니다.

정용재
갈근양비탕 드린 첫날의 호전반응이 이상하다 싶어 바로 집사람(태양인) 불러서 갈근양비탕
한 봉 먹여보기도 했습니다. 잘 먹더군요. ^^;; 어제 오셨는데 저도 하도 이상해서 갈근조위탕
을 두 봉 드려보았습니다. 오늘 전화해보니 아무렇지도 않다시네요. 조만간 태양인 쪽으로 바
뀌서도 투약해 보겠습니다. 감사합니다~

**열증 태음인의 공황장애에 열다한소탕 원방. 가슴이 조이면서 아프거나 빈맥 등의 증상이 있
으면 청심연자탕.**

20대 후반의 취업 준비생 태음인 열증 신체건강.
주소증: 공황장애로 가슴이 아프고 잠을 잘 못 이루면서 낮에 본 별 거 아닌 거에 대해서 밤
새 생각이 나고 마음이 불안함. 예를 들면 마트에서 닭고기 파는걸 보게 되면 닭 잡는 생각이
밤새나면서 눈에 피가 보이고 불안해 하는 증상.

처방:열다한소탕 원방

1개월 반 정도 약을 먹고 있는데 처음에는 흉통이 없어지고 지금은 닭고기의 피가 밤에 보이

지 않고 잘 자고 공부도 잘 하고 있다고 합니다. 심장질환이 아니고 정신적인 문제는 역시 열다한소탕을 써야한다는 결론입니다. 물론 심장병은 청심연자탕을 써야겠지요. 태음인의 정신분열에도 열다한소탕이 듣습니다.

최미령

귀한 임상경험 감사합니다~~ 그런데 우리가 환병이라고 하는 것들이요.. 나이 지긋하신 여성분들이 흔히 가지고 있는 .. 시댁과의 갈등... 그런것들도 정신적인 문제로 봐서 역시나 열다를 써야 하는건가요??

안준철

정신적인 문제로 심장까지 이상이 생기면 청심연자탕을 씁니다. 가슴이 조이면서 아프거나 빈맥 등의 증상이 있으면 청심연자탕을 씁니다.

불면

43년생 마른 태음인 열자 여성입니다.

대변은 매일 보시고 변비는 없으셨구요, 커피 드시면 불면증이 있어 안 드십니다. 채소를 드시면 변에 그대로 나옵니다. 5년전 위암 수술을 받으셨고 지금은 다 괜찮아서 병원에서도 그만 오라고 했다고 합니다. 불면증이 오래 되셨구요, 많이 자야 3, 4시간입니다. 그 외 심장증상은 보이지 않습니다. 입이 쓰고 입맛이 전혀 없다고 합니다. 드시고 소화는 괜찮습니다. 구건과 도한이 있습니다. 등 전체가 결리는듯, 시리는듯 불편합니다. 1달 전쯤 감기몸살 뒤에 입맛이 전혀 없다고 하셔서 일단 열다한소탕을 보름치 드렸습니다. 드시는 동안 아무런 불편은 없으시고 입맛도 여전히 없으나 억지로 더 드신다고 합니다. 다른 건 비슷하고 구건과 도한이 좀 줄었습니다. 후세방으로 어떤 개념에 속하는지도 조언 좀 해주세요~

--> 이윤양원장

수면은 영위의 작용, 영위는 기혈의 작용, 기혈의 근본은 비위, 기혈의 조절이 우선
식무미 불면은 기병, 온담탕 불면은 사결불수 공포^^, 식무미 기병은 양생음장 보중^^

불면이면 간병증보다 심병증일 가능성이 높다(안).

태음인 가슴답답 아침의 안면부종에 청심연자탕가 대항. 변비에서 설사로. 대항량을 줄이더라도 대항은 써야....

청심연자탕가 대항 반돈, 가슴 답답 호전, 아침에 안면부종 없어짐, 어깨 가벼워짐. 불면은 여전히, 계속 하루에 2-3번 설사해도 힘은 안 빠지고 기분 좋다. 소변은 정상. 대환 반 돈을 없애야 하나요? 아님 설사가 멈출 때까지 먹을까요?

답)

설사를 2-3회 하는 것이 문제인가요? 다음 약은 대항 용량을 줄이면 됩니다. 그래도 대변을 매일 안보는 거 보다는 2-3회 설사하는 편이 훨씬 더 좋아집니다.

소양인 한증여성의 한기, 스트레스로 인한 복잡해 보이는 증상들. 스트레스로 인한 것이면 간기울결. 소간탕에 위장이 안 좋으니 황련 치자를 초해서 3~5푼 가한다. 황련 치자는 심장에 쓸 때는 생으로, 위장이 안 좋으면 초해서 쓴다.

복잡해 보이는 증상이 스트레스로 인한 것이면 간기울결입니다. 소간탕에 위장이 나빠서 황련 치자를 초해서 3~5푼 가합니다. 기본적으로 황련 치자를 심장에 쓸 때는 생으로, 위장이 나쁠 때는 초해서 쓴다고 생각하면 됩니다.

소양인 한자 우울증환자에게 간기울결처방 가 황련 치자 각 5푼. 변비에는 결명자를 3~4돈 쓴다. 연교를 5푼 이하로 쓰면 건위작용.

이분에게 처음에 독활지황탕가 인동 연교2돈 황련 치자 시호 1돈을 처방했습니다.

이거 드시고 소화도 잘 되는 건 아니지만 약 안 먹을 때보다 낫고, 잠도 전엔 수면제 먹고 자도 새벽에 깬데, 약 먹으면서 수면제 먹고 안 깨고 잘 수 있고, 마음도 좀 편한 거 같다고 했습니다. 변비도 양약을 먹긴 하지만 좀 수월하다고 했습니다.

한제 다 드시고, 우울증과 주의력 결핍을 많이 호소하시고, 촌관맥에 부활삽한 것 같고해서, 담미심규가 아닌가 해서 복신과루인탕을 처방했는데, 3일 드시고는 전에 약보다 못하다고, 안 좋은 건 없는데, 수면제나 변비약을 더 먹게 된다고 하십니다. 제가 변증을 잘못된 거 같은데... 지금생각해보니 왜 그랬나 싶기도 하고...처방을 바꿔 드리기로 했는데, 지난번 독지가미로 써야할지, 아님 형방지황탕에다 가미해야할까요?

고진 선처 부탁드립니다.

(안)

한증이라서 간기울결로 변증해야 될 것 같습니다. 간기울결처방에 황련 치자들 5푼 정도 가미하면 간과 심을 함께 다스릴 수 있습니다. 변비에는 결명자를 3-4돈 사용하면 확실히 좋아집니다. 다른 가미보다 재발도 훨씬 적습니다. 연교를 5푼 이하로 소량 쓰면 건위작용이 있습니다. 인동은 적합하지 않습니다.

태음인 기억력감퇴 불안신경증 환자, 기억력감퇴 두려움 등의 증상, 신음허 심음허 간음허 간양상항 등을 고려한다. 치료순서는 환자가 해결을 원하는 것에 준해서...

청심연자 2제 드셨는데, 나빠진 것도 좋아진 것도 없습니다. 환자분은 가슴 벌렁거리는 건 좋아졌다고 하시는데, 남편 분은 동의 안하시네요. 환자분과는 의사소통이 잘 안됩니다. 이분이 3년 전부터 기억력감퇴가 되어 잘 잊어버리고, 자기를 정신병원에 보낼까봐 병원 가는 걸 두려워하고, 집밖으로 나오질 않습니다. 남편분은 식사량이 적으니(반 공기 조금 더 먹는데, 거의 맨밥만 드신다고 합니다. 간이 조금만 베어 있어도 맵다고 안 먹는답니다) 밥이라도 잘 먹어서 기운이라도 났으면 좋겠다고 하는데, 갈근조위쪽으로 처방을 써야할지, 아님 열증이니까 비음허?쪽으로 써야할지 기억력을 목표로 간신쪽 처방을 써야할지 고민입니다. 도움말씀 부탁드립니다.

(안)

가슴이 뛰는 증상은 청심연자탕으로 틀림없이 좋아졌을 거 같습니다. 기억력 감퇴는 신병증입니다. 겁이 많고 두려워하는 증상은 심담병증입니다. 소변이 붉고 땀이 많으면 심병증입니다. 소변이 맑고 땀에 변화가 없으면 담병증입니다. 증상의 경중에 따라서 선후를 정해서 약을 쓰시면 됩니다. 또는 환자에게 뭘 먼저 해결해드릴까요? 이렇게 물어봐도 됩니다. 열증이라서 신음허나 심음허(심병증은 대부분 불면이 동반됩니다.)로 접근하면 좋겠습니다. 또는 장기간의 스트레스로 인한 문제면 간음허로 볼 수도 있습니다. 간음허에 눈 머리(어지럼) 등 상부 열의 문제가 동반하면 간양상향증이 됩니다.

태음인의 열자의 제반정신질환에 청심연자탕, 황금청심탕(심화항성, 담화요심)

이혼한 여성, 다한 기절 불면 심계 등의 증상을 보여 연자탕으로 좋아졌으나 충분하지 못함. 황금청심탕을 쓰니 증상이 호전이 더욱 좋더라.

뇌혈관성 치매, 일단은 신음허로 간주. 문제가 되는 증상들은 하나씩 해결.

아, 그때 귀여운 할매시네요~ 천마가 현재까지 알려진 본초 중에서 유일하게 뇌혈관장벽을 통과하는 약물이며, 대량의 뇌신경전달물질 및 전구체를 보유하고 있다는 식의 살라살라를 들은 바 있습니다.

안준철

주소증이 뭔가요?

김봉찬

네 주소증이 부분 기억 상실입니다. 요근래 조금 더 기억을 잃어버리신 듯 하시고요 엠알아이 상으로도 뇌혈관성치매 진단을 받으셨다고 합니다

안준철

노인성이고 만성이고 허로에 준해서 생각해야될 것 같습니다. 신음허에 해당하는 처방을 쓰는 것이 좋겠습니다. 骨 髓 腦髓는 신과 관련됩니다. 다른 증상을 살펴서 문제가 되는 증상부터 하나씩 해결하면 좋겠습니다. 예를 들어 빈혈기가 보이면 심간혈허약을.....

극심한 스트레스 후 상열감, 전신발적 등등 증상은 열증의 간화상염으로 본다.

이혼 소송으로 극심한 스트레스를 받으시면서 상열감, 전신발적, 이마 부위 경직감, 안구 주변 발적 소양감, 경계, 항강, 두통 증상이 있으신 47세 남자 환자분입니다

지난 6월 말에 처음 오셨을 때 청심연자탕에 갈근 2 승마 울금 포공영 각 1 목통 2 이렇게 처방해드렸는데요. 오늘 오셨는데 경계, 항강, 두통 증상은 거의 없는데 상열감은 호전됐다 요즘 더 심해졌고 기타 전신 발적, 이마 부위 증상, 안구 주변 증상은 여전하다고 하십니다. 그리고 무척 피곤하다고 하십니다. 이 다음 처방을 어떻게 해야 할지 막연하네요

그대로 청심연자탕을 더 써볼까요? 아니면 열다한소탕으로 가야할까요?

그도 아니면 갈근조위탕에 승마 포공영 황금 산약 연자육 녹용... 이런 쪽으로 가야할까요?

안준철08.07.16. 11:27

열증의 간화상염증입니다. 유주열선생님의 갈근청간탕을 써보면 좋겠습니다.

태음인한증의 공황장애에 조위승청탕가감방 검토. 백자인 감국이 중요. 백자인은 심간의 혈을 돕고, 감국은 거풍한다.

태음인, 35세 남환입니다. 전형적인 공황장애로 불안, 초조, 심한 현훈(평진데 한쪽이 꺼져보임), 다몽, 천면이 있습니다. 특히 증상으로 제부 동계, 상충감이 있구요.

열증이면 안원장님과 여러원장님들의 치험례에서 보듯 '열다'로 확확 푸쉬하겠는데, 한열이 까다롭습니다.

1. 커피 - 먹으면 속이쓰리고, 구역감이 생겨서 먹지 않습니다.
2. 대변 - 2~3회/ 1일 -> 변비는 한 번도 없었다 합니다.
3. 제가 매일 먹는 약이라고 하면서, 일단 <태조 2일분>을 췌는데요.

밤에 전화와서는 이것도 봉지만 뜯어 놓고, 불안해서 못 먹겠습니다.....:(제가 좀 '칼스마'있게 말했어야 했는데, '테스트'성격이 있다는 식으로 얘기한 것 때문 같습니다..)

"원장님, 만약 이 약 먹고 제가 잘못되면 어떨까요???" --> 뭐, 이런식입니다.

대체로 음식반응들이 양호한데, 하필 커피만, 위장장애가 있네요...

일단, 대변만 보고 한증으로 밀어붙여야 하겠지요?

조위승청탕 가 갈근 2, 승마 1, 산약 1. 연자육 1 할까 합니다. 황금을 3푼이라도 쓸지 말지 고민이 좀 되구요.. 의견여쭙습니다.

안준철

백자인 감국이 중요합니다. 백자인은 심간의 혈을 돕습니다. (심간은 血장기 폐신은 氣장기입니다.) 감국은 거풍합니다.

스트레스 심한 여성의 갱년기 장애, 소화기장애 병발에 갈근조위탕가 심장을 돕는 산약, 연자육, 심계가 있으므로 황금을 가한다.

태음인 열증으로 판단하고 처방하려고 합니다. 결혼 후 30년간 심리적인 스트레스 상태에 지내신 분입니다. 교감신경항진증으로 복약 중이시고 갱년기 증상으로 호르몬제 복용하고 있습니다. 불면증이 있어서 안정제를 한 알씩 드신답니다.

심계 증상이 있고 굉장히 예민합니다. 위장이 안 좋아 오심, 구역, 이체, 쓰림 등의 증상이 있고 구건과 수족 한출증도 있습니다. 소변불리, 기상시 부종 등의 증상도 있네요.

위장치료부터 하는게 좋을까요?

안준철08.06.07. 11:41

위장을 고려해서 갈근조위탕을 쓰시고 심장을 도와주는 산약 연자육을 가하고 심계가 있어서

황금을 가하면 좋겠습니다. 소변불리 기상시부종도 위가 좋아지면 됩니다.

변비있는 태음인 화병에 갈근조위탕의 활용

근래 집안에 우환이 있어 말 못 할 속앓이가 심해 2주간을 과음으로 지내신 후
평소 심하던 알러지 결막염, 안면부종이 더 심해지고 계속 변비가 있으시다고
오늘 아침부터는 설사를 여러차례 했습니다.

불면증이 생겼고 한 눈에 초췌한 모습이 역력합니다. 아직 심장증상은 없는듯한데요,
청심으로 할까요, 갈조에 가감할까요? 아님 류썸 처방 한번 써볼까요??

조언 부탁드립니다. (-_-)

안준철

심계항진이나 흉통이 없으면 갈근조위탕으로도 제증상이 해결되겠습니다.

불면증에 온담탕을 쓰는 기준. 담음증상이 있어야, 구고 인건 목현 흉협통 등 膽의 증상에 오심 구역 등의 담음증 혹은 비위의 증상을 보고 온담탕 써야함.

태음인의 경우 열다한소탕이나 황금청심탕, 허증의 경우 양심탕을 쓰게 되는데요..

일반적으로는 온담탕도 쓰고, 류주열 선생님 책에도 체질별 온담탕을 개발해 놓으셨습니다.

온담탕을 써야하는 불면증에 대해서 설명을 좀 부탁드립니다.

불면증 치료가 꽤 어려운 느낌입니다.

안준철

온담탕류는 담음의 증상이 있어야 됩니다. 구고 인건 목현 흉협통 등의 膽의 증상에 오심 구역 등의 담음의 증상 또는 비위의 증상을 보고 온담탕을 써야 됩니다.

동의보감의 온담탕은 공포로 인한 불면 불안에 쓰입니다. 청말에 나온 장부변증은 중서회통의
가의 영향으로 현대의학적 내용이 첨가되고...따라서 동의보감의 온담탕과 장부변증에서의 온
담탕은 확연한 차이를 보입니다. 장부변증에서의 온담탕은 和胃利膽 위주의 처방입니다. 불면
과 거리가 있습니다.

-->자세한 설명 감사드립니다. 지난 번에 알려주신 심.담.간의 병증 차이와 함께 많은 도움이
될 것 같습니다.

**공황장애 그동안 쪽 치료했던 과정. 태음인에게는 쌀밥과 김치가 안 좋다. 통밀 수수 율무가
good. 현미가 태음인에게는 가장 해로운 음식.**

40대 중반으로 태음인 열증으로 나온 분입니다.

공황장애로 호흡 안 되고 불안하고 소변 자주 보고 변비 불면증 등이 있습니다

청심연자탕 산약 연자육

갈근조위탕+산약 포공영 연자육 갈근
갈근조위탕+맥문동 오미자 행인 길경 대황(160그램)
상황보음탕
황금청심탕

1년 동안 이런 식으로 쪽 썼더니 많이 호전됐습니다
마음도 편해지고 불안증도 없어지고 상당히 좋아졌습니다
다만 이 환자분은 변비와 소변을 자주 보는 것을 현재는 제일 해결하고 싶어합니다
특히 변비로 고생중입니다. 이런 경우에 갈조탕에 대황을 더욱 많이 넣어야 할까요?
아니면 다른 식으로 봐야할까요? 감사합니다

좋은 처방들이었습니다. 환자의 신뢰를 사기에 충분했던... 감사합니다

김상인

미천한 경험이지만 대황으로 해결이 안 되면 음혈을 보하는 보간탕 계통은 어떨런지요? 상황은 다르지만 우울증 경향이 심한 다이어트 환자 치료시에 대황을 증량(5돈까지도)해도 해결이 안 되더군요. 그 반대로 다이어트로 몸이 상해서 생리에 문제 생긴 환자 보간탕 계열 주니 변비까지 해결이 되더군요. '병인론'에서도 김구영원장님은 간-대장 상통으로 보간탕 많이 처방하시는 것 같습니다. 그래서 개인적으로 1.대황제 2.보간제 3노인분들은 보신제 뭐 이렇게 생각하고 있습니다. 다른 분들도 고견 올려주시구요 틀린 점 있으면 지도 부탁드립니다.저보다 더 잘 아시겠지만 태음인들 변비 푸룬주스(자두) 잘 듣는 것 같습니다.
예를 들었던 앞에 대황5돈 환자 매일 푸룬주스 먹고 대변 보기는 본다고.....오늘은 리플놀이 많이 했습니다. 틀린 내용이나 잘못된 점 있으면 기탄없이 지적해 주세요...항상 파이팅입니다..^^;;

안준철09.11.18. 12:19

태음인 변비에 쌀과 배추김치를 먹으면 해결이 안 되는 거 같습니다. 약을 쓰면 바로 좋아지지만 음식으로 인해서 다시 변비가 되어 버립니다. 모든 태양인 음식은 태음인에게 滯腸하는 작용을 한다고 생각하시면 좋겠습니다. 고혈압과 당뇨병의 경우도 마찬가지였습니다. 한약으로 바로 좋아지지만 쌀밥과 배추김치를 먹으면 곧 원래대로 됩니다. 우리나라에서 쌀과 배추김치로 인한 폐해로 태음인이 고혈압 당뇨 고지혈증에 가장 많이 이완되어있습니다. 이걸 사실입니다. 김치가 싸스나 풀루에 예방효과가 있다는 말..과연 그럴까 싶습니다. 물론 유산균은 좋지만 체질을 거스르는 배추가 주재료라는 사실은 심각한 문제입니다. 태음인에게요.

윤승일

쌀과 배추는 태양인만 먹어야겠네요. 저도 정말 쌀밥을 먹고 나는 늘 몸이 안 좋습니다. 미국 살 때는 밥을 많이 안 먹어서인지 좋았는데 여기서 매일 먹다보니 좀 안 좋습니다. 보리밥을 먹어야겠는데 저의 걱정은 보리 속엔 글루텐 단백질이 있어서 신경계에 영향을 미칠까 이것을 걱정합니다. 고견 주세요 감사합니다.

김상인

고견 정말 감사드립니다. 결국은 한약은 치료하고 음식은 유지하고.....음식이 중요하군요

안준철09.11.18. 12:58

음식으로도 치료됩니다. 음식의 비밀을 다 알려주면 한약 안 먹습니다. ㅋ 적절한 수준에서 티칭합니다. 물론 난치병은 엄정하게 지키도록 해야겠습니다만...태양인 변비에 변데기가 한약 못지 않습니다. 이런 거 환자들이 다 알면 변데기만 먹습니다. 한약보다 더 좋아합니다.

주영준

선생님 태음인은 주식으로 뭘 먹죠? 쌀밥에 통밀쌀 섞어서 먹으면 되나요? 통밀쌀 먹기 힘들어요

최미령

통밀 사서 100프로 통밀밥만 먹었더니... 맛은 오래 씹으면 구수하긴 하지만.... 씹는데 힘이 들고, 밥 먹고 나면 금방 배가 고파지더군요.. 그래도 태음인이신 저희 어머니는 대변이 훨씬 좋아지셨다고 하셔서 쌀의 비율을 낮춰 섞어서 먹고 있습니다. 여유되시면 울무도 섞어 드시면 더 맛나요~ ^^

주영준

몸이 허할 때 곰탕이나 꼬리곰탕을 즐겨 먹는데, 피부가 약간 가렵고 건조해 지네요. 그래서 갈근승기탕을 먹으면 변도 굵고 잘 나오는 거 같습니다. 갈근조위탕은 먹기가 승기탕보다는 못하네요. 계속 승기탕을 먹어도 별 문제 없을까요?

윤승일

태음인=통밀+수수+울무

안준철09.11.19. 16:49

현미는 태음인에게 가장 해로운 곡물입니다. 장기간 먹으면 위장병 변비됩니다.

태음인 열증으로 불안과 공포 초조가 있으면 심병증으로 보고 심음허 처방에 심화를 사하는 황금이나 목통을 가해서 쓴다.

전에 갈근조위탕은 허리 디스크로 처방했었습니다 반응이 좋았습니다.

회사에서 프리젠테이션 등을 할 때 두렵답니다 떨리고요. 술을 좋아했습니다

약간 다혈질이지만 욕하는 스타리고요. 말수가 적습니다

간신음허 정심보음탕 가감을 하는 경우와 간화로 봐서 청간탕

담화로 봐서 가감길경죽여탕, 담울담요로 온담탕

맥은 제가 잘 모르겠고요, 증상은 특별한 것은 없이 불안 공포가 조금씩 생겨서 해결을 하고자 합니다. 어떻게 변증을 함이 옳을까요? 그리고 반하 남성인 경우 환약을 만들어줄 때는 보통 그대로 처방하면 될까요? 감사합니다

안준철

기본적으로 공포 불안 초초는 심병증에서 찾아야 됩니다. 담울담요증은 痰증상이므로 메스꺼운 증상이나 토하는 증상이 반드시 있어야 됩니다. 청간탕은 청열약이 너무 많고 강해서 몸이

까라지기 쉽습니다(청간탕은 폭노한 경우에 쓰이는 처방이므로이 경우에 해당하지 않습니다. 급작스런 쇼크 등에 해당합니다.). 주의해야됩니다.

이분은 열증이므로 기본적으로 심음허증에 해당합니다. 심음허증 처방에 심화를 사하는 황금이나 목통을 가해서 쓰기도 합니다.

반하 남성은 소음인약입니다. 이분에게 해당이 없습니다. 소음인에게 반하 남성은 보통 탕제에 넣어서 다리고 반듯이 생강으로 법제합니다.

윤승일

위에 환자와는 상관없는 다른 소음인 환자 질문입니다: 생강법제한 반하 남성은 환으로 괜찮은지요 아니면 줄여야 하나요? 환으로 줄 경우에는요?

안준철

법제된 남성은 탕제에 사용하고 생남성은 환산제에 넣어서 쓴다고 생각하시면 됩니다. 남성의 경우 법제된 것은 3-6g사용합니다. 환이나 산제의 경우 흔히 생으로 사용합니다.(0.3-1.2그램을 성인이 1회에 복용합니다.)

갈근조위탕으로 비만에 도움되게 하려면 오미자(소화액분비 촉진)를 거하고 황금을 가한다. 산조인초 2돈 쓰면 불안도 줄이고 식욕향진에도 도움이 된다.

비만 까지도 해결을 원하는데요, 새로 처방을 할 때 혹시

갈조탕에 어떻게 가감하면 비만 또한 도움을 줄지 고견을 듣고싶네요

불안하고 가슴통증 두통 등은 많이 호전되었습니다. 감사합니다

안준철09.02.04. 11:00

오미자는 소화액 분비를 촉진합니다. 오미자를 거하고 황금을 가합니다. 산조인초 2돈 쓰시면 불안도 줄이고 식욕향진에도 도움인 많이 도겠습니다.

태양인 한증 8살 자폐아이-갑자기 흥분 불면 자해 등을 담화요심으로 보고 석곡청심탕

반복적 동작하면서 흥분하고 불안해하고 하는 등의 신경정신과적 반응이 심합니다

이런 경우 태양인 간 혹은 심병으로 어떻게 치료하시는지요? 전에 불면이면 심장으로 더 봐줘야 한다고 하셨는데요..맥유신 작합니다. 감사합니다

안준철

간을 상태에서 더 진행되면 불면이 옵니다. 즉 간병증에서 증상이 더 심해지면 심병증으로 진행됩니다. "제정신이 아니다, 미쳐 날뛰다" 이런 거는 심병증입니다.

윤승일

네 알겠습니다 그러면 담화요심의 석곡청심탕으로 해도 무난하겠습니까? 감사합니다

정용재

심화항성이나 담화요심에 해당될 것 같습니다. 심화항성은 심병 중 가장 급병이며 정신증은 없는 반면 담화요심은 정신이상이가 있어 미쳐 날뛰는 것이라고 류선생님이 말씀하셨습니다. 둘

다 석곡청심탕이 기본이네요.

■ 피부(피부건조, 여드름, 아토피, 습진, 사마귀, 탈모....등)

위장수술 받고나서 전신에 발적, 부어오르면서 소양감이 심하다. 갈근조위탕의 대항이 이담작용으로 가렴증 개선. 이로 미흡하면 창이자패장탕(풍채피부). 가렴증 심하면 부평 2배증량, 부기 있으면 백선평, 삼백초를 가함.

갈근조위탕 원방으로도 소양증이 많이 좋아집니다. 대항이 이담작용을 해서 빌리루빈 등의 수치를 내려주기 때문입니다. 갈근조위탕으로 미흡하면 창이자패장탕을 쓰면 됩니다.(가렴증이 심하면 부평초를 2배로 증량합니다. 부기가 있으면 백선평을 1돈 더 넣어서 쓰고 삼백초를 가합니다.) 위절재술이 원인이라면 갈근조위탕 원방이 더 잘 들을 같습니다. 이때는 이담작용이 강한 장엽대황을 쓰면 더 효과적입니다.

27세 남성, 지루성피부염으로 피나도록 긁고 아침에 각질. 갈근조위탕가 천문동 울금 청호 승마.

수면중에 피가 날 정도로 긁는다. 아침에 일어나면 각질이 많이 나옴.

(안)

태음인으로 보입니다. 갈근조위탕에 천문동 울금 청호 승마를 가해서 써봅니다.

물사마귀 치험례. 의이인이 최고다.

대개 물사마귀는 적절한 체질 보약으로 치료가 잘 되는 편인 것 같습니다.

심상성 사마귀(보통 사마귀)가 외관상 보기가 좋지 않고, 환자가 스트레스가 심합니다.

치료도 물사마귀보다 어려운 것 같습니다.

작년에 사마귀 강의를 듣고서 치료가 될 듯하여 몇 차례 시도해 보았습니다.

이번 환자는 30세 남환으로 손, 발에 콩만한 사마귀 10-20개 쯤,

얼굴에 녹두 만한 사마귀 5-6개 쯤 있었습니다. 체질은 태음인 열자입니다.

처방은 열다한소탕, 맥문동양폐탕, 갈근해표탕가 의이인10돈..등을 각 2-3제 정도 사용하였습니다. 침구치료는 침-열결, 뜸-가장 먼저 난 사마귀에 직구를 5분간 계속..습부-복삼혈에 2호 컵으로 거의 다 찰 정도로 사혈..일주일에 한 두번씩 치료하였습니다.

3개월 정도 치료해도 전혀 차도가 없어 보였는데-심지어는 중간에는 술먹고 컨디션 안 좋으면 심해지기도 했습니다. 2주 전부터 작은 놈들이 없어지기 시작하더니, 어제 왔는데, 다 떨어지고 손가락에 하나 남았네요. 그 놈도 허영게 말라서 곧 떨어질 것으로 보입니다.

사실, 사마귀에 유효하다는 치료를 동시에 진행하여서 어떤 것이 주된 작용을 한 건지는 모르겠습니다. 처방도 침터에서는 '곽향정기산 가 의이인'이 많이 검색되었는데, 태음인이라..위 처방을 써 보았습니다.

(안) 좋은 임상례입니다. 사마귀에는 의이인이 최곱니다. 의이인은 항바이러스 작용이 강력합니다. 예로부터 민간에서 울무 한 되를 다려서 다 먹으면 사마귀가 낫는다는 말이 있습니다

심한 사행성 원형탈모를 간신부족으로 간주하고 가미상황보음환

4246번 환자분은 중3 여학생으로 6월초에 후두부에 원형탈모가 하나 생겼는데 7월초부터 경희의료원 피부과서 스테로이드 주사 치료를 3주 (총 3번 맞았겠지요) 했는데 점점 머리가 심하게 빠져서 본원에 내원했을 때는 머리카락이 50퍼센트 정도는 없어진 상태였습니다. 어머니 말씀이 머리를 감으면 하수구가 막힌다고... 한의원에 오셔서 머리 견인을 해봤을 때 우수수 떨어졌습니다. 4249번 환자분도 후두부에 원형탈모가 생겨 피부과서 스테로이드 주사를 6주 하고 오셨는데 온 머리가 듬성듬성 다 빠져서 이 분도 한 50퍼센트는 없어진 상태였습니다

두 분 다 일반적인 원형탈모가 아니라 후두부는 원형탈모가 있고 (이건 제일 처음 생긴 원형탈모) 스테로이드 치료를 하면서 머리 전체가 듬성듬성 일정한 모양없이 다 빠져버린 사행성 원형탈모의 상태였고, 빠진 머리카락도 있지만 일부 끊어진 머리카락도 많았습니다

이 두 분은 정황상 원래 사행성 원형탈모는 아니었던 것으로 생각되고, 스테로이드 부작용으로 사행성이 진행된 것으로 보입니다.

상담시 앞으로 머리카락이 계속 더 빠질 것이며 최악의 경우 골룸처럼 머리카락이 하나도 안 남을 수도 있다고 얘기해주면서 가발을 준비하라고 했고, 머리카락이 다 나는 데는 1년에서 1년 6개월이 걸릴 것이라고 얘기하고 치료에 들어갔습니다

두분 다 태음인 열증으로 간신부족증으로 보고 가미 상황보음환 을 처방했습니다.

(상황보음탕에 상엽, 측백엽, 백자인, 황정, 백질려염수초, 흑두대신 흑두초)

하루 2회 2-3일 복용후 내원했는데 두 분다 머리카락 빠지는 것이 현저히 줄었으며, 중학생은 약 10일 만에 처음 생긴 후두부 원형탈모에서 흰 솜털 머리카락과 까만 잔 머리카락이 자라났고 4249번 환자분은 약 일주일만에 중학생과 똑같이 자라났습니다

보통 이 정도로 심한 사행성 환자들은 후세방을 썼을 경우, 한 두달 동안은 머리카락이 계속 빠져 골룸처럼 되고 그 후 또 한 두달은 지나야 머리카락이 나기 시작하는 것이 일반적입니다. 신기할 정도로 빨리 머리카락이 나기 시작하여 임상결과 발표방에 올립니다.

베체트병, 구토 자주하고 비습한 체형이라 濕淫으로 변증, 상지부평초탕가감방으로 저효.

태음인 열자 17세의 여고생이 베체트병으로 구강 잇몸 음부에 궤양이 생겨서 매우 걱정스런 상태로 래원. 평소 변비가 심한 편

변증:구토를 자주 하고 잘 붓는 비습한 체형이라서 濕淫으로 변증

처방:습음증후군에 쓰이는 상지부평초탕에

청열해독하는 패장

변비를 보고 대황

이뇨작용과 거습하는 작용을 하면서 어혈을 없애는 호장근

그리고 피부병에 진정작용과 청열 보음하는 천문동

청열작용을 하고 이담하는 청호를 가했습니다.(목통은 2돈 나머지 약물을 각1돈씩 가했습니다.)

결과:한달 만에 증상의 90%가 좋아졌습니다.(붓는 증상은 물론이고 변비도 좋아지고 피부도 좋아졌습니다.) 음부에 새살이 거의 다 차올랐다고 부모님이 아주 기뻐하십니다. 양방치료보다 확실히 좋다고 합니다. 조금만 더 약을 먹으면 끝이 날 거 같습니다.

병이 완치된 후에도 6개월 정도 음식을 가리라고 했습니다

태음인 한자 소아의 화상을 갈근해독탕(화열상염)으로 치료(한살)

갈근해독탕 먹이고 환부 자침

진물이 나면 청열조습, 진물이 안 나면 청열 해독하는 방향으로 접근한다.

주소증: 대상포진을 갈근해독탕가 대황2돈으로 치료.

38세

3월중순 피로감 코피로 내원하셨습니다. 처음엔 한자로 진단해서 갈근소간탕으로 처방했다가 가감단삼청열탕으로 바뀌서 드렸습니다. 피로감은 호전중이셨습니다. 업무로 밤샘이 많으편이셔서 코피는 밤새는 다음날에 아직 나다가 4월초 내원시 찜질방에서 주무시고 나서 대상포진이 발생하셨습니다.

라뽀가 형성된 분이셔서 한방으로 치료하자고 권해서 항바이러스제 진통제 안 드시고 치료를 시작했습니다.

초기 일주일에서 10일간은 통증이 심한편이시고 숨쉴 때 통증 조그만 쏘려도 불편감이 존재하셨습니다. 하루 3팩에서 6팩으로 증량해서 갈근해독탕가 대황2돈 후하 증량해서 투여했습니다. 10일이 경과 후 진행성 통증은 줄어드셨습니다. 그 후 대변상태로 차차 팩수를 줄였습니다. 일주일간 병가 후 일상생활로 복귀 하셨습니다. 한 달까지는 옷에 쓸리는 느낌이 아직 존

재 하셨고 한 달반 지난 후엔 쏘리는 느낌은 거의 사라지시고 아주 심한 운동시에 불편감이 약간 존재 하십니다. 현재 거의 증상 없으십니다.

급성기는 처음 치료한 케이스라서 올려봅니다.

초기치료시 감모치료처럼 탕제 복용횟수를 늘리는 것이 중요하다고 생각합니다. 신경염이 진행기일 땐 6팩 이상 복용시키는 것이 좋을 거 같습니다. 두부 신경염이 아니어서 항생제 진통제 복용을 중단하고 치료했습니다. 양방에선 한 달 입원시켜서 치료하시네요 보통요 급성기 통증도 7일보다 더 길게 가는 걸로 알고 있습니다. 허약해서 생기셨다고 다시 보약 권했습니다.^^

태음인 23세 여성 아토피를 갈근질려탕가미방으로 호전

작년 12월 19일 내원한 23세의 통통한 미혼여성입니다.
158cm, 53kg. 초등학교 이후부터 아토피가 있었는데
환처는 주로 접히는 부위였습니다.

내원하기 1년 전쯤부터 심해졌다고 하는데요,
그때가 일본 유학이 거의 끝날 무렵쯤이었다고 합니다.

지금은 저녁때 심하며 보습제를 계속 바르고 있는 상태입니다.
음식은 따로 부작용이나 불편을 느끼지 못하고 있습니다.

소화 잘되고 대변은 1일에 1, 2회 정도 보나 과거 거른적도 있었다고 합니다.
류 선생님 아토피처방 중 갈근질려탕 가미방 1제를 처방하고 음식 주의 시켰으며 보습제 금하고 온수욕을 시켜 1주에 1, 2번 정도 했습니다.

1제 먹은 후 팔은 비슷하나 다리 부분은 거의 좋아졌다고 합니다.

2제 먹은 후 많이 좋아졌다고 하고 가끔 안 맞는 음식을 먹을 때만 가렵다고 합니다.

컨디션도 너무 좋은데 보약을 썼냐고 묻길래 몸에 독소가 빠져서 그렇다고 했습니다.

(진즉에 녹용 좀 드시지...이후 이 분은 일반약만 먹습니다.^^)

3제 드신 후 로션을 안 발라도 될 정도로 건조감이 많이 사라졌다고 합니다. 얼굴은 너무 좋아졌다고 하네요. 쪽 괜찮다가 봄이라서 그런지 등이나 팔 접히는 곳에 약간 소양감이 생긴다고 합니다. 돼지고기를 가끔 먹으면 가렵다고 합니다.

집이 멀다고 초진 내원 후 한 번도 오지 않았는데 초진에 사진을 좀 찍어둘걸 하는 생각이 드네요. 4달 동안 3제 드신 셈이니 열심히 챙겨 먹진 않은 것 같습니다.

완전히 괜찮아도 1달 이상 약을 끊지 말고 먹어야 뿌리를 뽑을 수 있다고 강한 어조로 설명하고(ㅋ) 오늘 다시 같은 처방을 했습니다. 류 선생님 아토피 처방에 매우 잘 반응한 경우라 올려봅니다.

태음인 6세 아이 아토피를 자완청열탕가 백선평으로 호전

생후 1년부터 아토피 시작되어 팔다리 굴신부위에 가려움이 심했다고 합니다.

증세가 심할 때는 피부과 먹는 약 가끔 먹고, 바르는 크림(아토피) 가끔 발랐다고 하네요. 겨울엔 더 심해지고, 더울 때는 가려움이 심하다고 합니다. 땀은 잘 나고 날씨가 서늘해지면 배에 닭살끼가 있다고 합니다. 자다가, 자기전에 많이 긁는다. 얼굴은 비빈다. 얼굴이 전체적으로 붉고, 팔다리에 상처가 있습니다.

한 달 전에 와서 태음인으로 보고 자완청열탕 가 백선평3푼, 썼습니다. 15첩 달여 25일 복용 오늘 오셨는데 가려움 증상이 많이 줄었고 무릎뒤, 팔오금 상처는 거의 다 아물었네요.. 소화 대변은 비슷하구요..

무엇보다 놀라운 것은 아기 아버지가 하는 말씀이. 효과가 양약같아요~!!! 먹고 나면 얼마 후에 얼굴이 하얘졌다고 합니다..지금은 며칠 전에 무슨 음식을 먹고 입가에 약간 붉은 기가 올라온 것 외에는 얼굴도 하얘졌습니다.. 겨울에 심해지는데 지금은 증상이 많이 덜해졌다고 좋아하십니다. 임상결과 발표라기보다는 놀라워서.^^; 올려봅니다. 류썸 처방의 효과에 새삼 놀라게 되네요

물집커지고 진물 나는 피부질환을 창이자패장탕가 목통 의이인 삼백초로 호전. 건조해지면 목통 의이인을 빼고 천문동 청호를 가한다.

52세 여성. 물집.

창이자패장탕, 처음에는 좋아지다가 물집이 커지고 진물이 나는 방향으로 악화되어가는 듯하다. 이에 대해 안준철선생이 창이자패장탕에 목통 의이인 삼백초 등을 가해야 수포가 빨리 가라앉는다고 지도. 한 돈 씩 가미해서 반제를 복용하니 가려움 덜하고 환부가 확 줄어들면서 물이 마르고 딱지가 생기더라

(안)

짓무는 단계가 지나 비늘이 생기면 목통 의이인을 빼고 천문동 청호를 가합니다.

갈근질려탕과 의이부자패장산으로 호전되지 못한 가려움증이 갈근조위탕가 녹용으로 개선되었다.

이 할아버지 이후에 피곤이 많이 갠 거 같다고 한 번씩 아드레날만 받아가십니다.

한 번은 오셔서 손가락 습진으로 소양이 심하고 겨드랑이나 사타구니 등에도 소양증이 나타난다고, 피부연고는 기막히게 듣는데 그 때뿐이고 피부양약은 아는 피부과 의사가 있는데 그 양반도 피부과 약 독하다며 차마 처방할 수 없어 이비인후과로 전과한 분을 알고 있으시다

고.....
아, 그러시냐고, 그럼 한약 드시자고, 평소 소양증은 매우 자신있었길래 자신만만하게 말씀드

렸지요. 할아버지 흔쾌히 오케이 하시고 피곤은 갠으니까 용은 빼자고...

음.... 찻... 그러시자고. 그래서 갈근질려탕 드렸습니다.

아직도 땀만 나면 소양증이 여전하다고..겨드랑이는 뺨~끔 좋아진것 같다고...음.. 이상한데..그래서 이번엔 창이자패장탕을 드렸습니다.

1주전에 오셔선 점점 심해지는거 같다고...-.-;;

또다시 전투모드로 들어가서, 매일 비빔밥을 드신다길래 그라지 마시라,

느릅나무로 환을 지어 먹고 소변약, 안약, 비타민, 피부연고 등등 쓰신다길래 저를 믿고 혈압약 빼고 다 끊자. 할아버지 말씀하시길, 요번에는 녹용이 없어서 효과가 좀 미흡한 거 같다. 용이 들어가면 효과가 확실하다면 형편이 좋진 않지만 용을 좀 쓰자.

히든처방 두개가 다 공개된 마당에 비싼 돈 받고 확실한 효과의 처방을 찾아야 한다는 게 매우 부담되었으나 용의 유혹을 차마 못 떨치고 그러시자, 콜라 마개는 병따게로 따야지 손으로 1만번 힘줘봐야 몬 땀다..

이 후 2박 3일 고민 끝에...갈근조위탕 가 분골 처방했습니다.^.^;

약 보낼 때 아드레날 같이 좀 보내달라고 하셔서 그것보다 아미노 디 톡스가 좋을거 같아 이걸 보내드렸습니다. 이렇게 개념없이 막 써도 되는지 모르겠습니다.--;

암튼 결과는 대만족, 할아버지 용값 안 아까워 하시고 있습니다.

오늘의 주제는 구관이 명관입니다. 안 선생님, 제가 호프 한잔 사겠습니다.^.^;;

(안) 대항이 이담작용이 있습니다. 황달이나 빌리루빈 수치와도 관계됩니다. 간해독이 됩니다. 담즙으로 간의 독성이 배설됩니다.

(정용재) 안선생님께서 갈근조위탕을 소양증 쓴다고 강의에서 말씀해 주셨습니다. 풍열약(선회, 백선회)이나 청열해독약(포공영)을 쓸 수 있지만 원방이 더 강력했다고 하셨습니다. 갈근조위탕으로 간청소가 되고 대소변으로 습열이 빠지고 해독이 되므로.

스테로이드로 인한 전신습창이 재발하다. 소음인

처음에 인진지각탕으로 호전됨(風在皮膚)

3시간 동안 오래된 사진을 정리한 것이 계기가 되어 악화. 곰팡이 목욕 시키고 인진지각탕 썼으나 무효, 다시 황기지각탕 썼으니 또 무효.

왜 되었던 것이 안될까.....갑자기 피부를 발산하고 표리를 함께 풀어주어야 한다는 생각으로 향사양위탕가 천궁 소엽 창출 지각 각 한 돈 가함, 진물이 멎고 속살이 차오르기 시작함.

(안)

다음에는 황기를 이용해서 마무리하는 것이 좋겠습니다. 황기의 생기작용을 활용할 필요가 있습니다. 이 사례를 통해서도 소음인에게 인삼이 청열한다는 사실을 알 수가 있습니다.

태음인 두드러기에 갈근질려탕, 갈근조위탕으로 효과를 보다.

아토피에서 맥문동 천문동과 승마 황금 황련 황백의 용도

양부모가 태음인이라서 어린이는 태음인 열증이 확실해 보입니다. 승마는 조습청열합니다. 건조한 아토피에는 천문동 맥문동 위주로 약을 습니다. 황금도 짓무는 경우에는 잘 듣습니다만 건조한 경우에는 쓰지 않습니다. 황금 황련 황백 등은 조습청열한다는 사실이 중요합니다. 아토피 역시 증상에 따라서 다양하게 접근합니다.

곰팡이로 인한 피부질환(피부 가렵고 긁으면 검어짐)과 구설생창에 음혈 길러주는 단삼보간탕 가 백질려 부평으로 효과를 보다(갈근질려탕, 상황보음탕가산조인, 상자양간탕으로 무효)

평소 한의원을 내원하던 14세 남자 용환인데, 수개월 전부터 피부가 가렵고 긁으면 검어진다 고 왔습니다. 추워지면서 더 심해진 것 같다고 하시네요. 최근 학습량이 늘어나고 다소 피곤해한다고 합니다.

1번 용환은 영원한 용환이라;; 갈근질려탕(風在皮膚)에 단삼, 상심자 4g하고 녹용 약간 넣어 처방했습니다. (1월12일)

거의 비슷한 것 같습니다. 그간 체기도 3, 4차례 있었다고 합니다.

다시 간신음허로 변증하고 상황보음탕 가 산조인에 녹용 약간 썼습니다. (1월 31일)

거의 차이가 없습니다. 욕심을 내려놓고 차분히 다시 변증해서 이번엔 상자양간탕 원방을 처방했습니다(肝陽化風). 거의 차이가 없습니다. 여전히 체기도 계속 생기고 입술이나 혀가 한 번씩 터져 오래갑니다.(요건 소증으로 있던 증상)

자만을 내려놓고 차분히 <동의보감>을 펼쳤습니다.ㅠㅠ

外形編 口舌門에 입안이 허는건 心火라고 하더군요. 류썸 말씀에, 입안에 있는 세포가 가장 재생주기가 빠르는데, 이게 잘 낫지 않는 건 몸이 그만큼 허약하기 때문이다라는 말씀도 떠올랐 습니다. 긁으면 쉽게 검어지고 검은색이 오래가는 것도 세포가 금방 죽고 회복이 안 되는 걸로 이해가 되더군요.

궁리 끝에 음혈을 길러 혈을 고르게 하면 살이 윤택해지고 가려움이 그치리라 기대하게 되었습니다. 단삼보간탕에 백질려, 부평 4g 썼습니다. (간혈허 혈허생풍 간양상항) (3월19일)

그런데 다음날 감기로 목혈은 게 워낙 심해 병원에 갔더랍니다. 의사 왈, 헤르페스 감염으로 궤양이 생긴 거라 했다더군요. 피부도 보더니 대변에 곰팡이 감염이라고 했습니다. ㅠㅠ

순간 좀 우울해질라 카더군요. 이머....썸팡이같이.....

오늘 내원했는데, 보는 순간 벌써 얼굴빛이 다른걸 알겠더군요.

생기가 생긴 게 확연히 느껴졌고 어머니께 여쭙보니 그날 다녀간 뒤로

요즘 밥도 잘 먹고 체하는 것도 없고 입에 염증도 없었다고 합니다.

보시기에도 활기가 생긴 거 같다고 하시더군요.

제가 드린 약은 계속 먹었고 곰팡이 치료제(스테로이드 2알)은 3일 전부터 먹었다고 합니다.

컨디션은 1주일 전부터 좋아진 것 같다고 합니다. 오늘 보기에다 검게 변한 피부 밑으로 흰 살이 돌아오는 아름다운 광경이 목격됩니다.

스테로이드 효과도 봤겠지만 암튼 보혈약도 도움을 준 경우라 나름 판단하고 올려봅니다.
결론적으로 어머니가 저한테 고마워하시니 뭐 아무래도 좋습니다.^.^;;
곰팡이에 대해 기탄없는 조언을 해주신 윤원장님께도 심심한 감사를 드립니다.^^

태음인의 한증 아토피 태음조위탕 가 갈근2돈 승마 1돈 천문동,맥문동,포공영 1돈 대황 5푼
태음조위탕 가 갈근2돈 승마 1돈 천문동,맥문동,포공영 1돈 대황 5푼
3주 정도 먹었는데 많이 좋아졌다고 합니다.

소양인 탈모에 대한 변증별 처방종류. 독활지황탕가 황련 치자 시호 박하 백화사설초 연교 홍
맥 각1돈, 영지 별갑2돈으로 효과를 보다.

한증 25세남...정원장님 조언:
탈모도 변증이 꽤 복잡하네요. 원형탈모는 아니죠 ?
비듬이나 지루성 탈모 :

1. 혈열풍조에 생지황윤조탕 합 가감지황청영탕.
2. 혈조습열에 생지황윤조탕 가 백화사설초, 자초, 연교, 치자.
3. 음허습열에 지황양폐탕 가 자초, 연교, 백화사설초, 치자.
4. 장위습열에 치자황련탕 가 자초, 고삼, 백화사설초.
5. 비허습열에 형방지황탕 거 강활, 독활, 형개, 방풍, 가 홍맥, 자초, 백화사설초.

해서.... 독지+ 황련 치자 시호 박하 백화사설초 연교 홍맥 1돈 영지별갑 2돈
드시고 많이 좋으시다네요 ^^

설사경향의 소양인 面발진 手·前腕부 발진, 형방지황탕에 피부약 가미해서 호전. 얼굴의 발진
일으키는 습이 형방지황탕으로 없어지면서 호전된 것. 식체가 원인이면 독활지황탕에 가감해
야.....

주소 : 面발진 手·前腕부 발진
경과 : 양약 3개월 복용(대학병원) 여전--> 한의원 내원 아래 형방지황탕가미 1재 복용후 호
전

소화 : 과식시 가스 팽만, 소화불량
대변 : 1일 3-4회 무른 변, 평생 변비는 없음. 7-8분 앉아있음

형방지황탕은 변이 묽고 설사가 잦은 사람에게 쓰는 것이다. 쓰다 보면 변비가 될 수 있다.
숙지황 산수유가 장의 진액을 점점 말리기 때문이다.

20첩 20팩 10일분 1일 2회 1팩 100cc 대변이 물러서 형방지황탕에 피부약 가미 했는데, 효과가 좋습니다. 안 선생님 감사합니다.

(변재석)

독활지황탕에 가미했으면 더 좋지 않았을까 생각해봅니다.

안준철

결과적으로 얼굴의 발진이 습으로 인해서 왔다고 생각하시면 됩니다. 강활 독활 형개 방풍 복령 택사 차전자 등은 모두 거습하는 약물입니다. 사실 보신하는 약은 산수유와 숙지황뿐입니다.(복령 택사도 보신하지만 거습이 먼저이고 나중에 보신까지 됩니다. 그래서 독활지황탕은 형방지황탕보다 효과적이지 않았을것으로 보여집니다. 식체가 원인이 었다면 독활지황탕이 더 잘 들었을것으로 보여집니다.

장재식

습이 원인이면 형방지황탕, 식적이 원인이면 독활지황탕 이군요... 감사합니다.

태양인 여드름, 어성초백강잠탕으로 무효. 성격 예민해서 소화기문제 있는 것을 보고 간비불화 당삼소간탕가 어성초2돈, 백강잠1.5돈, 와송1돈으로 효과.

태양인 확인 후 태양인 피부의 풍음을 없애주는 어성초백강잠탕 일주일 투여
여드름 => 더 심해지는 느낌. 피지가 적어지는데 올라오는 것은 더 심해짐.
성격이 예민해서 소화기문제가 함께 오는 것으로 보고 간비불화에 쓰는
당삼소간탕 가 어성초 2돈, 백강잠1.5돈, 와송 1돈 투여
이후 여드름도 좋아지고 소화도 다 좋아졌습니다. 선생님께 감사드립니다.

소양인 여드름, 양격산화탕으로 안 되는 것을 독활지황탕 가감방으로 호전

주소증- 여드름.

아토피- 2005년 후세방 생혈윤부음 먹고 많이 가라앉아서 지금은 특별히 문제가 없음.

요즘 얼굴 여드름이 많이 올라옴.

소화-양호, 대변-잘 못감. 변비.2-3일/1회. 커피반응-조금 있음.

월경-불규칙. 한달2회. 3주1회. 월경통-없음.

안준철

소양인이 맞는거 같습니다.08.10.21 12:31

답글

소양인으로 확인하고 양격산화탕 일주일 투여했는데, 소화가 잘 안 되고 숨이 차는 느낌. 피부는 괜찮아지는 것 같음. 가슴이 답답한 느낌이 있음. 대변-하루 1회.양호.

배에 가스 차는 느낌 조금 있음. 그래서 다시 독활지황탕 가 생지황,인동등,연교 2돈 박하,차전자,고삼,황련,치자 1돈 을 처방했습니다. 이후 소화장애도 없어지고 피부증상도 모두 좋아졌습니다. 소증의 한열 차이가 참 중요하다는 것을 다시 한번 느끼게 해준 케이스였던 것 같습니다.

태음인 두드러기, 가려움증을 내상발반으로 판단, 류씨태음조위탕가 황금 부평초 선택 복용 각1돈으로 저효를 보다.

45세 주부.

주소증-----전신의 두드러기로 인한 소양감 6개월, 우측이명 3개월.

음식반응-----항상 우울하고 입맛이 없음. 특별히 탈이 나는 음식은 없으나 6개월 전쯤 무슨 음식인가를 먹고나서부터 온 몸에 두드러기가 나고 가려워 피부과 약물 계속 복용, 너무 가려워서 안 먹을 수 없다고 함. 소식을 함에도 소화는 항상 안 됨.

대변-----평생 변비에 걸려 본 적 없고 주로 묽고 가는 대변과 설사.

싸우나-----잘 안 가서 발한반응 무의미함.

커피-----커피로 인한 불면경향은 한 번도 없음.

피부-----상박의 피부 두꺼움.

맥-----유신? 무신? 애매함.

이목비구가 여유있게 발달한 태음인으로 보임.

남편과의 사이가 안 좋아서 항상 우울한데다 두드러기로 양약을 장기복용하던 중 위장이 더 나빠지고 이명까지 오게 된 환자임. 본인이 원하는 치료의 순서는 우선 두드러기로 인한 가려움을 해결해 주기를 원함.

전신의 상태가 語聲低微, 倦怠無力, 意欲低下, 顏面無華, 精神遲鈍 등 허증에 빠져 있고, 두드러기 증상자체도 만성화-고착화되어 있어 扶正祛邪의 치법이 필요할 것 같은데, 피부를 보고 외감약을 위주로 할지, 내상약에 가미할지가 애매함. 고견 부탁드립니다.

內傷發斑으로 보고 류씨태음조위탕 가 황금, 부평초, 선택, 녹용 각 1돈 20첩 처방.

금일 래원하였는데 두드러기와 가려움 80% 소실, 대변도 설사에서 정상 대변으로 돌아옴.

얼굴표정도 밝아짐. 한약을 이명 개선 쪽으로 바꿔 달라고 스스로 요구함.

태음인 아토피에 비음허 처방, 간기울결 처방을 시도해보다.

전형적인 태양인의 모습이 아닌가 합니다만 혹 소양인은 아닐까 궁금해서 올립니다.

돼지, 고등어, 삼치, 밀가루, 기름진 음식, 라면 등에 불편을 경험했습니다.

어려서도 병치레가 많았구요, 아토피가 10년 됐는데 그전에 천식으로 오래 고생했습니다.

15년간 애들을 가르치면서 스트레스를 대단히 많이 받았다고요. 튀김이나 단 음식을 좋아했었고, 한번씩 폭식을 하기도 합니다. 우보한의원에서 약 먹고 온갖 치료를 다 받아봤는데...

재밌는 에피소드가 있는데, 대상에서 나온 클로렐라를 3일만 먹었는데

아토피가 기막히게 깨끗해졌다고요. 그런데 없어졌던 천식이 재발하더라고요.-.-

태양인이면 식장탕부터 처방하려고 합니다. 절대 마음만 앞서서 복잡한 가감을 하지 않는다.
처방도 중요하지만 관리도 매우 중요하다. 순한 약부터 써볼랍니다.
경험으로 배운 소박한 신념입니다. ㅏㅏ

태음인으로 진단해주셨습니다.

복잡하게 처방하지 말고 기본적인 오장변증으로 처방해야겠다 싶어 비음허 처방인 사삼양비탕 썼습니다. 약 드시고 답답한 느낌이 생깁니다. 얼굴, 가슴 등에 열감이 더 느껴지고 손발은 더 찻니다. 반 봉만 드시라고 했습니다.

1주쯤 지나 1봉을 드시니 짝 막힌 느낌이 또 생깁니다.

또 반 봉만 드시라고 했습니다. 열흘 후 소고기를 먹고 바로 1봉 드시니 담날 아침 속이 불편합니다. 그 담날은 광어랑 참치를 드시고 반봉 드셨는데 속 편합니다.

1주쯤 지나니 속이 많이 편해졌습니다. 이제 한 봉씩 드셔도 불편하지 않고 속도 편하다고 합니다. 지금 약이 잘 맞는 것 같다고 다음약도 같은 처방 주시기를 원합니다.

그런다고 줄 제가 아니죠. --+

워낙 예민하시고 강박적인 성격까지 있으신데다 고 3 수험생 돌보느라 스트레스가 많았습니다. 수족냉이 심하고 간혹 상열도 있어 한증약이나 열증약이 들어있는 간기울결 처방했습니다. 연자소간탕. 아니나 다를까 한 봉 드시고 속이 짝 체하고 어지러워 너무 힘드셨다네요.

2봉째는 조금 나은것 같으나 그래도 힘들다고 전화왔습니다.

웬만해선 체질과 변증을 먼저 의심하지 않는 저로선 다른 원인을 찾기에 고심했습니다. --;

마음이 예민하면 몸도 예민한 것 같습니다. 변화와 포용에 취약한 거죠.

아마 이 분은 지난 번 약이 아닌 다른 무슨 약을 드렸어도 불편을 호소하셨을 것 같습니다.

그래서 약을 바꿔줄 수도 있다. 그러나 번거롭지만 반봉씩 드시는 게 좋겠다고 말씀드렸습니다. 오래된 불균형에 몸이 적응을 해서 새로운 약에 민감하신거라고..

서서히 적응시키는 과정을 거치면 몸이 새로운 변화를 맞이하게 될거라고...

저는 웬만해선 약 안 바꿔줍니다. 특히 이런 심리적인 문제를 낀 분들에겐.....

문제가 있으면 답변에 더 잘해드리면 되죠.^^;; 어떻게 변할지 지켜보도록 하겠습니다.

태양인 아이의 태선화된 피부에 풍열혈조, 風在皮膚의 어성초백강잠탕으로 저효. 아토피 관리 요령, 체질별 입욕제.

아들(5살)이 아토피는 아닌듯한데 피부에 문제가 생겨 이렇게 고견을 청합니다.

아들을 부모님한테 1달 가량 맡겼는데 1주일전쯤 아들놈이 놀다가 땀띠 종류가 약간 난 것 같습니다. 그런데 부모님이 '박트로반'을 아들 팔과 다리에 바르셨고 (얇게 도포하신 것 같습니다

니다). 바른 후 현재 박트로반을 바른 자리가 태선화가 발생하였고 각질이 생겼으며 가려움이 심해서 긁고 있습니다. 청풍학회에서 공부하신 선배님께 보였더니 박트로반이 보습 성분을 내주는 유산균을 다 죽여서 발생한 증상이라고 합니다. 이런 경우 아토피에 준해서 아들이 태양인이니 잠사청열탕을 써도 될까요? 잠사청열탕이 폐경풍열이니...아니면 강의록에 나오는 대로 오가피쌍해산에 가미를 해야 합니까? 또 가렵고 긁으며 건조한데 가미해야 될 약재는 어떤 것들이 있는지요? 또 장내 유산균이 활성화 되어야 한다고 하는데 그럼 '비오비타' 사서 한약이랑 같이 먹이면 될까요? 부모가 되어 자식이 아프니 당황스럽고 경황이 없습니다. 고진선처 부탁드립니다.

** 감사하게도 선생님과 윤승일 선생님 두 분이 도와 주셨습니다.

[선생님 답변] -----

가려우면 풍, 진물면 습, 붉어지면 열, 가려움이 심하면 풍열혈조 현상입니다.,<==가려우면서 건조하다.

#. 풍열혈조 처방

[이어성초백강잠탕-風在皮膚] 연조미후도 4돈 선학초 야교등 목적 송화 모과 저두강 백강잠 어성초 각1돈. 청열양혈거풍합니다. 쉽게 치료됩니다.

걱정마시길...아주 중요한 처방이므로 노트에 잘 적어놓으세요.ㅋㅋ

건조한 아토피에도 끝내준다.

* 목욕법 - 컨셉 : 자기 기름으로 자기 몸을 윤기 있게 만든다.

1) 아이가 더러우면 순한 어린이용 비누로 샤워로 먼저 시킨다.

2) 그 후 욕탕에 아이가 땀이 충분히 날 수 있을 정도로 온도를 맞춘 후 20~30분 정도 놀게 한다.

3)마지막에 절대로 비누를 쓰면 안된다.그냥 그 상태에서 마른 수건으로 닦고 나온다.

4) 보습제와 로션도 바르지 않는다. 매일 매일 목욕해도 괜찮다.

cf) 샤워는 아이의 몸을 더 건조하게 한다.

* 보습제 - 보습제는 바르지 않는걸 원칙으로 합니다.

피부를 열어서 발산하는데 방해가 됩니다.

원칙은 그렇다는 겁니다.

기름으로 피부를 막으면 악순환의 반복...

땀을 내서 내 기름으로 보습합니다.

아토피 종류는 아무리 심하게 뒤집어져도 치료가 되고나면 전혀 흉터가 남지 않기 때문에 전혀 염려하지 마시길..치료 후 흉터가 전혀 안 남는 것도 아토피의 특성

* 입욕제 - 태양인 어성초/ 소양인 고삼/ 소음인 애엽/ 태음인 삼백초

* 절대로 체질식 시켜야 한다. 태양인이므로 바다조개 국물(vs 민물조개는 태음인 음식)을 먹이면 좋은데 조개가 클수록 좋다. 절대로 밀가루 음식 먹이면 안 된다.

[윤승일 원장님]

www.designshealth.com

probiotic synergy caps

BASIC B complex

AllerGzyme 90 Capsules

하루 한 알을 두번 나눠서, 먹이시면 되요. 좀 더 필요하면 추가로 다른 영양제 복용해야 하고요. 일단 두 가지 먼저 복용시키세요. 장에 면역력이 문제니까요. 한약 먹이시면서요. 땀쓰

[08-09-22 사진] 정말 15일분 먹고 50% 이상 호전되었습니다. (물론 목욕법 + 윤승일 원장님

태음인열증의 여드름을 열다한소탕 가 대항 포공영 각 한돈반, 화피 부평초3돈으로 저효

여드름-20년정도. 대학때 한 번 심해지고 10년 전에 한번 심해지고 최근 1년 전부터 다시 심해짐. 이지함피부과에서 치료를 받음.

- 로아큐탄 많이 복용.항생제 복용.
 - 펄링,레이저 치료 했었음.
 - 현훈, 안충혈, 심계 안면부 상열감
 - 수면 ; 천면, 자주 깸, 수면시간 불규칙, 足熱로 잠이 깼 정도
 - 전신무기력,
 - 부종 ; 간헐적 저녁 일과 후 하지 부종
- > 열다한소탕 가 대항 포공영 1.5돈 화피 부평초 3돈, 15일 복용

좋아짐. 변비 없어짐. 1일1회. 잠도 너무 잘 잠. 피부 많이 좋아짐. 손톱만큼 나던 것이 없어짐. 열 내리면서 종기같은 여드름이 없어짐. 두통도 없어짐. 졸림이 많아짐. 피부과를 많이 다녔는데 느낌이 전혀 다름. 근본치료가 된 느낌. 참으로 오랜만에 들어보는 말이었습니다. 도대체 한약에 뭘 넣었길래 이렇게 효과가 좋은가요? 부평초 화피 3돈은 체형사상학회에서 여드름에 사용하더군요..참고했습니다.^

만성적인 소양증, 태음조위가감, 갈근조위가감, 산조인소간탕(간기울결)등으로 마무리 안 되다가 창이자폐장탕(風在皮膚)으로 완벽하게 마무리하다. .

1회째 태음조위탕 가 갈근2돈, 승마, 녹용 1돈, 대항 3푼썼구요,
2회째 대항 5푼으로 올렸구요, 3회째 대항 1돈까지 썼습니다.

1번째 약은 1주 깨끗, 1주 불편
2번째 약은 1주 깨끗, 2, 3일 불편
3번째 약은 가끔 조금 심한날도 있었으나 2번째 약과 비슷했다고 합니다.
3번째 약을 먹으면서 시험을 준비해서 스트레스와 수면부족이 있었고,
한번은 포도를 다량 먹고 좀 심하게 소양감이 생기다 내려간 적도 있었다고 합니다.
대항을 1돈까지 써도 대변은 전혀 이상이 없었습니다.

마무리가 안되서 마지막엔 갈근조위탕 가 녹용 5푼 썼습니다.

그게 작년 12월 일인데, 근래 오래간만에 오셨네요. 이 처방 쓰기 전에 갈근조위탕을 3일치 먼저 드렸는데 대변이나 기타 전혀 문제없고 오히려 좀 더 맞는 거 같다는 말씀을 했습니다. 그래서 나간 처방이지요.

그 후론 특별한 상황(돼지고기, 스트레스 등)에만 소양이 허벅지 위주로 생기는 정도입니다.

그래서 갈근조위탕 원방을 투약했는데 말 그대로 한봉 먹자마자 그날부터 소양이 심해졌답니다. 차이가 있다면 크게 부풀어 오르는 게 아니고 좁쌀처럼 작게..열감도 심하고 해서 잠을 못 잘 정도셨다네요. 그래도 약은 한 번도 안 빼고 다 드셨네요. 그렇게 2주 정도 계속 괴로우셨는데, 엿그제부터 갑자기 톱 ! 증상이 소멸했습니다. 지금은 괜찮습니다.

오늘 아침까지 약을 드셨네요. 아, 헛갈려.. -.-;;

피부 애네들 왜 이러는지 정말 알다가도 모르겠습니다.

성격이 지랄(흑..) 같게 느껴지네요. --^ 갈근조위탕을 계속 써야 할까요, 태음조위탕으로 바꿔 줘야 할까요?

안준철

이분은 한증이 분명합니다. 갈근조위탕이 들을 수도 있지만 이것은 어디까지나 열이 극심한 현증에 작용하는 것이고 근본적인 것은 태음조위탕에 청열약을 쓰는 것이 맞습니다. 의이인이 피부병약이기도 합니다. 두두러기 말고도 사마귀 등의 바이러스성 피부질환에도 사용합니다.

이후

태음조위탕 가 갈근, 승마, 대황 -> 그저 그렇다.

상동 가 오미자, 백령, 백선평 -> 아주 좋았다. 한번 살짝 가려움. 이때부터 증상이 소강국면에 접어듬

상동 가 황금 -> 좀 더 좋은 것 같다. 10흘 정도 무증상이다 소양증 약간 생기는 정도.

상동 가 선평 -> 열흘 정도 무증상이다가 소양 약간을 주기적으로 반복한지 두어달째.

이런 식으로는 마무리가 안 될 것 같아

간기울결로 보고 산조인소간탕 -> 비슷한 정도

風邪傷皮膚로 보고 창이자패장탕, 이 약 드시고 드디어 모든 증상이 사라졌습니다.

이후로는 약간 충혈된듯 올라오던 피부증상도 전혀 없다고 하네요.

패장 다리는 냄새가 워낙 구려 구린 약이라고 무시했었는데....^^;

정말 만 1년만에 심하고 고질적이던 소양증이 깨끗이 사라졌습니다.

믿고 따라와준 환자도 고맙지만 믿음을 줄 수 있는 사람으로 만들어 주신

안선생님께 큰 감사의 말씀을 드리고 싶습니다.

증상을 수반한 고혈압을 가지고 계신데 앞으로 혈압치료를 하기로 했습니다.

감사합니다.

=> 이 처방으로 고혈압까지 좋아져서 창이자패장탕 한제를 더 보내주기로 함.

태음인 여드름 가감법(안). 짓무는 여드름이면 황금을 쓰시고 건조해지는 편이면 맥문동 천문

동이 중요합니다. 덩어리가 뭉쳐지면 조각자를 써서 깨줍니다.

태음인 여드름이 거의 끝나갑니다. 갈근조위탕 등의 기본방에 백급, 백선파, 설파 등의 풍열약을 가미해서 좋은 성과를 거두다. 여드름 치료는 원래 오래 걸린다고 얘기해야.

사춘기부터 여드름이 이마와 콧등에 발생. 대학입학 후 턱까지 심해졌습니다.

어려서는 아토피가 있었으나 지금은 거의 없어졌습니다. 아랫입술만 조금 남아있고 피부도 건조합니다. 2, 3일 한번 통변하고 가스가 종종 찬답니다. 폭식을 한다네요.

아무리 먹어도 포만감을 잘 못 느낀답니다. 구건이 자주 있고 심계는 가끔 느끼며

생리가 아닌데 하혈하는 경우가 간혹 있습니다.

처방도 공모합니다~ 1방씩 처방도 날려봐 주시면 안될까요...^.^;;

김봉찬

태음인같은데요 갈근조위탕 대항 1.5 승마 황금 포공영 조각자 하면 어떨까요?08.02.15 🐼변재석

이미 청바지 광고를 하고 있는 것 같네요. 얼핏 홍명보 선수와 비슷한 느낌이 들어 두 사진을 비교해 봤는데 홍명보 선수보다 신국의 발달이 부족한 것 같습니다. 눈빛도 다르고요. 옆모습의 사진으로 볼 때 여드름이 습열성이 아닌가 싶습니다. 일단 대변을 확 통하게 하면서 습열에 대한 가미를 해야 할 듯 싶습니다.08.02.15 18:49

정용재

감사합니다. 갈근조위탕에 대항, 승마, 포공영, 천문동, 조각자 해서 처방해 보겠습니다.08.02.16 10:04

김태규

최근에 태음인 열증 여드름에 갈근조위탕 가 대항 승마 포공영 조각자 해서 처방한 예가 3케이스 정도 있었는데 모두 조건은 좋아지는데 여드름은 큰 호전이 없더라구요 ㅠㅠ.. 정원장님 써보시고 꼭 결과 알려주세요 ^^08.02.16 10:56

정용재

ㅋㅋ. 그러셨어요. 여드름이 간단하지 않음은 임상에서 많이 느끼고 있습니다. 김원장님 말씀 들으니 괜히 울금까지 넣어주고 싶네요. ^^:08.02.16 10:39

윤진수

이 분 같은 경우 청폐사간탕 가감은 어떨지요..자궁어혈(고본)도 그렇고. 구갈, 소곡선기 등 간열을 빨리 풀어 주는 쪽은 어떨지.. 열다 가 대항1돈 조각자1돈(피부,어혈), 포공영 1돈반(식울,어혈)하면서 음식 관리 시켜 보겠습니다. 08.02.17 11:57

=>갈근조위탕 가 대항, 승마, 포공영, 조각자, 천문동, 울금1 처방했습니다.

새로 돌아나는 게 줄었다고 합니다. 붉은 기도 조금 가라앉고요.

7, 8 / 10 정도 남아있는 느낌. 복약 중 아무런 위화감 없으며

대변은 더 수월해 졌다고 하네요. 그래도 1/2일.

아토피, 피부건조는 여전. 이 정도 좋아진 게 대단하다 생각되지만,
효과를 올리려면 어떻게 해야 하나 역시 고민입니다.
어혈약으로 녹각, 패장, 포황, 단삼, 호장근, 홍화 등이 눈에 보이고
(무식해서 어혈약은 일단 다 리스트에...;;)
대황 증량도 괜찮을 것 같고 수질을 써보고 싶은 유혹도 있네요.
사계의 조연을 기다립니다. ^^;

장재식

저도 아직 태음인 열증 여드름에 갈근조위탕으로 큰 차도를 본 경우가 없는 것 같습니다. 오
히려 제가 본 환자들은 열다한소탕 쪽이 조금 더 나았던 것 같구요...태음인 열증 여드름이 생
각보다 쉽지는 않은 것 같네요...08.03.14 18:08

=> 2월 15일 갈근조위탕 가 대황, 승마, 포공영, 조각자, 천문동, 울금1
3월 12일 상동 가 녹각, 백지1, 대황, 포공영, 녹용0.5
4월 25일 이때까지도 아토피나 구갈, 소곡선기 등이 조금 나으나 여드름은 거의 비슷하다고
말했습니다. 변은 계속 잘 뽏니다. 두 제를 한꺼번에 달여서 보냈습니다.

=> 열다한소탕 가 대황, 포공영, 조각자, 천문동, 울금, 오미자, 홍화 1
이어서 갈근조위탕 가 대황, 승마, 포공영, 황금, 백령1

약 끝난지 1달 정도 지났구요, 변이 또 1/2일 불쾌해 졌습니다.
느낌에 두번째 약이 (가 백령약) 더 괜찮은 것 같았다고 하네요.
오늘 보니 얼굴이 확연히 깨끗해졌습니다. 두 가지를 깨달았는데요.

첨부터 여드름은 오래 걸린다라고 말하고 치료하는 게 속 편하다는 것.
속부터 깨끗해져서 나오기 때문에 그렇다라고 얘기하면 잘 수긍합니다.

백령아 고맙다. 고심 끝에 찾은 약인데, 이 녀석이 잘 도와준 게 아닌가 생각합니다.

최근 오래된 소양증 환자에 백급, 백선평, 선평 등의 풍열약을 가미하니
확연히 개선된 경우가 있었습니다. 체질별 한열에 따른 기본방에 역시 특효 약재를 발굴해 가
미되야 고질적인 병을 움직일 수 있지 않나 생각이 되네요.

**태음인, 손바닥 손끝 갈라지면서 통증, 혈조상부처방에 보음혈하기 위해 상심자 가하고 갈라
져 출혈 있으면 단삼을 炒用**

손바닥, 손끝이 갈라지면서 나중에는 물을 대기도 힘들고 물건 잡기도 힘들다고 하십니다
血燥傷膚로 보고 二冬潤燥湯이나 沙參潤燥湯을 써볼까 하는데 어떨까요?

손부위라서 더 첨가할 약재나 더 알아줘야할 사항이 있을까요?

--> 혈조상부증이 맞는 거 같습니다. 윤기를 더해주고 보음혈을 목적으로 상심자를 가하는 것

도 좋습니다. 피부가 갈라져서 출혈이 있으면 단삼을 초해서 사용합니다.

탈모 불면 심계 불안감, 심계가 있고 잠이 안 오면 심병증에 가깝다. 태음인 탈모에는 측백엽 흑두가 가장 좋다.

태음인 열자 두드러기에는 당장 효과가 안 나는 것처럼 보여도 갈근조위탕(대황의 이담작용)

피부 알려지. 찬 곳에서 더운 곳으로 가면 가벼운 발진이 생깁니다. 손톱으로 긁으면 두드러기처럼 붉어집니다...침을 놓아도 모기 물린 것처럼 그렇더라고요...저녁이면 발바닥이 열납니다...수족에 땀이 많이 나구요...커피반응 없구요...사우나는 잘 못 들어갑니다...식후에 가스차구요...자주 체합니다...대변은 삼사일에 한번 뽀니다...갈근조위탕을 이틀 줬는데, 속도 불편하고 컨디션 안 좋아졌습니다...부종이 있구요...가스차고, 오심 어지럼증 심계 증상도 가지고 있습니다...그나마 잠은 잘 잡니다...^^

--> 외모로는 태음인 열자가 맞는 거 같습니다. 갈근조위탕을 계속 써보시기 바랍니다. 이 경우 소양인이라면 자초한련초탕을 씁니다. 갈근조위탕도 두드러기나 가렴증에 잘 듣습니다. 대황의 이담작용 때문에 빌리루빈 수치를 내려서 가려움증 등의 피부질환에 듣습니다.

소음인 가려움증에는 이담작용있는 인진과 피부가렴증의 요약인 지각을 활용한다. 술 마셔서 심해지면 습, 인진 익모초가 좋다.

곽향정기산으로 해주시켰는데, 별 무효전입니다...저녁에 심해지고, 술을 마시면 저녁에 심해진다고 합니다...어떻게 접근해야할까요?

--> 이담작용이 있는 인진과 피부가렴증의 요약인 지각을 잘 응용해 보시기 바랍니다. 술을 마시면 더 심해지면 습입니다. 소음인의 습에는 인진 익모초가 가장 중요합니다.

태음인 소양증은 대황 들어간 갈근조위탕으로

먼저 한열을 가리고 가려움의 원인을 파악합니다. 땀을 빼면 괜찮다면 표증 가능성이 많습니다. 나머지의 경우는 대황 등을 사용해서 이담시켜서 치료합니다. 빌리루빈 수치 등과도 관련됩니다. 작년에 햇빛을 많이 쬔 후 두드러기가 나기 시작했는데, 음식을 좀 잘 못 먹거나 술을 드시면 좀 더 심해집니다... 이담 시켜 치료해보도록 하겠습니다....

소음인피부 따끔거림. 풍열증 인진지각탕으로 무효면 곽향정기산으로 해기해본다.

소음인 피부가 따끔거린다고 함. 더운데 들어가거나 운동을 하면 몸이 따끔거리는데 땀을 내면 개안아진다. 풍열증 인진지각탕으로 무효--> 해기시키는 곽향정기산이 좋아보입니다.

태음인 열증 33세 직장여성의 여드름, 만성피로. 간기울결에 쓰이는 갈근소간탕이나 산조인소간탕에 간열을 끄는 감국1돈...청열해독하는 포공영1-2돈 결절이나 낭종을 깨는 하고초를 2돈 가하는 방향으로.

소증 : 변비 1회/1.5일 한번 변 볼 때 10분이상 걸리기도 한다. 커피불면감은 잘 모르겠음.
예전에 안준철원장님께 진료받고 태음인열증 간혈허처방 1제 복용했습니다.
피부증상은 가려운 것두 있구 아프고 터지면 고름처럼 나오는 큰 여드름도 있고,, 조그만 여드름은 고체 덩어리로 딱딱하다. 전체적으로 붉게 띄어나온다.
갈근승기탕으로 먼저 대변을 소통시킨 후 갈근조위탕이나 기타 피부처방으로 접근하는 것이 좋을지, 바로 갈근조위탕 가 승마 대항 청호 울금 패장 포공영 조각자 등을 가미하는 것이 좋을런지요. 새로 쓴 사상의학에서는 갈근질려탕과 창이자패장탕도 있구요.
처방 및 가감등에 대해 선생님들의 조언 부탁드립니다

--> 간기울결에 쓰이는 갈근소간탕이나 산조인소간탕에 간열을 끄는 감국1돈...청열해독하는 포공영1-2돈 결절이나 낭종을 깨는 하고초를 2돈 가하면 좋겠습니다.

26세 여성의 수장각화증. 수장각화증은 생수요법과 음식지도가 매우 중요하다.

대변-변비 2~3일에 한번

태음인- 갈근승기탕 2틀 복용 속이 울렁거림 어지러움 발생 변비개선 없음

소양인- 지황백호탕 별무 반응 대변 전과 동일 다른 불편감 없음 이후 생지황윤조탕 1제 복용- 증상의 현저한 개선없이 치료전과 동일, 악화는 없음

태양인- 생지황윤조탕 복용후 대변이 여전히 3~4일에 한번 보셔서 석옥승기탕 3일 투여 수장각화증 악화

소음인- 석옥승기탕이후 파두 1알 복용후 팔물군자탕 2틀복용 3일동안 대변매일봄 백작약양간탕(팔물이 떨어진관계로) 투여, 변은 그나마 제일양호하나 수장각화증 약간 악화

다음 방향을 잡질 못하고 있습니다. 체질 감별 부탁드립니다.

변비를 먼저 잡고자 대항량을 조금씩 증량하면서 갈근조위탕 드시고 사삼윤조탕 드시고 대변 때문에 다시 사삼양비탕 드시고 현재 여정실양액탕 드시고 나서 정심보음탕 복용중이십니다. 대변은 대항을 넣은 탕제 드실 땐 매일 보셨습니다. 여정실양액탕 과 정심보음탕 최근탕제는 일부러 대항을 넣지 않았습시다. 다시 2틀에 한번 보십니다. 유산균제제도 드시고 있습니다. 탕제 드실때 타 체질 반응은 없으셨고 현훈 생리통 요통은 초기 치료시에 다 없어지셨습니다. 만 7개월 넘게 치료중이신 분이십니다. 낮을수 있다면 꼭 낮게 해드리고 싶습니다. 손 발바닥이 갈라지셔서 매우 힘들어하십니다. 사회생활도 잘 못하시고요 다른 부위 피부도 매우 거친편이십니다. 수장각화증 환자들 중 돌 이후부터 어릴 때부터 증상이 있으신 분들은 다른 사람과 악수를 제대로 해보는 것이 소원이라고 말할 정도로 평생 손발이 갈라져서 고생하십니다. 양한방 다 치료해보신분 들이 대부분이시고요. 현재 이분도 아주 조금 좋아지시고 큰 호전반응 없으십니다. 낮을수 없는 질환일까요?

(정용재)

저도 중딩 남아 아무런 증상 없이 수장각화증만 있었는데, 서너달 약 먹어도 효과 없어 그만 오라고 했습니다. 이번에 류쌤에게 생수법을 배웠습니다.

1. 반드시 생수(개인적으로 삼다수 추천합니다.)- 끓인물, 첨가물 안 됨.
2. 공복에 복용 -기상직후 500cc, 아침 먹고 3시간후 500cc, 점심먹고 3시간후 500cc.

저녁은 수면방해 오므로 안함.

3. 기타 먹고 싶을 때 먹는다. 이렇게 하면 거의 하루에 삼다수 한 통 다 먹습니다.(1.8리터) 모든 건조증에 쓸 수 있습니다. 단, 비기거나 담음이 심한 환자는 치료 후 사용하는 게 좋습니다. 배워와서 집사람에게 알려줬더니 한 3일 먹고는 발 뒤 짹 짹 갈라지는 증상(디디면 아플 정도)이 눈에 띄게 좋아졌습니다. 그리고 희한하게 그 많은 물이 먹을수록 더 먹힌다네요. 지금 옛날 중딩 왔으면 알려줬을 텐데, 아쉽네요. 한약 먹으면서 같이 한 번 실행해 보세요

(안준철) 체질은 태음인으로 보여집니다. 장기간의 음식지도가 필요해 보입니다. 그리고 정용재 원장님 말씀대로 물이 모자라는 경우도 있다고 알고 있습니다. 반듯이 공복에 생수를 충분히 복용하면 위를 통과해서 15분 내에 소장에도달해서 뇌 간 피부 등으로 수분이 공급됩니다. 매우 중요한 방법이라고 생각합니다. 보리차 결명자차 등은 약간의 탄수화물이 있어서 위나 장에서 흡수하려는 작용 때문에 위장관내에서의 통과가 느려집니다. 그래서 공복에 충분한 양의 물을 마십니다.(반듯이 생수)

소양인소양증. 두드러기처럼 올라오는 것이 없는 가려움증은 간담의 문제이므로 치자온담탕에 이담하는 대계를 가해 쓴다. 가렴증이 있을 때 항상 소화장애나 오심 급체 등이 동반되면 풍열이 아니다. 반드시 식적을 내리고 이담하는 약물을 쓴다. 치자 백화사설초 대계(소계 포함) 고삼 등 이담작용이 강한 소양인이 약물을 기억할 것.

소양인 한증 환자입니다. 올 겨울 들어서 피부가 많이 가렵다고 하십니다

겉으로 두드러기처럼 올라오는 것은 없고 여기저기 가려우셔서 막 긁다보면 별절게 붉은 자국이 올라온다고 하십니다. 이불 속에 들어가면 더 가렵다고 하셔서 풍열로 보고 자초한련초탕을 썼는데 1주일 드신 지금 전혀 차도가 없다고 하십니다

방금 전화가 와서 잘 안 듣는다고 하시면서 싸우나를 일주일에 두 번 정도 가시는데 그게 문제가 될까요? 라고 이제서야 말씀을 하시는데요. 일단 싸우나는 가지 마시라고 했습니다

(답)

자초한련초탕은 주로 피부로 풍열을 발산하는 약물로 구성되어 있습니다. 두드러기처럼 올라오는 가렴증이 아니라면 간담의 문제이므로 치자온담탕에 이담하는 대계를 가해서 쓰시면 됩니다. 풍열약으로 해결되지 않는 가렴증은 대부분 이담작용이 있는 약물로 잘 해결됩니다. 이담이 되면 빌리루빈 수치 등이 내려갑니다. 즉 간 해독기능도 좋아지고 결국 피가 맑아져서 가렴증이 좋아집니다. 만약 술을 잘 먹는 사람이면 습열을 제거하고 이담하는 백화사설초를 가하는 것이 적절해 보입니다. 고삼은 건조한 피부에는 잘 쓰지않습니다.(고삼은 조습청열합니다.)

태음인의 가렴증에 어떠한 풍열약이나 발산약 보다는 갈근조위탕이 우수한 반응을 보였습니다. 대황의 이담작용이 간담에 작용해서...막말로하면 간담을 청소해서 가렴이 없어지게 됩니다

다.(빌리루빈) 즉 간내에서 지용성 물질 대사를 도와서 가렵의 원인을 배설한다고 생각하면 됩니다. 황달의 경우도 마찬가지였습니다. 한열을 불문하고 대항을 쓰면 황달과 가렵이 없어지게 됩니다. 이 경우도 역시 대항의 이담작용이 가장 큰 역할을 합니다. 크게 보면 대항을 쓰는 경우는 下法에 속합니다. 즉 피부로 풍열을 빼는 것보다 대항으로 사하시키는 것이 더 효율적이라는 말이 됩니다. 풍열약이 잘 안 듣고 간담약으로 해결되는 피부병이 더 많은 것 같습니다. 요즘은 나쁜 음식(인스턴트,인공조미료,보존료,튀김음식 체질에 안맞는 음식 등)이 가장 큰 원인이라서 풍열을 발산하는 경우보다 간담이나 위 등을 다스려야할 경우가 더 많습니다. 즉 음식이 원인이 되는지 아닌지를 생각해 보는 것이 변증의 핵심이 되겠습니다. 가렵증이 있을 때 항상 소화장애나 오심 급제 등이 동반되면 풍열이 절대 아닙니다. 이때는 반드시 식적을 내리고 이담하는 약물을 씁니다. 상기의 경우와 같습니다. 이번 기회에 치자 백화사설초 대계(소계 포함) 고삼은 소양인의 이담작용이 강한 약물이란걸 꼭 기억했으면 좋겠습니다.

이렇게 상세하게 알려주시다니 정말 감사합니다^^ 그런데 한자에도 치자온담탕이 적용이 될 수 있을까요?

안준철 치자온담탕을 포함한 온담탕은 소증의 한열을 불문하고 씁니다. 즉 현증이 열이라서 소증이 한증이라도 아무런 문제가 되지 않습니다. 물론 병증이 다 해결되고 난후에도 계속 복용하면 설사가 좀 나겠지요. 설사가 나면 치료가 다 됐다는 sign입니다.

소양인 두드러기, 추우면 심해진다. 가려운 두드러기는 풍열이고 추울 때 심해지면 풍한의 가능성이 많다.

주소 만성 두드러기, 가렵지도 않고 나기만한다. 상지내측 따라 손목까지. 허벅지내측. 추우면 더 그렇다. 요즘 잠 못 자면 더 올라오고, 스트레스 받으면 더 붉게 올라옴. 몇 년 되었음. 두드러기가 색깔 연하고 가렵지도 않고 해서 소양인 한증 기혈양허하고 양허 중에 고민하다가 복신보심탕 가 구기자 중용 숙지황 썼는데요 별 차도가 없네요. 식욕 대소변 수면도 별 차이가 없고 잠은 조금 잘 자는듯 하다고 합니다. 본인은 수면이 부족해서 그런거 같다고 하는데요...체질은 맞는 거 같고, 한열도 맞는 거 같은데...양허처방인 토사자보양탕으로 써야 할까요? 고견 부탁드립니다.

(안)

가려운 두드러기는 일단 풍열 가능성이 많고, 추우면 더 심해지면 풍한 가능성이 더 많습니다. 일반적으로 기허나 양허의 문제보다 풍열이나 풍한으로 접근하는 게 더 맞을 거 같습니다.

--> 풍한쪽을 간과했네요 감사합니다. 풍한쪽으로 처방하겠습니다.

태음인 역류성식도염 및 피부소양증, 겨울되면 가려움증. 접촉성 피부염. 가려움증.

피부가려움증은 보혈약을 쓰더라도 거풍하는 약이 가해져야 한다. 만약 보혈약으로 해결될 가려움증이라면 빈혈이 있고 혈색이 창백할 것. 대체로 피부가려움증은 간해독과 관련되고 이담작용이 있는 약을 써야 되는 경우가 많다. 갈근조위탕 원방.

예민한듯 해서 유근피화위탕에 패모 황금 가해서 썼습니다. (간기범위 변증이 한자 열자 공통이라고 책에 나오던데, 열증 처방은 없는 듯? 해서 이거 썼습니다.)

위산 올라오는 증상은 덜하고요, 근데 대변이 평소보다 더 물러지거나 굳어지지는 않는데 좀 더 보기가 힘들다고 합니다. 그리고 원래 겨울 되면 가려움증이 있었는데, 요새 건조해서저서 그런지 가려움증이 더 심하다고 합니다. 밤에 더 심하고요.

1. 간기범위 처방(갈근화위탕 유근피화위탕)은 다 한자 처방인가요? 한열 다 올 수 있는 거면 열자 처방도 있을듯한데, 여쭙어봅니다.

2. 이 환자의 경우 가려움증이 밤에 심하면 혈허로 봐서 다른 쪽 처방으로 써야 될지, 아님 그냥 저 처방에 보혈약 만 좀 가미해서 쓰는 게 좋을지 궁금합니다.

(안준철)

1. 간기범위증은 한자에게 쓰도록 만들어진 처방이나...간기울결이나 간기범위는 열이 생기는 특성이 있습니다. 그래서 찬 약이 많이 들어가고 원래는 한자의 처방이나 열자에게도 응용이 가능합니다. 이때는 간화상염에 쓰는 찬 약을 가해서 쓰는 경우가 많습니다.

2. 피부가림증은 보혈약을 쓰더라도 거풍하는 약이 가해져야 될 거 같습니다. 만약 보혈약으로 해결될 가림증이라면 빈혈이 있고 혈색이 창백할 것입니다. 대체로 피부가림증은 간해독과 관련되고 이담작용이 있는 약을 써야 되는 경우가 많습니다. 이담에는 대황이 최곱니다. 갈근 조위탕 원방으로도 얼마든지 좋아지겠습니다.

태음인 여드름. 장기관리 필요, 외부관리도 필요하다. 검게 덩어리 잡히는 여드름은 조각자로 깨고 포공영으로 청열해독합니다.

주소증 : 안면 여드름(많이 빨갛지는 않고 아프지도 않고 덩어리만 잡히는데 짜지지 않음)

태음인으로 보고 변증거리를 찾아 물어봐도 발견되지가 않는데 여드름 생길 때쯤 스트레스를 조금 받았다고 하길래 간병으로 보았습니다. 태음인이면 열증인데 간병으로는 간기울결 밖에 없어서 일단 갈근소간탕 가 감국 포공영 승마 패모 삼백초 해서 주었습니다

한제 복용 후 짜지지 않고 덩어리 잡혀있던 것이 짜지는 모양으로 바뀌고 조금 줄어들었습니다. 2번째 약도 같이 썼는데 복용후 4-5일뒤부터(일이 조금 많아지긴 했음) 심해지고 새로운 것들이 자꾸 생긴다고 합니다. 대소변 소화 컨디션 등의 변화는 원래도 나쁜 것이 없었고 복용 후에도 괜찮다고 합니다. 체질의 문제일까요? 변증의 문제일까요? 아니면 그냥 일이 많아져서 그런 걸까요?

답)

일단 뭐 음식체크는 해보셨을 테고, 3교대하는 직업이면 근무조가 야간이나 심야로 바뀌면 더 심해지는 것이 당연한 것 아닐지요..^^..그리고 여드름은 외부적으로 관리해줘야지 빨리 좋아짐을 느낍니다. 피부 질환은 뭐 양방애들도 기본적으로 빨라도 6개월 정도 보니까 천천히 여유를 가지고 치료하셔도 될 것 같습니다.&...여자들 생리 배란 때 되면 멀쩡하다가도 심해지고 하니 걱정마시구요...^^검게 덩어리 잡히는 여드름은 조각자로 깨고 포공영으로 청열해독

합니다.

태음인 구순헤르페스. 화음증후군의 갈근해독탕

갈근조위탕가 승마 4그램으로 무효

(안) 갈근조위탕을 써서 설사가 심하지 않고 복통도 없었으면 태음인 열증이 확실합니다. 갈근조위탕이 효과가 없는 것은 위장이나 간의 문제가 아니라고 봐야겠습니다. 화열이 상염해서 물질이 잡히고 가렵다고 봐서 화음증후군에 쓰이는 갈근해독탕이 적합해 보입니다.

태음인 두드러기 붓고 수포가 생기는 경우는 삼백초 목통 의이인 등을 써서 리수해야 신속히 호전됩니다.

태음인 두드러기. 배 아프면서 나는 두드러기는 장위습열증. 이담작용을 고려.

배가 아프면서 두드러기가 나는 경우는 장위습열증에 해당합니다. 배 아프면서 두드러기 나는 경우는 양방에서는 담즙배설이 안되고 빌리루빈 수치와 관련이 있다고 알려져 있습니다. 역시 이담작용이 있는 약을 씁니다.

--> 예 감사합니다. 두드러기 날 때 배 아픈 거는 잘 모르겠습니다. 다시 확인해보겠습니다. 그리고 혹시 한증일 가능성은 없는지요? 밥 양이 줄면 며칠 대변을 안 본 적도 있하는데, 밥을 좀 먹으면 매일 본다고 하고, 감기가 자주 걸린다고 해서요

--> 류샘 처방으로는 한증약에 가미해도 됩니다. 류샘은 어린이는 한증으로 더 많이 보는 경향이 있습니다. 사람은 누구나 물속(양수)에서 태어나고 음기가 성합니다. 노화는 음혈이 소모되어가는 과정이라고 보고 있습니다. 그래서 어린이는 결단코 음허가 없다고 말합니다. 좀 미묘한 문제입니다.

태음인 얼굴의 심한 여드름. 변증시 고려해야할 중요한 요소들-증상의 여러 정황들

갈근조위탕 + 포공영 1.5, 승마 1, 황금 0.5, 대황 0.5 해서 처방했습니다.

먹고는 대변이 하루 한번으로 좋아지고, 소화도 잘 되는 편, 잠도 편하게 주무신다는데...

피부는 날이 갈수록 안 좋아지네요... 좀 더 건조해지고 별걸게 올라오다가 내려오다가를 반복하신다고 합니다.

갈근조위탕 + 포공영 1.5, 황금 1, 천문동 1, 대황 0.5 할까 생각중에 있습니다.

어떻다면 좋을까요? 감사합니다!

(답)

이 게시판 134번 게시물에 제가 올린 케이스가 있는데요, (이분처럼 심한 경우는 아니었지만 갈조먹고 피부 심해진 경우라서) 거기 선생님 답글도 참고 하시고요... 제 경우엔 간음허간양상항 처방 백자양간탕가미방(황금은뺐습니다) 먹고 얼굴에 나던 게 진정되고 피부도 좋아졌습

니다(참고로 상자양간탕엔 반응이 없었습니다).

(134게시판의 안선생의 글)

변증은 증상만으로 하는 것은 아닙니다. 정황으로 때려잡는 경우가 더 많습니다. 예를 들어 노인이 허리가 잘 아프면 일단 신허를 생각합니다. 젊은 여자가 장기간 스트레스에 노출되어 피부가 안 좋아졌으면 간병을 생각합니다. 생리량이 현저히 줄거나 빈혈을 동반하면 심간혈증이 됩니다. 혈허증이 없으면 간음허증의 가능성이 가장 높습니다. 간음허가 장기간 계속된 후 상부로 열이 뜨게 되면 간양상향증입니다.

염색약을 쓰신 뒤로 귀, 손, 목 등등에 심한 가려움과 발진을 호소. 가렴증이 심하면 風邪다. 갈근질려탕 혹은 창이자패장탕

태음인 한증으로 보입니다.

이런 경우 태음조위탕에 갈근 2 승마 1 대황 0.5 백선피 선태(풍으로 봐서) 각 1]

이 정도로 가미하면 될까요? 아니면 옷 알레르기는 다른 관점으로 접근해야할까요?

(안)

가렴증이 심하면 풍사입니다. 태음인의 풍사상피부(피부소양, 홍진돌기)에 쓰이는 갈근질여탕이나 창이자패장탕을 응용하면 되겠습니다.

피부변증의 원칙들- 가려운 증상이 확실하고 가려움이 주소증이라야 풍사로 볼 수 있다. 붉은색이 많으면 열. 진물이 많으면 습. 음식과 관련되면 장위습열증.

전에 갈근조위탕도 잘 드셨고요. 두드러기(알러지성 피부)로 몸에 좁쌀만 하게 올라오는 상태에서 '풍사상피부'의 "갈근질려탕" 처방하여 2일 복용 후 오셨는데 아래 사진과 같이 전신에 홍반이 발하였네요. 약 드시면서 불편한 느낌은 전혀 없었고요. 이거 어떻게 보아야 될지 의견 여쭙습니다.

(답)

태음인은 확실해 보입니다. 가려운 증상이 확실하고 가려움이 주소증이라야 풍사로 볼 수 있습니다. 붉은색이 많으면 열입니다. 진물이 많으면 습으로 치료합니다. 음식과 관련되면 장위습열증으로 잘 치료됩니다.

--> 소화기는 전혀 이상 없습니다. 음식으로 인한 느낌은 없다고 하고요. 일하는 곳이 화학약을 취급하는 곳입니다. 우선 약으로 심해 졌으니 장위습열증(비위습열?)도 타당할 것 같습니다.

태음인 여드름에 대한 접근. 풍사상피부는 화농이나 결절 낭종 등과 관계없이 가려움이 주소증이 되는 경우. 스트레스를 받으면 심해지는 경우는 간기울결. 비위가 문제가 되면 비위의 약에 습담을 제거하는 약을 가함.(승마 대황 청호등)

대변-매일. 너무 자주봄.하루 2-3회.기분은 좋게 봄.

한 달에 2회 정도 음식과 상관없이 설사를 함.

커피반응-잠을 못자본 적은 없음.커피와 상관없이 원래 잠을 잘 못잠.

[1] 태음인 한증으로 생각되어 조위승청탕 가 갈근 2돈 승마 1돈 포공영 황금 1돈

=> 복용후 생리통은 호전되고 여드름은 별무호전.

자세히 물어보니..커피를 진하게 먹으면 밤에 잘 못잔다고...그래도 대변을 너무 자주보는 것 같아서

[2] 열다한소탕 가 대황 5푼, 포공영 1돈, 부평초 화피 3돈

=> 복용후 대변이 시원하지 못하고 대변이 오히려 하루 1회로 줄어들었는데 기분이 안 좋다고 함. 여드름은 더 심해짐.

대황을 너무 줄여쓴 것이 문제인 것 같습니다.

갈근조위탕에 대황을 1돈반 넣고 승마, 포공영, 황금, 백령 을 한 돈씩 가할까 합니다.

패장초, 백질려, 백선파 등을 더 가하면 좋을까요?

여드름 처방을 쓸 때 풍음증후 중 풍사상피부에 있는 약물을 얼마나 가미하는 것이 좋을지 감을 잡기가 좀 어렵습니다. 고견을 부탁드립니다.

안준철

풍사상피부는 화농이나 결절 낭종 등과 관계없이 가려움이 주소증이 되는 경우입니다. 스트레스를 받으면 심해지는 경우는 간기울결로 다스립니다. 비위가 문제가 되면 비위의 약에 습담을 제거하는 약을 가합니다.(승마 대황 청호등)

탈모는 신정부족. 상황보음탕가 산약초 녹각교

탈모는 신정부족과 관계됩니다. 태음인열증 신정부족에 쓰는 상황보음탕에 산약초 녹각교를 써보시는 것이 좋겠습니다.

한냉두드러기는 5사변증에서 風에 상한 것. 자초한련초탕

소양인이면 5사변증에서 풍에 상해서 가렵고 붓게 됩니다. 차초한련초탕이 좋겠습니다.

텔런트 아가씨 피부 두드러기 소양인한증에 독활지황탕가 차전자 고삼 황련 치자로 효과를 보다(식적해결로 두드러기 치료?).

독활지황탕 가 차전자 고삼 등으로 14일 만에 해결되었었습니다

드라마틱했었습니다 첫 7주일은 별로였다고 했는데 두번째 복용하니 확실히 없어졌고 지금까지 아무 문제 없었습니다 감사합니다.

또 다른 소양인 피부 두드러기 똑같은 처방-항히스타민제와 함께 병행하다 계속 한약이 더욱

가렵다고 호소 몇 차례 했었고 상당히 지속적으로 복용하는 게 힘들었는데 결국은 잘 해결 되었었습니다. 정신적으로 원래 문제 있었던 환자 지금도 문제 있고요
몇 달후에 다시 왔는데 다시 두드러기 조금씩 생겨서 부득이 같은 처방했는데
입술이 떨리고 손발 땀이 나고 마치 마황을 복용한 사람처럼 얘기하네요 아무리 봐도 독활인
데요. 카페인 마시면 똑같은 증상이 생긴다고 하시고요. 한약보단 스트레스나 다른 음식에서
왔다고 전 생각하는데요

혹시 고견있으시면 가르쳐주세요

아무튼 소양인 두드러기는 독활에 차전자 고삼 황련 치자 방이 신표한 거 같습니다
감사합니다

안준철

차전자가 비염에도 중요합니다. 비강내 점막의 흥분이 줄어듭니다. 비염에 차전자 전초를 차
로 상복하고 치료된 예도 있습니다. 차전자가 혈관이나 점막의 흥분을 안정시켜 준다고 생각
하면 됩니다. 천연의 항히스타민제 같은 역할을 한다고 생각하시면 됩니다. 그래서 혈관의 흥
분은 두드러기로 나타나고 비강내 점막의 흥분은 비염으로 나타나게 됩니다. 약은 똑같이 차
전자를 씹습니다.

고삼은 청열 燥濕합니다. 조습한다는 사실이 중요합니다. 그리고 이담작용이 있어서 황달에도
쓰입니다. 즉 간담습열에 대표적인 약미가 됩니다. 간이 청소되고 습열이 빠져서 두드러기에
효과가 있다고 생각하면 됩니다.

두드러기에 연교를 쓸수도 있습니다. 육울탕에서 열을 날리는 효과가 있습니다. 연교는 심 소
장관계에서 열을 제거합니다. 스트레스와 관련이 많은 약입니다.

이환자의 문제는 한약이 아닙니다. 오히려 입술 떨리고 손발 땀나고 하는 증상이 좋아집니

하만종08.06.04. 13:14

그분 팬인데 다행입니다~ㅎㅎ 소양인두드러기는 '식적'이며, 따라서 독지에 가감해야한다는 사
실 역시 중요한 것 같습니다. 소양인 두드러기에 독지원방만 써서 '1달'복용시 70~80%는 그
걸로 치료 끝이라는 동료한의사 말을 들은 적이 있습니다. 최대 세 달까지 끌고 가서 치료한
경우도 있었다고 하네요. 역시 독지만 줄창 췌다고 하네요^.^;

**소양인 봉독 알러지환자. 양독백호탕이 간해독에 문제가 되니 황련이 가장 좋다. 결명자 구기
자도 좋음**

저희 한의원에서 견비통으로 봉독치료(3회)시술후에 피부 알러지 반응이 난 52세 여환입니
다..^.^::: 환자가 문진에서 걸리는 것이 없고, 초기 반응이 미약하여, 안심하고 증량하던 중

1. 10일전 처음엔 허리와 둔부에 알러지 반응이 나, 봉독치료를 중단하고, 피부과치료를 권한
후
2. 피부과 치료를 매일 받았지만, 팔과 다리 사지까지 얼굴을 제외하고 거의 모든 부위에 피

부알러지가 퍼졌습니다...;; 평소 마른기침을 하신다 하여, 중간중간 기침하시는 것을 간과하여 생긴 결과로 생각합니다...^.^;

현재 혈압약 복용중이고, 갱년기 증상(면열)이 다소 있습니다.

피부증상은 요둔부가 제일 심하며, 풍열증(가렵고, 빨갛고)에다 밤에도 안정되지 않는(음혈허로 보입니다) 것을 겸하고 계십니다. 제가 보기엔 봉독반응상 소양인이 가장 의심됩니다. 최근 피부과 약을 먹으면서 다소 변비가 되시는 느낌이 있다 하셔서, 양독백호탕을 주방으로 하고, 마른기침을 계속 하시니 과루인 정도만 가해서 써볼까 합니다. 의견 여쭙습니다^.^;

안준철08.05.26. 12:38

소양인 한증으로 보여집니다. 급증에 양독백호탕을 쓸 수 있습니다만 간의 해독기능이 문제가 됩니다. 황련이 가장 잘 듣는 입니다. 구기자 결명자를 장복해도 됩니다.

--> 감사합니다. 선생님. 소양인 한증으로 치료해 보겠습니다. 양독백호탕이 그러면,류샘처방 중 자초한련초탕(541p) 등에 황련, 구기자를 가감하여 한번 써보겠습니다(어짜피 그냥 약 해드리기로 했으니...;;) 결과 좋으면 또 글올리겠습니다.

자초한련초탕가감을 보니, 결국 패독산에서 차전자와 지골피가 빠지는 것이랑 크게 다르지 않군요.. 패독산 가 황련, 금은화, 우방자, 인동, 연교, 자초해서 써보겠습니다.

태음인 열증 피로 소화불량 아토피

21세, 여, 대학생, 이xx입니다. 한의원에 피로및 소화불량과 아토피로 내원하였습니다.(아토피는 고등학생때 심하다가 현재는 얼굴에 보이는 정도와 손목정도에 남아있습니다.)

최근 피로감이 심합니다. 아토피에 음식관련성은 적었다고 합니다. 고등학생때 아토피때문에 한약먹고, 얼굴전체로 엄청 심해져서, 숨쉬는 것도 불편한 적이 있었다 합니다.

태음인 열증으로 생각하고, <갈조원방에 황금1돈, 포공영1돈, 녹용3푼>을 40첩 60봉 처방할까 합니다.(불으니, 청열하는 황금을 가하되, 한증약인 녹용은 5푼을 넣기가 조심스럽습니다..) 어떻게 생각하시는지요?

안준철08.04.21. 10:47

후세방 승마갈근탕이 면부 발적에 쓰입니다. 양명경 열을 제거하는 승마를 꼭 써야됩니다. 면열에 승마 아주 중요합니다. 갱년기에도 승마 관절염에도 승마 두드러기에도 승마

태양인 두드러기에는 백강잠을 써서 피부를 열어줘야 겠습니다. 그리고 여성초가 중요합니다. 2돈이 적당합니다.08.05.14 14:47

■ 각종 통증관련, 사지관련질환

1. 제반통증

허리 다리 무릎 아픈 소양인의 필수약(강활은 지통거습하고 지골피 보간신한다)

소양인들 허리 다리 무릎이 아프다고 할 때는 강활 + 지골피 cap짱!! 반드시 써야 낫는다!!

강활은 祛濕止痛하고, 지골피는 補肝腎한다. 一瀉一補.

보통 6~8g 정도를 사용한다.

지골피는 사상의학적으로 볼 때 소양인 최고의 補肝腎약이다. 祛濕작용은 없다.

cf. 소양인 하지 질환 (저림 통증 관절염 등) - '홍모오가피' 도 응용할 수 있습니다.

지골피는 강력한 혈당강화 작용도 있습니다. 무릎 장단지의 통증에는 최고입니다.(노인들 퇴행성 관절염 등으로 계단보행시에 통증을 느끼는 경우 등)

진교가 이담작용이 있고 풍한습비질환에 많이 쓰입니다(관절질환치료). 그리고 술로 인한 황달을 치료한다고 동의보감에 나옵니다(주황,황달을 해독) 그리고 대소변을 잘 통해줍니다.

이것이 뭐겠습니까 카~ 간해독이 되면 관절이 보호되는 기전과 연결되는 순간입니다. 윤승일 원장님이 말씀하신 황이 해독에 관여하고 황이 부족하면 슬연골의 황을 끌어다 해독하게되고 그러면 슬연골은 망가지게 됩니다. 이때 진교가 이담해서 간해독을 하고 슬연골을 보호하게 되는 기전이 성립됩니다. 요즘 황성분이 있는 녹각교 아교 규판교 별갑교 등도 관절염에 주목되는 약물이지만 진교는 아는 사람만 아는 풍한습 관절질환에 핵심이 되는 약입니다.중요

(계속 안선생님 말씀) 최신 입수된 최고급 정보입니다.ㅋ 류샘도 진교를 자식처럼 아껴 쓰신답니다.ㅎㅎ윤원장님께 한 수 안배웠으면 기전을 제대로 몰를뻔 했습니다. 감사합니다. 통마늘 진액도 마늘속 황을 이용한 해독 식품입니다. 현대의학적 해석이 여러가지 문제를 이해할 수 있게 합니다. 의성 허준이나 동무 이제마가 지금 내려온다 해도 현대의학적 해석에 귀 기울릴 것입니다. 약물을 이용한 실험도 더 많이 할 것입니다.

(이어서) 이담작용이 있는 약물이 왜 중요한지 다시 한번 느끼는 순간입니다. 모든 수용성 물질은 신장을 통해 소변으로 배설되고...모든 지용성 물질은 담즙의 형태로 대변으로 배설됩니다. 이때 생야채가 담즙을 흡착해서 대변으로 나가게 됨으로 소장에서의 콜레스테롤 재흡수를 방지할 수 있습니다. 하여튼 이담작용은 간에 작용해서 선천과 후천을 다 회복시켜줍니다.(간신동원이라서 선천이고 간은 소화기이기도 합니다.) 간이 우리 몸의 화학공장이라는 말이 생 각됩니다. 하여튼 이담작용이 있는 약물이 중요합니다. 쓰임새가 넓고 고지혈증 당뇨 고혈압 등 대사성 질환과도 밀접한 관계가 있습니다. 간보호 관절보호로도 연결이 되는군요.

(이어서) 용담과 식물입니다. 초롱담만큼 강한 작용은 아니지만 간담습열에 쓰이는 초롱담 비(이어서) 간 대장 상통이라는 말이 요즘은 마음에 와 닿습니다. 담즙이 나와야 대변이 원활하고..또 대변이 원활해야 간담의 疎泄작용이 제대로 되는 거 아니겠습니까? 이담작용이 간의

소설작용과 같지는 않지만 상당부분 일치합니다. 흑마늘로 간이 해독되고 이어서 대장은 저절로 좋아질 수 있다고 생각합니다. 태음인의 경우 소고기도 이담작용이 있습니다.(특히 한증) 태음인이 소고기 많이 먹으면 콜레스테롤이 바로 떨어집니다. 이담작용 때문입니다. 태음인의 경우 고지혈증에 소고기 안 먹으면 제대로 고치기 어렵습니다. 소고기==>태음인의 이담제.(특히 한증, 열증은 효과가 느립니다. 소고기는 태음인 한증약이기 때문입니다.)

과거에 생긴 어혈이 치료중 올라오는 신기한 현상

예전에 다른 원장님부터 그런 일이 있다는 경험담은 들은 적이 있는데,
막장 직접 경험해보니 신기해서 올려봅니다.^^;
꾸준히 침맞으러 오는 할머니인데, 수일전에 갑자기 왼쪽 무릎이 붓고 열이 난다고 왔습니다.
아무런 이유도 없이 말 그대로 갑자기 그렇다네요.
염증이 좀 생긴걸로 보고 침 치료후 여정자진교탕을 2일치 처방했습니다.
주말을 보내고 오늘 오셨는데 붓고 열나는 건 거의 다 없어졌다고 합니다.
그런데 오늘 무릎을 보니 멍이 들어있더라네요. 그러면서 하시는 말씀이
수개월전에 여러 차례 무릎을 부딪힌 일이 있었는데 그때 아무 문제도 없이 넘어갔다.
그런데 그 후 가끔 무릎이 탁자에 살짝이라도 부딪히면 무릎이 송곳으로 찌르듯이 통증이 오
더라고 하시네요. 세상에 오늘 멍든데를 보니 그때 부딪힌 자리라고 합니다.
속으로 숨어있는 어혈을 잘 해결해주지 못하면
이렇게 갑작스런 관절염 증상이 오는구나 생각을 해봤습니다.^^;

**태음인열자 요각통을 여정자진교탕 가 오공 전충으로 치료하고, 마른 가래는
폐음허로 보고 백합양폐탕가 백과(초)12, 비파엽 포공영 행인 4g으로 치료하다.**

74세 여성

#. 주소증 - 협착증으로 인한 다리저림 및 통증 (날갯이 있음)

<안준철> 태음인이 맞는것 같습니다

==> 여정자진교탕 + 오공 전충

1제로 요각통 80% 소실 되었습니다. 약 드시고 요각통이 거의 없어지시니까

평소에 가지고 계시던 가래 증상을 고쳐달라고 하십니다.

평소에 목과 코사이에 가래가 많이 낀다. 주로 목 위쪽에 붙어 있는 느낌이고
뱉기에 힘들다. 이비인후과에서는 코물이 뒤로 넘어가서 생기는 것이라고 했다.
각~각~해서 억지로 뱉으면 진한 가래가 나온다. 감기에 걸리면 심해진다.

이비인후과에서 후비루라고 했지만 저는 그냥 기관지 문제라고 보고 처방했습니다.

변증은 燥痰이었으므로 ‘폐음허’라고 보았습니다. (태음인 열자라서)

==> 백합양폐탕 + 백과(초) 12 비파엽 포공영 행인 4g. (나이가 많아서 음형처방을 골랐습니
다) 약을 드신지 정말 딱 3일 되었습니다.

환자분의 말씀을 그대로 옮깁니다.

‘한약이 이렇게 신기할 줄 몰랐다.

여러 가지 양약 먹어도 낫지도 않던 것이 한약 하루분 먹었는데 금방 가래가 삭더라.

가래 때문에 저녁에 잘 때도 좀 불편했었는데 이제는 그런 것도 없어졌다.

이제까지 한약 먹어 봤지만 이렇게 잘 듣는 것은 처음 봤다.’

사상의학 정말 대단합니다. 이것은 정말 사상의학이 아니고는 도저히 해낼 수 없는 것 같습니다. 정말 요즘 같아서는 환자들 한약만 장복하면 어느 정도는 다 호전시킬 것 같습니다....^^;; 요즘은 환자들이 다 약을 안 먹기 때문에 안 낫는 것이라고 시건방진 생각까지도 합니다.... 헐~~~물론 제가 침 `약 실력이 미천해서 잘 낫지 않겠지만..... 열심히 공부해야겠네요..선생님께 정말 감사드립니다.

태음인 열자 할머니의 요각통을 여정자진교탕가 오공 전충으로 치료.

여정자 진교탕 가 오공 전충

7일만에 통증이 줄고 시린 느낌도 덜 하다.

(하만중)

여정자진교탕 무난하게 쓸 수 있는 것 같습니다. 전 드라마틱한 얘기는 못 들었지만, 그럭저럭 좀 낫다는 얘기는 듣는 것 같습니다. 소화 등에 부담있다는 얘기 못 듣는 게 장점인 것 같구요. 한열불문 처방이 하나 뿐인게 가장 맘에 듭니다 ㅎㅎ

태양인, 디스크 수술 후 하지저림과 근육떨림 호소환자, 신음허로 보고

원잠보음탕가 오가피 도인으로 다리저림 경감. 소변이 시원치 못하다 해서 상동처방 加 구인 해서 제반증상이 현저히 호전되다.

54세 여성환자. 1년전 디스크 파열로 수술하셨습니다.

허리 쪽에서 접근하지 못하고 복강으로 들어가 수술하셨는데,

그 수술 후 다리가 계속 쥐가 나고 근육이 떨린다고 하십니다.

어혈은 당연히 있겠지? 하고 얼굴을 보니, 무당느낌이 납니다.

아!! 태양인이구나. 하고 문진해보니 발한 후 무력감 빼고는 걸리는 게 없습니다.

그래도 곳곳하게 태양인 처방을 꺼내드립니다.

1. 소화는 보통이라지만 대변이 굳은데다가, 설질상 열증으로 보고 신음허처방을 골랐습니다. 원잠보음탕에 오가피 도인을 더해 처방했습니다. 원래 교통사고 후유증에 쓰는 처방인데 제 맘대로 끌어다 써봅니다.

보름 후 내원하셨는데 다리저림이 60% 감소하셨다고 합니다.

근데 왜 이렇게 춥냐고 하십니다. 소변도 잘 안 나온다고 하시네요...
뭘 잘못된 걸까? 고민합니다. 다리 떨리는 건 크게 호전되진 않았다고 하십니다.
아!! 며칠 전 보았던 방광염증세가 생각납니다. 감기기운에 소변문제..
그래서 방광염일수도 있다고...슬쩍 말을 던지고...여전히 열증으로 보고 치료를 합니다.

2. 두번째 처방은 위 처방에 구인을 가했습니다. 소변 문제때문에 구원투수를 올렸습니다.
그리고 하루에 한 끼는 문어 꼭 배부르게 먹으라고 말씀드리고, 체질식 정확하게 하라고 했습니다.
안선생님께서 태양인의 보혈명방이라고 누누히 말씀하신 그 문어입니다.
혈허때문에 다리 떨릴 수도 있다는 생각에 복용을 매우 권했습니다.

제가 슬쩍 던진 말 듣고 병원가서 검사해보니 방광염 맞았습니다.
제가 양약먹지 말라고 했다고 양약 안 먹고 그냥 위 처방 드셨답니다.
감동입니다. 양약의 유혹을 뿌리치신 신여사님 화이팅!!

3. 증상이 거의 소실되었습니다. 쥐 나는 것도 거의 없어졌고, 다리 떨리는 건 가끔 있다고 합니다. 상동처방 한 번 더 썼습니다. 감사하다고 합니다.
넌지시 총각이나고 물어보십니다. 자기 딸 이쁘다고...주소 보니 강남구 소재 주상복합...약간 흔들렸지만 환자분 본인 닮았다고해서 되었다고 했습니다. 너무 무섭게 생기셨습니다.

태음인 한증 요각통, 다리 당기고 슬관절통증을 신양허로 간주하고 건울보양탕가 곡기생1돈, 녹각교 처방--> 당기는 증상이 소실되다. 슬관절통도 간신허에 풍한습으로 인한 비증이므로 처방 리피트. 곡기생은 보간신하면서 거풍습한다. 다리 특히 장딴지 당기는 데는 곡기생이 최고다.

과거에 소화 안 되고 어지러워서 조위승청탕에 녹용을 가해서 봄 가을로 6년 정도 보약을 드시던 마르고 민감한 성격의 63세의 태음인 한증 여성입니다.

이번에는 무릎이 아프고 다리가 당기는 증상으로 찾아왔습니다.(송파구 가락동에서 2일에 한 번씩 찾아와서 침을 5회 맞았습니다.) 거리도 멀고 침도 맞기 싫으니 한약으로 해달라고 해서 태음인 한증 신양허에 쓰이는 건울보양탕에 곡기생 1돈 녹용은 녹각교로 바꿔서 썼습니다. 15일 약을 드시고 다리 당기는 증상은 없어졌다고 합니다.

이번에는 다리 당기는 증상은 해결됐으나 무릎은 1/2정도만 좋아졌으니...
무릎약을 다려달라고 합니다. 이번에도 똑같이 썼습니다. 어차피 간신허에 풍한습으로 인한 비증이기 때문입니다. 곡기생은 보간신하면서 거풍습합니다.

조선족은 관절염을 풍습병이라고 부른다고 합니다.

우리말에는 풍습병이 없어지고 있습니다.(이것은 곧 풍습병을 이해하고 치료할 기회가 박탈되는 상황입니다.) 언어가 인간과 사회를 지배합니다.

간신이 부족하면 그 허한 틈으로 풍한습이 침범해 들어옵니다. 간신부족증 풍습병 정부족증 이런 용어를 사용했으면 좋겠습니다. 간신부족증 풍습병 이런 용어를 쓰지 않으면 노인들의 관절염이나 디스크를 치료할 기회를 놓치게 됩니다. 한의학은 용어가 모든 것입니다. 다리(특히 장딴지) 당기는 데는 곡기생이 최곱니다. 독활기생탕이 사실은 간신부족에 장딴지 당기고 쥐 내리고 시린 풍습 비증에 씁니다. 쌍기생은 유독하고 유통도 잘 되지 않습니다. 지금 시중에 유통되고 있는 쌍기생은 모두 곡기생이라고 생각해도 됩니다.

무릎병이 풍습병에서 관절염으로 바뀌면서 한의학이 소외되어 가는군요. 민족성을 말살하려고 언어를 먼저 없앤다던데....슬픈 현실입니다.ㅠㅠ

태음인 운동 후 견불거를 어혈저락으로 보고 단삼대황탕가 진교 상지

오늘 한가해서 전화를 돌려봤습니다. 63세 태음인 여성이십니다. 팔운동을 하다가 약간 빠긋한 뒤로 오른쪽 팔꿈치와 견봉 부위가 아픕니다. 오른손을 뒤로 해서 올려보니 허리정도밖에 안 올라갑니다.

경추주위염의 어혈저락증으로 보고 단삼대황탕 가 진교(진교, 진범), 상지 처방했습니다.

1주일정도 드시고 전화해보니 어깨부위의 저림 증상과 무릎 불편한 증상은 호전감을 느끼시는데 아직 팔이 더 올라가는 것 같지는 않다고 하시네요. 어혈이 좀 더 풀리면 팔도 좀 더 풀릴 거라고 말씀드렸습니다. 통쾌하진 않지만 듣고 있는 중이라 생각되어 올려봅니다.^^;

10일전의 계류 유산 후 생긴 슬통, 요통, 완관절통을 갈근조위탕가 산약, 연자육 각8 포황4 홍화 1.2g

30세. 사무직

** 태음인 열증으로 보입니다. 예전에 마황지제 처방했을 때 현훈, 무기력을 심하게 호소한 적 있습니다. 지금 사상 공부하면서 생각해보니 열증인데 한증약을 주어서 기능항진이 생긴 듯 보입니다. 고견 부탁드립니다. 감사드립니다.

==> 갈근조위탕 + 산약 연자육 8 포황 4 홍화 1.2g

처방 후 슬통은 없어졌고 요통은 반 이상 호전되었습니다.

너무나 평범한 임상레이죠...^^..

태음인 야간통증 및 하지저림 환자분이 간신음허 처방인 정심보음탕가 감국 산조인초로 호전. 상황을 뺐는데 그래도 되나요?--> 상황 빠진 정심보음탕은 속지황빠진 육미와 같습니다.

태음인 간신음허 처방인 정심보음탕가 감국 산조인초 처방했습니다.

통증 완전히 없어지지 않았지만 많이 줄고, 대변도 시원하다 합니다. 여기에서 상황을 빼고 썼는데요, 다른 분들은 상황을 어떻게 하시는지....

(안)

상황은 태음인 보음보혈의 핵심입니다. 상황없이 보신하는 약을 쓴다는 것은 육미지황탕에서 숙지황이 빠진 것과 같습니다. 북한산 상황을 쓰면 됩니다. 설탕은 태음인 음식입니다. 황설탕이 좋습니다. 흑설탕에는 색소가 있고, 백설탕에는 표백제가 있습니다.

소양인의 통증관련해서 강활 독활 지골피의 활용- 지골피는 허열을 끄고

간신을 보한다. 寒은 혈액순환이 잘 안 되는 것을 말한다. 따라서 열자도 나이가 들면 한이 생기게 된다. 그러므로 한습을 몰아내는 강활 독활을 열자에게도 꼭 써야한다. 일반적으로 두돈까지 쓴다. 가감에 있어서는 한열을 자유롭게 넘나들 수 있다.

64세 남자 소양인(?) 열자. 3월전에 감기가 걸린 후 기침을 하다가 허리가 아픈 것이 지금까지 아픔. 64세임을 감안하여 신음허로 변증. 소양인 관절질환에 강활 지골피 울트라 캡짱이라고 하였는데 소양인 열자에게도 강활을 1돈반에서 2돈까지 써도 괜찮은지? 독활을 가미해도 괜찮은지 궁금합니다. 가미 하면 용량은 어느 정도인지 강활 독활 둘 다 한증약이라서....

--> 열이 지나치거나 염증 상태가 되면 혈류가 과도히 충혈된 상태이고 찬약으로 지나친 충혈을 빼줘야 합니다. 그리고 한증의 상태는 혈류가 차단돼서 혈행이 잘 안 되는 상태입니다. 열자는 기본적으로 혈류가 과도한 상태로 보고 청열약을 씁니다. 그러나 나이가 많거나 병이 오래됐으면 열자도 한이 끼게 되고...기본은 열자이지만 한이 발생되게 됩니다. 그래서 한습을 몰아내는 강활 독활을 열자에게도 꼭 써야 됩니다. 2돈까지 일반적으로 사용합니다. 지골피는 허열을 끄고 간신을 보합니다. 한자의 경우도 마찬가지입니다. 한자는 기본적으로는 온보를 해야 하지만 급성열성 질환의 경우에는 청열약으로 염증을 꺼줘야 합니다. 그리고 그 열적인 증상이 다 사라지면 원래의 약으로 조리합니다. 용량의 문제는 기본적으로 동의보감 등의 기존 의서의 용량을 따릅니다. 선대의 경험에 의지해서 용량을 정하고 미흡하면 그때 다시 생각해서 결정합니다. 기본적으로 소증의 태생적 한열은 잘 파악하고 시작해야겠지만...가감에 있어서는 한열을 자유롭게 넘나들 수 있다고 생각하면 됩니다. 그래서 사상의학입니다. 8이 아니고...

71세 태음일열자 대퇴골 골절 후 조리에는 비증에 쓰는 여정자진교탕보다 신음허처방에 강근골하는 속단, 어혈약인 단삼을 가해서 써본다.

여정자진교탕으로 가슴답답, 머리 지끈거림

--> 신음허처방에 강근골하는 속단, 어혈약인 단삼을 가해서 써보세요. 여정자진교탕은 비증에 쓰는 처방입니다. 마황이 들어있어 부작용을 일으킬 수 있습니다. 40세만 넘어가도 신음허가 시작됩니다.

수술후유증신음허로 보고 거기에 강근골하는 속단, 상기생, 어혈약을 가해보는 것이 어떨까요

58세 소양인 한증여성의 관절통, 퇴행성관절염, 불면 등이 있을 때 관절통증의 치료는?--> 요슬통, 불면은 신허증. 토사자보양탕에 구판 별갑 등을 가해서 신음을 도와주고 방풍 강활 독활로 거습지통, 지골피로 보간신하면서 골절통을 다스린다. 관절염에는 황백(생), 인동등 등을 응용.

58세 소양인한증 여성의 손가락관절의 퇴행성관절염으로 통증, 슬통, 불면 등의 증상이 있습니다. 피부색이 검고, 다크써클이 있고, 대변을 시원하게 보는 편은 아닙니다. 알레르기비염, 천식 등이 있습니다. 과거 소양인 형방지황탕 가감방, 육미지황탕 등으로 비염, 불면 등에 어느 정도 효과를 보았습니다. 현재의 관절통증의 치료는 어떻게 접근하는 것이 좋을까요? 새로 쓴 사상의학에서 강활홍오탕 처방을 찾았는데, 어떨까요?

-->

요슬통이 있고 불면까지 있으면 신허증입니다. 토사자보양탕에 구판 별갑 등을 가해서 신음을 도와주고 방풍 강활 독활로 거습지통... 지골피로 보간신하면서 골절통을 다스립니다. 소양인의 관절염에는 황백(생) 인동등 같은 약을 응용합니다.

태음인 열증 오십견, 관절통 처방 문의. 태음인 열증, 64세 여환. 보간신하고 서글활락하는 여정자진교탕에 대한 가감법 언급(필히 확인!!)

- 18년동안 좌측어깨가 아파서 치료받음
- 올초에 견관절 석회제거수술을 받았지만, 견관절 ROM이 떨어지고 찬 바람 쐬거나 비올 거 같으면 어깨가 아프고 쑤신다.
- 가만히 있어도 야간에 아플 때가 많다.
- 어깨뿐만 아니라 무릎, 손가락관절 등등 관절들이 뻑뻑하고 쑤신다.
- 요즘에는 발바닥도 화끈거린다.
- 한 번씩 속이 쓰리고, 혈압당뇨가 있으며 불면이 있다.
- 아직 시어머니를 모시고 사는데 스트레스가 많고
- 젊을 때 일을 많이 하여 34세때 생리가 멈췄다.
- 대변은 1회/1일, 땀 많이 흘리고, 땀 흘려도 힘들지 않고 개운한듯하다.

새로 쓴 사상의학의 진교의이인탕에 녹각상, 석창포, 고본등을 가미하는 것이 좋을런지요?
갈근조위탕에 승마1.5 위령선1 전충 홍화 0.5 유근피1 단삼 포황 포공영 조각자 녹각교 마황 석창포1 등으로 처방하는 것은 어떨런지요?(가감이 너무 많나요)

(안)

보간신하고 서글활락하는 여정자진교탕이 좋겠습니다. 여정실(주증) 진교 각2돈 속단 곡기생 1.5돈 자노아 의이인 상심자 각1돈 녹각상 마황5푼어혈약으로 홍화 단삼 그리고 지절통에 쓰이는 상지를 가합니다. 열증이고 불면이 있어서 마황 의이인은 빼고 씁니다. 위령선은 태음인 약이 확실히 아닙니다. 일일이 부작용이 납니다.

경추손상으로 사지마비된 환자가 근육이 굳는다고 한다--> 보음, 보혈로 접근해야 하는 것이지만 몇 년에 걸쳐 약을 복용할 것이 아니면 손대지 않는 것이 낫다.

이 경우 약을 정확하게 써도 3개월 이상 써야 반응이 나오기 시작한다. 가급적이면 손대지 않는 것이 좋습니다. 보음, 보혈하는 것이 맞습니다. 즉 음혈을 보해야 합니다. 음혈이 마르는 이유는 내열이 발생되기 때문입니다. 음허약에 청열약을 가해야 합니다. 3~4개월 복용후 반응이 나오고 몇 년씩 복용할 것이 아니면 손 떼는 것이 맞습니다. 난치병은 난치병으로 인정해야 합니다. 비음허로 인한 경우도 있습니다만 비음허의 경우는 못 먹어서 마릅니다. 그래서 이분은 비음허를 배제합니다. 즉, 간기가 성해서 비기를 압박하는 경우입니다. 몸이 마르지 않아서 비음허는 아니고 음혈의 부족으로 보는 것이 맞습니다.

태음인 관절통에 전충 홍화 각 3~5푼이면 빠른 진통효과

태음인 열증으로 보여집니다. 관절통에 전충 홍화를 3-5푼 가하면 빠른 진통효과를 노릴 수 있습니다

잘 호전되지 않는 태음인 허리디스크와 슬통, 수족냉. 다한. 수족냉은 비위의 문제가 가장 많고 아니면 신양허증. 양증의 양허는 신음양양허증. 허리와 소퇴(장딴지)의 문제는 신허이고 시린 느낌이 있다면 신양허이다. 수족에 땀나는 증상은 생산조인이 가장 좋다. 수족에 땀 많은 것은 일종의 자율신경실조인데 산조인은 자율신경을 조절한다. 시호나 여정실로 간열을 사할 수도 있다-중요!!

43세 여자.

#. 주소증 - 1. 손발이 차다. 아랫배가 차다.

2. 땀이 너무 많이 난다. 주로 상체 (거드랑이, 등줄기, 전중혈 부위)

3. 허리디스크 (L5~S1 버징)로 인한 좌측 소퇴부 당김 증상과 통증. 무릎 아픈 문제가 더 급하다.

[안준철] 태음인입니다. 갈근조위탕을 쓰면 됩니다. 비주사말(비위가 좋아지면 수족도 따뜻해 집니다.)

[08-09-01. 경과보고]

갈근조위탕(대항은 6g) + 승마6 포공영 위령선4 홍화2 삼백초4

주소증에 별 차도가 없습니다. 여전히 손발 차고 상체(특히 거드랑이)로 땀이 많이 나신다고 합니다. 약 먹고 불편한 점은 없었다고 합니다.

[08-09-25]

위의 처방 복용하고 여전히 주소증에 차도가 별로 없고 허리디스크 (L5~S1 버징)로 인한 좌측 소퇴부 당김 증상과 통증은 별 차도가 없다고 합니다. 지금 손발 차고 땀나는 증상도 증상이지만, 다리 당기고 아프며 무릎 아픈 문제가 더 급하다고 합니다.

태음인 허리 디스크와 슬통(퇴행성 관절염 소견 있습니다)에 관한 처방 고견 부탁드립니다. 아울러 수족냉증과 땀나는 것도 조언 부탁드립니다. 감사합니다.

안준철

수족냉증은 비위의 문제가 가장 많습니다. 아니라면 신양허증입니다. 열증은 신음양양허증이 됩니다. 이분의 경우 소퇴(장판지)의 문제는 신허증입니다. (윤원장님이 말씀하시는 부신기능의 저하입니다.) 시린 느낌이 있다면 양허증입니다. 열증은 음허가 먼저오고 음허가 오래되서 양허까지 진한된 경우입니다. 그래서 양증의 양허는 음양양허증입니다.

수족에 땀나는 증상은 산조인<생>이 가장 좋습니다. 산조인이 자율신경을 조절하는 것으로 알려져 있습니다. 수족에 땀이 지나치게 많은 것은 일종의 자율신경 실조입니다. 시호나 여정실로 간열을 사할 수도 있습니다. 여정실은 생으로 쓰면 간열을 사하고 주증하면 보음합니다.

상지마목 손가락관절통 손마디가 아프면 전충 홍화를 3푼씩 가합니다.

자고나면 붓는 것은 대부분 식적. 다크서클, 부종 없으면 신양허. 태음조위탕.

자고나면 붓는 증상은 대부분 식적입니다. 다크서클, 부종 없으면 신양허입니다. 와잠이 부어 있으면 같은 다크서클이라도 담음으로 보고 약을 씁니다. 태음인 한증입니다. 태음조위탕에 가미하면 되겠습니다.

하지무력하고 허리 자주 아픈 태양인 해역병에는 오가피장척탕

하지무력, 허리도 자주 아프고 소변도 덜 시원하다는데 신기허로 보면 맞을까요?

태양인 해역병에 오가피장척탕을 씁니다. 하지의 무력은 해역증의 초기입니다.

어깨의 통증에 갈근조위가감방을 써도 안 들어서 갈조가감방을 써알지.

류선생님의 풍한습비 처방을 써알지 문의==> 변증의 순서를 말함. 장부변증하고 음양기혈진액 변증, 오사변증 통해 병의 원인을 알아내야 한다.

갈근조위탕(대항 3푼) 가 홍화 상지 조각자 각 1돈으로 無效

(안)

야간통 또는 누르면 아픈 경우, 일점통이면서 옮겨다니지 않으면서 밤에 더 아프다고 하면 어혈이고 단삼 포황 대황 같은 어혈약을 씁니다. 또는 검은 어반이 있어야 어혈로 보고 약을 씁니다.

풍한습으로 인한 비증 역시 장부의 허약을 타고 들어옵니다. 기본적으로 장부변증을 먼저 하고 오사변증을 통해서 풍한습조화를 제거한다고 생각해야 합니다. 예를 들어 간이 나빠지면 어혈이 생기게 되고, 어혈은 이차적으로 병의 원인이 됩니다. 그래서 간과 어혈을 같이 다스려야 합니다. 비위가 허약하면 습담이 생기고 습담이 관절로 가면 오십견 등이 생길 수 있습니다.

니다. 이때에도 비위와 습담을 동시에 다스려야 합니다.

따뜻하게 해서 덜 아프면 한이고, 차게 해서 덜 아프면 열입니다. 어혈은 설진상 어반을 확인하고 가합니다(또는 다른 어혈증상을 확인해야 합니다). 장부변증을 하고난 후에 다시 음양 기혈진액변증과 오사변증을 통해서 병의 원인을 해결합니다.

태양인 한증 손가락 골절엔 어떤 약물이 가감되는 게 좋나요?--> 상황에 따른 가감방법과 가감원칙을 말함. 중요!!

특별한 불편한데는 없는 환자로서 손가락 골절로 스프린트 대고 있습니다

태양인 한증 어떤 처방과 가감이 필요할까요? 감사합니다

안준철

어혈약으로 우슬이 좋습니다. 상지질환에는 0.5돈만 쓰면 됩니다. 1돈 이상 쓰게 되면 하지로 하행합니다. 활혈 행기하는 현호색도 생각해 볼수 있겠습니다. 변비가 있으면 도인이 좋습니다. 음허를 겸하면 구인을 쓸 수 있습니다.

한열이나 표리병의 구분이 불분명하거나 병증이 모호한 경우 또는 표리병을 겸하고 있으면 쌍해산에 가미하시면 됩니다. 나중에 손가락이 뻣뻣해서 부드럽게 할려면 백강잠을 1돈 가하면 됩니다.

태음한증슬통처방. 슬관절통에 가장 효과과 좋은 태음인 약은 전충. 나이가 40이 넘고 슬통이 있다면 보신하는 처방에 곡기생 속단 등을 가하고 전충 홍화를 5푼 이하로 씁니다. 전충 홍화는 손가락 등의 다발성 관절염에도 특효약입니다.

2007년판 안선생님 강의록 보며 임상처방을 쓰고 있습니다.

이번에 태음인 한증인 분이 약간 몸집이 있고 소화도 잘 안되고 무릎이 아프다고 하여 강의록을 보고 태음조위탕+ 위령선, 조각자1돈 홍화5푼으로 처방했는데 큰 변화는 없어서 부종형은 아니어서 삼백초 제외. 관절에 강활승습의 의미로 승마를 쓴다고 하는데 습성으로 통통 붓고 열리는 경우에 쓴다고 하여 제외

슬통은 늘 고민거리입니다. 카페는 유선생님처방들이 자주 올라오는 것 같은데 혹시 좋은 의견 있으시면 답글 부탁드립니다....

안준철

위령선은 태음인 약이 확실히 아닙니다. 위령선은 태양인 약으로 추정되나 확인을 더 해봐야 합니다. 조각자도 태음인약으로 쓰였으나 역시 체질이 의심됩니다. 슬관절통에 가장 효과과 좋은 태음인 약은 전충입니다. 나이가 40이 넘고 슬통이 있다면 보신하는 처방에 곡기생 속단 등을 가하고 전충 홍화를 5푼 이하로 씁니다. 전충 홍화는 손가락 등의 다발성 관절염에도 특효약입니다.

간신히 겸 풍한습 체질별 처방(중요)

간신히 겸 풍한습 처방

<태음인> 여정자진교탕 - 여정실주증 진교 8 속단 곡기생 6

자노아(=청목피) 의이인 상심자 4 녹각상(녹각, 녹각교 대용가능) 마황 2

<소양인> 숙지황독활탕 - 숙지 독활 8 방풍 백복령 6 구기자 강활 홍모오가피 인동등 4

<태양인> 우슬오가피탕 - 회우슬주증 가시오가피 8 음양곽 송절 적하수오 6

발계 잠사 모과 4

<소음인> 두충구척탕 - 두충염수초 8 구척 모당귀(?) 백작약 천궁 계지 당귀 4

세신 감초 2

태양인 대퇴골절후에 어떤 방법의 처방을 하는지요?--> 연세 많으시고 당뇨병같은 소모성 질환이 있으니 허증으로 접근, 한증이면 신양허에 가 오가피, 열증이면 신음허에 가 오가피. 어혈 있으면 파혈하는 구인 현호색을 가함. 문어를 常食

장인어른이 한달전 우측 대퇴골절로 이제 약간씩 걸음걸이를 하시는데요

태양인이시고요. 당뇨 심장병 있고요. 화가 많으세요-그림은 못 그리시고요

생화탕 스타로 처방하나요? 회복에 빠른 처방 가르쳐주세요. 감사합니다

안준철

연세가 많고 당뇨병 같은 소모성 질환이 있어서 허증으로 접근해야 됩니다. 한증이면 신양허 증 처방에 오가피를 가합니다. 열증이면 신음허 처방에 오가피를 가합니다. 어혈증상이 있어서 야간에 통증이 심하거나 일점통 또는 헛바닥이 푸른색으로 어혈색을 가지고 있으면 파혈하는 구인 현호색을 가합니다. 현호색이 원방에 들어가는 처방은 2배로 증량합니다.

태양인은 문어를 집중적으로 많이 드시게 하는 것도 방법입니다. 매끼마다 문어를 드시면 보혈작용이 있고 외상 후 회복에 탁월한 효과를 가집니다. 낙지 쭈구미도 태양인에게 도움이 됩니다만 단연 문어가 최고입니다.

태음인 노인. 열증의 슬관절통에 대한 질문. 날씨가 흐릴 때 안 좋으면 습증이지만 노인은 신허를 겸하면서 습이 끼어든다고 봐야 한다. 열증이라서 신음허가 된다. 여정자진구탕은 보간 신하면서 풍한습을 흠어주는 처방.

주소증은 슬관절통. 노인

겸증 잘 붓는다.(얼굴 손 발), 소화 잘 안 되는 편. 추위와 날씨 흐리면 더 안 좋다.

손발이 차다.

변증에 관한 질문입니다.

1. 신허수범?
2. 부종으로 습사?

3. 수족냉으로 한사?
4. 갈조에 전충 홍화 등등.

그런데 1,2,3 모두 한증약 밖에 없네요.ㅠㅠ
4번으로 가야 될까요? 고견 부탁드립니다.

정용재

여정실(주증) 진교 8g 속단 곡기생 6g 자노아 의이인 상심자 4g 녹각상(녹각 대용可) 마황 2g
<여정자진구탕> 관절염에 많이 쓰는 처방입니다. 모르시면 때리시면 됩니다. 단, 반은 낮고
반은 안 낮습니다. ^^;

김태규

어디에 나오는 처방인가요? ^^

안준철

잘 붓고 날씨 흐리면 더 앓 좋다.==> 습증으로 보여집니다. 그러나 노인이면 신허를 겸하면서
습이 끼어든다고 봐야 됩니다. 노인이면 열증이라서 신음허가 됩니다.

정용재

퇴행성은 무조건腎이라고 하셨습니다. 여정자진구탕은 보간신하면서 풍한습을 흠어주는 의미
로 구성한 류선생님 처방.

각 체질별 척추 관절질환 처방

■ 태음인 : 위령선 승마 전충 홍화 조각자, 진교

- 한증 태음조위탕 + 위령선 조각자 녹각 홍화(석창포 전충 해동피 옵션)
- 열증 갈근조위탕 + 위령선 조각자 승마 포공영 홍화 (녹각 전충 옵션)

■ 소양인

- 한증 독활지황탕 + 지골피 강활 황백 시호 생지황 금은화
- 열증 사백산 + 지골피 황백(붓는 관절염) 거 형개

■ 소음인: 파고지 세신 두충 가미 다리당기면 천오가 좋다

- 한증 십이미관중탕 +파고지 두충 세신 인삼 황기 옵션 천오 거 적백하수오 양강
- 열증 황기계지탕(유한) 천궁계지탕(무한) + 파고지 세신 두충
팔물근자탕 +세신
천궁계지탕에 활혈시키는 당귀 천궁 등 가미한다

■ 태양인: 지절통-송절 석곡 오가피 우슬 현호색 포도근 / 어혈-구인 도인 잠사 택란

- 한증 미후도식장탕
- 열증 오가피장척탕
- 한열 오가피쌍해산

2. 사지관련 기타질환(손발저림, 수족떨림증, 파킨슨병...)

태음인 열자 수전증. 심계 불안 변비. 심음허로 보고 사삼양심탕가 대항1돈. 수전증은 심허다.

69세 할머니, 주소증은 수전증 불안 심계 변비

과거력:2년전 뇌경색으로 수전증 시작

변증: 수전증은 심허입니다. 열증이므로 심음허로 변증

처방:태음인 열증 심음허에 쓰이는 사삼양심탕에 대항1돈을 썼습니다.

결과:15일 드시고 손 떨림은 현저히 좋아지고 불안 심계도 좋아졌습니다.

대변이 잘 나와서 속도 너무나 편하다고 합니다.

고찰: 커피에 불면이고 척맥이 심하게 뛰어서 음형처방을 선택했습니다.

사삼 백합은 보음합니다. (그래서 음형처방에 주로 쓰입니다.)

사삼 백합은 보음약류에 속합니다.

안준철

동의보감에 수전증은 심허라고 나옵니다. 한열에 따라서 한증은 심기허나 심양허증에 해당하고 열증은 심음허증에 해당합니다. 동의보감을 잘 알면 정말 쉽습니다. 체질 알고 한열 알면 끝입니다. 사삼 백합은 보음하므로 척맥이 심하게 뛰는 경우에 사용됩니다. 동의보감의 한마디가 정말 중요합니다.

예전에는 이런 경우에 청심연자탕을 주로 사용했는데 청심연자탕은 한열허실이 모두 섞인 처방이라서 처음에는 효과가 좋지만 끝을 내기 어려웠습니다.

태음인 머리가 맑지 않고 언어어눌, 두통, 손발 저림, 요통, 뒷목경직, 만성피로

등을 평간식풍하는 백자양간탕 가 천마 조구등 단삼 전갈 처방--> 머리 맑아지고 손저림이 개선. 두 번째로는 천마를 두배로 증량하고 전갈은 반으로 줄임. 다음은 상황보음탕 가 백령 단삼해서 요통도 개선시키다.

남자 55세, 혈압 125/68

본인이 적어온 주소증...들

1) 어깨통증-근육, 뒷목경직

2) 두통-머리가 맑지 못하고 뭐가 씩은 느낌

3) 턱관절통증, 언어어눌

4) 손발저림-아침 손발 부은 느낌

5) 심장 자주 두근거리고 숨참.

- 6) 소변 1~2회만...매우 짧음
- 7) 입 마르고 갈증
- 8) 눈 열나고 침침
- 9) 기력 떨어지고 만성피로. 기억력저하, 집중력저하.

대변은 변비기왕력 전혀 없고, 매일 시원하게 보신다고 합니다.
커피반응 없고 음식도 특별한 반응 없었습니다.

뭘 치료해야 할까 고민하다가 아무래도 머리가 맑지 못하고 말이 굉장히 어눌하고 어색하여서 뇌동맥경화증을 의심하고 치료하였습니다. 물론 MRI찍어보라고 권하고 차트에 기록한 후 치료 진행했습니다^^.

1. 첫 처방은 평간식풍시키는 백자양간탕에 천마 조구등 단삼 전갈을 가해서 썼습니다.
보름 후 내원하셨는데 머리가 많이 맑아지고 손발 저린 게 20%도 안 남았다고 하십니다.
2. 두 번째처방은 위의 처방에다가 천마를 2돈으로 증량하고 전갈을 반으로 줄였습니다.
그리고 근골격계통증과 턱관절은 침치료를 병행하기로 하고 일주일에 3번 내원하게 하였습니다.
3. 말이 엄청 빨라지셨습니다. 처음에는 김응룡감독보다 말이 느리고 답답했는데 이번에 내원하셨을 때는 마치 랩을 듣는 느낌이었습니다. 손발저림은 없다고 하셨습니다.
세번째 처방은 상황보음탕에다가 단삼 백령을 가해서 썼습니다.
아무래도 설질이 흥하고 음허증상이 보이기 때문에 열자로 보고 치료를 들어갔습니다.
참, 그리고 MRI예약했다가 몸이 많이 좋아지셔서 그냥 취소하셨습니다.
전 그래도 한번 검사해보는 게 좋을 꺼라고...소심하게 방어진료했습니다^^;;
4. 허리아픈 것도 많이 좋아졌다고 합니다. 본인 말씀으로는 침 맞아서 좋아진 거다...이러시는데 전 약먹어서 좋아지신 거라고 했습니다. 그래서 상동처방 한재 더 했습니다.

50대 이후 환자가 말이 어색하고 어눌, 그리고 손발저린게 있으면 뇌동맥 경화증을 의심하라고 류선생님께서 강의중 말씀하셨습니다.

이런 환자 잘 모르고 치료하다보면 큰일날 수도 있었을 텐데 참 다행이라고 봅니다.

태음인 한자 사경증을 조위승청탕가 천마로 치료하다(권투선수)

태음인 한증 49세 남자

과거 권투선수출신으로 머리에 충격을 많이 받아서 사경증으로 10년전에 래원
99년도에 조위승청탕에 천마1돈을 가해서 5제 연복 그동안 연락이 없었는데....오늘 보약을 드
시겠다고 10년 만에 진료실에 들어오는데 고개를 똑바로 세우고 들어오십니다.

전국에 침 잘 놓는 집은 다 찾아 다니면서 침을 무지하게 많이 맞았으나 조위승청탕 가미방으로 목이 굳어진 것이 눈 녹듯이 녹아버리는 느낌이 있는 후로 사경이 없어지고 고개가 바로섰다고 합니다. 10년전의 실력으로 천마를 가했다는 것이 참 잘 했다는 생각이 듭니다.

천마는 BBB를 뚫고 뇌로 진입해서 뇌순환을 개선합니다.

10년전 임상결과를 오늘 알게됐습니다. 재미있는 케이스라서 올려봤습니다.

태음인 열증 파킨슨병을 간신음허로 보고 정심보음탕가 감국5푼, 산조인초1돈,

천마 5푼(간신음허에 평간식풍하는 천마를 가함). 감국은 거풍하지만 장복하면 보음한다. 산조인초는 입간해서 보간보혈한다. 천마는 수전증을 보고 씀.

82세 변비가 좀 있는 태음인 열증 할머니

수전증이 심한 상태의 파킨슨병 귀도 잘 안 들리는 상태. 맨달이 상당히 나쁜 상태(이것도 정 부족증입니다.). 맥상은 척맥이 심하게 뛰면서 간신음허를 나타내고 있었습니다.(류샘 방식으로 음형처방을 써야 되는 척맥 쪽의 현맥입니다.)

정심보음탕에 감국5푼 산조인초1돈 천마5푼 가해서 썼습니다.(간신음허증에 평간식풍하는 천마를 가해서 썼습니다.)

3일 만에 침 맞으시겠다고 따님이 모시고 왔습니다.

따님 말씀이 "오늘이 약 먹은지 3일째인데 수전증이 현저히 덜하다"고 합니다.

그리고 우울해 하신지 오래 됐는데 상당히 명랑하고 기분이 좋아 지신 것 같다고 하십니다.

할머니가 웃음을 보이시며 여유를 부리시네요.

감국은 거풍하지만 장복하면 보음합니다.

산조인초는 입간해서 보간보혈합니다.

보혈하면 잠 잘 자게되고 잘 자면 또 음혈이 보충됩니다.==>불면의 악순환에서 숙면의 선순환으로 변합니다.

천마는 거풍 잠양하는 약성이고 뇌신경전달물질을 만드는 전구물질을 많이 함유하고 있는 게 맞는 것 같습니다.ㅋ 지금까지 천마를 사용하지 않은 경우와 완전히 반응이 다릅니다.

물론 수전이 없었으면 천마를 쓰지 않았을 것입니다. 정부족증으로 수전 치매 노망이 온다고 알려져 있습니다.

전 국민이 나이드신 부모님께 보간신하는 약을 먹이는 운동을 했으면 좋겠습니다

(치매노인을 보살피는 비용에 비하면 국가적으로도 엄청난 이익입니다.)

보정하는 약을 쓰면 노인들이 똑똑해지고 명랑해집니다. 손도 떨지 않습니다. 精爲至寶!!!!

야간통증 하지저림 치매 하지무력으로 거동곤란한 여성에게는 일단 補肝血하는 것이 중요합니다. 노인들의 저린 증상은 일단 혈허로 접근해서 보혈해줘야 한다. 어혈약이 비증약을 함부로 쓰지 않는다(82세 여성 태음열증).

(안)

치매에는 보신하는 약물이 잘 듣습니다. 저린 증상에도 실증약을 쓰기 곤란합니다. 보혈하는 약을 가해서 써야 합니다. 보혈약은 보간혈하는 것입니다. 결론적으로 간신을 보하는 것이 최선이 되겠습니다. 열증으로 보고 약을 쓰는데 만약 열증약으로 설사한다면 한증약을 쓰면 됩니다. 노인들의 저린 증상은 우선 혈허로 접근해서 보혈해 줘야 합니다. 파혈하는 어혈약이나 비증약을 함부로 쓰면 위험합니다. 열이 보여도 청열약을 함부로 쓰지 않습니다. 청열약을 가하면 몸이 갈아지기 쉽습니다.

■ 비만

3년간 관찰한 태음인 열자 다이어트 사례 여성 59킬로

1. 갈근조위탕가 대황3돈 승마 황금 포황 마황 각한돈 1개월 변화 없음
2. 의이인7.5 건울5 갈근4 마황 나복자 3 길경 석창포 오미자 원지 산조인 용안육 맥문동 천문동 황금 대황 승마 각2 59킬로
3. 태음조위탕 가 대황 황금 3돈 56킬로
4. 상동 가 갈근2 승마1 대황0.5 황금1 55킬로
5. 태음조위탕가 의이인 승마 황금 대황 포황1, 마황0.5 53~54
6. 상동 가 거 포황...각각 1개월씩 처방.

연락두절.

11월 다시 연락 왔는데 53~4 오락가락
7,8,9 태음조위탕 가감해서 처방 53킬로
2009년 7월 다시 연락 옴. 2킬로 늘어서 54킬로 가람 된다고...
10,11,12 태음조위에 이래저래 가감했으나 체중이 56까지 올라가다가 겨우 55에서 진정
13,14,15는 아침, 점심은 태조가감방을, 저녁은 따로 복용시킴.

- 1) 갈근조위거 오미자 가 황금 산조인(초)2, 대황1
- 2) 황금의이인탕 가 대황
- 3) 의이인삼백초탕

이렇게 처방하는 동안 잠도 잘 자고 속도 편하고 대변도 잘 보게 됨. 체중은 여전히 55킬로. 안 빠짐. 올해 6월 다시 연락왔는데 체중이 58~59정도 된다고...운동해도 안 빠지고 살만 단단해졌다고...그 이후로 여러 가지 시도해보았으나 몸은 좋아졌지만 체중은 별로 빠지지 않았다는 임상례.

공개하는 비만방(태음인 소양인).

태음비만방(단위 그래프)

의이인25 건물15 나복자10 마황8

갈근 길경 맥문동 산조인(초) 석창포 오미자 원지 용안육 천문동 포황 황금 각3, 대황 승마 각2를 130cc 45봉 식전 3봉씩 보름분으로 처방함. 20만원

소음인은 십이미관중탕, 소양인은 독활지황탕, 육미지황탕 쪽으로 처방하면 살이 빠지기도 하지만 살이 안 빠져도 몸이 좋아진다고 해서 컴플레인 크게 없다.

(정용재)

상기 처방의 기원과 소양인 비만처방.

의이인30, 건물20 마황 나복자 각12 길경 오미자 석창포 원지 산조인 용안육 맥문동 천문동 황금 각8 이상을 한첩으로 해서 하루에 한첩을 복용함.

이는 조위승청탕 가미로서 양심 안신시켜 과잉한 식욕을 억제시켜주고자 하는 의도. 태음조위 비염방보다는 효과가 좋았음. 중요한 가미가 있는데, 태음인으로서 간열이 있는 경우 상기의 처방으로 속이 더부룩하거나 변비가 생길 수 있다. 이때 가미하는 것으로 갈근, 승마, 대황의 비율을 2:1:1로 하는 것이다(예 16:8:8). 정신적인 안정을 도모할 경우, 용골을 가하고 대황으로 변비가 해결되지 않으면 행인을 가한다.

소양인 비만방의 경우

생지황24 목통16 현삼 과루인 각12 전호 강활 독활 형개 방풍 백복령 택사 치자 박하 각8. 구지가 16. 이상을 한 첩으로 하루에 한첩 복용.

형방 도적산 가감방.

태음인 열자의 비만에 태음조위탕 가감 처방례

75년생, 34세, 여성. 2010년 3월26일 초진.

아래 소아의 엄마입니다.

열자의 비만에 다양한 처방을 활용해 보지만

아직 만족스러운 처방이 없어 교육지책으로

태음조위탕에 가감해 본 결과를 보고드립니다.

속이 늘 불편하고 특히 신경쓰면

속이 쥐어짜듯 아프고 위경련도 자주 일어난다고 합니다.

공복에 속 쓰리고 잘 울렁거리며

명치 부위 답답한 느낌도 자주 있습니다.

아랫배가 자주 불편하고 가스도 많이 찹니다.

돼지고기가 잘 채하고

밀가루 아이스크림, 고구마, 떡, 기름진 음식도 탈이 납니다.

특이한건 소고기(생고기)도 먹고 한 번 체한 적이 있다고 합니다.

아마 같이 먹은 음식에 문제가 있지 않았나 짐작해 봅니다.

커피는 괜찮으며 하루 4잔 정도 마십니다.
처음 마실 때는 불면이 있었다고 합니다.

땀은 거의 나지 않고 사우나 하면 현기가 나고 힘이 빠집니다.

소변은 2, 3번 보는데 시원치 않고 기침하면 조금 새기도 합니다.
대변은 하루 한 번 보는데 무르고 가늘며 잔변감이 남습니다.

잠들기가 힘들고 짜증이나 화가 많습니다.
두통도 잦고 간혹 상열감이 있으나 피로감이 심합니다.
부종이 심한데 오전에 많이 붓고 피곤하면 오후도 붓습니다.
젓가락질이나 연필질을 하면 손저려 못할 정도라고 합니다.
생리가 빨라지고 생리통도 심하며 황대하가 조금 있습니다.
다이어트를 원하셨으나 일단 몸이 안 좋아 치료부터 받길 권했으며
고로 초반에는 살이 덜 빠질 수도 있고
대신 몸이 좋아지면 그만큼 살빼기도 쉽다고 말씀드렸습니다.

위장문제와 간문제가 함께 있다고 판단되어 빠른 치료를 위해
아침, 점심은 황금의이인탕 가 대황4g을 처방하고 저녁은 백자약간탕을 드시게 했습니다.
약이 끝날 즈음 위장은 거의 좋아졌으며 부종도 확연히 좋아졌습니다.
덜붓고 매일 변 잘보고 피곤도 매우 개선이 되었다고 좋아하셨습니다.
다만 체중은 그대로 라는거.....같은 처방을 다시 드렸습니다.
중간에 쭈꾸미 드시고 심하게 부었으며
건포도 드시고 식도염증상과 더불어 불면이 생겼으나 잘 넘어갔습니다.
생리통도 심하지 않았다고 좋아하셨습니다. 다만 이번에도 체중은 그대로라는거.....

건강이 상당히 개선되어 본격적인 다이어트 처방을 해드린다고 말씀드렸고
열자 처방에 체중의 변화가 없어 한자 처방인 태음조위탕 가 갈근, 승마를 드렸습니다.

컨디션은 그대로 잘 유지되었으며 수면에 지장도 전혀 없었습니다.
다만 이번에도 체중은 그대로라는거.....
그런데 옷이 좀 낙낙해지고 주변에서 얼굴이 좀 빠져보인다고 한답니다.

좋은 사인으로 보고 5월20일,
태음조위탕 가 의이인, 마황, 산조인(초) 4g 처방했습니다.
이 약 드시고 열흘 쯤 뒤 크게 충격을 받아
팔, 다리가 꼬이면서 쓰러지셔서 응급실을 다녀온 적이 있었다고 합니다.
이 후 기운이 없고 계속 위통이 있으며 한번씩 미식거린다고 합니다.
또 주사를 여러번 찔러 손목이 아프고 손가락이 찌릿하다고 하셨는데,

이 부분은 IRT(AK의 치료기술)를 통해 즉각적으로 호전이 되셨습니다.

오늘 오셨는데 역시 AK적인 방법으로 진단해보니
스트레스가 강하게 나타나서 간단한 치료를 해드렸습니다.

그런데 그런 와중에도 이번 약은 드시고 나서 3kg이 빠졌다고 합니다.
물론 약을 드시면서 위화감은 전혀 없었습니다.
앞으로 계속 다이어트를 하실 것이므로
계속 치료해보고 추가 경과 보고드리겠습니다.

이상의 방법은 제가 만족스러운 열자의 비만 처방을 찾지 못해서
편법적으로 활용하는 방식입니다.
따라하셨다가 충혈된 환자의 눈을 쳐다보며 원망을 들어도 전 모릅니다.^^;;

사실 그간 열자의 비만에 태음조위 가감방을 다양하게 구성하여 활용해 봤으나
위화감은 없으나 체중의 변화도 없는 경우도 많이 있었습니다.

또 한자의 경우라고 해도(예전 상담게시판에 올린 예)
마황을 3돈까지 올려봤으나 꿈쩍도 하지 않는 경우도 있었습니다.
(거의 대부분 류 선생님의 과일식이법을 병행함.)

맹목적으로 마황만 신뢰하는 방식은 문제가 있다고 보이지만
현재로선 일단 여러가지로 실험해 보고 있습니다.

개인적으로는 열자의 처방에 감량 효과가 없는 경우
태음조위탕을 시험 투여해서 부작용이 없는 경우에만 선택적으로 사용해 보고 있습니다.

그런데 이런 경우는 커피에 내성이 생긴 경우가 많았습니다.
초기 커피불면이 있더라도 커피에 내성이 있으면 마황에도 내성이 있으며
용량을 증량하더라도 잘 견뎌낸다고 생각해 보고 있습니다.

열자에 태음조위탕 가감방을 쓰는 이러한 방식은
오래 사용하면 필연적으로 부작용이 생길 것으로 보이므로
당장 위화감이 없더라도 계속 잘 확인해야 하며
다이어트를 위한 임시방편임을 감안하고 치료에 임해야 할 것 같습니다.

앞으로 더 좋은 열자의 다이어트 처방이 나와서
맘 편히 임상했으면 하고 바라봅니다.
좋은 처방 있으면 많이 공유하길 기대합니다~

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.^^

저는 열자에 태음조위탕 변방들 써서 성공한 경우가 별로 없었던것 같아요.
다이어트 성공한지가 너무 오래 되어서 포기상태입니다 제 살부터 빼야 될까요TT

고생하셨습니다. 근데 전 황금의이인탕이 주고 류선생님 체질식 시키면 어느 정도 빠지던데요....저만 그런가요? 대부분 안빠지는 경우는 환자가 지시를 어기고 체질식 안하거나 불량식품 먹거나 몰래 야식 먹거나 여하튼 티칭한 대로 안하면 당연히 안빠지는 것 아닌가요? 그 경우를 제외하고는 어느 정도라도 빠졌던 것 같은데요.....

저도 처음엔 처방 구성을 보고 황금의이인탕, 의이인삼백초탕이야말로 태음인 열자의 비만 처방이라고 희열을 느끼고 꾸준히 써봤는데, 제 경우엔 1케이스도 성공한 사례가 없어 이런 짓을 하게 된 것입니다.ㅠㅠ 그런데 태음조위탕 가감방을 써서 잘 빠지는 경우 딱 3kg만 빠집니다. 보름에 3kg. 희안하게 그렇습니다.;; 식이를 잘 관리하는 것은 정말 중요하다고 생각합니다.

이런 경우도 IRT 쓰는군요.. 자침으로 인해 찌릿할 때 써도 되겠네요..

소양인비만. 비만치료에 있어서의 총론적 원칙.

약보다 식이가 더 중요. 아침 공복에 곡물을 먹지 않고 딸기 참외 등 소양인에 맞는 과일을 먹게 해서 인체가 영양과잉이라는 착각을 갖게 해야 합니다. 그러면 점심 저녁에 먹는 칼로리를 배설하는 모드로 몸이 바뀝니다. 8시 30분 이후에는 물만 먹고 암 것도 먹지 말아야 합니다. 아침을 굶지 않고 과일을 먹는게 핵심이고 점심, 저녁에는 무조건 체질식을 해야 합니다. 비만은 체질에 맞지 않는 음식을 먹어서 생기는 이물질의 축적으로 정의합니다. 체질에 맞지 않는 음식은 과일당뇨를 유발하지만 맞는 과일은 그런 문제를 유발하지 않습니다.

소양인 갑상선기능저하증 우울증 변비 환자 다이어트. 신양허증에 처방에 결명자를 3돈 이상 가해서 대변을 통하게 해준다.

<윤승일>

소양인한증 여성 50세 갑상선기능저하 만성변비 우울증입니다
체중이 53킬로에서 40킬로 후반대로라도 감량을 원하시는데요
어떤 컨셉으로 접근하면 도움이 될지 고견주세요

<안준철> 10:31

일단 신양허증 처방에 결명자를 3돈 이상 가해서 대변을 통해줘야 되겠습니다.

우울한 증상도 신허증 또는 정부족증입니다.

애들은 우울하지 않습니다. 애들은 뭘해도 즐겁습니다.ㅋ

<유태영>

갑상선기능 저하증의 변증은 기본적으로 기체에 의한 간열(한자) or 간화(열자)로 보고

나머지 변증은 상황에 따라 구사하는 게 좋습니다. 그래서 시호소간탕 가 차전자 대맥근 과루 인 증량. 수술(위)이나 몸 전체의 기운에 영향을 주는 병명(갑상선등)에는 무엇보다 그 증상 중심으로 변증하는 게 좋음. 소화 되고 속이 편하면서 기분도 좋아짐. 살도 빠짐.

■ 피로 보약

사삼유근피탕 먹고 어떻게 피로가...

과거에 임상결과발표에 몇번 올린적 있던 할아버진데요,
요즘 너무 피곤하다고 오랜만에 오셨습니다. 과거 처방들을 쭉 되집어보니 간신음허에 가감했는데, 웬지 갈수록 효과가 조금 미흡한 거 같아 이번엔 간음허약에 청열약을 조금 추가해서 처방했습니다. 쯔끔만 움직여도 피곤해서 꿈쩍도 못하겠다고 하셨어요.
처방하고 한 1주쯤 지나 오늘 오셨는데요, 왜 약이 다르냐고 따지시네요.
아 약지어가신 날 제가 약 받으실 때까지 드시라고 사삼유근피탕을 2일치 드렸거든요.
久嗽가 있으셔서요. 아, 그거야 당연히 다르죠 그랬더니 지은 약은 먹고 피곤이 전혀 가시질 않는다고 근데 그때 먼저 준 약은 너무 좋았다고 하시네요. 피곤이 잘 가시는 것 같았는데, 왜 그걸 안줬냐고....

정성들여 처방한 녹용약이 입가심하시라고 드린 약보다 전혀 못하다고 하시니 웃어야될지 울어야될지 모르겠습니다.ㅠ 이 분 피로의 키워드가 전혀 식도문제가 아닌것 같은데, 참 어떻게 이해해야 될지 모르겠네요.--;

아래 과거 올렸던 임상례입니다. 안 읽으셔도 되지만 그냥....^^;

태음인 70세 할아버지, 전주분인데 38년전 상경하셔서 자수성가하신 분입니다.
도예업 사장님이신데, 아침부터 밤까지 일요일도 없이 일하십니다. 일이 고된 것보다 스트레스가 많은 것 같습니다. 피로가 심하고 족냉증이 주소입니다.

첫번째, 신음양허로 보고 상황보음탕 가 췌양, 녹각상 처방했습니다.
드시는 동안은 피곤이 호전된다고 좋아하십니다. 약 끝나니 다시 피곤하시답니다.
슬프고도 기쁜 이야기입니다.^^;

두번째, 상황보음탕 가 췌양, 녹용 처방했습니다.
끝나고 한참은 좋았다고 합니다. 다시 피로한데 심하지는 않다고 하십니다.
짜증이나 스트레스는 여전히 많으시고 구건이 심하며 안피로가 있습니다.

세번째, 신간음허로 변증하여 상황보음탕 가 산조인, 녹용 처방했습니다.
예전약만 못한 느낌이랍니다. 이가 부러져 혀에 염증이 생겨서 5일간 시달렸답니다.

그래서 그런지 피곤이 심하다고 합니다.

네번째, 상황보음탕 가 쇠양, 녹각상 처방했습니다. 계속 피곤하시답니다.

그간 틀니도 문제가 생겨 계속 치과 치료를 받아왔다고 합니다.

웬지 자신이 없어집니다.--;;

다섯번째, 정심보음탕 가 쇠양, 분골 처방했습니다.

웬지 자신이 없습니다. 그래서 약 드리면서 adrenal complex를

한의원 약 봉투에 담아 같이 드렸습니다. 증이 맞으므로 도움이 될 것 같았습니다.

드시고 좋았다고 합니다. 그러면서 알약도 도움이 되는 것 같다고 덧붙이시네요.

아침 8시부터 저녁 8시까지 쉴 수가 없습니다.

여섯번째, 반갑게 맞이 했습니다. 근데 알약 좀 더 주면 안되겠냐고 하십니다.

아.....아드레날콤플렉스가 용환을 쓸어가는구나.ㅠㅠ 그래서 한약은 됐고

알약만 봉투에 담아드렸습니다. 아드레날콤플렉스에 콤플렉스가 생기는 순간입니다.ㅠㅠ

일곱째, 오늘 오셨네요.ㅋ 아드레날콤플렉스도 좋고 한약도 좋습니다.^^

태음열자의 기허증상 치험례. 기음양허를 피로에 활용한다.

저번 경과 이후로 그럭저럭 지내시다가 할아버지가 뇌경색으로 갑자기 쓰러져서 병원에 입원하시는 1달 동안 병 수발 하시느라 고생을 좀 하셨나 봅니다.

힘도 들고 병원 밥이 맛이 없어서 잘 먹지 못했다고 합니다.

할아버지 퇴원하시고 다시 내원하셔서 '힘없고, 몸이 벌벌 떨리고, 입맛이 없고, 가슴과 머리 위로 땀이 엄청 흐른다. 정강이 부분이 시리다.' 라고 하십니다.

변증은 '氣虛 + 濕' 으로 봤구요, 추우신 증상은 땀이 자꾸 빠져나가서 생기는 것으로 봤습니다. (물론 근본은 신허를 깔고 계십니다)

== 사삼보폐탕 + 승마 마황근 부소맥 4g 이렇게 처방했습니다.

태음인 열자였으나 素證 보다는 現證에 포인터를 두고 처방했습니다.

15일 분 드시고 오셨는데요 식사도 잘 하시고 땀도 없어지고 추운 것도 없다고 하십니다.

아마 계속 드시면 열자니까 기능 항진 증상이 어느 정도 나타날 거라고 봐집니다.

개인적인 생각으로는 이렇게 해 놓고 補腎陰하는 약으로 마무리 하면 더 깔끔하리라 생각합니다.

안준철 10.06.21. 12:24

기허에 음허까지 겹친 경우를 기음양허라고 합니다(한자의 경우는 기허가 먼저이고 음허는 나중에 생기게 됩니다. 열자는 음허가 있는 상태에서 기허가 겹쳐집니다.) 이 분은 기음양허에 해당한다고 할 수 있습니다.

66세 여성 기운이 없다(폐기허로 보고 사삼보폐탕가 마황근 천마. 태음인의 한출은 대개 사삼보폐탕을 해결가능)

#. 주소증 - 기운이 없고 피곤해서 아침에 일어나기 힘들다.
기운이 없어서 그런지 머리가 아프고, 어지럽고 땀이 많이 난다.
(머리가 항상 땡~~ 하고 아프다)
기운이 없을 때면 눈도 더 침침하고 소변도 시원하지 않다.
소화가 잘되지 않는다. 전신이 쑸다.

#. 계통 문진

@ 식욕 - 입맛이 없다. 끼니때가 되면 어쩔 수 없이 먹는다.
@ 소화 - 자주 더부룩. 가스 많이 참. 가끔 속이 쓰리다.
@ 음식반응 - 커피 불면증 없다. 커피 먹으면 오히려 기운이 좀 더 나고 눈도 밝아진다.
입맛이 없어 잘 먹지 않아서 그런지 음식 먹고 불편한 것은 크게 없다.
@ 대변 - 하루나 이틀에 1번. 금방. 보통 변
@ 소변 - 낮에 소변 2회 정도. 야간 수면뇨 1회. 약간 시원하지 않음. 소변색 희고 맑음
@ 땀 - 얼굴 뒷목 쪽에 땀이 많이 난다.
@ 수면 - 꿈을 많이 꾸고 피곤해서 아침에 일어날 수가 없다.
@ 찜질방 ` 사우나 - 답답해서 잘 가지 않는다.
@ 맥 - 유신.
@ 피부 - 후
@ 설진 - 설적 미황태
@ 기타 - 각종 관절통 작신이 쑸고 비가 오면 더하다. 머리가 아프고 어지럽다.

** 이 분은 태음인 열증으로 보입니다.

연세가 있지만 (신허쪽보다는) 면백하고 언어저미하고 자한 등으로 봐서 기허증으로 변증하고 처방하려고 합니다. (후세방 보중익기탕증??)
고건 부탁드립니다. 감사합니다.

<안준철> 태음인이 확실합니다. 09.09.26 14:35

== 사삼보폐탕 + 마황근 천마 2g

이 환자분이 위의 기록된 주소증 이외에 가장 큰 주소증은 우측 퇴행성 슬관절염이었습니다.
그것 빼고는 전반적으로 다 호전 되었다고 합니다. 기운없음, 피곤 일어나기 힘들, 두통, 어지러움 등등 이 분 두통과 어지러움도 기허였나 봅니다
너무 쉬운 임상레인가요....^^;; 퇴행성 관절염이나 협착증 뭐 이런 거 약 먹고 팍~팍~ 나오면 정말 좋으려만....

김상인: 땀 줄줄 태음인 노인분들 거의 사삼보폐탕으로 해결되네요...^^...

만성피로에 청열약가미하는 것이 좋다. 상황보음탕 가 포공영 감국 녹각교 각4

아래 올린 도예업 사장님이십니다. 지난번에 오셔서 만성피로 처방을 썼습니다.

상황보음탕 가 포공영, 감국, 녹각교 4g

만성피로의 핵심은 청열약을 조금씩 가미하는 것이라고 류 선생님께서 말씀하셨습니다.
그간 상황보음탕을 그렇게 썼었는데, 이번에 청열약 조금 가미해드렸더니 바로 다음날부터
피로가 갠다고 하십니다.

근데 약 먹은 다음날부터 두드러기가 한 3일 생겼다고 해서 이후 약을 1봉씩만 먹고 계시다
네요. 계속 써온 상황보음탕이 주소가 좋아지는데 뭘 두드러기가 생기다니..뭐 말도 안 되는
상황인거 같아 음식드신 걸 여쭙보니 조기새끼를 3번 정도 드셨답니다.

전혀 약 부작용이 아니라고 안심시켜드리고 아무 문제없으니 그대로 3번 드시라고 했습니다.

5일 지나 오늘 전화해보니 3번씩 먹는데 두드러기는 없어졌다고 하십니다.

조기 새끼를 먹어서 그런 게 맞는 거 같다고...

음식 주의시켜 드리고 약 잘 드시라고 했습니다.

그간 만성피로로 보음약을 오래 써오셨던 분인데, 청열약을 조금 가미해보니 확실히 차이가
있는 것 같아 임상례 올려봅니다. 감사합니다.(..)

녹각교는 한증약 아닌가요? 녹각교도 청열약인가요?

정용재09.06.26. 12:49

저도 정확히는 모르지만 감국, 포공영이 청열약이고, 녹각교는 보양을 강화하기 위해 넣으신
것 같아요. 맘에 안 들면 빼시든가....=33

보음하는 약이 강화되고 청열약이 원방에 들어있는 정심보음탕은 어떨까 싶습니다. 태음인 음
형은 보음약이 강화되고 청열약이 약간 추가된 상태입니다. 즉 음허가 더 심하고 허열이 뜨는
사람에게 씁니다. 간신부족이면 감국 산조인을 가합니다.

태음인 열증 환자 갈근조위탕가 승마 황금 포공영 각 한 돈으로 치료

48세 기혼, 장사하시는 여성 환자분이십니다.

주소증은 두통, 천면, 소화불량, 매핵기, 사지통, 항강증, 피로권태무력 등 거의 종합병원 수준
이고 매일의 피로 때문에 얼굴이 거무튀튀하고 변비가 상당히 심했습니다.

돈 아끼기를 거의 목숨처럼 하시는 분인데 오늘 오셔서 약을 더 지어 달라고 스스로 말씀하십니다. 복약 후의 반응을 물었더니 이렇게 좋은 약은 처음 먹어 본다고, 약을 먹기 시작하고부터 모든 증상이 좋아지고 몸이 가벼워지고 얼굴이 환해져서 주위 사람들이 뭘 먹었냐고 물어 본답니다. 전형적인 태음인 형상이라 사진은 찍지 않았습니다.

처방은 갈근조위탕(대황 1.5돈)+ 승마, 황금, 포공영 각 1돈, 45팩 15일분이었습니다. 갈근조위탕을 쓰면 거의 대부분의 케이스에서 제반 증상이 호전되는 것을 확인하곤 하는데 이 환자분은 최근 들어 약효를 가장 탁월하게 본 케이스라서 글 올립니다.

태양인 피로

수년전 소변문제와 자궁문제가 생기면서 생긴 피로에 아직 힘들어 하는 분입니다. 당시 소변을 보는데 아랫배가 빠근하면서 장이 꼬이듯 아프고 설사도 조금 했다고 합니다. 지금은 소변문제는 전혀 없는데 검사상 혈뇨는 보인다고 하네요.

동시에 생리양이 늘면서 덩이가 많아졌습니다. 냉도 많구요. 생리는 지금도 그렇다고 합니다. 생리하고 나면 기운이 더 빠진답니다. 당시 두드러기가 생겼었고 지금도 간혹 발생합니다. 암튼 여러가지로 한 번에 안좋아졌습니다. 잠을 깊이 못자고 피곤에 지쳐 쓰러져 잔다네요. 아침부터 힘들어 하루 종일 피곤하다고 합니다. 구고도 심하고 두통이 잦고 소화를 거의 못시킵니다. 대변은 거르지 않고 잘 본다고 합니다. 커피도 속만 불편하고 잠과는 무관하답니다. 다리가 좀 길지만 관골이나 시원한 생김이 태양인이라 생각됩니다.

위가 너무 안좋아
식장탕 가 백모근 2돈, 계혈등, 택란, 와송, 오가피, 어성초, 원잠 1돈 써보려고 합니다.
조언 부탁드립니다.

안준철
피부두께 육식이나 밀가루음식(튀김,라면) 발한후 반응이 궁금합니다. 오래 앉아 있어도 허리에 큰 부담이 없는지 문진해봤나요? 맥은?08.05.14 12:54
문진시에 대답이 빠르면 태양인 가능성이 많습니다.08.05.14 12:51

정용재
피부두께는 얇고요, 육식은 먹기만 하면 체한다고 합니다. 이런 건 아버지 때부터 그렇다네요. 밀가루, 우유 등도 탈이 납니다. 마른 오징어 먹고 두드러기가 난 적이 있습니다. 땀을 내면 힘빠지고 처집니다. 긴장은 하시던데 주춤하거나 둔한 반응은 아니었습니다.08.05.14 12:55

안준철
태음인 아니면 태양인인데 어깨도 넓고 해서 태양인으로 봐야겠습니다. 태양인이 이렇게 다리가 길어지면 불안정한 느낌을 줍니다.08.05.14 14:44

두두러기에는 백강잠을 써서 피부를 열어줘야 겠습니다. 그리고 어성초가 중요합니다. 2돈이 적당합니다.08.05.14 14:47

식장탕 가 백강잠, 어성초 2돈 계혈등, 택란, 와송, 오가피, 원잠 1돈 썼습니다.

약 드시면서 육식과 밀가루를 철저히 가리게 했습니다.

소화, 구고, 피로가 많이 좋아지셨습니다. 몸도 많이 따뜻해졌다고 좋아하시네요.

그런데 덩이는 조금 줄어도 생리량이 여전히 많습니다. 이게 좀 줄어야 할 것 같은데, 묘안 부탁드립니다. 감사합니다. ^^

노인보양에는 간신을 보하는 것이 핵심(뇌출혈 이후 밥을 너무 못 먹고 기운 없고 흰 목소리, 발음부정확)

노인은 간신을 보하는 것이 관건입니다. 정신도 맑아집니다. 뇌수의 부족으로 치매가 옵니다. 간신을 보해서 치매 증풍을 예방합니다. 보신하는 약은 모두 뇌수를 보충합니다. 기억력 인내력 등도 좋아집니다.

--> 간신음허 처방 정심보음탕(가 감국 산조인초)을 써야 하겠습니다. 석창포 1돈, 산약초 1돈도 써볼까 합니다.

■ 처방에 대한 반응 혹은 처방설명

갈근승기탕에 관한 글모음(태음인의 갈근조위탕, 소양인 지황백호탕, 소음인 팔물군자탕)

태음인 감기 환자의 제일 중요한 처방 (누누히 강조를 많이 하셨죠..^^)

오늘도 다시 한 번 강조하셨는데 한줄메모장에 있어서 원포인트 레슨방으로 옮기는 겸해서 '갈근승기탕' 에 대해서 임상례 올리신 분들 글 대충 모아봤습니다.

태음인 감기에 갈근승기탕이 중요하고 효과 굉장히 좋다는 것 기억 하시고 밑에 내용은 그냥 참고로 보세요.

(그래서 그런지 치험례로 많은 편이네요..^^)

■ 葛根承氣湯

□- 갈근 16g 대황 황금 8g 길경 백지 승마 4g

□- 通便, 攻下泄熱

□- 태음인 열자의 大腸府證, 膀胱蓄血, 陽明府證, 少陰兼陽明證, 氣分證, 熱結氣分內入胃腸(大腸秘結),

□□□大腸實熱證

□- 大腸府證, 膀胱蓄血 加 蒲黃

■ 안준철 [한줄 메모장] 10-3-31

태음인 감기의 경우 갈근승기탕이 확실히 잘 듣습니다.

한자 열자 모두 쓸 수 있습니다. 한자는 설사를 하면서 좋아집니다.

열자도 마지막에는 설사를 좀 합니다.

설사가 나면 치료가 끝났다는 신호입니다. 특히 열이 있는 경우에는 더 그렇습니다.

소양인의 경우도 마찬가지네요. 지황백호탕이 대단히 신속합니다.

소양인의 풍열범폐증에 쓰이는 은교청열탕 등도 좋지만 요즘 금은화가 6만원이 넘습니다.

그리고 품귀현상이라네요. 천문동 홍화도 물량이 모자란다고 합니다. 참고하시기 바랍니다.

■ 감기

감기 급증의 경우에는 한열불문하고 갈근승기탕을 쓴다.

몸살 오한 발열 두통 비색 후비루 가래 기침 등의 증상에도....

한증인 경우에도 實邪가 있으면 쓸 수 있다. 설사가 나면 치료가 끝난 것이다.

초기의 오한에도 (갈근해기탕 가감방보다는) 갈근승기탕이 낫다.

갈근승기탕으로 몸이 따뜻해진다. 가래 기침 콧물 모두 해결.

심지어 천식환자의 경우, 천명음도 사라진다.

갈근승기탕에 승마 백지 갈근 등이 있어서 처음부터 피부를 열어서 표사를 다스릴 수 있는 것 같다.

태음인은 오한 발열 신통단계에서 이후통 가래 기침 등으로 까지 병이 진행된 경우까지 한열 불문하고 모두 갈근승기탕으로 해결됨.

하지만 소양인의 경우에는 오한이 있을 경우에는 (한열불문하고) 패독산을 먼저 쓰고

오한이 사라지고 나면 한열불문하고 지황백호탕을 쓴다.

오한이 있을 때 지황백호탕을 쓰면 표한이 있는 상태에서 리열을 제거해서

중기의 下陷을 가져와 감기가 더 오래 가는 것이다.

고열이 나는 어린이들이 원인불명으로 열이 나는 경우가 많다. 이럴 경우에 갈근승기탕을 사용함. 갈근승기탕은 외감약, 따라서 대변이 정상인 사람에게 쓰는 것이다. 열이 대단히 빨리 떨어짐. 설사를 하기 시작하면 그때부터 열이 다 떨어진 것으로 보면 된다.

열이 떨어지면 약을 중단하고 조리하는 방향으로 약을 쓴다.

* 갈근승기탕. 중초를 고려해서 나복자를 넣으면 더 좋다.

특히 기침에 좋다. 병이 있으면 많이 먹어도 설사를 안 한다.

감기로 인한 가래 기침 인후통 또는 한열감등.

갈근승기탕을 1-2일 쓰고 갈근조위탕에 녹용을 쓰는 것이 좋다.

외감이 완전히 정리됐으면 바로 갈근조위탕으로 가면 된다.

* 태음인 소양인의 감기 <http://cafe.daum.net/an4sang/AK2v/50>

태음인 열증에 갈근승기탕이 너무나 신속하고 탁효가 있어서 한증에도 응용을 해보았습니다.

결과는 열증과 마찬가지로 신속히 콧물 기침 오한 인후통 등이 신속히 해결되었습니다.

소증은 寒이지만 현증이 熱이라서 설사나 소화장애 같은 부작용이 전혀 없었습니다.

너무나 놀라운 사실이고요.

급증에는 현증을 우선 다스리고 소증을 나중에 다스린다는 원칙을 재삼 확인하게 되었습니다.

■ 정용재 09.10.30 17:55

갈근승기탕은 정말 발표약인가 봅니다.

인통이 있고 첨엔 근육통이 있다가 지금은 피부가 아프다고 해서

한사가 피모에 있으니 말그대로 마황발표탕을 써야하나 잠시 고민하다가 승기탕을 드렸는데 (어제), 머리가 흠뻑 젖을 정도로 땀이 많이 나면서 감기가 많이 좋아졌습니다.(태음인 열자, 1 회/4일 통변) 정말 신기하네요.^^;

■ 변재석 09.10.31 12:40

갈승, 정말 좋은 약이죠. 이 처방 써서 2-3일 내로 안 낫은 감기가 없어요.

며칠 전에도 옆집 6세 여아 기침감기를 몇 달씩 하던 것,

갈승 6봉지 주고 하루에 2봉지 먹이라고 했는데 엄마 말씀이 한 봉지 먹일 때마다 기침이 줄더니 4봉지 만에 끝나 버리더라고...

■ 태음인 열증 콧물 코막힘에 대한 약반응

김봉찬 08.05.10 16:03

저는 태음인 열증으로 비염이 있습니다.

몸이 힘들면 하얀 콧물이 나오고 심하지 않으면 10시정도까지 잠시 안좋으면 점심때까지 있다가 없어집니다. 술먹은 다음날이나 감기 뒤끝에는 며칠씩 하루종일 안좋기도 합니다.

안선생님이 가르쳐주신 갈근조위탕 가 비파엽 포공영 백부근 승마 마황 1돈을 먹고 나면 상당히 빨리 호전되는 것을 느낄 수 있었습니다.

이번에 감기가 아주 심하게 오면서 노란 콧물과 코막힘 인통 두중통 미오한 등이 있었습니다. 갈근승기탕을 먹었습니다. 1봉지를 먹어도 별 반응이 없길래 10분뒤 1봉지 더 먹었습니다. 조금 덜한 느낌입니다. 2시간뒤 증상이 다시 원래대로 돌아가는 듯 해서 또 먹었습니다.

바로 약간 덜해지는 느낌이 있었습니다.

이런 식으로 하루에 5-6봉지를 먹으니 이틀정도만에 많이 편해지긴 했지만 코감기가 심하고 컨디션이 아주 안좋았습니다.

3일째에 갈근승기탕을 점심식사후에 다시 2봉지를 연복했더니 배가 불편해지면서 오히려 몸이 안좋아지는 듯 했습니다.

감기급증은 다 좋아져서 그런가보다 해서 저녁약부터는 갈근조위탕 비염약을 먹었습니다.

다음날 아침에 도로 더 안좋아졌습니다.

몸도 더 힘들고 코도 더 막히고 콧물도 노래지고 해서 다시 갈근승기탕을 먹었습니다.

이번에는 식후 1봉지씩 먹었는데 약간 불편한 느낌이 있다가 배변 욕구를 느끼고 대변을 보통 변으로 보고 나면 몸이 더 편해지는 것을 느끼면서 코도 좋아졌습니다.

그런 식으로 2일을 갈근승기탕을 더 먹고나니 80프로 이상 좋아진 것 같은데

코는 좀 남아있으면서 깨끗하지는 않은 상태입니다.

하지만 아직 설사를 하지 않았으므로 계속 갈근승기탕을 복용할 생각입니다.

느끼는 증상이 콧물 코막힘이 동일하다 하더라도

감기에서 시작된 경우는 갈근승기탕을 거의 마무리될때까지 복용해야지 좋아지는 것 같습니다. 중간에 갈근승기탕 연복후 불편했던 것은 대변을 못봐서 그랬던 것 같습니다

■ 갈근승기탕(갈근조위탕) 복용기...

전창환

제가 술을 좋아해서 장이 맛이 가서 그런지 아니면 대항에 대한 감수성이 좀 높아서 그런지 갈근조위탕도 그렇고 갈근승기탕도 그렇고 좀 예민하게 반응하는 편입니다

평소 변비가 약간 있는데 갈근조위탕 한 돈짜리를 먹으면 좋다가 약간 설사를 하다가 배가 좀 아프다가 그렇습니다. 그래서 3그램 넣은 걸로 먹곤 하는데요...

이것도 장의 상태에 따라 다른지 어떤 때는 한 돈짜리 먹어도 아무런 변화가 없을 때도 있습니다. 작년 가을부터 감기가 올 때마다 갈근승기탕을 먹어보는데요...

처음에는 두 봉지 먹고 배가 아파서 중단했습니다

좀 더 먹어봤어야하는데 배가 아프고 짜르륵거리니 힘이 빠져서 중단을 했고요...

겨울에 다시 감기가 왔는데 이번에는 열이 높은 감기였습니다

그 때는 5봉지를 먹으니 비로소 설사가 나더군요. 그리고 감기 증상도 개선이 되었습니다

아하, 이게 열이 어떤가에 따라서,또 내 몸의 상태에 따라서 상대적으로 반응을 하는구나 싶더군요. 그리고 이번 주...맑은 콧물 감기에 약간의 미열... 열 재보니 37.4도였습니다

월요일 낮부터 갈근승기탕을 먹기 시작했습니다. 화요일인 어제 오후까지...

어제 오후에 바빠서 점심 먹고 약을 먹는다는 걸 거의 6시가 다 돼서야 먹었는데요...

오후부터 콧물은 많이 줄더군요. 그리고 6시 저녁 먹기 전 빈속에 먹으니 속이 좀 아리더군요...사지에 힘이 쭉 빠지는 느낌...

그리고 두 시간 뒤... 설사를...자기 전에 또 한 번...

그래서 자기 전에 한 봉 더 먹고 자려고 했는데 안 먹었습니다

오늘 아침...더 이상 콧물은 안 나고 코가 약간 불편한 상태. 온몸이 찌뿌둥한, 약간 덜 나은 상태입니다. 한 80-90%정도 호전된 상태라고 할까요?(총 네팩 먹었네요...)

결론은요...변비여부가 대항의 증량에 가장 중요하지만

그 사람의 평소 섭생(술이나 음식등)으로 인해 대장의 민감도 여부가 그때그때 대항에 대한

반응에 영향이 있는 듯 하고요...

감기의 경우 아무래도 발열 상황에 비례해서 갈근승기탕의 복약 팩수가 증가하는 거 같습니다. 그리고 콧물 감기, 열감기, 기침 감기 모두 갈근승기탕이 유효했습니다.

■ <안준철> 09.09.21

전남 무안에 사는 환자가 전화를 해서 감기약을 2제를 부쳐달라고 하네요.

가족 4명이 모두 태음인인데 작년 겨울에는 갈근승기탕으로 겨울을 잘났는데...

올해는 지금부터 2제면 충분하지 않을까 싶다고 하네요.

갈근승기탕이 초기 중기 말기 감기 모두에 잘 듣는다고 합니다.

(설사가 나면 완치랍니다. 참 잘도 압니다.ㅋ) 이웃과 함께 먹어도 잘 듣는답니다.

이웃 사람도 태음인인가 봅니다. 감기만 한의원으로 와줘도 좋겠습니다.

신종 플루도 갈근승기탕으로 승산이 있지않을까요? 해열이 너무 잘되니

↳ 윤승일 09.09.21 18:59

저도 갈근승기탕 배운대로 많이 써보는데요 대부분 다 잘 해결되더라고요. 감사합니다

■ 정용재 09-11-02 [한줄메모장]

평소 늘 감기로 내원하던 태음인 열자 7세 남아인데, 엿그제 감기기가 있어 갈근승기탕 1일분 줬더니 다음날 설사하면서 감기가 많이 호전되었다고 합니다.

내원 당일 타미플루를 처방받아 복용을 같이 했는데, 오늘 검사결과 플루양성이 나왔네요.

저는 갈근승기탕의 효과라 굳건히 믿고싶습니다만...^^;

신증플루도 사상 감기처방에 준해서 치료하면 너무 잘될것 같습니다.

요즘 신증플루 한의원이 이라는데, 광고라도 좀 해야할까봐요.

↳ 안준철 16:08

온병도 정의가 여러가지입니다만 결론적으로 말하면 윙기는 전염성 질환은 모두 온병에 해당합니다. 이번 신종 플루 역시 온병에 속하게 됩니다. 동무공의 시대는 구한말 나라는 망해가고 역질이 창궐하던 시기였습니다. 수세보원 전체가 온병 또는 역질과의 싸움이라고 할 수 있습니다. 그래서 갈근승기탕은 전염성 질환에 탁월하리라 여겨집니다.

이번 기회가 우리들이 솜씨를 보여줄 때가 아닌가 싶습니다. 수세보원 처방으로..

■ 중이염 열증

갈근승기탕을 2-3일 먼저 쓰고 (열다한소탕보다) 갈근조위탕에 가미하는 것이 좋다.

진물이 많으면 마황을 증량하고 대변을 매일 못 보면 대황을 증량한다.

치료되고 나서 일년에 4번 환절기 때마다 3년간 약 먹으라고 지도한다.

■ 태음인의 중이염

글쓴이: 안준철 <http://cafe.daum.net/an4sang/AK2v/24>

태음인 열증이고 평소에 갈근조위탕에 가미해서 철마다 녹용을 지어드시던 50대의 아줌마인데.....감기만 걸리면 중이염으로 악화되서 귀가 잘 안들리고 먹먹하고 심하면 농도 나오는 환자인데 갈근승기탕 2일먹고 귀도 잘들리고 가래 기침 오한도 같이 좋아졌습니다.

그런데 감기증상이 좋아진 건 말도 하지않고 귀가 좋아진 걸 엄청 좋아하시네요.

그동안 이비인후과에서 항생제를 아무리 먹어도 귀가 잘 안들렸는데 한약 감기약으로 귀가 좋아지다니.....환자가 의아해하면서 갈근승기탕 5일치를 더지어 갔습니다.
열다한소탕이나 갈근조위탕에 가미해서 마무리 해야될 것 같습니다.
(이때 비염에 준해서 처방합니다. 그러나 시간은 더 많이 걸립니다.)
한약이 원래 양약보다 잘 듣는 것인데.... 잘 쓸 줄 몰라서.....

■ [한줄게시판] 김봉찬 08.10.20 15:03

고3 남학생이 태음인같은데 열나고 토하고 복부압통이 심해서 갈근승기탕 3일치를 줬더니 열도 안나고 대변도 시원하게 보고 좋아졌습니다.
그런데 다음날 스트레스를 조금 받았더니 바로 토하고 더부룩하다고 해서 간기범위에 쓰는 갈근화위탕 3봉지 주고
다음날 나오라고 했는데 안와서 전화해보니 하나도 안아프고 밥도 잘먹는다고 안옵니다.
상태보고 한제 지어줄렀더니 껌... 약이 너무 좋은가 봅니다

■ 갈근조위탕과 갈근승기탕과의 비교

진짜 변비가 있을 때는 갈근승기탕(감기에 걸려서 열로 인해서 대변을 못보는 급증에 쓴다)을 쓴다고 알려져 있는데, 급증에만 쓰고 일반변비에는 거의 듣지 않는다.
감기로 인한 고열과 변비에 쓰면 변비는 안 풀리고 고열만 바로 떨어졌던 사례도 있었다.
열이 떨어지고 나면 설사를 하는데, 설사를 하면 약을 중단해야할 시점이다.
갈근승기탕. 열이 날 때는 이것을 써도 설사가 안 나고 열이 내리고 나면 설사가 난다.
이때는 약을 중단해야 한다. 외감약이기 때문이다.
열이 있을 때 대항을 쓰면 열만 내리고 사하작용은 못한다.

■ 열증의 두드러기

두드러기는 비위의 병이다. 갈근조위탕에 승마 1돈만 가해서 써도 충분하다.
급증에는 갈근승기탕을 준비해 두었다가 증상이 있을 때마다 급하게 복용하는 것도 좋은 방법이다. 갈근승기탕도 위열을 사하는 처방이다.

■ 태음인 아토피 환자에 관한 질문과 대답

태음인 아토피에 열을 내리기 위해 갈근승기탕을 먼저 쓰는 경우도 있다(질문원장).
아토피 환자에게 갈근승기탕을 5일분 투여했는데 피부가 더 심해지는 경우가 있더라는 질문에
대해
→ “리열이 확실하지 않는 상태에서 승기탕을 쓰면 중기가 하함됩니다.
그러면 병이 교착상태에 빠져 회복될 기회를 잃어버립니다”

■ 열증의 여드름

<http://cafe.daum.net/an4sang/4GIU/134>
여드름의 색이 붉습니다. 붉으면 열증입니다.
갈근조위탕에는 온보하는 약물이 많다. (오미자 길경 맥문동 행인 모두 온보하는 약물이다).
온보하는 약을 쓰면서 열이 제거되기를 기대하면 안 된다.

갈근승기탕으로 먼저 사하한다.

(원방으로.....나복자는 쓰지 않는다. 나복자가 없는 경우가 열을 제거하는데 더 효율적이고 가래가 많아서 거담해야 할 경우에는 나복자를 가하는 것이 좋다.

나복자는 원래 강기거담하고 소식하는 약이다.

이는 표본완급과 관련된 것으로서 급하면 표를 다스리고 급증이 해소되고 나면 근본을 다스려야 한다는 의미이다). 그 다음에 열다한소탕으로 조리하고, 마지막으로 갈근조위탕으로 정리한다. 설사가 나더라도 물려서면 안 된다. 열증이면 설사가 나아 확 좋아진다.

■ 갈근승기탕은 태음인 변비에는 듣지 않는다.

태음인 열증이 확실합니다. 갈근승기탕은 외감약입니다.

감기에 쓰면 해열이 빨리되고 콧물 가래 기침 인후증상 등이 신속히 해결됩니다.

(감기에 갈근승기탕을 쓰면 설사가 전혀 나지 않습니다. 외감이 해결될 시점이 되면 약간씩 변이 묽어지기 시작합니다.

설사가 나면 감기가 다 나았다고 생각하면 됩니다.)

* 한 가지만 더 말씀드리면요, 갈근승기탕도 변비에 잘 안 씁니다.

고본이 빠지고 대항이 들어간 약인데 변비에 안 들어요.

제가 무척 많이 써봤는데 한 번도 성공한 적이 없어요.

그런데 변비가 전혀 없는 상황에서는 재미를 좀 봤거든요.

감기로 인한 고열이 날 때 대항을 2돈 넣어쓰니까 설사도 안 나면서 열이 푹 떨어지더라구요.

그런 식으로 해결한 예가 많아요.

특히 어린이들 경기가 나고 고열이 되서 문제가 되고 그럴 때.

고열이 날 때는 대항을 아무리 써도 설사가 안나거든요.

열을 신속히 떨어뜨렸을 뿐이라는 거죠.

변비가 있을 때는 갈근승기탕이 아니라 갈근조위탕에 대항을 증량해서 써야합니다.

■ 한줄메모장

지황백호탕 역시 소양인의 외감약입니다. 효능은 갈근승기탕과 같습니다. 전혀 변비에 듣지 않습니다.

팔물군자탕 역시 갈근승기탕이나 지황백호탕과 주치와 효능이 같습니다. 외감약입니다.

소음인의 변비에는 하기하는 목향 지각이 위주가 됩니다.

당귀나 흑호마(검은깨)를 윤장할 목적으로 쓰기도 합니다. 18:06

■ 구안와사

<안준철> 태음인 열증으로 보여집니다.

구안와사 초기에는 갈근승기탕을 씁니다.

구안와사 초기에는 외감에 준해서 표증약을 2-3일 먼저 씁니다

■ 감 먹고 심한 변비 부작용난 태음인 한증 할머니, 갈근승기탕을 쓴다.

감을 먹고 부작용을 난 사람을 봤는데요, 태음인 한증의 할머니가 있어요.

평생 변비가 안 된 사람인데요, 배가 풍선처럼 부풀어 올라서 왔어요. 이유가 뭐냐면, 밥을 머

칠 동안 안먹고 대신 감을 먹었대요. 근데 그 할머니 상태가 심각했어요.
 배는 부풀어 오르고 손도 차고, 죽을 지경이죠.
 태음인 한증이니까 그런 경우에는 당연히 태음조위탕에다가 갈근 승마를 써야되겠지요?
 근데 그거는 완병에 쓰는 것이고, 그때에는 갈근승기탕을 써야되요.
 대황 이런 걸 써가지고, 설사를 한번 시켜야 되요.
 약을 써서 설사가 한번 나오면 그때부터 약을 중단하고,
 태음조위탕에다가 갈근 승마가 든 약으로 조리를 해야합니다.
 그 당시에는 갈근승기탕을 썼어요.
 지금 같으면 그렇게 안쓰고 갈근조위탕에다가 대황을 증량해서 썼겠지요.
 실제로 감을 먹고 탈이 많이 나는 체질은 태음인이 제일 심하고 소양인도 좀 문제가 되고,
 태양인은 감을 많이 먹어도 별 문제가 없어요.
 포도 같은 경우도 태음인이 먹으면 속이 아린다고 그러고 속이 불편하다고 해요. 그런 경험해 보셨어요?
 감, 꽃감, 감식초도 모두 마찬가지예요. 감식초먹고 배가 너무 괴롭다고 하는 경우도 있어요.
 식초 같은 것도 재료가 무언가에 따라서 어느 체질인지가 다 달라집니다.

 이상은 갈근승기탕에 대한 글모음

태음인 vs 태양인 음식 반응 문진 요령 중 하나...

태음인의 경우 음식반응을 확인할 때 회나 해산물을 안주로 술을 먹으면 더 많이 빨리 취하고...그 다음날 술이 잘 안 깨는 현상이 있는지 확인해 보시면 좋습니다.
 태음인만 해산물 안주에 약합니다.

vs

태양인은 조개나 해산물 등에 아주 좋은 반응을 나타냅니다. 술을 마시는 사람이면 이렇게 문진하는 것도 좋은 요령입니다.

 참치나 고등어 연어 등의 붉은살 생선은 소음인 음식으로 분류가 됩니다만
 태음인은 전반적으로 해산물에 약한 거 같습니다.
 민물조개 갈치 홍어 가오리 상어는 확실히 태음인에게 유익한 생선입니다.
 태음인 할아버지 한분은 홍어 삭힌 거 드시면 소화가 잘되고 체기도 내려가고 속이 그렇게 편해진다고 합니다.ㅋ

갈근조위탕의 해독작용

아래는 모두 태음인열증환자입니다.

1. 차증이 개선된 경우

개원후 갈근조위탕을 드신 환자분들이 재진시 몇케이스에서 '평소 잦은 오한과 몸살기'가 개선되었다는 얘기를 들을 수 있었습니다. 대항을 2~3돈 쓴 경우도 있어서, 긴가민가 했더랬습니다.

2. 주소증이 '자고 일어나면, 매번 삭신이 쑤신다'는 73세 할머니

갈근조위탕에 산약 2, 연자육 2로 호전되었습니다. 아예, 없어졌다고, 할머니 엄지손이 치켜올라왔습니다^.^;

3. 42세 여환

원래 문제 없었는데, 생계상, 몇달전부터유독가스가 나오는 공장에서 일하고 나면서(자동차타 이어관련), 일주일에 2~3번은 '오한과 몸살'로 꿈쩍을 못한다고 내원했습니다.

초기 갈근승기탕 5일분 - 전화 문의시 별무 호전

후기 갈근조위탕 10일분 - 아무 소식이 없어, 유독가스로 인한 경우라 긴가민가하고 있었는데, 우연히 식당에서 만나서 여쭙보니, 좋아졌다고 웃었습니다.

오한몸살이 감기와 같은 외감병이 아닌 경우에 '갈근조위탕'이 효과적인 것 같습니다. 또한, 안선생님이 말씀하신 태음인 열증의 리열이 풀리면, 표한증도 해결될 수 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 감사합니다~

약물의 체질 적합판정 여부, 주소증의 호전의 정도가 아니라, 피로감, 대소변상태, 수면으로만 살펴됩니다. 환자는 주소증만 보려고 합니다. 똥똥 떠다니는 느낌은 신허증입니다.

약 먹고 가려운 경우에는 이담화위하는 감국온담탕 혹은 청호온담탕을 쓰는 것이 좋다.

시호소간탕을 먹고 나른해 하는 데 대해

두 가지를 생각해 볼 수 있습니다.첫째 이 분은 소양인이 아닐 수 있습니다.(소양인 아니면 소음인인데 소음인의 가능성도 많이 있습니다.) 둘째로는 소양인이라도 허증이면 시호소간탕을 쓰면 안 됩니다. 허증맥이면 대맥소간탕을 씁니다. 패증의 원인은 전자일 가능성이 더 많습니다. 즉 소음인 가능성이 더 많습니다.

주소증이 흉번, 심계, 상열한출, 백자양심탕으로 생긴 약진--> 자노아를 거하고 보혈하고 심장의 통증을 잡아주는 단삼을 가한다.

주소증 흥번. 심계 상열한출(1달전 아들을 잃고 나서.)

2월23일. 조위승청 가 갈근 승마(대변 일3회. 커피영향 없다고 함)

-> 약 드시고 조금 나아졌다고 함.

3월24일. 심음허로 보고 백자양심탕(커피에 불면하다고 말 바꿈.)

->약 복용 후 목 부위에 약진같은 피부발진이 생겨 복용 중단함.

피부 알려지 기왕력 없음.

환자분은 저번 약(조위승청)으로 바꿔 달라고 하고, 상황은 열증이고, 이것 어떻게 해야 현명 할까요? 체질은 태음인 맞죠?

(안) 태음인이 확실해 보입니다. 백자양심탕의 자노아는 약간의 독성이 있습니다. 자노아를 거 하고 보혈하고 심장의 통증을 잡아주는 단삼을 가하는 것이 좋겠습니다.

갈근조위탕으로 속이 불편하면 위음허증으로 접근

형방지황탕으로 설사가 나면 소양인이 확실히 아니다. 태음인으로 접근....

소양인약으로 졸립고 취한 반응이 나오면 태음인일 가능성이 높다.

가래 기침 천식 등에 내상약인 갈근조위탕은 쓰지 않는다. 기침에는 외감과 관련있는 열다한 소탕에 행인 상백피 백과초 마황 대황등을 가한다.

갈근조위탕은 내상약입니다. 기침에는 외감과 관련있는 열다한소탕에 행인 상백피 백과초 마 황 대황 등을 응용합니다.

--> 네..소화기 상태가 너무 안 좋은 듯 하여 식적해수의 가능성이 있다고 봐서 갈근조위탕 처방했었는데 틀렸군요..정말 감사드립니다. 요즘 부쩍 선생님의 존재를 더 크게 느낍니다.

조위승청탕을 잘 먹고 결과도 좋았으나 태음조위비염방 먹고 부작용이 많이 생긴 할머니

태음조위탕 가 산약 연자육 갈근 각8, 승마 포공영 조각자 녹각 위령선 각4, 홍화 전충 녹용 각2. 먹고 울렁거리고 토하고 식욕부진

(안)

조위승청탕을 잘 먹었으면 태음한증은 맞는 것 같습니다. 한증에는 일반적으로 산약이나 연자 육을 한 돈 이하로 씁니다. 포공영 녹각 조각자도 열증약이라서 한증에는 용량을 적게 씁니다. 홍화도 위품이 많이 유통됩니다. 소화장애 일으킵니다. 전충은 반드시 염분을 제거하고 써야 합니다. 위령선도 소화장해를 일으킵니다.

소음인이 갈근조위탕 가감방을 먹고 복통 설사 등의 반응을 보인 예.

1. 73세 할아버지

주소증 : 장판지통 - 족번열

사우나 : 오래 못 있음/ 맥 : 유신..

소화 : 소화제 거의 먹지 않음/ 상복부 가스감 없음

소변 : 전립선약 먹고 있음/ 현재는 문제없음

대변 : 1회/ 1일/ 변비없었음

커피 : 불면/ 대부분의 음식 아무런 문제없다.

태음인으로 보고 갈근조위탕 가 산약 2, 연자육 2, 곡기생 1, 전충 2푼(고관절통, 슬통) 썼습니다. 약 하루치 먹고 밤새도록 복통, 설사로 병원 가서 링겔 맞았다 합니다.

제가 한의원 휴가로 연락이 되지 않아, 이틀 쉬었다가 이번 월요일 약을 재복용, 2봉 먹고, 설사를 엄청 쏟아내고선 탈진.. 입원해 있다고 연락왔네요...;;

갈조먹고 설사한다는 얘기가 종종 듣지만, 탈력감이 심하고, 물설사를 쪽쪽 쏟아낸다고 하니, 그냥 넘기기 힘들어서 글 올립니다. 고견 여쭙습니다~~

안준철08.08.06. 16:07

커피에 불면이라서 태음인이라면 열증이 맞습니다. 태음인 열증은 이런 반응이 없습니다. 이분은 소음인이라고 봐야 됩니다.

잘 못 자던 사람이 갈근조위탕을 먹고 잠이 너무 온다고 하면 매우 좋은 반응이다.

예전에 소음인이라 생각하고 약을 몇 번 지어드렸던 분입니다...;

두통도 잦으시고 불면이 심하신 분입니다. 성격이 좀 예민한 편이라 기운 없고 해도 신경쓰시면 수면제로도 잠이 안 오셔서 밤을 꼴딱 새신다고 하십니다.

얼마 전부터 헬스를 하시는데 헬스하신 후로는 약 드시면 잠 잘 온다고 하시네요..

얼마 전에 넘어지시면서 오른손목 골절이 되면서 어깨도 아파서 검사해봤더니 양쪽 어깨 관절에 석회화가 된다고 하십니다.

대변은 2~3일에 한번, 매실액 드시면 좀 낫다고 합니다. 평소에 변비가 심하신 편입니다.

소변이 특이하게도 94년도부터 검사상혈뇨가 나온다고 하십니다. 소변색깔에 이상은 없으나 현미경검사상 적혈구가 검출되는..아픈곳이 많고 조금만 무리하면 몸살을 잘 앓으시네요..

불면이 심하시나 커피는 드신다고 하네요. 별 반응 없으시구요..

몸도 잘 붓고요..예전에는 막연히 피부가 기운이 없고 푸석한 두부살에 흰 피부라 소음인이구나라고 생각했었는데 오늘 다시 만져보니 푸석하긴 하지만 약간 두꺼운듯 하고..

얼굴형도 딱히 소음인이라고 하기엔 뭔가가 부족한듯 하여...태음인이 아닌가 하여 올려봅니다..예전에 소음인약을 종류별로 골고루..써봤는데 별 반응 없으셨고 그냥 기운이 나는 정도??였던것 같습니다...

태음인 열증으로 보고 갈조(대황은 3푼)가 포공영, 승마, 황금 한돈 해서 드렸습니다.
한 일주일 드셨는데 속이 너무 편하시고(평소 소화가 잘 안되서 소화제를 상용하셨다네요.),
잠도 너무 잘 주무신다고 하시네요.. 어제 물어 보시기를 잠을 너무 잘 잔다고... 낮에도 3~4
시간씩 계속 잤다고 하시네요..두통은 원래 심하셔서 두통약을 잘 드시는데 약한 두통이 좀 있
긴 하다고 하십니다..
낮에도 주무시고 밤에도 너무 잘 잔다고 하시는데.. 이것을 순반응으로 볼수 있는지요?
평소에 너무 못 주무셨던 터라 우선은 좋다고 말씀드렸는데...궁금해서 올려봅니다.

정용재08.05.16. 11:39

너무너무 좋은 반응이죠.^.^ 호전 반응 중 잠이 쏟아진다는 걸 많이 봅니다. 치유라는 자기회
복기전을 돌리기 위해 몸은 수면현상을 이용합니다. 치유에너지의 낭비를 최소화시키는 겁니
다. 움직이는 기계 고치는 거보다 쉬는 기계 고치기가 훨씬 쉬운 거지요. 잠은 치유입니다. 몸
이 많이 회복되면 저절로 잠은 줄어듭니다. 생활에 지장이 될 정도로 잠이 쏟아지면 복용량을
반으로 줄이게 합니다. 대신 회복속도는 더디다, 니가 선택해라고 얘기해 드리죠. 최근 복약
후 수면에 대한 경험이 생겨 한마디 거들어 봅니다. ^.^;

안준철08.05.16. 11:51

그렇습니다. 식적이 있으면 횡격막을 밀어올리고 심장을 압박하고 교감신경을 항진시켜서 불
면이 유발됩니다. 식적이 대변으로 나가면 정신적으로 안정되고 긴장이 소실되어 잘 자게됩니
다. 오장 육부가 쉴 수 있는 환경을 만들어 준겁니다. 최고의 반응입니다. 이런 경우 고지혈이
나 고혈당 고혈압 등이 동시에 소실됩니다.

사람은 누구나 잠자고 쉴 때 회복됩니다. 쉬고 싶어도 쉬지 못하고 자고 싶어도 잘 잘 수 없
는 상황이 가장 나쁜 것 입니다. 몸과 마음이 쉬면 이미 병은 회복의 길에 드러섰습니다.歇即
菩提(혈즉보리,수능엄경에 나오는 말입니다. 쉬는 것이 깨달음이다. 심신이 쉬면 이미 부처가
되는거죠.)

실제로 식적만 해결되도 고혈압 고혈당 고지혈증 부종 불면 피로 무기력 두통 요통 견비통 피
부병 수족궤냉등 무수한 증이 개선됨을 임상에서 확인할 수 있습니다. 물론 원전에 있는 이야
기입니다. 그래서 적게 먹어야 오래 삽니다.

**태음인이 청심연자탕 먹고 속이 불편한 것은 위장이 약해서 그런 것. 갈근조위탕으로 먼저 조
리한다.**

이제 이 정도면 태음인으로 보이는데, 오랫동안 독지 가감을 잘 드셔오신 분이랴
확인차 올립니다. 피부는 두껍게 집히는데 사우나만 하고 오면 몸살에 걸린다고 하네요.
부정맥, 심계가 심해 과거에 치료했었는데, 선물 받은 보이차를 드신 후 희한하게 좋아지셨습
니다. 보이차가 녹차 대업을 발효한 거네요. 이게 태음인에 맞을까요.a
식후 가스 있고 변비 있었습니다. 소양인 아니죠?

아직 가끔 부정맥, 심계가 있다하여 청심 원방을 처방했습니다.

앞서 갈근조위탕 하루치 처방했는데 아무 무리없이 드셨구요.

그런데 청심을 먹으니 속이 훑으면서 기운이 쏙 빠지고 헛땀까지 나신다는군요.

이 무슨 당혹스러운 반응입니까? 간단히 처리를 해드리긴 했는데, 아무래도 이상해 문의드립니다. 처방의 문제일까요?

안준철

위가 매우 나쁜 사람입니다. 갈근조위탕으로 위를 먼저 회복하고 청심연자탕을 다시 먹으면 아무 문제없습니다. 위가 너무 나쁘면 거담하는 약미가 많은 청심이 문제되는 경우가 드물게 있습니다. 갈근조위탕을 5-10일 정도 먼저 써서 위를 좋게 하자고 하면 환자들도 이해합니다. 염려 마세요.

태음인 열증의 설사에 갈근조위가감방을 썼는데 설사를 지속하는 경우

--> 대항량을 인경약으로 1g이하로까지 줄이고 청열약인 승마 포공영을 빼야 한다.

밥맛이 없고 한 달 전부터 살이 너무 빠져서 오셨습니다. 소화는 더부룩하고 고기 드시면 잘 체한다고 하시네요. 밀가루 음식 드시면 헛배부르구요. 속은 허하신데 밥은 한 숟갈 들어가면 더 먹고 싶지 않다고 하네요. 예민하셔서 지난번엔 불면으로 침치료를 몇 회 받으셨었습니다. 예민하시니 신경 쓰면 잠 안 오고 소화도 잘 안되고요.

대변은 하루 한번정도 보는데 속이 안 좋으면 하루 여러 번 설사를 하신다고 합니다.

며칠 전부터 설사 하셔서 병원약 먹고 좀 나아지셨다고 하시네요.

땀은 많이 안 나고 사우나 가시면 답답하시다고 합니다.

12년전 뇌출혈로 쓰러지셨고 커피 드시면 잠 안 오고 박카스도 잠이 안 와서 안 드신다고 하십니다. 헛바닥이 아프고 헛바늘 같은 게 돌으면서 혀가 부은듯 하더니 그후 밥맛이 없어져서 한 달이 지났다고 하시네요. 감기는 일 년에 한번정도인데 한번 걸리면 오래 간다고 하십니다. 혈압은 174/88 정도로 혈압약 드시는 중이라고 합니다.

태음인으로 볼수있을까요? 턱모양이나 등모양 등으로 봤을때 소양인도 의심됩니다..

체질감별 토론방에 예전에 올렸던 분입니다..

설사를 계속하신다고 하셔서 커피반응과 예전 대변상태를 보고 태음인 열증으로 보아 갈근조위탕가 승마,포공영으로 처방을 했는데.. 그동안 소식이 없으시더니..

약을 먹고 계속 설사를 하셨다고 하시네요.. 그래도 약은 거의 다 드셨다는...;

하루 3봉 먹고 설사가 지속되서 양방병원약 먹으면서 한동안 띄었다 드시기도 하고..

그런데 설사가 하루 여러 번, 자다가도 가신다고 합니다. 한꺼번에 많이 보시는 게 아니라 조금씩 자주 보신다고요..한열의 구분이 잘못된 탓일까요?--;;

정용재

대항을 줄여 쓰셨어야죠. ^^;

아 처방수정..입니다.-대황5푼으로 줄이고 산약,연자육도 가미했는데.. 아무래도 이 둘의 영향
일까요??

안준철

주소증이 설사인가요? 대황을 더 적게 1그램 이하로 써야 됩니다. 그리고 승마는 발산력이 있지만
청열약입니다. 포공영도 청열 해독하는 약입니다. 설사에는 성질이 차가운 승마 포공영
을 쓰게 되면 곤란합니다. 한열은 정확히 가려졌습니다. 열증의 설사에 대황이 빠지면 안됩니
다. 인경약입니다. 최소한으로 줄여서 쓰면됩니다.

류씨태음조위탕과 의인건비탕 비교. 류씨 태음조위탕은 태음병 소음병, 의인건비탕은 비기허
에 쓴다.

* 건비탕: 의인초 건을 산약초 원육 나복자초 오미자증 석창포
초와 증 등 법제를 많이 했습니다. 비기다운된 것을 올려주는 개념으로 쓰시는 거 같습니다

* 류씨태음조위탕: 의인 건을 나복자 신곡 오미자 오매 석창포 유근피
초와 증은 없습니다. 신곡 오매 유근피가 특징인거 같습니다. 온중산한 온양보허 건비화습

어떤 환자가 어떤 상태일 때 specific하게 가려서 쓸 수 있을지 가르쳐 주세요
소화장애 태음인 한증인데 복통 설사 등도 함께 있을 때 쓰는 거 같은데요
상당히 좋은 처방으로 느껴집니다. 감사합니다

안준철09.04.20. 14:53

류씨태음조위탕은 태음병 소음병에 쓰입니다.(즉 배가 냉해서 설사를 잘 할 때 쓰게 됩니다.)
건비탕류는 비기허에 쓰입니다. 비기허는 면색 창백 음식부진 사지권곤 등의 증상이 있으나
설사하는 태음병 소음병과 구분됩니다.

태음인 청심연자탕증인데 대변이 변비 경향이라면? 갈근 승마로 청열하고 부족하면 대황을 가
한다.

태음인 열증 청심연자탕증인데 대변을 2~3일에 한 번씩 본다면지 아니면 대변이 딱딱하고 안
시원하다던지.....대황을 그냥 가미하면 되나요?

청심연자탕에 산약 연자육 등은 수렴하는 약인데 대황은 사하하는 약이라서 저어하게 되는데
요....아니면 그냥 갈근조위탕에 청심연자의 의미로 황금 등을 가미하시나요?

다른 원장님들은 이런 경우에는 어떻게 하시나요? 고견 부탁드립니다. 감사합니다.

안준철09.04.16. 18:40

청심연자탕증이 뭐라고 생각하세요?

김상인청심연자탕증이라기 보다는 카페 자료에 나와있는 청심연자탕이 쓰이는 증상들에 해당할 것 같습니다. 예를 들자면 심장질환, 칠정병 등등.....보통 이런 경우 처방하신 경험레가 청심연자탕을 쓰는 것 이외에 갈근조위탕에 가미한 것도 있었습니다. 굳이 변명을 하자면 청심연자탕을 써보고 싶는데 대변이 걸리는 경우의 해결방법이 궁금해서입니다. 감사합니다.

안준철09.04.16. 22:37

변비가 있으면 기본적으로 갈근 승마 등의 약물로 청열합니다. 부족하면 대황을 가합니다.

태음조위탕 드시고 대변이 시원치 않다면 열증일까요? 한열이 섞인 경우로서 갈근 승마를 가하거나 혹은 마황을 빼고 조습하는 건물을 1돈으로 내릴 수 있다. 생냉지물에 상한 것이 아니면 태음조위탕에서 마황을 빼도 무방하다.

태음조위탕 드시고 수면, 소화, 흥민감, 경계감 등등은 전혀 없는데 대변만 양이 줄고 뭔가 시원한 느낌이 안 든다고 합니다. 변비경력 전혀 없고 커피반응도 없다고 하신데다가 테스트약 이틀치 드릴 때도 별 문제 없다고 하셨는데 태음조위탕 며칠(일주일) 드시더니 그런 말씀을 하시네요. 이런 경우도 열증일까요?

안준철

태음조위탕 원방에서 이런 반응이면 태음인 한증이 맞습니다. 소증은 한증이나 내열이 있어서 대변이 시원하지 않게 됩니다. 갈근 승마 등을 가하면 됩니다. 또는 마황을 빼거나 조습하는 건물을 1돈으로 내릴 수 있습니다. 이 경우는 한증에 열이 협한 경우라고 보시면 됩니다.

전창환

아, 그렇군요... 정말 중요한 말씀입니다!! 감사합니다!! 그런데 마황을 아예 빼도 괜찮을까요? 독지에서 목단피처럼 태음조위탕하면 마황이 켈 중요할듯한데요...

안준철

마황은 생냉지물에 상했다고 보고 쓰여진 약미입니다....위장이 감기든 상태입니다. 그래서 해표하는 마황을 썼습니다. 생냉지물과 관련이 없으면 마황을 안 쓰는 것이 더 좋습니다.

독활지황탕의 목단피는 직접 식적을 없애는 작용을 합니다. 방풍은 승거작용을 합니다.(중기가 하함된 걸 위로 끌어올립니다.) 독활은 한증에게 따뜻하게 해주고 거습합니다.(강활 독활이 후세방에서는 찬 약이지만 소양인에게는 한습을 없애는 따뜻한 약미입니다.) 형게 방풍은 풍열에 쓰여서 찬 성질의 약입니다. 풍열을 날려 보냅니다.(어찌되었든 차게 합니다.) 강활 독활은 한증약...형게 방풍은 열증약으로 기억하면 됩니다.

사백산을 먹고 가스가 찬다고 하면--> 설사가 아니면 별 문제 없다.

51세 여자분이고 평소 과로를 하셔서 보약을 썼으면 좋겠다고 하신 분입니다

스트레스 잘 받으시고, 눈 뻑뻑한 느낌이 있는 분인데요

평소 가스 차는 느낌은 없다고 하셔서 소양인 중에서도 열증이라 보고 사백산 3일치를 드렸습니다...그리고 연휴 끝난 오늘 어떠신지 전화해보니 소화, 수면, 대변 등등 별 문제가 없는데

방구가 많이 나온다고 하시네요. 약 맛이 쓰게 느껴지고요...

유주열 쌤 책 찾아보니 태양인이나 소양인 가운데 한증인 경우에 가스 차는 느낌이 들 수 있다고 하시던데요...태양인 가능성은 거의 없고 소양인으로 생각되는 분이어서요...

사백산 드시고 방구 많이 나온다고 하신 분은 처음이라서 혹시 한증이 이럴 수 있나 싶어 질문드려봅니다. 아니면, 열증이라도 잠깐 이럴 수 있나요? 그냥 쪽 밀고 나가볼까요?

안준철 08.09.16. 16:20

소양인이 확실하다면 설사가 아니면 별문제 없겠습니다.

갈근승기탕 먹고 소변이 붉게 나올 수 있을까요?

저희 직원인데요... 갈근승기탕 먹고 소변이 붉게 나왔다고 합니다

저도 가끔 먹는 약인데 저는 한 번도 그런 적이 없어서 여기에 문의드립니다

갈근승기탕이나 갈근조위탕 먹으면 저 같은 경우는 항상 맑은 노란색(갈근조위탕)이나 진한 노란색, 또는 약간 갈색을 띠는 노란색(갈근승기탕)으로 소변이 나오는데요...

예전에 권승만 원장님이 여자분께 갈근 조위탕 쓰고 소변이 갈색으로 나왔다고 한 글을 본 적이 있었는데요...안선생님과 다른 원장님들 이런 경험 해본 적 있으신가요?

그리고 이런 경우 별 문제는 없을까요?

(제 짧은 소견으로는 대항의 용혈작용 때문이 아닐까? 하는 생각이 드는데요)

안준철

갈근조위탕이나 갈근승기탕 복용후 소변에 한약 냄새가 난다거나 소변색이 노랗게 변한다는 이야기는 많이 듣습니다. 그러나 소변이 붉어지거나 혈변을 경험한 적은 없습니다.

■ 변증별 처방정리

제1절 외감병변증

1. 四時傷寒辨證

1) 초기

- ① **風寒束肺證** [咳嗽, 咯痰清稀, 鼻塞, 流清涕, 聲重, 噴嚏, 頭痛, 惡寒發熱, 無汗, 周身酸痛, 舌苔薄白, 脈浮緊]
- 태음인(열-가감갈근해기탕 / 한-유씨한다열소탕혹가자완, 갈근해표탕)
소양인(열-이씨형방패독산 / 한-방풍해표탕)
태양인(열-유씨오가피장척탕 / 한-잠사해표탕 或이향정기산)
소음인(열-가감천궁계지탕 / 한-이씨곽향정기산가신이)
- ② **風熱犯肺證** [發熱, 微惡風寒, 咳嗽痰黃稠, 咽喉疼痛, 鼻流濁涕, 口渴喜飲, 氣喘, 鼻煽, 煩躁不安, 舌質紅, 苔黃或黃膩, 脈浮數或滑數]
- 태음인(열-갈근청열탕가노근, 백부근청열탕가노근 / 한-자완청열탕)
소양인(열-은교청열탕 / 한-방풍청열탕가시호)
태양인(열-오가피청열탕 / 한-잠사청열탕)
소음인(열-황기청열탕 / 한-소엽청열탕)
- ③ **燥邪傷肺證** [乾咳無痰, 鼻燥咽乾, 痰少而粘, 咳痰不爽, 咳引胸痛, 咯痰帶血, 惡寒發熱, 頭痛, 身楚, 舌質紅少津, 苔薄黃而燥, 脈浮細數]
- 태음인(갈근청열탕가천문동 비파엽, 백부근청열탕가행인 사삼)
소양인(은교청열탕가천화분)
태양인(오가피청열탕거향유 가옥죽 문합)
소음인(황기청열탕거총백 반하 가호마인)

2) 후기

- ① **肺經風熱證** [鼻塞, 鼻流黃涕, 後鼻漏, 咳嗽痰黃稠, 口乾, 喉痒, 煩躁, 或皮膚搔痒, 舌質紅, 苔黃燥, 脈浮數或滑數]
- 태음인(열-갈근청열탕, 백부근청열탕 / 한-자완청열탕)
소양인(열-은교청열탕 或가백화설초 / 한-방풍청열탕)
태양인(열-오가피청열탕 / 한-잠사청열탕)
소음인(열-황기청열탕 / 한-소엽청열탕)
- ② **寒痰擾肺證** [咳嗽喘促, 痰稀清白, 咯出容易, 身冷惡寒, 胸膈滿悶, 口淡不渴, 舌苔百潤, 脈沈遲]
- 태음인(마황보폐탕거산약 가자완백부근, 사삼보폐탕거산약 가자완백부근)
소양인(방풍차전자탕)
태양인(아삼온폐탕거산앵도인 비해 가곽향 시체)
소음인(계지반하생강탕가세신)

2. 六經辨證

(1) 太陽證

1) 太陽經證

- ① **太陽中風證** [惡風寒, 發熱, 自汗, 頭項强痛, 鼻鳴乾嘔, 舌苔薄白, 脈浮緩]
- 태음인(열-가미해기탕<氣喘痰多중용행인, 腹滿痛拒按便秘가대황, 腹滿時痛喜按가라복자, 心下滿微痛 小便不利가라복자 유근피> / 한-유씨한다열소탕<기천담다중용행인가절패모, 복만통거안변비중용갈근, 복만시통희안중용의이인건울, 심하만미통 소변불리중용의이인라복자>)
소양인(열-이씨형방패독산가석고중용방풍<기천담다가과루인, 복만통거안변비용형방

사백산, 복만시통희안중용복령생지황 불중용방풍, 심하만미통 소변불리중용생지황 불중용방풍> / 한-방풍해표탕<기천담다용방풍차전자탕가과루인, 복만통거안변비가석고, 복만시통희안중용복령가택사, 심하만미통 소변불리중용복령가택사>)

태양인(열-오가피쌍해산<기천담다가구인, 복만통거안변비가도인, 복만시통희안가교맥軟棗미후도, 심하만미통 소변불리가백모근 연조미후도> / 한-목적쌍해산<복만통거안변비가도인, 복만시통희안가교맥백편두, 심하만미통 소변불리가곽향저두강>)

소음인(열-황기계지탕<기천담다가반하, 복만통거안변비가지실或선용파두一粒, 복만시통희안중용작약, 심하만미통 소변불리가백출지실> / 한-계지탕<기천담다가후박, 복만통거안변비가지실或선용파두반립, 복만시통희안중용작약, 심하만미통 소변불리가백출대복피>)

② **太陽傷寒證**[惡寒, 發熱, 無汗, 頭項強痛, 身痛腰疼, 氣喘, 嘔逆, 脈浮緊]

태음인(열-가미발표탕<喘咳嘔逆 痰多 小便不利加拉복자 백부근, 下利或嘔逆重用갈근 가라복자, 煩躁不得臥用갈근해기탕> / 한-마황발표탕<項強加갈근, 천해구역 담다 소변불리가훼백 오미자, 하리或구역가라복자 의이인, 번조부득와중용황금가갈근승마>)

소양인(열-이씨형방패독산중용형개가석고<천해구역 담다 소변불리중용복령가택사 불중용형개, 하리或구역중용복령가택사 불중용형개, 번조부득와불중용형개> / 한-방풍해표탕<천해구역 담다 소변불리용방풍차전자탕가택사, 하리或구역중용복령가택사, 번조부득와가치자>)

태양인(열-유씨오가피장척탕<천해구역 담다 소변불리가문합 연조미후도, 하리或구역가연조미후도, 번조부득와가구인> / 한-잠사해표탕<천해구역 담다 소변불리가洋蔥皮, 번조부득와가구인 獼猴梨葉>)

소음인(열-천궁계지탕가소엽<천해구역 담다 소변불리가반하, 하리或구역가반하, 번조부득와가인진> / 한-궁귀향소산<천해구역 담다 소변불리용이씨곽향정기산, 하리或구역용이씨곽향정기산, 번조부득와가인진>)

2) **太陽腑證**

① **膀胱蓄水證**[小便不利, 小腹脹滿, 發熱, 惡風, 自汗, 渴不欲飲, 飲入即吐]

태음인(열-상지부평탕 / 한-마황부평탕)

소양인(열-유씨저령차전자탕가석고 / 한-유씨저령차전자탕)

태양인(열-오가피쌍해산가우슬백모근 / 한-목적쌍해산가우슬비해)

소음인(열-이씨이중탕거건강용계지1.0가지실 / 한-이씨곽향정기산중용백출대복피)

② **膀胱蓄血證**[太陽病不解, 小腹脹滿, 急結硬痛, 如狂喜忘, 小便自利, 舌紫脈澀]

태음인(열-갈근승기탕가포황 / 한-의이인승기탕가포황)

소양인(열-지황백호탕용석고2~3.0가목단피 / 한-선용지황백호탕용석고1.0가목단피 후용형방지황탕대생지황가목단피)

태양인(열-석옥승기탕가도인 / 한-미후도승기탕가도인)

소음인(열-선용파두일립 후용팔물군자탕 / 한-선용파두반립 후용이씨곽향정기산가당귀천궁)

(2) **陽明證**

① **陽明經證**[不惡寒反惡熱, 煩渴引飲, 蒸蒸汗出, 心煩譫語, 氣粗如喘, 舌苔黃燥, 脈洪大]

태음인(열-열다한소탕 / 한-의이인승기탕거대황)

소양인-저령차전자탕

태양인(열-석옥승기탕 / 한-미후도승기탕)

소음인(열-이씨보중익기탕 / 한-승양익기탕)

- ② 陽明腑證[日晡潮熱, 汗出不止, 腹滿拒按, 煩躁譫語, 循衣摸床, 驚惕不安, 大便秘結難下, 苔黃焦燥起刺, 脈沈實有力]

태음인(열-갈근승기탕 / 한-의이인승기탕或가조협)

소양인-지황백호탕

태양인(열-석옥승기탕 / 한-미후도승기탕)

소음인(열-선옹파두일립 후옹팔물군자탕或독삼팔물탕 / 한-선옹파두일립 후옹승양익기탕)

- (3) 少陽證[口苦, 目眩, 寒熱往來, 胸脇苦滿, 咽乾, 默默不欲食, 喜嘔, 心煩, 舌苔滑白, 脈弦]

태음인(열-갈근해기탕가라복자<兼陽明腑證用열다한소탕가대황, 兼太陰證加의이인> / 한-한다열소탕<兼太陽證用유씨한다열소탕, 兼陽明腑證加갈근대황>)

소양인(열-형방도적산가시호或형방사백산<겸양명부증용형방사백산중용석고> / 한-유씨소시호탕<겸태양증용방풍해표탕가시호, 겸양명부증용형방사백산중용석고>)

태양인(열-유씨오가피장척탕<겸양명부증용석옥승기탕, 겸태음증용미후도식장탕> / 한-잠사해표탕가용담초<겸양명부증용미후도승기탕, 겸태음증용이향정기산>)

소음인(열-계지반하생강탕가인진<겸태양증용황기계지탕가반하, 겸양명부증선옹파두반립 후옹팔물군자탕, 겸태음증용유씨인삼양위탕중용반하> / 한-이씨곽향정기산<겸양명부증선옹파두반립 후옹곽향정기산>)

- (4) 太陰證[腹滿, 嘔吐, 食不下, 腹瀉時痛, 腹痛喜溫喜按, 口不渴, 舌質淡, 脈沈遲]

태음인(열-갈근라부자탕 / 한-태음조위탕, 유씨태음조위탕)

소양인-형방지황탕

태양인(열-미후도식장탕 / 한-유씨미후도식장탕)

소음인(열-유씨인삼양위탕가천초 / 한-이씨이중탕)

(5) 少陰證

1) 少陰寒化證

- ① 陽虛寒證[四肢逆冷, 口渴欲吐, 心煩, 精神萎靡不振欲睡, 下利清穀, 舌淡苔白, 脈微]

태음인-태음조위탕가녹용, 유씨태음조위탕

소양인-형방지황탕가선모

태양인-유씨미후도식장탕

소음인-관계부자이중탕

- ② 陰盛隔陽證[下利清穀, 四肢厥逆, 身不惡寒, 面赤, 脈微欲絕]

태음인-태음조위탕가녹용, 유씨태음조위탕가녹용

소양인-형방지황탕重가선모

태양인-유씨미후도식장탕

소음인-관계부자이중탕중용부자

- ③ 陽虛水泛[頭目眩暈, 心悸, 肉瞤, 全身肢體振顫, 尿少浮腫, 腰背痛, 腹痛下利, 脈沈弦]

태음인-건울온신탕, 여정자건울탕

소양인-토사자온신탕

태양인-비해송화탕

소음인-관계부자이중탕

④ 虛寒下利[下利不止, 下利膿血, 小便不利]

태음인-연자육양장탕, 오매양장탕

소양인- 토사자양장탕

태양인-당삼양장탕

소음인-이씨이중탕가적석지초 糯米

2) 少陰熱化證

① 心煩不寐[心煩不寐, 口燥咽乾, 尿黃赤, 舌紅絳, 脈細數]

태음인-열다한소탕가이동

소양인-형방사백산가황련 과루인

태양인-石斛玉竹湯

소음인-백작약보음탕

② 水熱互結[咳嗽, 嘔吐, 口渴, 心煩不寐, 尿少, 舌質紅]

태음인-열다한소탕가천문동 삼백초

소양인-저령차전자탕

태양인-석곡옥죽탕

소음인-백작약보음탕

3) 少陰兼證

① 兼太陽表證[惡寒發熱, 但欲寐, 脈沈]

태음인-태음조위탕

소양인-형방지황탕

태양인-유씨미후도식장탕

소음인-관계부자이중탕가세신

② 兼陽明證[口燥咽乾, 心下痛, 腹脹滿, 大便難]

태음인-갈근승기탕

소양인-지황백호탕

태양인-石玉승기탕

소음인-선옹파두일립 후옹팔물군자탕

(6) 厥陰證

1) 厥逆證

① 寒厥[惡寒, 舌淡, 脈微細]

태음인-한다열소탕 或 웅담산

소양인-가감독활지황탕가비자

태양인-유씨미후도식장탕가당삼

소음인-인삼오수유탕, 독삼팔물탕

② 熱厥[手足厥冷, 煩熱口渴, 尿黃, 脈滑]

태음인-열다한소탕

소양인-저령차전자탕 或 形방사백산

태양인-석곡승기탕

소음인-팔물군자탕

③ 蛔厥[手足厥冷,氣上衝胸,心中熱痛,飢不欲食,吐蛔,下之則利不止]

태음인-태음조위탕가오매, 유씨태음조위탕가사군자

소양인-형방지황탕가고삼황련

태양인-유씨미후도식장탕가苦木

소음인-이중탕 或이씨이중탕

2) 嘔吐下利

① 虛寒嘔吐[嘔吐涎沫,乾嘔頭痛]

태음인-태음조위탕가비파엽, 유씨태음조위탕

소양인-가감독활지황탕

태양인-유씨미후도식장탕가시체

소음인-삼미삼유탕

② 上熱下寒[穀入即吐,腹痛下利]

태음인-태음조위탕가황금 갈근, 유씨태음조위탕가황금

소양인-활석고삼탕

태양인-유씨미후도식장탕중용연조미후도

소음인-인삼계지탕 或인삼부자이중탕

③ 身熱下利[裏急後重,渴欲飲水]

태음인-열다한소탕가저근백피麴炒

소양인-황련청장탕가황백 或형방사백산가황련과루인

태양인-석옥승기탕거산앵도인가선향초

소음인-팔물군자탕중용인삼 或가적석지초 백두옹

3. 衛氣營血辨證

(1) 衛分證

1) 風溫傷衛[身微發熱,微惡風寒,頭痛,咳嗽,痰少而粘,咽喉痛,口微乾而渴,舌邊尖紅,苔薄白,脈浮數]

태음인(열-갈근청열탕, 백부근청열탕 / 한-자완청열탕)

소양인(열-은교청열탕 / 한-방풍청열탕)

태양인(열-오가피청열탕 / 한-잠사청열탕)

소음인(열-황기청열탕 / 한-소엽청열탕)

2) 暑溫傷衛[發熱重,惡寒,無汗,頭痛,身重痛,舌質紅,苔白膩,脈浮數或浮濡]

태음인(열-갈근해기탕가두시청호 / 한-유씨한다열소탕거마황가승마두시청호)

소양인-형방사백산 或은교청열탕

태양인(열-오가피청열탕 / 한-잠사청열탕)

소음인(열-황기청열탕거인진 / 한-소엽청열탕거인진)

3) 濕溫傷衛[惡寒,無汗,身熱不揚,頭身脹重,胸悶不飢,面淡黃,舌苔白膩,脈濡緩]

태음인(열-갈근라복자탕, 상지부평탕 / 한-마황부평탕, 한다열소탕거마황가부평)

소양인(열-형방사백산거석고 / 한-형방지황탕거산수유)

태양인(열-유씨오가피장척탕 / 한-잠사해표탕)

소음인(열-유씨인삼양위탕 / 한-이씨곽향정기산)

4) 秋燥傷衛

- ① 溫燥[身熱,微惡風寒,頭痛,少汗,乾咳,痰粘量少,咳而不爽,胸脇疼痛,皮膚鼻咽喉乾燥,口渴心煩,舌邊尖紅]
태음인-갈근해기탕가행인두시,백부근청열탕가행인두시사삼
소양인-은교청열탕 或 방풍청열탕
태양인-오가피청열탕
소음인-황기청열탕
- ② 涼燥[發熱惡寒,頭痛無汗,乾咳,咽乾唇燥,苔薄白而乾]
태음인-한다열소탕,자완청열탕가행인
소양인-이씨형방패독산가과루인
태양인-목적쌍해산
소음인-이씨곽향정기산가소자

(2) 氣分證

- 1) 熱結氣分內入腸胃[身熱惡熱,潮熱,面目紅赤,大便乾燥,腹脹滿拒按,氣促,譫言妄語,瀉下黃糜稀水,或下利頻繁,脈沈數,舌紅苔黃]

① 大便秘結

태음인(열-갈근승기탕 / 한-의이인승기탕)
소양인-지황백호탕
태양인(열-석육승기탕 / 한-미후도승기탕)
소음인(열-선용파두일립 후용팔물군자탕 / 한-선용파두반립 후용승양익기탕)

② 下利頻繁

태음인(열-열다한소탕 / 한-갈근의이인탕)
소양인-저령차전자탕 或 형방사백산가황련
태양인(열-석육승기탕가연조미후도 / 한-미후도승기탕)
소음인(열-팔물군자탕중용인삼 / 한-승양익기탕)

- 2) 熱邪壅肺[身熱,咳喘,胸脇疼痛,痰黃稠粘,汗出,舌紅苔黃,脈滑數]

태음인(열-갈근포공영탕 / 한-자완상백피탕)
소양인-형방도적산가석고
태양인-酸漿淸咽湯重用구인
소음인(열-황기소엽탕 / 한-계지소엽탕)

3) 濕溫在氣

- ① 濕重于熱[午後熱甚,四肢困怠,渴不欲飲,脘悶納呆,出粘汗,頭目脹痛昏重,便溏不爽惡臭]
태음인(열-황금의이인탕,의이인삼백초탕 / 한-豆黃의이인탕)
소양인(열-형방사백산가활석 / 한-형방지황탕거산수유가활석대생지황)
태양인(열-오가피청열탕 / 잠사청열탕)
소음인(열-유씨인삼양위탕가인진중용반하 / 한-이씨곽향정기산가후박)
- ② 熱重于濕[午後熱甚~脘悶納呆,汗出熱臭,目赤,頭暈,口苦,便秘,尿短赤,苔黃膩,脈濡數]
태음인(열-황금의이인탕가대황,의이인삼백초탕가갈근두시 / 한-두황의이인탕가두시중용갈근)
소양인-형방사백산가황련치자

태양인(열-오가피청열탕중용구인 / 한-잠사청열탕거송화가구인)

소음인(열-유씨인삼양위탕가인진지실중용후박 / 한-이씨곽향정기산가인진후박지실)

(3) 營分證

① 營衛合邪[身熱夜甚,煩躁不寐,神昏譫語,發斑發疹,舌紅絳,脈數]

태음인(열-우각청영탕 / 한-단삼청영탕)

소양인-지황청영탕중용연교 或양격산화탕

태양인(열-산장청영탕 / 한-어성초청영탕)

소음인-작약청영탕

② 熱在營分[身熱夜甚,煩躁擾,譫語不寐,舌紅絳無苔,脈細數]

태음인(열-우각청영탕 / 한-단삼청영탕)

소양인-지황청영탕

태양인(열-산장청영탕 / 한-어성초청영탕)

소음인-작약청영탕

③ 熱入心包[神昏譫語,高熱,四肢厥冷,脈細數或滑數]

태음인(열-우각청영탕 겸복이씨우황청심환 / 한- 단삼청영탕 겸복이씨우황청심환)

소양인-지황청영탕가복신

태양인(열-산장청영탕중용구인 / 한-어성초청영탕代重用생석곡

소음인-작약청영탕

(4) 血分證

① 熱在血分[高熱夜甚,五心煩熱,神昏譫語,口渴汗多,出血發斑]

태음인(열-우각청영탕거포공영패장가포황 / 한-단삼청영탕거포공영패장가포황)

소양인-지황청영탕거금은화연교가목단피중용생지황

태양인(열-산장청영탕거어성초중용백모근가와송 / 한-어성초청영탕거어성초가와송)

소음인-작약청영탕중용작약가지유

② 熱動肝風[頭痛,眩暈,目紅赤,發熱,口渴,項背拘急強直,陣陣抽搐,舌紅絳,脈弦數]

태음인(열-우각청영탕 겸복이씨황청심환 / 한- 단삼청영탕 겸복이씨우황청심환)

소양인-지황청영탕가별갑방풍

태양인(열-산장청영탕중용구인가진주모 / 한-어성초청영탕가백강잠진주모)

소음인-작약청영탕중용작약

③ 血熱傷陰[身熱面紅,口舌乾燥,耳鳴耳聾,神疲不寐,五心煩熱,脈虛數]

태음인(열-맥문동양액탕 / 한-여정실양액탕)

소양인-별갑지골피탕

태양인(열-석곡옥죽탕 / 한-미후도옥죽탕)

소음인-가감작약청영탕가인진

④ 亡陰失水[肢體瘦弱乾枯,脣萎舌縮,牙齒積垢,目陷,肢端厥冷,拘急抽搐,手指蠕動,脈微欲絕]

태음인(열-맥문동양액탕거황금가백질려 / 한-여정실양액탕거황금가천마)

소양인-별갑지골피탕거황백가모려

태양인(열-석곡옥죽탕거백모근가백하수오 / 한-미후도옥죽탕거백모근중용백하수오
가진주모)

4. 三焦辨證

(1) 上焦濕熱證

- ① 濕困肌表[初期微熱或無熱,惡寒重,無汗或多汗,身重而疼,頭沈如裹,昏蒙脹重,耳鳴耳聾,神志呆滯,沈默嗜眠,不思飲食,咳嗽痰多,腹瀉腸鳴,苔膩脈濡]
태음인(열-갈근라복자탕, 상지부평탕 / 한-마황부평탕, 한다열소탕거마황가부평)
소양인(열-형방사백산거석고 / 한-형방지황탕거산수유)
태양인(열-유씨오가피장척탕 / 한-잠사해표탕)
소음인(열-유씨인삼양위탕 / 한-이씨곽향정기산)
- ② 表濕化熱[頭痛惡寒,周身重痛,肢倦無力,身熱不揚,午後熱甚,口不渴,脘悶不飢,面黃,苔膩脈濡]
태음인(열-갈근라복자탕중용의이인가두시, 상지부평탕가두시 / 한-마황부평탕가갈근담두시, 두황의이인탕)
소양인-형방사백산가활석
태양인(열-오가피청열탕 / 한-잠사청열탕)
소음인(열-유씨인삼양위탕가인진 / 한-이씨곽향정기산가후박백두구)

(2) 中焦濕熱證

- ① 濕熱阻塞氣機[發熱,身體倦怠,肢節痠痛,胸悶腹脹,惡心或嘔吐,小便黃赤,舌苔黃白濁膩]
태음인(열-황금의이인탕, 의이인삼백초탕 / 한-두황의이인탕)
소양인(열-형방사백산가연교 / 한-형방지황탕거산수유가저령)
태양인(열-오가피청열탕가적소두중용어성초 / 한-잠사청열탕가적소두중용어성초)
소음인(열-유씨인삼양위탕가인진충울자 / 한-이씨곽향정기산가인진충울자)
- ② 脾胃升降失調[脘腹脹滿,大便溏瀉不爽,身肢重痛,舌苔微黃或滑白而膩,脈濡緩模糊不清]
태음인(열-갈근라복자탕중용의이인 / 한-태음조위탕, 유씨태음조위탕)
소양인(열-치자황련탕 / 한-형방지황탕)
태양인(열-미후도식장탕가적소두 / 한-모과실비탕)
소음인(열-유씨인삼양위탕 / 한-이씨곽향정기산)
- ③ 濕熱鬱發白痞[發熱身痛,汗出不解,胸脘痞悶,欲嘔,釀發白痞,舌苔黃膩]
태음인(열-황금의이인탕, 의이인삼백초탕 / 한-두황의이인탕)
소양인-활석고삼탕
태양인(열-오가피청열탕 / 한-잠사청열탕)
소음인(열-유씨인삼양위탕가인진충울자 / 한-이씨곽향정기산가인진충울자)
- ④ 濕熱釀痰蒙蔽心包[身熱不甚,神昏譫語,苔黃垢膩,脈濡滑而數]
태음인(열-우각청영탕 겸복이씨우황청심환 / 한-단삼청영탕 겸복작동)
소양인-지황청영탕가복신
태양인(열-산장청영탕중용구인 / 한-어성초청영탕중용석곡)
소음인-작약청영탕

(3) 下焦濕熱證

- ① 濕滯膀胱[頭腦脹痛,脘腹痞悶,小便不通 或整日無尿,大便不爽,舌苔灰白而膩,脈濡]

태음인(열-황금의이인탕가지부자, 의이인삼백초탕 / 한-두황의이인탕가등심)

소양인(열-황련청장탕가백화사설초 / 한-형방지황탕거숙지황가백화사설초)

태양인(열-玉米鬚백모근탕 / 한-어성초제습탕)

소음인(열-인진충울자탕 / 한- 십이미관중탕)

② 濕滯大腸[頭脹脛悶, 腹脹疼痛, 大便不通, 苔灰黃, 脈濡]

태음인(열-의이인승기탕 / 한-한다열소탕거마황중용행인가승마조각)

소양인-지황백호탕

태양인(열-석옥승기탕 / 한-미후도승기탕가잠사)

소음인(열-선용파두일립 후용유씨인삼양위탕 / 한-선용파두반립 후용곽향정기산)

제2절 內傷雜病辨證

1. 臟腑辨證

(1) 肝病證

① 肝氣鬱結證[脇肋脹痛, 心煩易怒, 精神抑鬱, 胸悶, 善太息, 多疑欲哭, 經前乳房脹痛, 小腹脹痛, 月經不調, 舌苔薄, 脈弦]

태음인-갈근소간탕或연자소간탕, 산조인소간탕

소양인-시호소간탕或대맥소간탕

태양인-현호색소간탕

소음인-향부자소간탕或향부자팔물탕

② 肝火上炎證[頭脹痛, 眩暈耳鳴, 目赤腫痛, 煩躁易怒, 面紅口苦, 脇肋灼痛, 失眠多夢, 口渴, 小便短赤, 大便秘結, 舌紅苔黃, 脈弦數]

태음인-갈근청간탕, 하고초청간탕

소양인-결명자청간탕

태양인-용담청간탕

소음인-충울자청간탕

③ 肝陰虛證[頭暈目眩, 兩目乾澀, 脇肋隱痛, 五心煩熱, 口乾咽燥, 肢麻筋攣, 爪甲不榮, 煩躁易怒, 觀紅赤, 尿黃便乾, 潮熱盜汗, 舌紅少苔, 脈弦細或弦細數]

태음인-柏子양간탕, 桑子양간탕

소양인-구기자양간탕

태양인-미후도양간탕

소음인-백작약양간탕

④ 肝陽上亢證[眩暈耳鳴, 頭痛脹感, 面赤烘熱, 失眠多夢, 煩躁易怒, 頭重脚輕, 腰膝酸軟, 咽乾口燥, 舌質紅, 脈弦細數或弦勁有力]

태음인-백자양간탕거산약가황금천마조구등백질려염초, 상자양간탕가백질려염초 조구 등 황금

소양인-구기자양간탕대생지황가치자모려별갑

태양인-미후도양간탕가진주모구인

소음인-백작약양간탕가익모초

- ⑤ **肝血虛證**[眩暈耳鳴,視物昏花,夜盲,肢體麻木,筋脈拘攣,面色淡白少華,脇肋綿綿作痛,筋惕肉瞤,爪甲枯脆,口脣指甲淡白,月經量少而色淡,舌質淡,脈細]
태음인(열-단삼보간탕 / 한-연자보간탕, 여정자보간탕)
소양인(열-생지황보간탕 / 한-숙지황보간탕)
태양인(열-백모근보간탕 / 한-계혈등보간탕)
소음인-당귀보간탕
- ⑥ **肝陽化風證**[抽搐拘攣,肢體麻木,口眼歪斜,言語不利,半身不遂,卒然僵仆,痙攣性頭痛,眩暈欲倒,腰膝酸軟,面紅口乾,神志不清,舌紅絳,脈弦]
태음인-백자양간탕, 상자양간탕 皆검복이씨우황청심환
소양인-구기자양간탕대생지황가방풍별갑모려
태양인-미후도양간탕가백강잠초롱담구인
소음인-백작약양간탕가백부자 검복소합향원
- ⑦ **血虛生風證**[肢體麻木,筋脈拘急,筋惕肉瞤,視物昏花,手足痙攣,面色蒼白,口脣指甲淡白,爪甲枯脆反甲,脇肋隱痛,舌質淡,脈弦細]
태음인(열-단삼보간탕가천마조구등백령 / 한-연자보간탕가천마조구등, 여정자보간탕가조구등백령)
소양인(열-생지황보간탕가방풍모려별갑 / 한-숙지황보간탕중용방풍)
태양인(열-백모근보간탕가백강잠구인 / 한-계혈등보간탕가백강잠)
소음인-당귀보간탕가백부자
- ⑧ **寒滯肝脈證**[少腹脹痛,痛引臍丸,畏寒喜暖,陰囊冷縮,形寒肢冷,口淡不渴,小便清長,苔白滑,脈沈弦]
태음인-黎豆난간전
소양인-가감독활지황탕가구기자 비자
태양인-음양곽난간전
소음인-오수유부자이중탕거인삼가당귀
- ⑨ **肝經濕熱證**[脇肋脹痛,煩躁易怒,口苦飲食無味,嘔惡腹脹,小便短赤,寒熱往來,臍丸腫脹熱痛,帶下黃臭,外陰搔痒,大便不爽,舌苔黃膩,脈弦滑數]
태음인(열-갈근청간탕가목통, 하고초청간탕가목통삼백초 / 한-연자소간탕가포공영청호지부자, 산조인소간탕가목통삼백초청호)
소양인(열-결명자청간탕가활석백화사설초 / 한-시호소간탕가치자활석연교)
태양인(열-용담청간탕가천우슬와송어성초 / 한-현호색소간탕가초롱담천우슬어성초)
소음인(열-충울자청간탕중용인진 / 한-향부자소간탕가인진익모초)

(2) 心病證

- ① **心氣虛證**[心悸氣短,動則尤甚,神疲無力,畏風自汗,胸悶,心胸隱痛,面色蒼白,少氣懶言,語聲低微,舌質淡,脈細數或結代]
태음인-연자보심탕, 소맥보심탕
소양인-복령보심탕
태양인-당삼보심탕
소음인-인삼보심탕
- ② **心血虛證**[心悸怔忡,面色淡白無華或萎黃,失眠,多夢,健忘,驚惕不安,眩暈,口脣指甲淡白,舌

質淡,脈細]

태음인(열-백자양심탕거자노아가단삼, 사삼양심탕거호박가단삼 / 한-연자보심탕거자
노아호박가녹각교, 소맥보심탕거호박중용원육)

소양인(열-지황양심탕 / 한-복령보심탕가속지황중용구기자)

태양인(열-야교등양심탕가백하수오계혈등 / 한-당삼보심탕가계혈등 백하수오)

소음인(열-대조양심탕가천궁중용당귀 / 한-인삼보심탕가당기천궁작약)

- ③ 心陰虛證[心悸心慌,失眠多夢,五心煩熱,口乾咽燥,健忘,驚惕不安,觀紅,尿黃便乾,潮熱盜汗,
舌紅少苔,脈細數]

태음인-백자양심탕, 사삼양심탕

소양인-지황양심탕

태양인-야교등양심탕

소음인-대조양심탕

- ④ 心陽虛證[心悸氣短,動則氣促,形寒肢冷,心胸悶痛,面色㿔白,少氣懶言,畏風自汗,尿清便
溏,舌質淡,苔薄白而潤,脈沈遲無力,細弱或結代]

태음인-연자보심탕가녹용(녹각상), 소맥보심탕가녹용(녹각상)

소양인-복신보심탕

태양인-당삼보심탕가동충하초

소음인-인삼보심탕가계지

- ⑤ 心火亢盛證[口舌生瘡,心悸失眠,煩躁不安,面赤口渴,胸中煩熱,尿赤,狂躁譫語,大便秘結,舌
紅或舌尖獨赤,脈數有力]

태음인-황금청심탕

소양인-황련청심탕

태양인-석곡청심탕

소음인-합환피청심탕

- ⑥ 心血瘀阻證[心胸悶痛(刺痛,痛引肩背內臂,突然發作,心痛如刀割),昏厥,心悸怔忡,口唇
青紫,自汗,四肢厥冷,舌質紫暗或有瘀點 瘀斑,脈細澀或結代或脈微欲絕]

태음인-단삼회백탕 或이씨우황청심환

소양인-목단피과루인탕

태양인-도인현호색탕

소음인-당귀후박탕 或삼부탕

- ⑦ 痰迷心竅證[精神抑鬱,神志痴呆或神志昏蒙或卒然昏仆,不省人事,嘔吐痰涎,四肢抽掣,面色晦
滯,不思飲食,獨白自語,表情淡淡,行動舉止異常,胸悶痰多,喉中痰鳴,苔白膩,脈
濡或滑]

태음인-창포천마탕가죽력조복 或이씨우황청심환

소양인-복신과루인탕

태양인-야교등백강잠탕가진주말조복

소음인-가감척담탕가백부자

- ⑧ 痰火擾心證[心悸心煩,神志不清,失眠多夢,面赤氣粗,便秘尿赤,狂妄躁動,哭笑無常,呼號怒
罵,打人毀物,胡言亂語,舌質紅,苔黃厚膩,脈弦滑數]

태음인-황금청심탕가백합중용황금대황가죽력조복

소양인-황련청심탕거박하연교가석고3.0

태양인-석곡청심탕중용구인가백강잠

소음인-합환피청심탕가충울자 남성강제

- ⑨ **水氣凌心證**[心悸,喘息不能平臥,周身浮腫,面色晄白,心慌,神疲倦怠,氣短,胸脘痞滿,畏寒肢冷,小便短少清白,舌質淡,舌胖大,苔白滑,脈沈細]

태음인-가감승청탕

소양인-복신보심탕가저령택사선모

태양인-비해송화탕가진주모

소음인-관계부자이중탕

(3) 脾病證

- ① **脾氣虛證**[面色萎黃,倦怠,氣短懶言,飲食不振,食後腹脹,大便溏薄,四肢倦怠,肢體浮腫,小便不利,經少色淡,甚則閉經,舌淡苔白,脈緩弱]

태음인-의이인건비탕或가신곡,연자건비탕或가신곡

소양인-홍맥건비탕

태양인-교맥건비탕

소음인-백출건비탕

- ② **脾氣下陷證**[氣短無力,食入則脹,脘腹重墜,便意頻數,久瀉脫肛,胃下垂,子宮下垂,頭暈目眩,言語底微,自汗食少,精神倦怠,大便溏泄,舌淡苔薄白,脈虛弱]

태음인-의이인건비탕가승마或가녹용,연자건비탕가승마或소백피초

소양인-홍맥건비탕가시호或가금앵자

태양인-당삼보기탕

소음인-이씨보중익기탕或가지각초

- ③ **脾不統血證**[面色蒼白或萎黃,大便溏泄,便血,衄血,皮膚紫斑,月經過多,崩漏,食少,食後脹滿,倦怠無力,短氣懶言,手足不溫,消瘦,舌淡苔白,脈濡細弱]

태음인-의이인건비탕가녹각교,연자건비탕가녹각교우피교

소양인-홍맥건비탕가숙지황4.0구기자형개

태양인-당삼보기탕가계혈등

소음인-백출건비탕가당귀천궁건강초탄

- ④ **脾陰虛證**[食少,食後腹脹,口乾少津,大便秘結,倦怠無力,短氣懶言,脣舌乾燥,口渴喜飲,低熱,舌乾苔少,脈細弱而數]

태음인-갈근양비탕,사삼양비탕

소양인-천화분양비탕

태양인-석곡양비탕

소음인-작약양비탕

- ⑤ **脾陽虛證**[食少,腹脹,腹中冷痛,喜溫喜按,四肢不溫,面色蒼白,大便稀薄,形寒,口淡不渴,肢體浮腫,小便不利,白帶清稀量多,舌質淡胖,苔白滑,脈沈細或沈遲]

태음인-의이인건비탕가녹용(녹각상)或가훼백,연자건비탕가녹용(녹각상)

소양인-가감독활지황탕

태양인-교맥건비탕가菝葜양강

- ⑥ **寒濕困脾證**[脘腹脹悶,腹痛瀉瀉,頭身困重,口淡不渴,不思飲食,惡心嘔吐,口粘無味,肢體浮腫,面色晦黃,帶下綿綿,舌胖苔白膩,脈濡緩]

태음인-태음조위탕, 유씨태음조위탕
 소양인-형방지황탕
 태양인-이향정기산或교맥관장탕
 소음인-이씨곽향정기산或유씨인삼양위탕

(4) 肺病證

- ① **肺氣虛證**[面色㿔白, 咳喘無力, 動則氣短, 自汗怕冷, 精神倦怠, 聲音低微, 短氣懶言, 痰多清稀, 舌淡苔薄白, 脈虛弱]
 태음인-마황보폐탕, 사삼보폐탕
 소양인-방풍보폐탕
 태양인-이삼보폐탕
 소음인-이씨보중익기탕
- ② **肺陰虛證**[乾咳少痰, 午後觀紅, 口乾咽燥, 潮熱盜汗, 痰少而稠, 五心煩熱, 形體消瘦, 聲音嘶啞, 舌紅絳少津, 脈細數]
 태음인-맥문동양폐탕, 백합양폐탕
 소양인-지황양폐탕
 태양인-옥죽양폐탕
 소음인-소자양폐탕
- ③ **肺陽虛證**[咳喘無力, 面色㿔白, 形寒肢冷, 動則氣短, 神疲少氣, 聲音低怯, 自汗, 背寒, 痰清稀, 咳吐涎沫, 舌質淡, 苔薄白, 脈虛弱]
 태음인-산약보폐탕, 사삼보폐탕가호도육녹용
 소양인-방풍보폐탕중용방풍
 태양인-이삼보폐탕중용동충하초
 소음인-이씨보중익기탕가건강세신
- ④ **肺氣陰兩虛證**[咳喘無力, 動則氣短, 口乾咽燥, 自汗盜汗, 五心煩熱, 神疲少氣, 聲音低微, 面色無華, 觀紅, 痰少而稠, 咳痰帶血, 形體消瘦, 午後潮熱, 舌淡嫩紅, 脈細弱]
 태음인(열-맥문동양폐탕가산약 / 한-녹용대보탕중용천문동가백합, 사삼보폐탕가백합이동)
 소양인(열-지황양폐탕거황백가영지복령홍맥 / 한-방풍보폐탕가속지황지모한련초)
 태양인(열-옥죽양폐탕거구인가당삼송화아삼 / 한-이삼보폐탕가옥죽백보근석곡)
 소음인(열-소자양폐탕가인삼황기 / 한-이씨보중익기탕가작약아교소자)
- ⑤ **肺氣衰絕證**[喘息鼻脹, 咳不能咳, 呼吸少氣, 不能息, 面色㿔白, 皮毛乾枯, 形體消瘦, 動則汗出氣喘, 咽乾, 舌淡苔少, 脈微弱或脈浮散無倫]
 태음인-녹용대보탕 或공진흑원단
 소양인-방풍보폐탕가속지황 구기자
 태양인-당삼보기탕
 소음인-이씨보중익기탕
- ⑥ **水寒犯肺證**[咳嗽, 喘促不能臥, 下肢浮腫, 痰多稀白, 胸脇滿悶, 小腹脹滿, 腰部冷痛, 脛膝冷感, 尿少, 惡寒發熱, 無汗身痛, 舌苔薄白而潤, 白膩, 脈浮緊或弦緊]
 태음인-가감정천탕, 동과자온폐탕
 소양인-형방지황탕거산수유가감수말조복

태양인-아삼온폐탕

소음인-관계부자이중탕가세신반하강제

- ⑦ **寒痰阻肺證**[咳嗽,痰稀白,喘促不能臥,痰多,咯出容易,形寒畏冷,胸膈滿悶,舌苔白膩,脈沈遲]

태음인-마황보폐탕가백과관동화,사삼보폐탕가관동화

소양인-방풍차전자탕

태양인-아삼온폐탕거산앵도인비해가시체

소음인-계지반하생강탕가세신

- ⑧ **痰熱壅肺證**[咳嗽痰鳴,痰黃粘稠,發熱,呼吸促急,痰稠膠固,咳吐不爽,痰中帶血,胸膈痞滿,舌紅苔黃膩,脈滑數]

태음인(열-갈근포공영탕 / 한-자완상백피탕)

소양인-사과락과루인탕

태양인-산장청인탕중용구인

소음인(열-황기소엽탕가반하강제지실 / 한-계지소엽탕가남성강제소자신이화)

(5) 腎病證

- ① **腎精不足證**[眩暈耳鳴,腰膝酸軟,小兒發育遲延,男子不妊,女子經閉不孕,健忘少眠,動作遲鈍,形體消瘦,齒搖髮脫,小兒泉門閉遲,知能低下,反應遲鈍,肌肉萎縮,舌淡苔白,脈細弱]

태음인-상황보음탕가산약초녹각교초주,정심보음탕가녹각교炒珠

소양인-이씨육미지황탕가구판교초주토사자

태양인-원잠보음탕가산앵도육

소음인-백작약보음탕代인삼가두충

- ② **腎氣虛證**[眩暈耳鳴,腰膝酸軟,氣短自汗,倦怠無力,面色㿔白,小便頻數,遺精早泄,舌淡苔白,脈細弱]

태음인-건울보양탕거쇄양가오미자,연자보양탕거쇄양가산약

소양인-산수유보신탕

태양인-당삼보신탕

소음인-홍삼보양탕거부자건강중용홍삼

- ③ **腎氣不固證**[小便頻數而清,尿後餘瀝不盡,遺尿,小便失禁,滑精,早泄,胎動易滑,面色㿔白,神疲無力,腰膝酸軟,聽力減退,自汗,白帶清稀,舌淡苔白,脈細弱]

태음인-건울보양탕거쇄양가오미자원지,연자보양탕거쇄양가산약

소양인-산수유보신탕가금앵자복신모려

태양인-당삼보신탕가菟絲동충하초

소음인-홍삼보양탕거부자가파고지오약계내금

- ④ **腎不納氣證**[氣短喘息,呼多吸少,動則喘甚,面色㿔白而虛浮,甚則面脣青紫,自汗,畏寒肢冷,腰膝酸軟,舌淡苔白,脈細弱或虛浮無根]

태음인-호도육보신탕

소양인-토사자보양탕가영지금앵자

태양인-당삼보신탕거刺오가피가동충하초

소음인-홍삼보양탕거부자가소자代인삼

- ⑤ **腎陰虛證**[頭暈目眩,耳鳴耳聾,腰膝酸軟,五心煩熱,潮熱盜汗,健忘少寐,遺精早泄,齒搖髮脫,小兒發育遲延,知能低下,男子不妊,女子經少不孕,口乾咽燥,尿黃便乾,舌紅少苔,脈細數]
- 태음인-상황보음탕,貞樞보음탕
소양인-귀판보음탕혹가지모황백염수초
태양인-원잠보음탕
소음인-백작약보음탕
- ⑥ **腎陽虛證**[畏寒肢冷,腰膝冷痛,五更泄瀉,小便清長,面色晄白或黧黑,眩暈耳鳴,男子陽痿不舉,早泄,性慾減退,女子宮寒不孕,尿少浮腫,白帶清稀,舌淡嫩,苔白滑,脈沈遲無力]
- 태음인-건울보양탕,연자보양탕
소양인-토사자보양탕
태양인-충초보양탕 或 당삼보신탕가동충하초
소음인-홍삼보양탕
- ⑦ **腎陰陽兩虛證**[眩暈耳鳴,腰膝酸軟疼痛,五心煩熱,盜汗,遺精,手足冷,自汗,面色晄白,觀紅,失眠健忘,多夢,精神萎弱,齒浮動搖,毛髮乾枯,動則氣喘,足浮腫,舌紅無苔,脈細數或舌淡苔白,脈沈遲而弱]
- 태음인(열-상황보음탕가녹용(녹각상)쇄양,정심보음탕가녹용(녹각상)쇄양 / 한-건울보양탕거쇄양녹용가상황여정실주증오미자蒸,연자보양탕가저실자증용여정실주증)
소양인(열-귀판보음탕가복분자토사자 / 한-토사자보양탕중용숙지황가차전자)
태양인(열-원잠보음탕가동충하초토사자 / 한-충초보양탕가적하수오주증)
소음인(열-백작약보음탕가부자포 / 한-홍삼보양탕가흑호마炒研 蟲울자)
- ⑧ **腎虛水泛證**[全身水腫(下肢尤甚 按之沒指),腰膝酸痛,尿少,心悸氣短,咳喘痰鳴,陰囊水腫,舌淡體胖,苔白滑,脈沈弦]
- 태음인-건울온신탕,여정자건울탕
소양인-토사자온신탕
태양인-비해송화탕가菝葜우슬
소음인-관계부자이중탕가대복피

(6) 膽病證

- ① **膽熱證**[兩側頭痛,目眇痛,目眩耳聾,口苦咽乾,胸脇滿痛,往來寒熱,嘔吐苦水,煩躁易怒,夜寐不安,黃疸,舌紅苔黃,脈弦數有力]
- 태음인-갈근청간탕거조구등저실자가포공영,하고초청간탕가청호울금
소양인-결명자청간탕거귀판중용치자가복령
태양인-용담청간탕거진주모중용용담초
소음인-충울자청간탕가진피중용인진
- ② **膽鬱痰擾證**[頭暈目眩,口苦,驚悸不寧,失眠,脇脹痛,食慾不振,嘔惡,煩躁不寐,胸悶善太息,右脇不舒,舌苔黃膩,脈弦滑]
- 태음인-청호온담탕,감국온담탕
소양인-치자온담탕
태양인-산장온담탕
소음인-인진온담탕

(7) 小腸病證

- ① 小腸氣滯證[少腹絞痛, 一側陰囊腫脹, 或睪丸偏墜, 畏冷, 腹脹腸鳴, 失氣則舒, 少腹部或有聚氣突起, 重墜不舒, 舌苔白滑, 脈沈弦]
- 태음인-黎豆난간전, 或마황정통탕
소양인-가감독활지황탕가대맥근
태양인-음양곽난간전중용현호색
소음인-십이미관중탕가소회향천련자오약
- ② 小腸虛寒證[大便秘結不化, 腹痛, 四肢不溫, 小便不利, 大便清稀, 形寒肢冷, 舌苔白滑, 脈沈無力]
- 태음인-태음조위탕, 유씨태음조위탕
소양인-형방지황탕거숙지황
태양인-교맥관장탕가현호색
소음인-이씨이중탕
- ③ 小腸實熱證[小便短赤, 尿道灼痛, 口渴, 心煩, 甚則血尿, 口舌生瘡, 舌紅苔黃, 脈數有力]
- 태음인-천문동도적산, 유근피도적산
소양인-가감팔정산
태양인-용담청간탕거진주모가천우슬백모근
소음인-충울자청간탕가익모초천련자

(8) 胃病證

- ① 胃氣虛證[胃脘隱痛(按之痛減), 不思飲食, 嘔吐呃逆, 消化不良, 食入即吐, 痛有定時, 喜熱喜按, 少氣懶言, 語聲低微, 面色萎黃, 舌質淡, 苔薄白, 脈虛弱]
- 태음인-태음조위탕거마황가산약흑사당, 건울보위탕
소양인-맥아보위탕
태양인-당삼보위탕
소음인-황기보위탕
- ② 胃陰虛證[食慾不振, 食少, 胃脘虛痞, 胃脘疼痛, 乾嘔, 飢而不食, 口乾咽燥, 大便秘結, 尋煩潮熱, 舌質光紅無苔(鏡面舌), 舌紅少苔, 舌乾少津, 脈細數]
- 태음인-맥문동양위탕, 백합양이탕
소양인-생지황양위탕
태양인-석곡양이탕
소음인-작약양비탕
- ③ 胃寒證[胃脘冷痛, 嘔吐呃逆, 嘔吐清水, 喜熱食, 面白少華, 畏寒怕冷, 手足冷, 脘痛拒按, 舌質淡, 苔白, 脈遲緩或弦緩]
- 태음인-마황정통탕或태음조위탕가훼백, 유씨태음조위탕
소양인-맥아보위탕가독활선모
태양인-교맥관장탕
소음인-이씨곽향정기산
- ④ 胃熱證[胃脘灼痛, 多食善飢, 口臭, 便秘, 牙齦腫痛出血, 食入即吐, 渴喜冷飲, 舌紅, 身熱, 煩渴, 舌質紅, 苔黃厚, 脈洪大或滑數]
- 태음인-갈근청위탕, 유근피청위탕或건울청위탕

소양인-황련청장탕
태양인-미후도청위탕
소음인-인진청위탕

(9) 大腸病證

- ① **大腸津虧證**[大便乾結, 排便困難(努責難下), 數日一行, 便秘, 形體消瘦, 咽乾少津, 口乾, 口臭, 頭暈目眩, 舌質紅, 苔黃燥, 脈澀或細數]
태음인-갈근양비탕중용갈근或가마자인해송자, 사삼양비탕중용노근가갈근마자인해송자
소양인-천화분양비탕중용과루인가생지황
태양인-석곡양비탕중용도인적하수오
소음인-작약양비탕가당귀미아교
- ② **大腸虛寒證**[腹部隱痛, 喜熱喜按, 腹瀉, 便溏, 粘液便, 四肢不溫, 腸鳴, 大便失禁, 脫肛, 舌質淡, 苔薄白而滑, 脈沈遲或沈細無力]
태음인-연자육양장탕, 오매양장탕
소양인-토사자양장탕
태양인-당삼양장탕
소음인-이씨이중탕가부자포파고지가자육
- ③ **大腸濕熱證**[腹痛下利, 下利粘液, 便膿血, 裏急後重, 便物如漿如黃水, 肛門灼熱, 胸腕滿悶, 飲食無味, 嘔惡, 寒熱, 口渴, 小便黃赤, 午後熱盛, 肢體沈重, 舌苔黃膩, 脈滑數]
태음인-갈근청장탕, 유근피청장탕
소양인-황련청장탕或가황백백화사설초
태양인-미후도청장탕
소음인-가감작약탕
- ④ **大腸實熱證**[大便乾燥秘結, 腹脹硬滿, 腹痛拒按, 惡心嘔吐, 身熱面赤, 口渴, 肛門灼熱, 小便短赤, 舌苔黃燥, 甚則黑褐芒刺, 脈洪數有力]
태음인-갈근승기탕, 의이인승기탕
소양인-지황백호탕
태양인-석옥승기탕
소음인-팔물군자탕가후박지실 或선용파두일립

(10) 膀胱病證

- ① **膀胱虛寒證**[小便頻數, 小便清長, 小便不禁, 尿有餘瀝, 遺尿, 尿後白濁, 小便點滴不爽, 無力排出, 腰痠楚, 少腹冷痛, 舌淡, 苔薄白而潤, 脈沈細]
태음인-건을보양탕가백과, 연자보양탕가백과
소양인-토사자보양탕가금앵자
태양인-충초보양탕
소음인-홍삼보양탕가오약
- ② **膀胱濕熱證**[頻尿, 尿急, 尿澀, 尿痛, 尿黃赤混濁, 尿血, 發熱, 腰痛, 尿中有砂石, 舌紅, 苔黃膩, 脈滑數]
태음인-천문동도적산, 유근피도적산
소양인-가감팔정산가백화사설초

태양인-용담청간탕거진주모가천우슬백모근비해
소음인-충울자청간탕가익모초천련자대복피

(11) 臟腑兼病證

- ① **肝脾不和證** [兩脇脹滿疼痛, 脘腹脹滿, 食慾不振, 煩躁易怒, 善太息, 腹痛欲瀉, 腸鳴失氣, 月經不調, 舌苔白膩, 脈弦緩]
태음인-연자소간탕, 오매소간탕
소양인-토사자소간탕
태양인-당삼소간탕
소음인-향사양이탕거반하가후박
- ② **肝氣犯胃證** [胃脘痞滿時痛, 兩脇脹痛或竅痛, 嘈噯嘔逆, 噯氣吞酸, 善太息, 頭痛, 舌苔薄白或薄黃, 脈弦]
태음인-갈근화위탕, 유근피화위탕
소양인-시호화위탕
태양인-현호색화위탕
소음인-향사양위타옥가오수유
- ③ **肝火犯肺證** [咳嗆氣逆, 胸脇疼痛, 胸脇不舒, 性急易怒, 痰少粘, 痰帶血, 目赤口苦, 咽乾聲啞, 頭暈頭痛, 小便短赤, 大便秘, 舌質紅, 苔黃乾, 脈弦數或弦細數]
태음인-천문동청폐탕, 상백피청폐탕
소양인-지황양폐탕가차전자석고
태양인-문합청폐탕
소음인-소자양폐탕가충울자
- ④ **肝腎陰虛證** [腰膝酸軟, 兩目乾澀, 胸脇疼痛, 五心煩熱, 健忘失眠, 觀紅脣赤, 頭暈目眩, 耳鳴如蟬, 咽乾口燥, 盜汗, 遺精, 女子月經量少, 舌紅絳少苔, 脈細數]
태음인-상황보음탕가산조인초, 정심보음탕가감국산조인초
소양인-귀판보음탕
태양인-원잠보음탕
소음인-백작약보음탕
- ⑤ **心肝血虛證** [心悸怔忡, 健忘失眠, 多夢, 頭暈目昏, 四肢麻木, 面色淡白, 驚惕不安, 筋脈拘急, 夜盲, 舌質淡, 脈細無力]
태음인(열-단삼보간탕중용백자인 / 한-연자보간탕, 여정자보간탕중용원육가백자인)
소양인(열-생지황보간탕가귀판중용복령 / 한-숙지황보간탕가영지중용복령)
태양인(열-백모근보간탕가석곡야교등 / 한-계혈등보간탕가야교등)
소음인-당귀보간탕가인삼중용대조
- ⑥ **心肺氣虛證** [心悸氣短, 咳嗽, 動則氣喘, 面色淡白無華, 神疲無力, 咳痰清稀, 心胸悶, 語聲低微, 自汗, 舌質淡, 苔薄白, 脈細弱]
태음인-마황보폐탕거마황중용오미자가원지, 사삼보폐탕가백합부소맥
소양인-방풍보폐탕중용복령영지
태양인-이삼보폐탕중용육축칠가야교등
소음인-이씨보중익기탕代황기밀자중용대조
- ⑦ **心脾氣血兩虛證** [心悸怔忡, 失眠健忘, 食少倦怠, 腹脹便溏, 面色萎黃, 頭暈目花, 月經不調, 閉

經,崩漏,皮下紫斑,舌質淡嫩,脈細無力]

태음인-연자양혈탕, 단삼보혈탕

소양인-복신보심탕가구기자

태양인-백하오양혈탕

소음인-가감귀비탕

- ⑧ **心腎陽虛證**[形寒肢冷,心悸氣短(動則尤甚),尿少身重(특히 하지부종),面色暗體,心胸痞悶(甚則疼痛),脣甲青紫,腰脊冷痛,自汗,神疲體倦,舌暗淡或青紫,苔白滑,脈沈微]

태음인-건울온신탕가원지석창포훼백

소양인-토사자온신탕거목단피가영지복신

태양인-야교등음양곽탕

소음인-관계부자이중탕

- ⑨ **心腎不交證**[心煩驚悸,健忘少眠,多夢遺精,眩暈耳鳴,口乾咽燥,潮熱盜汗,五心煩熱,腰膝酸軟,尿黃便乾,舌紅無苔或苔薄少津,脈細數]

태음인-백자양심탕가지부자황금, 사삼양심탕가여정자주증지부자

소양인-지황양심탕가지모황백염수초

태양인-야교등양심탕가회우슬주증

소음인-대조양심탕가두충충울자

- ⑩ **脾胃濕熱證**[脘腹痞悶懊憹,口苦,口粘,嘔惡(吐出飲食物味酸苦),食少,便溏臭穢,肢體困重,小便短赤,面目肌膚發黃,皮膚搔痒,身熱起伏,汗出熱不解,舌苔黃膩,脈滑數]

태음인-황금의이인탕가청호, 유근피청위탕가청호

소양인-치자황련탕

태양인-산장온담탕중용연조미후도가향유백편두

소음인-인진온담탕가창출광곽향대복피

- ⑪ **食傷脾胃證**[胃脘脹滿疼痛拒按,嘔吐酸腐,噯氣壓食,腸鳴腹痛,瀉下糞便臭如敗卵,或大便秘結,苔厚膩,脈滑或弦滑]

태음인-태음조위탕가갈근신곡초흑가대황, 유씨태음조위탕흑가황금대황

소양인-독활지황탕가맥아황련석고, 대맥소간탕

태양인-유씨미후도식장탕 冲服穀芽末

소음인-이씨곽향정기산가산사지실

- ⑫ **脾肺氣虛證**[咳嗽氣短,痰多清白,自汗,易感冒,面色無華,神疲懶言,飲食減少,腹脹滿,便溏,浮腫,舌淡苔薄白,脈細弱]

태음인-마황보폐탕, 사삼보폐탕

소양인-방풍보폐탕

태양인-당삼보기탕

소음인-백출건비탕 或보중익기탕가반하소자

- ⑬ **肺腎陰虛證**[咳嗽氣促,痰中帶血,咯血,腰膝酸軟,骨蒸潮熱,咳痰不爽,口乾咽燥,聲音嘶啞,形體消瘦,觀紅,五心煩熱,盜汗,男子遺精,女子月經量少,經閉,舌紅少苔,脈細數]

태음인-맥문동양폐탕가산약상황, 백합양폐탕가여정자주증상심자

소양인-지황양폐탕가귀관택사

태양인-옥죽양폐탕가적하수오주증

소음인-소자양폐탕가沙苑子

- ⑭ **脾胃陽虛證** [腰膝冷痛, 少腹冷痛, 大便溏泄, 完穀不化, 五更泄瀉, 形寒肢冷, 面色㿔白, 少氣懶言, 精神萎靡, 小便不利, 面浮肢腫, 甚則腹滿膨脹, 舌淡苔白, 脈沈細]
- 태음인-의이인건비탕가연자육녹용(녹각상)
 소양인-가감독활지황탕가구자
 태양인-교맥건비탕가菝葜음양곽동충하초
 소음인-관계부자이중탕가파고지육두구

2. 陰陽氣血津液辨證

(1) 陰陽辨證

- ① **亡陰證** [汗出如粘稠, 身熱, 精神煩躁(或昏迷譫妄), 呼吸氣粗, 肌肉乾燥, 皮膚皺折, 脣乾齒燥, 目眶深陷, 渴喜冷飲, 舌質乾紅, 脈虛數或細數無力]
- 태음인-맥문동양액탕가오미자산약, 여정실양액탕가오미자
 소양인-별갑지골피탕가산수유모려
 태양인-석곡옥죽탕가당삼
 소음인-가감작약탕청영탕가인삼황기
- ② **亡陽證** [汗出不止(冷汗淋漓), 四肢厥冷, 呼吸微弱, 精神萎靡或恍惚, 畏寒倦臥, 渴喜熱飲, 面色蒼白, 舌淡潤, 脈微欲絕或浮大無力]
- 태음인-태음조위탕거마황가녹용5.0부소맥회백
 소양인-가감독활지황탕중용방풍가모려
 태양인-당삼보기탕용당삼5.0
 소음인-승양익기부자탕 或삼부탕
- ③ **清陽不升證** [頭暈眼花, 視物不清, 耳鳴耳聾, 畏寒肢冷, 困倦無力, 食不知味, 納呆便溏, 舌淡, 苔薄白, 脈弱或虛]
- 태음인-의이인건비탕가길경, 연자건비탕가길경
 소양인-홍맥건비탕가시호
 태양인-당삼보기탕
 소음인-이씨보중익기탕
- ④ **濁陰不降證** [脘悶腹脹, 食少便溏或便秘, 小便不利或不通, 身體困重, 倦怠乏力, 甚則下肢浮腫, 舌苔濁膩, 脈濡滑]
- 태음인-태음조위탕, 유씨태음조위탕
 소양인-형방지황탕
 태양인-교맥관장탕
 소음인-이씨곽향정기산 或유씨인삼양위탕
- ⑤ **陰陽兩虛證** [形體萎弱, 精神萎頓, 倦怠無力, 少氣懶言, 形寒肢冷, 稍動則發熱汗出, 潮熱盜汗, 五心煩熱, 心悸目眩, 頭暈耳鳴, 舌淡而少津, 或有齒痕, 或光剝, 脈微細而數]
- 태음인-건울보양탕가맥문동상황마자인, 정심보음탕가녹용산약
 소양인-토사자보양탕가귀판별갑
 태양인-원잠보음탕가당삼교맥동충하초
 소음인-백작약보음탕가인삼부자포

(2) 氣血辨證

- ① **氣滯證** [脘腹胸脇乳房腰背疼痛, 脹悶(時輕時重 痛無定處 竅痛或攻痛 隨情緒而增減), 噯氣太息, 結塊(聚散無常), 噯氣失氣後症狀輕減, 肩肘腿膝流走疼痛, 月經時少腹竅痛, 苔薄, 脈弦]
태음인-갈근소간탕 或 연자소간탕, 산조인소간탕
소양인-시호소간탕 或 대맥소간탕
태양인-현호색소간탕
소음인-향부자소간탕
- ② **氣陷證** [氣短乏力, 脘腹墜脹, 泄瀉, 脫肛, 婦人陰挺, 腰痠欲折, 遺尿, 經水漏下, 流產, 神疲懶言, 頭暈目眩, 舌淡胖, 脈細緩無力]
태음인-의이인건비탕가승마, 연자건비탕가승마
소양인-홍맥건비탕가시호
태양인-당삼보기탕
소음인-이씨보중익기탕
- ③ **氣閉證** [昏迷, 牙關緊閉, 兩手握固, 大便秘結, 小便不通, 躁動不安, 舌強, 言語蹇澀, 譫語煩躁, 氣粗鼻鼾, 喉間痰聲漉漉, 手足拘攣, 半身不遂, 小腹胀滿, 小腹痛, 噯氣頻作, 苔膩, 脈弦滑或沈滑]
태음인-갈근청간탕, 하고초청간탕 皆 葜 복이씨우황청심환
소양인-결명자청간탕가석고
태양인-용담청간탕가진주말조복
소음인-충울자청간탕 葜 복소합향원
- ④ **血瘀證** [局部疼痛, 腫脹(腫塊不移 刺痛 拒按 一點常痛), 面色黎黑, 口脣青紫, 皮膚瘀斑, 出血, 口渴欲漱而不欲飲, 肌膚甲錯, 腹壁青筋怒脹, 皮膚絲狀紅縷, 魚際部位紅斑, 月時腹痛, 血塊, 色紫暗, 或經閉]
태음인(열-단삼대황탕 / 한-단삼건울탕, 단삼포황탕)
소양인(열-생지황목단피탕 / 한-숙지황목단피탕)
태양인-도인백모근탕
소음인-당귀작약탕
- ⑤ **血熱證** [出血鮮紅(鼻衄 吐血 尿血 便血 등), 身熱夜重, 斑疹, 心煩易怒, 面紅目赤, 月經先期而量多色紅, 神志昏糊, 譫語狂亂, 煩躁不寧, 齒齦腫痛, 舌深絳, 苔焦黃少津, 脈細數或弦數]
태음인-우각청영탕가포황, 가감단삼청영탕
소양인-가감지황청영탕
태양인-가감산장청영탕
소음인-작약청영탕중용충울자가당귀천궁
- ⑥ **血寒證** [疼痛(頭四肢胸少腹 등), 手足冷(色青紫), 四肢攣急, 肌肉麻痺, 胸痛徹背, 背痛徹心, 脘腹冷痛, 月經疼痛, 月經量少, 經色暗有塊, 或閉經, 舌暗淡或青紫, 苔白膩, 脈緊或沈細]
태음인-마황통맥탕, 홍화통맥탕
소양인-방풍통맥탕
태양인-계혈등통맥탕

소음인-당귀통맥탕가백부자

- ⑦ **血脫證**[出血(外傷性大出血 咳血 吐血 崩漏 産後出血不止),面色蒼白,譫妄神昏,汗出如珠,二便失禁,口脣爪甲淡白,瞳孔散大,舌質淡,脈散大或芤]

태음인-연자양혈탕가단삼가녹용5.0, 단삼양혈탕가단삼가녹용5.0 皆겸복생우절즙

소양인-복신보심탕중용숙지황가형개

태양인-백하오당삼탕

소음인-독삼탕

- ⑧ **血燥證**[口脣乾裂,咽乾咯痛,手燥足裂,皮膚乾燥,毛髮乾枯,鼻腔乾燥出血,大便乾結,乾咳無痰,口乾咯血,頭暈眼花,肌膚甲錯,肢軟筋萎,指甲髮脆,經少經閉,舌燥無津,脈細數或沈澁]

태음인-이동윤조탕, 사삼윤조탕

소양인-생지황윤조탕

태양인-하수오윤조탕가도인

소음인-당귀윤조탕

- ⑨ **氣血虛證**[面色蒼白,眼瞼口脣淡白,神疲乏力,呼吸氣短,食無味,頭暈眼花,心悸怔忡,失眠多夢,聲音低微,健忘脫髮,手足麻木,肢體痿軟,肌肉瘦削,經少,色淡如水,舌淡嫩,脈細弱無力]

태음인-연자양혈탕, 단삼양혈탕

소양인-복신보심탕가구기자

태양인-하수오양혈탕

소음인-가감귀비탕

- ⑩ **氣陰虛證**[神疲乏力,聲音低微,汗出氣短,食慾不振,便溏,口乾咽痛,觀紅,低熱盜汗,五心煩熱,午後潮熱,乾咳少痰,咳喘咯血,上氣喘促,脘痛灼熱,頭暈目眩,心悸肢腫,腰痠耳鳴,舌質紅,苔少而剝,或有裂紋,脈虛細而數]

태음인(열-맥문동양폐탕가산약 / 한-녹용대보탕중용이동, 사삼보폐탕가백합이동)

소양인(열-지황양폐탕가영지복령홍맥 / 한-방풍보폐탕가생지황지모한련초)

태양인(열-옥죽양폐탕가당삼송화아삼 / 한-당삼보기탕가옥죽석곡)

소음인(열-소자양폐탕가인삼황기 / 한-이씨보중익기탕가작약아교)

(3) 津液辨證

- ① **津液虧損證**[口渴,咽乾舌燥,口乾少津,皮膚不潤,鼻脣乾燥,乾咳少痰,津少舌強,目澁少漏,小便短少,大便乾結,多食反瘦,嘔吐,皮膚乾枯,舌紅且乾,苔乾或剝,脈細或澁]

태음인-맥문동양폐탕가갈근, 백합양폐탕중용사삼가상심자

소양인-지황양폐탕중용생지황가석고

태양인-옥죽양폐탕가생백편두미후도

소음인-소자양폐탕중용당귀수삼

- ② **水飲內停證**[胃中振水音,腸間漉漉有聲,四肢重腫,胸脇痞痛,咳唾引痛,背冷如掌大,素盛今瘦,脘腹痞脹,氣短息促,痰多,嘔吐涎沫,頭暈目眩,顏面浮腫,苔白膩,脈弦滑或沈弦]

태음인-가감정천탕감마황흑가훼백, 동과자온폐탕가삼백초

소양인-형방지황탕거산수유 감수말조복

태양인-아삼온폐탕

소음인-계지반하생강탕가세신

- ③ **陽虛水泛證**[浮腫(안면, 눈두덩이 微腫, 四肢浮腫, 심하면 胸腹腰背水腫), 小便不利, 身重胸悶, 惡心欲嘔, 脘腹脹滿, 形寒肢冷, 腰痛痠重, 發熱惡寒, 苔白膩, 脈浮滑或沈緩]

태음인-건울온신탕가동과자길경, 여정자건울탕감건울녹각상가유근피

소양인-형방지황탕

태양인-비해송화탕가적소두

소음인-간계부자이중탕가대복피

- ④ **寒濕證**[頭身困重, 脘悶腹脹, 形寒肢冷, 肢節屈身不利, 不飢不食, 腹脹, 腹痛, 便溏, 下利清穀, 小便不利, 吐瀉, 身痛浮腫, 喘咳稀痰, 肢體麻痺, 疝瘕作痛, 舌淡, 苔白膩, 脈濡緩]

태음인-태음조위탕

소양인-형방지황탕

태양인-교맥관장탕

소음인-이씨곽향정기산가백부자

- ⑤ **風痰證**[頭暈目眩, 嘔吐痰涎, 甚則卒然昏倒, 口眼歪斜, 半身不遂, 胸脇滿悶, 喉中痰鳴, 抽掣痙厥, 舌苔薄膩, 脈弦滑]

태음인-천마구등탕, 감국구풍탕

소양인-방풍구풍탕

태양인-야교등백강잠탕중용구인

소음인-가감척담탕가백부자

- ⑥ **寒痰證**[痰白清稀, 咳嗽喘促, 形寒肢冷, 胸部滿悶, 口淡不渴, 大便溏泄, 舌質淡, 苔白潤, 脈沈滑]

태음인-한다열소탕가오미자훼백, 사삼보폐탕가관동화자완

소양인-방풍차전자탕가영지

태양인-아삼온폐탕거산앵도인비해가시체

소음인-계지반하생강탕가세신

- ⑦ **熱痰證**[痰稠色黃, 痰膠結難咯, 咳嗽喘促, 喉中痰鳴, 心中煩熱, 胸中悶痛, 口乾咽燥, 小便短赤, 大便燥結, 舌質紅, 苔黃膩, 脈滑數]

태음인-갈근포공영탕, 자완상백피탕

소양인-사과락과루인탕

태양인-문합청폐탕

소음인-황기소엽탕가반하강제소자신이

- ⑧ **燥痰證**[痰少膠粘, 口鼻乾燥, 咳嗽氣促, 咽喉乾痒, 口渴喜飲, 尿少便乾, 皮膚乾燥, 舌紅少津, 脈弦細數或細澀]

태음인-맥문동양폐탕가행인, 백합양폐탕가행인

소양인-지황양폐탕가과루인

태양인-옥죽양폐탕가문합

소음인-소자양폐탕가지실

- ⑨ **濕痰證**[咳喘, 痰多色白, 胸部痞悶, 食慾不振, 惡心嘔吐, 腹脹便溏, 眩暈心悸, 肢重嗜臥, 舌體胖大, 苔滑膩, 脈滑或緩]

태음인-한다열소탕가훼백, 한다열소탕거마황가상백피백부근오미자

소양인-형방지황탕거산수유가전 호초

태양인-교맥관장탕가문합양총피

소음인-유씨인삼양위탕가백개자세신밀자

- ⑩ **痰氣鬱結證**[梅核氣, 胸膈痞悶或竄痛, 情志抑鬱, 躁急易怒, 咳嗽痰稠, 善太息, 月經不調, 舌苔膩, 脈弦滑]

태음인-갈근소간탕가행인절패모, 산조인소간탕가행인

소양인-시호소간탕가차전자

태양인-현호색소간탕가문합

소음인-향부자소간탕가반하강제

3. 五邪辨證

- (1) **風淫證候**[頭痛身痛, 肌肉關節痛, 或左或右, 或上或下, 痛無定處, 或口眼歪斜, 面部肌肉抽動, 或皮膚搔痒, 疹出色紅突起, 或四肢抽搐, 牙關緊急, 角弓反張, 或頭暈眼花, 手足顫動, 四肢麻木, 或頭暈脹, 耳鳴聾, 善太息, 肢體震顫, 躁急易怒, 舌脈不定]

- ① **風在頭**[頭痛, 或左或右或在顛頂]

태음인(열-갈근해기탕가천마선퇴 / 한-유씨한다열소탕가천마, 갈근해표탕가조구등선퇴)

소양인(열-형방사백산중용방풍 / 한-방풍해표탕가박하)

태양인(열-오가피쌍해산 / 한-오가피장척탕가백강잠)

소음인(열-천궁계지탕거계지가오약남성강제혹가백부자 / 한-천궁계지탕가오약남성강제세신혹가백부자)

- ② **風中面絡脈**[口眼歪斜, 或肌肉抽動]

태음인-천마구등탕, 감국구풍탕

소양인-방풍구풍탕

태양인-야교등백강잠탕중용백강잠

소음인-가감척담탕가오약청피백부자

- ③ **風在皮膚**[皮膚搔痒, 紅疹突起]

태음인-갈근질려탕, 창이자패장탕

소양인-자초한련초탕

태양인-어성초백강잠탕

소음인-인진지각탕

- ④ **風在肌肉關節**[肌肉關節痛, 竄痛不定, 左右相移]

태음인-갈근해기탕가천마선퇴, 갈근해표탕가조구등선퇴

소양인-방풍해표탕가박하혹가석고

태양인-오가피쌍해산

소음인-천궁계지탕가오약남성강제백부자

- ⑤ **風在筋骨**[四肢抽搐, 牙關緊急, 角弓反張]

태음인-천마구등탕, 감국구풍탕

소양인-방풍구풍탕

태양인-야교등백강잠탕중용백강잠

소음인-가감척담탕강약청피백부자

- (2) **火淫證候**[面紅目赤,口乾舌燥,口舌生瘡,齒痛,喉腫,耳鳴聾,大便秘結,小便黃赤,或衄血,咳血,吐血,便血,尿血,,或咳喘痰少,淡黃粘稠,胸脇灼痛,發疹發斑,或五心煩熱,潮熱盜汗,舌紅絳,脈洪數有力,或舌尖紅,脈細數無力]

① **火熱上炎**[目赤,喉腫,齒痛等]

태음인-갈근해독탕, 감국해독탕

소양인-가감양격산화탕

태양인-산장청인탕

소음인-황기해독탕

② **虛火上炎**[口舌生瘡等]

태음인-황금청심탕

소양인-황련청심탕

태양인-석곡청심탕

소음인-합환피청심탕

③ **陰虛肺熱**[咳嗽少痰或痰少而粘等]

태음인-맥문동양폐탕, 백합양폐탕

소양인-지황양폐탕

태양인-옥죽양폐탕

소음인-소자양폐탕

- (3) **濕淫證候**[頭暈沈,耳鳴聾,周身困重,四肢沈倦麻木痠痛,關節重痛,胸悶脘痞,納少嘔惡,腹脹腹痛,大便溏瀉,小便黃赤,黃白帶下,下肢沈痛,浮腫,麻木或足跟痛,舌淡嫩胖大,有齒痕,脈沈緩]

① **濕在上在外**[頭暈沈,耳鳴聾,皮膚濕疹等]

태음인(열-가감갈근부평탕 / 한-한다열소탕, 상지삼백초탕)

소양인(열-형방사백산 / 한-형방지황탕)

태양인(열-유씨오가피장척탕 / 한-잠사해표탕)

소음인(열-유씨인삼양이탕 / 한-이씨곽향정기산)

② **濕溢肌膚**[浮腫,小便不利等]

태음인-태음조위탕가부평, 상지부평탕

소양인-형방지황탕가저령

태양인-잠사해표탕가적소두

소음인-유씨인삼양이탕가대복피익모초

③ **濕在經絡**[四肢沈倦麻木痠痛,關節重痛等]

태음인(열-진교의이인탕 / 한-마황의이인탕, 상지의이인탕)

소양인(열-인동등지황탕 / 한-강활홍오탕)

태양인(열-포도근오가피탕 / 한-잠사오가피탕)

소음인(열-황기백출탕 / 한-오약창출탕)

④ **濕痰在肺**[咳嗽,痰多色白,胸滿等]

태음인-한다열소탕, 한다열소탕거마황가상백피백부근오미자

소양인-형방지황탕거산수유가전호초

태양인-교맥관장탕가문합양총피

소음인-유씨인삼양이탕가백개자세신밀자

⑤ 濕熱在肝膽[赤白帶下,小便黃赤不利等]

태음인(열-갈근청간탕가목통,하고초청간탕가삼백초목통 / 한-연자소간탕가포공영청
호지부자,산조인소간탕가삼백초목통지부자)

소양인(열-결명자청간탕가활석백화사설초 / 한-시호소간탕가치자활석연교)

태양인(열-웅담청간탕가천우슬와송어성초 / 한-현호색소간탕가천우슬어성초)

소음인(열-충울자청간탕중용청피인진 / 한-향부자소간탕가익모초인진)

⑥ 濕在脾胃[胸悶脘痞,納少嘔惡,腹脹便溏等]

태음인-태음조위탕,유씨태음조위탕

소양인-형방지황탕

태양인-교맥관장탕

소음인-이씨곽향정기산,或유씨인삼양이탕

⑦ 寒濕在腎[下肢浮腫,腰痛,足跟痛,形寒肢冷,肢節屈伸不利等]

태음인-건을온신탕,여정자건을탕

소양인-토사자온신탕

태양인-비해송화탕

소음인-관계부자이중탕

(4) 燥淫證候[口鼻乾燥,咽乾口渴,咳嗽痰少,痰粘如絲如珠,難于咳出,或痰中帶血,喘息胸痛,或胃脘灼痛,乾嘔,呃逆,大便燥結,小便短少,或肌肉消瘦,皮膚皴裂,乾燥如鱗(肌膚甲錯),舌乾紅,少苔,脈小數]

① 燥傷肺[咳嗽,痰少而粘,難于咳出,喘息胸痛等]

태음인-맥문동양폐탕,백합양폐탕

소양인-지황양폐탕

태양인-옥죽양폐탕

소음인-소자양폐탕

② 燥傷胃[胃脘灼痛,乾嘔,呃逆等]

태음인-맥문동양위탕,백합양위탕

소양인-생지황양위탕

태양인-석곡양위탕

소음인-작약양비탕

③ 燥傷大腸[大便乾結,排便困難(努責難下),數日一行,形體消瘦等]

태음인-갈근양비탕거원육가대황망초,사삼양비탕거원육가대황망초

소양인-천화분양비탕중용과루인가생지황

태양인-석곡양비탕중용도인적하수오

소음인-작약양비탕가당귀미아교

(5) 寒淫證候[頭與肢體關節肌肉劇痛,固定不移,遇寒則重,咳喘胸悶,呼吸氣促,痰多稀白,胃脘劇痛,得溫熱則痛減,舌淡隱青,脈沈緊有力,胸背徹痛,心悸,咳逆氣短,胸腹隱痛,嘔吐清水,納少腹脹,便溏,腰脊冷痛,小便清長,畏寒肢冷倦臥,神疲欲寢,舌淡脈微弱或沈遲]

① 寒在肌肉關節[頭與肢體關節肌肉劇痛,固定不移等]

태음인-마황발표탕가백지고본,갈근해표탕중용창이자거상백피

- 소양인-방풍해표탕
태양인-잠사해표탕
소음인-천궁계지탕가부자포
- ② 寒在肺[咳喘胸悶,呼吸氣促等]
태음인-마황정천탕, 갈근해표탕가자완관동화
소양인-방풍차전자탕가영지
태양인-오가피쌍해산가양충피송자
소음인-계지반하생강탕가세신
- ③ 心寒胸痺[胸背徹痛,心悸等]
태음인-단삼훼백탕
소양인-목단피과루인탕
태양인-도인현호색탕
소음인-당귀후박탕가백부자
- ④ 腎寒腰痛[腰脊冷痛,小便清長等]
태음인-건율보양탕, 연자보양탕
소양인-토사자보양탕
태양인-충초보양탕
소음인-홍삼보양탕
- ⑤ 胃寒痛[胃脘劇痛,得溫熱則痛減等]
태음인-태음조위탕가훼백, 유씨태음조위탕
소양인-맥아보위탕가선모
태양인-교맥관장탕
소음인-이씨곽향정기산가촉초
- ⑥ 寒結大腸[腹痛,手足不溫,久痢赤白,或冷積便秘等]
태음인-태음조위탕가대황훼백, 오매양장탕가대황
소양인-맥아보위탕가석류피금앵자
태양인-교맥관장탕
소음인-이씨이중탕

■ 체질별 방제

태음인 방제

H001. 가미해기탕

갈근8, 맥문동6, 황금6, 길경4, 행인4, 고본4, 마황4, 백지4, 승마4

H002. 갈근해표탕

백부근8, 갈근8, 창이자4, 고본4, 백지4, 길경4, 황금4, 상백피4, 상엽4, 마황2
 H003. 류씨한다열소탕
 의이인8, 백부근8, 길경4, 백지4, 고본4, 갈근4, 라복자4, 창이자4, 마황2, 상엽2
 H004. 백부근청열탕
 백부근8, 갈근8, 황금6, 상백피6, 감국4, 길경4, 상엽4, 승마4, 선퇴4, 백지2, 창이자2
 H005. 자완청열탕
 백부근8, 감국6, 자완6, 창이자4, 길경4, 황금4, 상백피4, 선퇴4, 고본2, 백지2
 H006. 갈근청열탕
 갈근12, 황금6, 길경6, 포공영4, 행인4, 담두시4, 선퇴4, 백지4, 고본4
 H007. 한다열소탕
 의이인12, 건률12, 라복자8, 행인4, 황금4, 마황4, 맥문동4, 길경4
 H008. 갈근포공령탕
 갈근12, 황금8, 포공영8, 노근8, 행인4, 길경4, 자완4, 질패모4
 H009. 자완상백피탕
 백부근8, 상백피8, 자완6, 황금6, 감국4, 노근4, 백선평4, 삼백초4, 행인4
 H010. 가미발표탕
 갈근8, 길경6, 마황6, 고본4, 행인4, 황금4, 백지4, 맥문동4, 승마4
 H011. 마황발표탕
 길경12, 마황6, 황금4, 행인4, 맥문동4
 H012. 갈근해기탕
 갈근12, 고본6, 황금6, 길경4, 백지4, 승마4
 H013. 상지부평탕
 의이인12, 갈근12, 부평초8, 상지8, 라복자4, 길경4
 H014. 마황부평탕
 의이인12, 건률12, 길경8, 부평초4, 마황4, 라복자4
 H015. 갈근승기탕
 갈근16, 대황8, 황금8, 길경4, 백지4, 승마4
 H016. 의이인승기탕
 갈근8, 황금8, 유근피8, 사삼4, 의이인4, 승마4, 행인4, 대황2
 H017. 열다한소탕
 갈근16, 고본8, 황금8, 길경4, 백지4, 라복자4, 승마4
 H018. 갈근라복자탕
 의이인8, 갈근8, 맥문동6, 황금4, 마황4, 길경4, 라복자4, 오미자4, 석창포4
 H019. 태음조위탕
 의이인12, 건률12, 라복자8, 마황4, 맥문동4, 길경4, 오미자4, 석창포4
 H020. 류씨태음조위탕
 의이인12, 건률12, 라복자8, 선곡4, 오미자4, 오매4, 석창포4, 유근피4
 H021. 웅담산
 웅담3~5푼 溫水調下
 H022. 가감갈근해기탕
 갈근12, 길경6, 고본6, 황금4, 백지4, 창이자4, 행인4, 백부근4, 담두시4

H023. 갈근의이인탕

의이인12, 갈근12, 황금8, 건률4, 맥문동4, 라복자4, 유근피4

H024. 황금의이인탕

의이인12, 갈근12, 황금8, 길경4, 대두황권4, 라복자4, 포공영4, 승마4

H025. 의이인삼백초탕

의이인12, 삼백초8, 갈근6, 황금6, 해동피4, 백지4, 유근피4, 길경4, 승마4

H026. 두황의이인탕

의이인12, 대두황권6, 황금6, 길경4, 갈근4, 마황4, 라복자4, 석창포4

H027. 우각청영탕

우각12, 맥문동8, 황금8, 단삼4, 패장4, 포공영4, 대황4

H028. 단삼청영탕

우각12, 포공영8, 황금8, 맥문동4, 패장4, 길경4, 단삼4

H029. 맥문동양액탕

맥문동8, 진교6, 천문동6, 마자인4, 사삼4, 상심자4, 황금4

H030. 여정실양액탕

사삼8, 여정실주증6, 황금6, 해송자4, 맥문동4, 상심자4, 지부자4

H031. 갈근소간탕

백질려염수초8, 갈근8, 담두시4, 백렴4, 조구등4, 라복자4, 산조인4, 여정실4, 연자육4

H032. 산조인소간탕

사삼8, 여정실8, 감국4, 조구등4, 라복자4, 백렴4, 산조인4, 유근피4, 백질려염수초4

H033. 갈근청간탕

갈근8, 황금8, 백질려염수초8, 맥문동4, 괴화4, 조구등4, 청고4, 저실자4, 대황2

H034. 하고초청간탕

갈근8, 여정실8, 백질려염수초4, 하고초4, 황금4, 조구등4, 산조인4, 감국4, 괴화2, 상엽2

H035. 백자양간탕

상황8, 저실자6, 여정실주증6, 백자인4, 맥문동4, 산조인4, 산약4, 오미자4, 오미자4

H036. 상자양간탕

여정실주증12, 상심자8, 산조인8, 사삼4, 저실자4, 감국4

H037. 연자보간탕

연자육8, 용안육6, 산약6, 산조인4, 백자인4, 녹각교炒珠4, 여정실주증4, 홍화2

H038. 여정자보간탕

여정실주증12, 산조인6, 용안육6, 상심자4, 단삼초, 녹각교炒珠2, 홍화2

H039. 단삼보간탕

여정실주증8, 단삼초8, 저실자4, 맥문동4, 백자인4, 산조인4, 상심자4

H040. 여두난간전

건률12, 라복자6, 여두6, 조각자4, 오미자4, 마황4, 여정실4, 해백4

H041. 연자보심탕

산약8, 연자육8, 라복자4, 석창포4, 산조인초4, 자노아4, 원지4, 용안육4, 맥문동4, 호박2

H042. 소맥보심탕

부소맥8, 연자육8, 오미자4, 백합4, 석창포4, 산조인초4, 원지4, 용안육4, 호박2, 황금2

H043. 백자양심탕

백자인8, 맥문동8, 천문동4, 자노아4, 목통4, 산조인4, 원지4, 용안육4

H044. 사삼양심탕

백합8, 산조인8, 사삼4, 호박4, 황금4, 오미자4, 백자인4, 원지4, 용안육4, 부소맥4

H045. 황금청심탕

황금8, 맥문동8, 대황4, 등심4, 백합4, 목통4, 천축황4, 우각4, 울금4

H046. 단삼해백탕

단삼8, 녹용6, 해백6, 백령4, 호박4, 홍황4, 길경4, 원지4, 울금4

H047. 이씨우황청심원

산약7돈, 포황초2돈반, 서각2돈, 대두황권초1돈7푼, 맥문동 황금 각1돈반,

길경 행인 각1돈3푼, 우황 1돈2푼, 영약각 용뇌 녹향 각1돈, 백령 7푼,

금박 140박 內40箔爲衣, 오매 20매...책참고!

H048. 청포천마탕

단삼주초8, 맥문동8, 천마6, 천패모6, 목통4, 백령4, 석창포4, 원지4, 천축황2, 호박2

H049. 가감승청탕

의이인12, 건률12, 라복자6, 해백4, 마황4, 목통4, 길경4, 오미자4, 석창포4, 원지4

H050. 연자건위탕

의이인초12, 연자육6, 용안육6, 라복자초4, 산약초4, 사삼4, 건률4, 오미자증4, 석창포4

H051. 의이인건비탕

의이인초12, 건률12, 산약초8, 원육4, 라복자초4, 오미자증4, 석창포4

H052. 갈근양비탕

노근12, 맥문동8, 갈근8, 행인4, 용안육4, 천문동4, 라복자초4, 백자인4

H053. 사삼양비탕

사삼12, 노근8, 노근피6, 맥문동6, 라복자초4, 용안육4, 행인4, 백자인4

H054. 마황보폐탕 亦治肺氣虛鼻塞症(流涕 遇寒冷則甚 倦怠 氣短 有汗 舌淡脈弱)

의이인8, 산약8, 길경8, 라복자4, 행인4, 마황4, 오미자2, 황금2

H055. 사삼보폐탕

의이인8, 산약8, 라복자4, 사삼4, 천패모4, 오미자4, 길경4, 행인4

H056. 맥문동양폐탕

맥문동12, 천문동6, 백합6, 길경4, 황금4, 용안육4, 오미자4.

H057. 백합양폐탕

백합8, 사삼8, 천패모4, 황금4, 맥문동4, 용안육4, 동상엽4, 오미자4

H058. 산약보폐탕

의이인8, 산약8, 녹용6, 호도육4, 길경4, 마황4, 맥문동4, 오미자4, 행인4, 해백4

H059. 녹용대보탕

의이인6, 맥문동6, 행인4, 마황4, 천문동4, 녹용4, 오미자4, 산약4

H060. 공진흑원단

녹용4~6兩, 산약 맥문동 각 4兩, 蟬蛻1~2兩, 녹향5돈 煮烏梅肉爲膏, 和丸梧子大, 溫湯下

50~70丸 或 燒酒下

*제조 代상황 맥문동 1兩

H062. 동과자온폐탕

동과인8, 행인6, 마황6, 자완4, 길경4, 라복자4, 녹각상4, 오미자4, 삼백피4

H063. 상황보음탕

상황12, 여정실주증8, 저실자8, 흑두4, 지부자4, 오미자증4, 상심자4

H064. 정심보음탕

여정실주증12, 저실자8, 상심자8, 오미자증4, 상황4, 사삼4, 지부자4

H065. 건롤보음탕

건롤12, 연자육8, 산약6, 호도육6, 녹용4, 쇠양4, 속단주초4

H066. 연자보양탕

연자8, 여정실주증6, 상심자6, 오미자증4, 속단주초4, 호도육4, 건롤4, 쇠양4, 지부자4

H067. 호도육보신탕

건롤12, 호도육8, 라복자6, 산약6, 녹용4, 오미자4, 맥문동4, 여두4

H068. 건롤온신탕

건롤12, 의이인12, 산약4, 마황4, 라복자4, 녹각상4, 오미자4, 지부자4

H069. 여정자건롤탕

건롤12, 여정자주증6, 지부자6, 산약4, 오미자4, 삼백초4, 삼백피4, 녹각상4

H070. 청호온담탕

의이인8, 청호6, 축여6, 비파엽4, 황금4, 동과인4, 라복자4, 절패모4

H071. 감국온담탕

사삼8, 감국6, 유근피6, 황금4, 축여4, 청호4, 비파엽4, 절패모4, 울금4

H072. 마황정통탕

의이인12, 건롤12, 마황8, 라복자8, 행인4, 백자인4, 맥문동4, 길경4, 오미자4, 석창포4, 사군자4, 용안육4

H073. 천문동도적산

천문동8, 등심4, 호장근4, 목통4, 포공영4, 포황4, 지부자4, 진교4

H074. 유근피도적산

백합8, 등심4, 호박4, 목통4, 포황4, 삼백초4, 유근피4, 지부자4

H075. 건롤보위탕

의이인초12, 건롤6, 산약초6, 사삼4, 라복자초4, 석창포4, 신곡4, 사당4, 오매2, 유근피2

H076. 맥문동양위탕

갈근8, 노근8, 맥문동8, 황금4, 황정4, 천문동4, 라복자초4, 비파엽4

H077. 백합양위탕

사삼8, 노근8, 유근피6, 맥문동6, 황금4, 라복자초4, 비파엽4, 백합4

H078. 갈근청위탕

갈근12, 황금8, 맥문동6, 유근피6, 노근4, 절패모4, 라복자초4, 비파엽4

H079. 유근피청위탕

황금8, 유근피8, 의이인4, 감국4, 절패모4, 비파엽4, 라복자초4, 삼백초4, 노근4

H080. 건롤청위탕

사삼8, 유근피8, 건롤6, 황금6, 의이인4, 라복자초4, 감국4, 삼백초4, 노근4

H081. 이건롤청위탕

의이인8, 건률8, 용안육6, 유근피6, 라복자초4, 오미자4, 사삼4, 석창포4, 노근2, 황금2
 H082. 연자육양장탕
 의이인초12, 건률12, 갈근煨, 라복자초4, 오미자4, 석창포4, 연자육4, 춘근피2, 해백2
 H083. 오매양장탕
 의이인8, 연자육8, 건률4, 라복자초4, 오미자4, 오매4, 유근피2, 저백피麩炒2
 H084. 갈근청장탕
 의이인8, 황금6, 거근백피麩炒6, 괴화4, 해동피4, 담두시4, 대황4, 유근피4, 갈근煨4
 H085. 유근피청장탕
 유근피8, 황금6, 의이인6, 해동피4, 감국4, 저근백피4, 괴화4
 H086. 연자소간탕
 의이인초8, 연자육8, 백령4, 라복자4, 오미자4, 석창포4, 백질려염수초4, 산조인4, 해백2, 조구등2
 H087. 오매소간탕
 의이인초8, 연자육8, 조구등4, 오미자4, 오매4, 산조인4, 유근피4, 여정실4, 백령4
 H088. 갈근화위탕
 의이인8, 갈근8, 백질려염수초4, 담두시4, 백령4, 비파엽4, 맥문동4, 라복자4, 유근피4
 H089. 유근피화위탕
 의이인8, 유근피8, 백질려염수초4, 백합4, 라복자4, 사삼4, 비파엽4, 감국2, 백령2
 H090. 천문동청폐탕
 천문동8, 황금6, 맥문동6, 비파엽4, 자완4, 절패모4, 상백피4
 H091. 상백피청폐탕
 사삼8, 황금6, 상백피6, 천문동4, 감국4, 비파엽4, 백선피4, 상엽4
 H092. 연자양혈탕
 산약8, 연자육8, 맥문동4, 녹가교炒珠4, 석창포4, 산조인초4, 단삼초4, 원지4, 용안육4, 백자인4
 H093. 단삼양혈탕
 백합8, 용안육8, 백자인4, 단삼4, 오미자4, 산조인초4, 원지4, 감국2, 황금2
 H094. 단삼건률탕
 건률12, 단삼6, 홍화6, 연자육4, 녹각4, 포황4, 상황4, 길경4
 H095. 단삼포황탕
 단삼8, 홍화8, 백령4, 호박4, 여정실주증4, 포황4, 숙단4, 상황4
 H096. 단삼대황탕
 단삼8, 황금6, 맥문동6, 길경4, 호장근4, 대황주증4, 백령4, 녹각4, 포황4
 H097. 가감단삼청영탕
 사삼8, 여정실8, 단삼4, 황금4, 포황4, 백령4, 우각4, 유근피4, 측백엽4
 H098. 마황통맥탕
 건률8, 단삼6, 진교6, 녹각상4, 석창포4, 여두4, 홍화4, 마황2, 고본2, 백지2
 H099. 홍화통맥탕
 여정실주증8, 사삼8, 홍화6, 단삼4, 고본4, 여두4, 진교4, 백지2, 녹각상2
 H100. 이동운조탕 亦治風熱血虛證(皮膚搔痒夜甚 皮膚變色如暗 皮膚色素沈着 皮膚組織肥厚 乾燥脫屑 或毛髮失榮脫落 舌質紅 苔少 脈細數)

맥문동8, 천문동6, 백질려6, 단삼4, 행인4, 패장4, 승마4, 지부자4, 부평초4

H101. 사삼윤조탕 亦治風熱血虛證

사삼8, 뱀부근6, 상엽6, 백선평4, 행인4, 맥문동4, 여정실주증4, 단삼4, 선평4

H102. 천마구등탕

천마6, 조구등6, 갈근4, 백령4, 조각자4, 석창포4, 원지4, 전충2, 오공2

H103. 감국구풍탕

조구등8, 감국6, 상지6, 천마4, 백령4, 석창포4, 선평4, 전충2, 원지2

H104. 갈근질려탕 亦治風熱作痒證, 風濕蘊膚證

백질려8, 부평초8, 지부자6, 해동피6, 괴화4, 백지4, 패장4, 승마2, 갈근2

*風熱作痒證-皮疹及搔痒無定處, 皮膚焮紅, 灼熱, 丘疹, 或斑疹, 結節, 皮膚脫屑, 夏節尤甚, 冬季輕減, 口渴咽乾, 大便燥, 小便短赤, 舌邊尖紅, 苔微黃, 脈浮數

*風濕蘊膚證-皮膚粟疹, 水疱, 搔痒無度, 或皮膚乾燥, 脫屑, 搔破潰爛流水(風이 重하면 上半身爲重, 粟疹爲主, 水疱不多, 搔痒無度 / 濕이 重하면 下半身爲主, 水疱多, 粟疹不多, 搔痒不止, 搔破潰爛流水).

*풍습온부증에서 풍이 중하면 중용백지가선평, 습이 중하면 용백질려부평1.0 가의이인삼백초

H105. 창이자패장탕 亦治風熱作痒證, 風濕蘊膚證

백선평6, 선평6, 백부근4, 창이자4, 감국4, 상엽4, 해동피4, 지부자4, 패장4, 부평초4

* 풍습온부증에서 풍이 중하면 중용부평, 습이 중하면 중용백선평가삼백초

H106. 갈근해독탕

갈근16, 황금8, 포공령8, 백령4, 맥문동4, 패장4, 길경4, 승마4

H107. 감국해독탕

사삼8, 감국6, 백선평6, 황금4, 백령4, 삼백초4, 상엽4, 선평4

H108. 상지삼백초탕

의이인8, 부평초6, 상지6, 라복자4, 삼백초4, 해동피4, 유근피4, 지부자4

H109. 가감갈근부평탕

의이인12, 부평초8, 갈근8, 곤포4, 길경4, 황금4, 맥문동4, 라복자4

H110. 마황의이인탕 亦治 寒者 風寒濕痺證

의이인12, 라복자6, 마황4, 백지4, 석창포4, 녹각상4, 해동피4, 해백2

*풍한습비증에서 寒重하면 중용휘백마황, 濕重하면 중용의이인

*風寒濕痺證-麻木疼痛, 得溫痛減, 遇陰雨寒冷則痛增, 疼痛劇烈時跛行, 或痛處腫脹, 不紅不熱. 寒濕重則肌體肌肉關節冷痛, 重着, 痛有定處, 屈伸不利, 晝輕夜重, 或痛處腫脹, 舌苔白膩, 脈弦緊或弦. 風邪挾則疼痛遊走, 痛無定處. 寒氣偏重則關節冷痛重着, 痛有定處. 濕氣偏重則關節冷痛, 腫脹, 皮色不紅.

H111. 상지의이인탕 亦治 寒者 風寒濕痺證

의이인12, 창이자6, 상지6, 백선평4, 곡기생4, 해동피4, 진교4

* 풍한습비증에서 한기편중 중용창자가마황소허, 습기편중 중용백선평상지

H112. 진교의이인탕 亦治熱者 風寒濕痺證

의이인12, 진교8, 목통6, 해동피6, 백령4, 라복자4, 곡기생4, 백자인4

*풍한습비증에서 한기편중 가녹각상석창포고본 或가창이자, 습기편중 거백자인중용의이인가 상지 或가백선평

H113. 마황정천탕 亦治風寒閉肺證(惡寒發熱,咳嗽喘促,痰稀,無汗,鼻塞,鼻涕,苔白,脈緊)

백과12, 마황12, 행인6, 관동화4, 황금4, 길경4, 맥문동4, 하복자4, 상백피4

H114. 의이인청폐탕 治肺經鬱熱犯鼻證

천문동8, 황금6, 비파엽6, 맥문동4, 백합4, 의이인4, 승마4, 창이자4, 포공영4

*鼻前孔皮膚紅腫,疼痛,灼熱,微痒,鼻塞,鼻涕粘稠或黃,咽乾,便燥,尿赤,舌紅苔黃,脈數.

H115. 창이자청폐탕

비파엽8, 황금6, 창이자6, 백합4, 백선피4, 상엽4, 사삼4, 맥문동4

H116 백지창이자탕 治熱毒外侵肺竅證

백지8, 황금8, 갈근8, 창이자4, 패장4, 길경4, 맥문동4, 포공영4

*鼻塞,黃涕粘稠,前頭痛,發熱微惡寒,口渴咽燥,便燥,尿短赤,舌紅苔黃 脈浮數.

H117. 조위승청탕 亦治心脾氣虛證

의이인12, 건률12, 라복자6, 오미자4, 석창포4, 산조인4, 원지4, 원육4, 길경4, 마황4,

맥문동4, 천문동4

*心悸胸悶,心胸隱痛,面色黃白,四肢倦怠,氣短懶言,語聲低微,飲食不振,食後腹脹,大便溏,肢體浮腫,小便不利,舌淡苔白,脈緩弱.

H118. 사삼유근피탕 治痰鬱胃熱證

비파엽8, 행인8, 의이인6, 라복자6, 황금4, 유근피4, 사삼4, 삼백초4, 오미자4, 맥문동4

*咳嗽夜甚,痰膠結難咯,或喉中痰鳴,心中煩熱,胸中悶痛,胃脘灼痛,渴喜冷飲,吞酸,口乾咽燥,口臭,小便短赤,便秘,舌質紅,苔黃厚,脈洪大或滑數.

H119. 연자생화탕 治寒者 產後瘀血阻滯證,產後血風症,產後流產後調理

의이인12, 연자육8, 상황8, 녹각교炒珠4, 포황4, 숙단4, 홍화4, 호장근2, 목통2

H120. 상황생화탕 治熱者 產後瘀血阻滯證,產後血風症,產後流產後調理

상화12, 의이인12, 천문동4, 녹각교炒珠4, 포황4, 초장근4, 숙단4, 목통4

H121. 여정자생화탕 治寒者 產後瘀血阻滯證,產後血風症,產後流產後調理

여정자주증8, 상황8, 의이인8, 백선피4, 오미자4, 포황4, 단삼4, 홍화4, 숙단4, 녹각교炒珠2

H122. 울금청담탕 治肝膽濕熱證,肝膽鬱熱證,脾膽鬱熱證

울금8, 유근피8, 갈근6, 포공영6, 대황4, 황금4, 라복자초4, 청호4

소양인 방제

P001. 이씨형방패독산

방풍4, 복령4, 차전자4, 독활4, 강활4, 형개4, 전호4, 시호4, 지골피4, 생지황4

P002. 방풍해표탕

방풍8g, 형개6, 강활6, 복령4, 전호4, 독활4, 금은화4, 연교4, 홍모오가피4

P003. 은교청열탕

금은화8, 사과락8, 차전자4, 방풍4, 형개4, 전호4, 석고4, 우방자4, 연교4, 생지황4, 박하2

P004. 방풍청열탕

방풍8, 금은화6, 사과락6, 복령4, 강활4, 전호4, 형개4, 차전자4, 연교4, 독활4

P005. 방풍차전자탕

방풍8, 강활6, 복령6, 차전자4, 형개4, 사과각4, 독활4, 전호초4
 P006. 사과각과루인탕
 사과각8, 전호8, 차전자4, 금은화4, 과루인4, 방풍4, 시호4, 연교4, 복령4, 백화사설초4
 P007. 형방사백산
 생지황12, 택사8, 복령8, 강활4, 형개4, 석고4, 방풍4, 독활4, 지모4
 P008. 류씨저령차전자탕
 복령8, 택사8, 저령6, 차전자6, 시호4, 지모4, 방풍4
 P009. 지황백호탕
 석고20, 생지황16, 지모8, 독활4, 방풍4
 P010. 저령차전자탕
 복령8, 택사8, 저령6, 차전자6, 강활4, 형개4, 방풍4, 석고4, 독활4, 지모4
 P011. 형방도적산
 생지황12, 목통8, 과루인6, 현삼6, 독활4, 형개4, 전호4, 강활4, 방풍4
 * 거목통(태음인약) 代사과각
 P012. 류씨소시호탕
 방풍8, 복령6, 형개6, 강활4, 과루인4, 독활4, 시호4, 숙지황4
 P013. 형방지황탕
 복령8, 산수유8, 택사8, 숙지황, 강활4, 형개4, 방풍4, 차전자4, 독활4
 * 숙지황代紅毛五加皮
 P014. 독활지황탕
 숙지황16, 산수유8, 택사6, 복령6, 방풍4, 독활4, 목단피4
 P015. 활석고삼탕
 복령8, 고삼8, 활석8, 택사8, 방풍4, 독활4, 황백4, 황련4, 형개4, 강활4
 P016. 황련청장탕
 생지황16, 목통8, 택사8, 복령8, 황련4, 저령4, 방풍4, 차전자4, 강활4
 * 거목통
 P017. 지황청영탕
 생지황12, 현삼8, 금은화8, 황련4, 석고4, 연교4, 치자4, 지모4
 P018. 양격산화탕
 인동등8, 연교8, 생지황8, 형개4, 방풍4, 석고4, 박하4, 치자4, 지모4
 P019. 별갑지골피탕
 건지황12, 지골피8, 구판교6, 별갑초6, 황백4, 목단피4, 복령4, 지모4
 P020. 홍맥건비탕
 홍맥8, 복령8, 맥아8, 토사자4, 맥이당4, 택사4, 영지4, 연교2, 방풍2
 P021. 숙지황고삼탕 治寒者 腎陰虛兼膀胱濕熱證
 숙지황16, 산수유8, 택사6, 복령6, 황백4, 고삼4, 지모4
 P022. 시호소간탕
 숙지황8, 시호6, 복령6, 맥아초4, 박하4, 과루피4, 택사4, 목단피4
 P023. 대맥소간탕
 복령8, 홍맥8, 방풍6, 맥아초6, 대맥근4, 형개4, 택사4, 박하2, 시호2, 과루피2
 P024. 결명자청간탕

견지황8, 결명자8, 별갑6, 시호6, 차전자4, 구판4, 모려분4, 치자4
 P025. 구기자양간탕
 숙지황16, 산수유8, 구기자8, 목단피4, 복령4, 택사4, 구판4
 P026. 숙지황보간탕
 산수유8, 구기자8, 형개6, 복령6, 택사4, 숙지황4, 방풍4
 P027. 생지황보간탕
 숙지황16, 생지황8, 구기자8, 산수유4, 택사4, 복령4, 한련초4
 P028. 복령보심탕
 복령12, 구기자8, 영지8, 백복신4, 홍맥4, 시호2, 모려분2
 P029. 지황양심탕
 숙지황12, 구기자6, 복령6, 백복신4, 구판4, 지골피4, 생지황4, 천화분4
 P030. 복신보심탕
 영지8, 복령8, 홍맥4, 토사자4, 백복신4, 숙지황4, 방풍4
 P031. 황련청심탕
 생지황12, 황련6, 복령6, 현삼4, 박하4, 모려분4, 연교4, 치자4
 P032. 목단피과루인탕
 대맥근12, 복령8, 과루인초8, 목단피4, 사과락4, 생지황4
 P033. 복신과루인탕
 백복신12, 과루인6, 영지6, 대맥근4, 복령4, 목단피4, 모려분4, 연교4, 치자초4
 P034. 천화분양비탕
 숙지황16, 복령8, 천화분4, 과루인4, 석고4, 택사4, 지모4
 P035. 가감독활지황탕
 숙지황8, 복령8, 택사8, 독활4, 방풍4, 토사자4, 선모4
 P036. 방풍보폐탕
 복령8, 영지8, 홍맥6, 방풍6, 맥이당4, 토사자4, 전호초4
 P037. 지황양폐탕
 숙지황12, 생지황6, 현삼6, 한련초4, 지골피4, 천화분4, 지모4, 황백2
 P038. 이씨육미지황탕
 숙지황16, 산수유8, 구기자8, 택사6, 복령6, 목단피4
 P039. 산수유보신탕
 산수유8, 복령8, 토사자8, 복분자4, 택사4, 홍맥4, 영지4, 구기자4
 P040. 토사자보양탕
 숙지황8, 복령8, 토사자8, 산수유8, 구기자4, 구자4, 택사4, 선모4
 P041. 구판보음탕
 숙지황16, 택사8, 산수유8, 한련초4, 목단피4, 복령4, 구기자4, 구판4
 P042. 토사자온신탕
 구기자8, 택사8, 복령8, 산수유6, 저령6, 목단피4, 구자4, 선모4
 P043. 치자온담탕
 복령4, 치자4, 과루피4, 황련4, 사과락4, 시호4, 연교4, 지모4
 P044. 가감팔정산
 복령4, 치자4, 차전자4, 활석4, 저령4, 석고4, 택사4, 생지황4

P045. 맥아보위탕

맥이당8, 맥아초8, 영지8, 복령6, 홍맥초6, 대맥근4, 토사자4, 방풍4

P046. 생지황양위탕

숙지황12, 생지황6, 복령6, 모려분4, 석고4, 택사4, 천화분4, 지모4

P047. 황련청위탕

생지황12, 복령8, 지모8, 모려분4, 석고4, 치자초4, 황련초4,

P048. 토사자양장탕

복령12, 맥아초8, 택사8, 홍맥4, 금앵자4, 토사자4, 석류피2, 황련초2

P049. 삼황양심탕

숙지황16, 택사6, 복령6, 생지황4, 목단피4, 치자초2, 시호초2, 석고2, 활석2, 황백초2, 황련초2, 지모초2

P050. 토사자소간탕

복령12, 맥아초6, 시호6, 홍맥4, 박하4, 차전자4, 토사자4

P051. 시호화위탕

복령8, 맥아초초6, 시호6, 생지황6, 박하4, 택사4, 모려분4, 황련초2

P052. 치자황련탕

복령8, 택사8, 차전자4, 활석4, 황련4, 저령4, 치자4, 백화사설초4

P053. 숙지황목단피탕

숙지황8, 홍맥8, 복령6, 형개6, 목단피4, 영지4, 대계4

P054. 생지황목단피탕

숙지황12, 목단피6, 시호6, 자초4, 과루인4, 대계4, 석고4, 생지황4

P055. 가감지황청영탕

생지황12, 택사6, 현삼6, 한련초4, 석고4, 금은화4, 치자4

P056. 방풍통맥탕

숙지황8, 방풍8, 독활6, 강활6, 홍모오가피4, 목단피4, 사과락4, 홍맥4,

P057. 생지황윤조탕 亦治風熱血虛證

생지황12, 한련초6, 숙지황6, 형개4, 목단피4, 우방자4, 방풍4, 천화분4, 독활4, 금은화4

P058. 방풍구풍탕

방풍8, 인동등6, 형개6, 사과락4, 강활4, 백복신4, 모려분2, 시호2

P059. 자초한련초탕 亦治風熱作痒證, 風濕蘊膚證

방풍8, 독활6, 형개6, 한련초4, 고삼4, 금은화4, 자초4, 우방자4, 연교4

*풍습은부증에서 風重하면 거한련초 用독지1.0 重用우방자형개 加강활, 濕重하면 用방풍형개1.0重用자초한련초연교 或加백화사설초

P060. 가감양격산화탕

인동등8, 연교8, 생지황8, 황련4, 백화사설초4, 석고4, 박하4, 치자4, 지모4

P061. 강활홍오탕 亦治寒者 風寒濕痺證

방풍8, 강활6, 독활6, 홍모오가피4, 영지4, 선모4, 대맥근4, 복령4, 사과락2, 인동등2

* 풍한습비증에서 寒重하면 用방풍1.0 重用선모, 濕重하면 加저령

P062. 인동등지황탕 亦治熱者 風寒濕痺證

인동등12, 방풍6, 사과락6, 숙지황4, 강활4, 시호4, 독활4

* 풍한습비증에서 寒重하면 用방풍1.0 重用강활독활, 濕重하면 加저령

P063. 사과락청폐탕 治肺經鬱熱犯鼻證

사과락8, 지모6, 현삼6, 치자4, 숙지황4, 석고4, 차전자4, 과루인4, 백화사설초4, 박하2

P064. 양격청폐탕 治熱毒外侵肺竅證

금은화12, 연교12, 방풍4, 형개4, 과루인4, 황련4, 석고4, 생지황4, 박하4

P065. 숙지황생화탕 治寒者 產後瘀血阻滯證, 產後血風症, 產後流產後調理

숙지황8, 택사8, 복령8, 형개6, 방풍6, 목단피4, 대계4, 영지4

P066. 생지황생화탕 治熱者 產後瘀血阻滯證, 產後血風症, 產後流產後調理

숙지황16, 택사8, 목단피4, 대계4, 구판4, 형개4, 생지황4, 복령4

P067. 숙지황독활탕

숙지황8, 독활8, 방풍6, 복령6, 구기자4, 강활4, 홍모오가피4, 인동등4

태양인 방제

L001. 류씨오가피장척탕

목적8, 포도근8, 향유8, 모과4, 양총피4, 송절4, 산장과4, 오가피4

L002. 잠사해표탕

향유8, 잠사6, 곽향6, 오가피4, 양총피4, 포도근4, 모과4, 송절4

L003. 오가피장척탕

오가피16, 모과8, 청송절8, 노근4, 앵도육4, 교맥미4, 포도근4

* 거노근(태음인약물)

L004. 목적쌍해산

오가피12, 포도근8, 모과8, 앵도육4, 목적4, 송화4, 잠사4

L005. 오가피청열탕

향유8, 백강잠6, 목적6, 어성초4, 구인4, 오가피4, 산장4, 백모근4

L006. 잠사청열탕

오가피8, 향유8, 어성초4, 모과4, 양총피4, 잠사4, 산장4, 곽향4, 목적4

L007. 오가피쌍해산

포도근8, 목적8, 백강잠8, 오가피4, 모과4, 청송절4, 향유4

L008. 석옥승기탕

생석곡20, 생옥죽20, 적하수오6, 백모근6, 산앵도인4, 미후도4, 구인4

L009. 미후도승기탕

생석곡10, 생옥죽10, 미후도8, 산앵도인6, 저두강6, 교맥미4, 구인4

L010. 교맥관장탕

교맥12, 곽향6, 목향6, 향유4, 저두강4, 백편두4, 앵도육4, 송화4, 양강4

L011. 류씨미후도식장탕

연조미후도8, 곽향6, 목향6, 백편두4, 오가피4, 저두강4, 양강4, 앵도육4, 송화4

L012. 미후도식장탕

연조미후도(다래)16, 모과8, 포도근8, 앵도육4, 노근4, 오가피4, 저두강4, 송화4

*거노근 / 미후도= 키워

L013. 산장청영탕

석곡12, 산장8, 백모근8, 구인4, 백강잠4, 어성초4

*석곡대신 생석곡30g을 쓰면 더욱 좋다.

L014. 어성초청영탕

어성초12, 백모근8, 연조미후도8, 구인4, 석곡4, 산장과4, 옥죽4

L015. 석곡옥죽탕

생석곡20, 생옥죽16, 회우슬주증8, 백모근4, 구인4, 적하수오4, 진주모4

L016. 미후도옥죽탕

연조미후도12, 옥죽8, 백모근4, 적하수오4, 석곡4, 회우슬주증4, 백하수오4

L017. 모과실비탕

비해12, 백편두초8, 적소두8, 모과초4, 오가피4, 옥미수4, 송화4, 곽향4

L018. 백모근탕

백모근12, 옥미수8, 천우슬8, 구인4, 적소두4, 비해4, 교맥4

L019. 어성초제습탕

비해8, 어성초8, 옥미수8, 연조미후도4, 앵도육4, 오가피4, 백모근4, 천우슬4

L020. 현호색소간탕

미후도8, 교맥8, 현호색4, 모과4, 석곡4, 양강2, 석결명2, 진주모2, 적하수오2

L021. 용담청간탕

적하수오8, 석곡8, 석결명6, 진주모6, 산장4, 미후도4, 초롱담4, 구인4

L022. 미후도양간탕

미후도12, 적하수오증8, 회우슬주증8, 백하수오4, 석결명4, 석곡4, 옥죽4

L023. 계혈등보간탕

계혈등8, 백하수오8, 적하수오증6, 회우슬주증6, 미후도4, 모과4

L024. 백모근보간탕

미후도12, 백하수오8, 회우슬주증8, 백모근4, 적하수오증4, 옥죽4, 계혈등4

L025. 음양곽난간전

음양곽8, 미후도8, 회우슬주증8, 모과4, 오가피4, 포도근4, 현호색4, 양강4

L026. 당삼보심탕

당삼12, 옥촉서8, 야교등6, 송엽6, 앵도육4, 송화4, 자오가피4, 진주모4

L027. 야교등양심탕

야교등12, 석곡8, 옥죽8, 진주모4, 옥촉서4, 연조미후도4

L028. 석곡청심탕

석곡12, 진주모6, 백모근6, 초롱담4, 연조미후도4, 구인4, 야교등4

L029. 도인현호색탕

현호색8, 도인6, 양총피6, 도초4, 홍국4, 송화4, 천우슬4, 야교등4

L030. 야교등백강잠탕

백강잠8, 야교등8, 진주모4, 자오가피4, 석곡4, 양총피4, 구인4, 송엽4

L031. 비해송화탕

비해12, 송화8, 향유4, 저두강4, 문합4, 양강4

L032. 교맥건비탕

당삼12, 저두강6, 아삼6, 모과초4, 교맥4, 백편두초4, 앵도육4, 곡아4

L033. 당삼보기탕

당삼12, 교맥미8, 송화8, 백하수오4, 아삼4, 앵도육4, 백편두초4, 향유1.2, 곽향1.2

L034. 석곡양비탕

석곡12, 백하오8, 옥죽8, 저두강4, 연조미후도4, 도인4, 적하수오4

L035. 이삼보폐탕

아삼12, 송화6, 당삼6, 양총피4, 옥촉서4, 동충하초4

L036. 옥죽양폐탕

옥죽12, 백모근6, 석결명6, 백하수오4, 동충하초4, 석곡4, 구인4

L037. 아삼온폐탕

송자8, 양총피8, 향유4, 아삼4, 산앵도인4, 송화4, 비해4, 동충하초4

L038. 원잠보음탕

옥죽12, 회우슬주증8, 적하수오증8, 백하수오4, 석결명4, 석곡4, 원잠4, 미후도4

L039. 당삼보신탕

백하오8, 회우슬주증8, 자오가피6, 산앵도4, 옥죽4, 당삼4, 음양곽4

L040. 충초보양탕

옥죽주증12, 백하수오8, 회우슬주증6, 음양곽6, 동충하초4, 발계4, 원잠아4

L041. 산장온담탕

연조미후도8, 용담초4, 저두강4, 문합4, 백모근4, 산장4, 와송4

L042. 당삼보위탕

당삼8, 곡아6, 홍국6, 연조미후도4, 모과초4, 현호색4, 앵도육4, 교맥4, 송화4

L043. 석곡양위탕

석곡12, 백하수오8, 연조미후도8, 미후리엽4, 백모근4, 백편두4, 저두강4, 옥죽4

L044. 미후도청위탕

연조미후도12, 백모근8, 미후리엽8, 용담초4, 저두강4, 석곡4, 옥죽4

L045. 당삼양장탕

당삼8, 백편두초6, 산앵도6, 교맥4, 발계4, 곡아4, 연조미후도4, 송화4

L046. 미후도청장탕

현지초8, 선학초8, 백모근6, 적하오6, 곡아4, 백편두4, 연조미후도4, 산장4, 적소두4

L047. 당삼소간탕

교맥8, 당삼8, 백편두초4, 현호색4, 모과초4, 미후도4, 곡아4, 진주모2, 석결명2

L048. 현호색화위탕

연조미후도12, 모과초6, 현호색6, 저두강4, 곡아4, 백모근4, 미후리엽4, 잠사포전4, 진주모2

L049. 문합청폐탕

적하수오8, 백모근8, 문합6, 구인6, 산장4, 석결명4, 송자4

L050. 백하오양혈탕

당삼8, 백하수오6, 야교등6, 교맥4, 백편두4, 저두강4, 옥촉서4, 송화4, 계혈등4, 진주모2

L051. 야교등음양곽탕

당삼12, 음양곽6, 야교등6, 진주모4, 앵도육4, 송화4, 동충하초4

L052. 도인백모근탕

도인8, 천우슬8, 계혈등4, 현호색4, 홍국4, 오가피4, 미후도근4, 송절4, 백모근4

L053. 가감산장청영탕

백모근8, 산장8, 목적4, 연조미후도4, 구인4, 석곡4, 와송4

L054. 계혈등통맥탕

송절8, 오가피8, 계혈등6, 야교등6, 포도근4, 도초(栲草)4, 양강4, 모과4

L055. 백하오당삼탕

당삼16, 백하수오16

L056. 하수오윤조탕 亦治風熱血虛證

옥죽12, 앵도육6, 야교등6, 적하수오4, 백강잠4, 선학초4, 송엽4, 목적4

L057. 어성초백강잠탕 亦治風熱作痒證, 風濕蘊膚證

어성초8, 송엽8, 백강잠6, 목적6, 선학초4, 야교등4, 잠사포전4, 와송2, 적하오2

* 풍습온부증에서 風重하면 用어성초1.0 重用잠사, 濕重하면 去목적적하수오 重用와송 加비해

L058. 산장청인탕

어성초8, 산장8, 백강잠4, 구인4, 목적4, 미후도근4, 도엽4, 와송4

L059. 잠사오가피탕 亦治寒者 風寒濕痺證

발계12, 음양곽8, 송절8, 모과4, 오가피4, 포도근4, 저두강4, 천우슬4, 잠사포전4

*풍한습비증에서 寒重하면 用모과천우슬0.5, 濕重하면 重用포도근오가피

L060. 포도근오가피탕 亦治熱者 風寒濕痺證

포도근12, 석곡8, 오가피4, 미후리엽4, 비해4, 백강잠4, 천우슬4, 야교등4

*풍한습비증에서 寒重하면 去미후이엽 用포도근2.0加송절, 濕重하면 用야교등0.5 석곡1.0 重用비해

L061. 이향정기산 亦治寒者 외감풍한으로 인한 內傷濕滯證, 風寒挾濕證

곽향6, 모과4, 오가피4, 향유4, 저두강2, 발계2, 목적2, 양강2, 백편두2, 양충피2, 잠사포전2

L062. 백모근청폐탕 治肺經鬱熱犯鼻證

백모근8, 구인6, 어성초6, 석곡4, 문합4, 옥죽4, 승자4, 산장4

L063. 도인생화탕 治熱者 產後瘀血阻滯證, 產後血風症, 產後流產後調理

적하수오주증8, 옥죽8, 회우슬6, 영실6, 오가피4, 미후도근4, 백모근4, 도인4

L064. 현호색생화탕 治寒者 產後瘀血阻滯證, 產後血風症, 產後流產後調理

백하수오8, 오가피8, 회우슬6, 택란6, 계혈등4, 현호색4, 당삼4, 영실4

L065. 이어성초백강잠탕

연조미후도16, 선학초4, 야교등4, 목적4, 어성초4, 송화4, 모과4, 저두강4, 백강잠4, 포도근4

L066. 우슬오가피탕

회우슬주증8, 오가피8, 음양곽6, 송절6, 적하오주증4, 발계4, 잠사4, 모과4

소음인 방제

R001. 가감천궁계지탕

계지4, 모당귀4, 대조4, 생강4, 창출4, 자감초4, 천궁4, 진피4, 소엽4, 신이4

R002. 궁귀 향소산 亦治寒者 肺氣虛鼻塞證

향부자8, 총백5, 창출4, 당귀4, 대조4, 생강4, 자감초4, 천궁4, 자소엽4, 진피4

* 폐기허비색가인삼황기신이

R003. 이씨곽향정기산

광곽향6, 생강4, 대조4, 자소엽4, 백출2, 대복피2, 반하강제2, 계피2, 자감초2, 창출2, 건강2, 익지인2, 청피2, 진피2

R004. 황기청열탕

황기8, 총위자6, 신이6, 생강4, 창출4, 모당귀4, 인진4, 반하강제4, 소엽4, 총백2, 세신2, 감초2

R005. 소엽청열탕

창출6, 신이6, 인진4, 총위자4, 계지4, 생강4, 반하강제4, 소엽4, 진피4, 세신4, 총백2, 감초2

R006. 계지반하생강탕

생강12, 반하강제8, 계지8, 백출4, 자감초4, 백작약4, 진피4

R007. 황기소엽탕

황기12, 인진12, 백작약8, 감초4, 당귀4, 대조4, 생강4, 소엽4

R008. 계지소엽탕

계지12, 황기8, 백작약8, 당귀4, 감초4, 대조4, 생강4, 소엽4

R009. 천궁계지탕

계지12, 백작약8, 대조4, 생강4, 창출4, 자감초, 천궁4, 진피4

R010. 황기계지탕

계지12, 황기8, 백작약8, 당귀4, 자감초4, 백하수오4, 대조4, 생강4

* 거백하수오(태양인약)

R011. 계지탕

계지12, 백작약8, 감초4, 생강4, 대조4

R012. 이씨이중탕

백출8, 계지8, 건강포8, 인삼8, 백작약8, 자감초4, 진피4

* 백하수오代인삼

R013. 팔물군자탕

인삼8, 천궁4, 당귀4, 대조4, 생강4, 자감초4, 황기4, 백출4, 백작약4, 진피4

R014. 이씨보중익기탕 亦治肺氣虛鼻塞證

황기12, 인삼12, 대조4, 생강4, 자감초4, 백출4, 당귀4, 진피4, 소엽2, 광곽향2

*폐기허비색증가계지세신毛當歸

*내상잡병減인삼황기1.5~2.0

R015. 승양익기탕

계지8, 황기8, 인삼8, 백작약8, 당귀4, 자감초4, 백하수오4, 대조4, 생강4, 육계4

*거백하수오

R016. 독삼팔물탕

인삼40, 천궁4, 당귀6, 대조4, 생강4, 자감초4, 황기4, 백출4, 백작약4, 진피4

R017. 류씨인삼양위탕

창출8, 반하강제6, 생강6, 대조4, 자감초4, 광곽향4, 후박, 인삼4, 백작약4, 진피4

R018. 관계부자이중탕

인삼12, 육계8, 건강포8, 백출8, 부자포4, 자감초4, 백작약4, 진피4

R019. 백작약보음탕

백작약8, 아교8, 충위자6, 수삼6, 감부리4, 사원자4, 나도근4

R020. 인삼오수유탕

인삼40, 생강12, 오수유12, 당귀4, 백작약4, 육계4

R021. 이중탕

인삼8, 백출8, 건강8, 자감초8

R022. 삼미삼유탕

오수유12, 인삼8, 생강4, 대조4

R023. 인삼계지탕

자감초7.2, 계지7.2, 백출6, 인삼6, 건강6

R024. 인삼부자이중탕

인삼8, 백출8, 건강포8, 자감초4, 부자포4

R025. 작약청영탕

충위자12, 백작약8, 인진8, 감초4, 나도근4, 수삼4

R026. 가감작약청영탕

백작약12, 자감초8, 충위자8, 황기4, 아교4, 수삼4

R027. 인진충위자탕

인진12, 황기8, 충위자8, 백작약4, 백출4, 지실4, 진피4

R028. 십이미관중탕

청피4, 대조4, 건강4, 향부자4, 적하수오4, 백하수오4, 익지인4, 양강4, 진피4, 목향2, 후박2, 지실2, 대복피2

*거백하수오 적하수오 양강(태양인약)

R029. 향부자소간탕

창출6, 향부자6, 천궁4, 백작약초4, 소엽6, 지각초4, 진피초4, 청피2, 자감초2

R030. 향부자팔물탕 治肝氣鬱結證,婦人思慮傷脾證

당귀8, 향부자8, 백작약8, 대조4, 생강4, 자감초4, 천궁4, 백하수오4, 백출, 진피4

*거백하수오

R031. 충위자청간탕

충위자8, 백작약8, 향부자4, 감초4, 인진4, 청피4, 지실4, 희침4

R032. 백작약양간탕

아교8, 백작약8, 당귀4, 희침주증4, 감초4, 충위자4

R033. 당귀보간탕

당귀8, 백작약8, 사원자4, 대조4, 생강4, 구감초4, 아교4, 천궁4

R034. 오수유부자이중탕

인삼, 백출, 건강포, 관계 각8, 백작약, 진피, 구감초, 오수유, 소회향, 파고지 각4, 부자포 4~8

R035. 인삼보심탕

인삼12, 대조8, 합환피4, 구감초4, 소엽4, 진피4

R036. 대조양심탕

수삼8, 대조6, 백작약6, 합환피6, 황기4, 당귀4, 감초4, 아교4
 R037. 합환피청심탕
 수삼12, 향부자6, 합환피6, 적작약4, 인진4, 당귀4, 감초4, 지실4
 R038. 당귀후박탕
 후박8, 계지8, 생강4, 구감초4, 천궁4, 적작약4, 토당귀4, 진피4, 산사4
 R039. 삼부탕
 부자포12, 인삼6
 R040. 가감조담탕
 반하강제6, 지실6, 생강4, 굴호4, 인삼4, 남성강제4, 천궁4, 감초2
 R041. 백출건비탕
 백출8, 인삼6, 진피6, 생강4, 구감초4, 후박4, 반하강제4, 대조4, 계내금구4
 R042. 작약양위탕
 백작약8, 수삼8, 지실6, 대조4, 나도근4, 감초4, 감부리4
 R043. 소자양폐탕
 백작약8, 아교6, 당귀신4, 가자육4, 소자밀구6, 수삼4, 감초4
 R044. 홍삼보양탕
 홍삼8, 사원자6, 백작약6, 당귀4, 익지인4, 두충염수초4, 부자포2, 구감초2, 건강2
 R045. 인진온담탕
 인진8, 생강6, 반하강제6, 구감초4, 백작약4, 지실초4, 진피4
 R046. 황기보위탕
 나교당16, 백작약8, 계지4, 구감초4, 대조4, 황기4, 생강4, 계내금구4
 R047. 인진청위탕
 인진8, 백작약초6, 지실초6, 대조4, 나도근4, 생강4, 수삼4, 감초4, 감부리4
 R048. 가감작약탕
 백작약12, 당귀6, 산사炒焦, 구감초4, 빈랑4, 목향燉, 육계4, 지각초4, 희침4
 R049. 향사양위탕
 백두구4, 백출4, 반하강제4, 대조4, 생강4, 구감초4, 건강4, 향부자4, 인삼4, 백작약4, 사
 인4
 산사4, 진피4
 R050. 가감귀비탕
 백출4, 당귀신4, 대조4, 구감초4, 합환피4, 황기4, 인삼4, 백작약4, 목향2
 R051. 승양익기부자탕
 계지8, 황기8, 인삼8, 백작약8, 부자포4, 구감초4, 백하수오4, 대조4, 생강4, 육계4
 *거백하수오
 R052. 당귀작약탕
 토당귀8, 익모초6, 적작약6, 감초4, 천궁4, 계지4, 오령지4, 지각4, 당귀미4
 R053. 당귀통맥탕
 토당귀8, 계지8, 백작약8, 천궁4, 구감초4, 생강4, 오수유2, 세신2
 R054. 독삼탕
 인삼20~40
 R055. 당귀윤조탕 亦治風熱血虛證

당귀8, 적작약6, 지각초6, 천궁4, 소엽4, 대조4, 애엽4, 감초2

R056. 인진지각탕 亦治風熱作痒證,風濕蘊膚證

인진8, 지각초6, 모당귀6, 감초4, 익모초4, 애엽4, 소엽4, 생강4, 진피4

*풍습온부증에서 風重하면 거인진용애엽익모초0.5중용모당귀,濕重하면 가천련자

R057. 황기해독탕

황기8, 충위자6, 인진6, 감초4, 희침4, 천궁4, 감부리4, 수삼4, 지유4

R058. 오약창출탕 亦治寒者 風寒濕痺證

창출8, 토당귀6, 오약6, 모당귀4, 계지4, 구척4, 생강4, 세신2, 구감초2

*풍한습비증에서 寒重하면 重用계지세신或加부자,濕重하면 용오약1.0중용모당귀

R059. 황기백출탕 亦治熱者 風寒濕痺證

백출초12, 황기8, 모당귀4, 생강4, 토당귀4, 적작약4, 오약4, 희침4

*풍한습비증에서 寒重하면 용황기1.0 加계지총백,濕重하면 重用모당귀

R060. 신이청폐탕 亦治肺經鬱熱犯鼻證

신이8, 아교6, 충위자6, 소자밀구4, 가자육4, 지각4, 황기4, 수삼4, 감초4

R061. 창출생화탕 治寒者 產後瘀血阻滯證,產後血風症,產後流產後調理

창출8, 당귀6, 익모초6, 계지4, 향부자4, 천궁주초4, 백작약초4, 산사4, 인삼2, 구감초2

*관절통加토당귀

R062. 익모초생화탕 治熱者 產後瘀血阻滯證,產後血風症,產後流產後調理

익모초8, 당귀6, 백출6, 향부자4, 황기4, 천궁주초4, 백작약초4, 산사4, 인삼2, 감초2

R063. 두충구척탕 두충염수초, 구척6, 모당귀6, 백작약4, 천궁4, 계지4, 당귀4, 세신2, 감초2

*관절통加토당귀