

사상임상의학회

체질별 정리

-목차-

<소음인>

1. 소음인의 판별-----3
2. 소음인 한열, 표리, 병위, 처방의 관계-----9
3. 소음인 약물의 가감 및 질환별 처방운용-----16

<소양인>

1. 소양인의 판별-----40
2. 소양인 한열, 표리, 병위, 처방의 관계-----48
3. 소양인 약물의 가감 및 질환별 처방운용-----58

<태음인>

1. 태음인의 판별-----97
2. 태음인 한열, 표리, 병위, 처방의 관계-----104
3. 태음인 약물의 가감 및 질환별 처방운용-----110

<태양인>

1. 태양인의 판별-----170
2. 태양인 한열, 표리, 병위, 처방의 관계-----174
3. 태양인 약물의 가감 및 질환별 처방운용-----175
4. 태양인 처방-----184

<소음인>

1. 소음인의 판별

성정

- 소양인은 결정을 빨리 하고 판단력이 빠르다. 판단을 정확하게 한다는 말과는 의미가 다름. 반면에 소음인은 검색해야 할 것이 많으므로 판단이 느리다.
- 소음인은 아무리 채찍질을 해도 달리지 않는 소다.
- 과거지향적.
- 소음인 태음인은 기존의 친한 친구와 헤어지면 새로운 친구를 만들기가 너무 어렵기 때문에 차라리 고통을 주더라도 과거의 친구를 좋아한다.
- 생각의 노출이 잘 안 된다.
- 과거의 경험을 잊어버리고 생각과 행동이 반사적으로 이루어지는 것이 양인. 침착하게 과거의 실수를 기억해서 다시 반복하지 않는 것은 음인. 양인들은 그냥 반사적으로 행동하는 경향이 있다.
- 고려사항이 너무 많은데서 오는 불안정지심. 결정에 시간이 많이 걸린다.
- 물건을 살 때 많이 사지 않는다.
- 계산성 사색적 예민성 소양인은 순발력 행동력 모험심 의협심 자유분방함...태양인은 무계획성, 즉각적이므로...태음인은 지구력 계획성. 소음인은 질서, 소양인은 무질서....소음인은 계획이 없으면 불안해 한다. 계획하지 않은 일은 하지 않는다.
- 소양인은 통 큰 것을 좋아한다. 섬세한 것과는 거리가 멀다.

몸의 특성

얼굴윤곽

- 소음인은 광대뼈가 커지기 힘들다. 관골이 큰 경우가 대단히 드물다(5%). 소양인은 관골이 퍼진 느낌이 있다. 태음인도 관골이 퍼졌는데 소양인의 관골은 짝 퍼져서 평면으로 퍼지지만 태음인은 볼록하게 퍼진다. 소양인은 五嶽이 납작한듯 하고 태음인은 울퉁불퉁하다. 관골은 기세다. 기허한 소음인은 관골이 커지기 어

럽다.

- 기운이 아래로 내려감.
- 역삼각형 모양. 소양인과 반대로 더 내려가 있는 형. 전체적으로 음이 발달하고 양이 부족하기 때문에 턱이 쪽 빠져있고 코끝이 뻗혀 있으며 입이 크고 뚜렷하다. 얼굴이 역삼각형으로 좁아져 내려오면 소음성. 이마가 좁고 볼폭이 크면 소양성.

여자분은 소음인이 확실합니다. 강의시간에 말씀 안 드린 내용인데 이분을 보니 생각나는군요. 소음인 여자들 중에 구봉서(코메디안)처럼 볼이 나오는 경우가 매우 많이 있습니다. 이분은 전형적인 소음인입니다.

눈

- 눈에 힘이 없다. 눈의 힘은 비위에서 온다.
- 동태눈. 눈에 힘을 쥐도 주어지지 않는다.
- 눈이 축축하고 침착하고 차분하다. 생각이 많아서 눈이 왔다갔다 하지 않는다.
- 소음인의 눈은 축축하다 흐리다는 표현을 씁니다. 음이 발달되었다는 뜻이고 뭘 생각하지 않는 눈입니다. 관심이 내부에 있어서 그렇습니다. 반대로 소양인의 눈빛은 반짝거리고 관심이 외부에 있고 호기심이 많아 보이고 강해보인다. 소음인은 세상일이 어떻게 돌아가는지에 대한 것보다 내가 어떻게 할까? 뭐 이런 눈입니다. 안광이 없이 빛이 들어가는 눈입니다. 안구가 움직이는 속도에도 차이가 있습니다. 양인이 빠르고 음인이 느립니다.

이마

- 소음인은 미간이 약하다. 산근이 발달되어 있지 않음.
- 양이 부족하니 모아 놓으면 좁고 뾰뚱하게 설 정도밖에는 안 되어 중간이 가로주름이 생기고, 펼쳐 놓으면 둥그스름 하나 부족해서 홀 넘어가게 된다. 대체로 중간 부위가 함몰되어 있다. 전체가 넓적하고 불룩하면서 살짝 넘어감. 양미간 1/3 위에서 조금 들어갔다 다시 올라감.
- 이마가 매우 순하고 기운이 없다.
- 이마가 처음부터 힘없이 뒤로 휘익 넘어간다. 태음인이라면 절대 약해 보이지 않는다.
- 미륵골 위가 가로로 눌러있다.

코

- 소음인은 코의 기세가 죽지 않고 끝까지 살아있다. 반면 태양인은 코가 끝에서 죽는다.
- 인중의 길이는 아무래도 소음인 태음인이 강하다.
- 소음인은 코끝이 못 생긴 사람이 극히 드물다. 거의 없다고 보면 된다. 소음인도 들창코가 있다.
- 태음인 중에 산근이 확 꺼진 사람도 많다. 소양인은 그래도 자세히 보면 뭔가가 있다. 흔적은 남긴다. 소음인은 코끝이 뾰족해지고 발달되어 있고 산근이 현저하게 약해진다. 코가 올라갈수록 가늘어지고 가늘어지면서 뾰족해진다. 가늘다는 것은 약하다는 말이다. 소음인은 코가 뾰족하다기 보다는 끝에 뭔가 여유가 있는 것이다. 태음인도 물론 끝이 발달이 되는데 너무 발달이 되어서 못 생겨지고 태양인은 가다가 죽어버려서 못 생겨지고 소양인은 코가 짧고 기세가 끝까지 안 내려오니까 못 생겨지는 것이다. 소음인은 산근이 팍 죽으면 못 생겨지는 것이다.
- 코끝이 발달되고 산근이 죽는다.
- 코가 크지만 순하다.
- 산근이 약해서 좁고 낮다. 준두가 발달함.
- 코가 얼굴전체 길이의 절반 가까이 된다. 끝이 발달되고 예쁘다. 뾰족하고 얇게 보이는 것이 약한 것이다.
- 소음인의 코는 아랫부위(음의 부위)가 잘 매듭지어지고 야무지게 생깁니다. 그리고 산근(양의 부위)은 약해져서 가늘거나 날카로와 집니다. 소양인과 대비해서 생각하면 소양인은 산근이 둥글고 부드럽고 자연스럽다고 말할 수 있습니다. 그러나 소양인의 코는 음허해서 아래가 부실하게 됩니다. 길게 내려오지 못하거나(짧다) 코가 위로 달려있고 끝이 부실해져서 평퍼짐하거나 뻣힌 곳이 없어지게 됩니다. 그래서 소양인은 눈과 미간 산근 등 상부는 잘 생기고 하부는 못 생겨집니다(음허해서 음의 부위가 부실해집니다).
- 산근은 약하고 코끝의 마무리가 좋다(물방울처럼). 기세가 아래를 향한다는 느낌.

입

- 이빨; 소음인은 빠드렁니, 소양인은 옥니. 소음인의 입은 견구형.
- 입이 크다(볼푼에 비해). 입이 크면 뺨이 큰 것이다.

- 웃으면 입이 U자로 되는 사람이 많다. 입꼬리가 올라간다.
- 입이 돌출
- 입술의 윤곽이 뚜렷하고 야무지다. 입이 크고 도톰하고 또렷하고 발달함. 쳐질 수는 있어도 들리지는 않는다.
- 쿤타킨테 같은 입술은 태음인에 많다. 소음인은 입이 커도 가지런하다.
- 입이 커도 자연스럽지 않으면 태음인일 수도 있다. 즉 소음인은 입이 크지만 자연스럽고 상하 균형이 있어서 어색하지 않다. 너무 커서 뒤집어진 느낌이면 태음인이다. 소음인은 입이 크지만 단정하고 잘 생겼다.
- 입이 함몰되면 턱이 커져서 소음성을 과시한다.
- 입이 작아도 윤곽이 아주 뚜렷하고 야무진 모양이 된다.
- 입이 크면 신이 크고 비가 작으므로 입맛이 까다롭다.
- 볼 아래 부분이 구봉서씨처럼 사탕을 물고 있는 듯이 보이는 소음인 여성들이 많다. 이 사람도 양 옆으로 작은 사탕을 물고 있다. 양쪽으로 신국이 발달된 것이 어디엔가 드러나는 것이다. 구봉서는 태음인이다.

턱

- 턱끝부터 하순의 경계라인까지 물에 담글 때 물이 가장 많이 넘치면 소음인. 승장혈 이하의 하악이 꺾인다. 저작근이 있는 협거혈부위가 胃다. 소음인 중에 협거혈 부위가 발달한 사람이 드물다. 턱이 뾰족한 것은 약한 것이다.
- 턱의 크기가 꺾의 크기이므로 크다.
- 주걱턱은 어느 체질에나 있다. 입이 함몰되면서 턱이 얇아지면 소양인이고, 입이 돌출하면 소음인이다.
- 아랫입술끝에서 턱끝까지의 길이가 길다. 혹 무턱이 되더라도 면적은 넓다.
- 턱끝이 샤프한 소음인은 거의 없다. 샤프한 것이 약한 것이다. 뭉툭한 것이 강하다.
- 아랫입술에서 턱끝까지의 길이가 이마의 길이보다 더 길어보이는 소음인도 있다.
- 정면에서 보아 턱이 뭉툭하다. 신이 발달한 것이다.

* 태음인과의 감별과 관련하여

하악의 각도나 신국의 발달이 소음인보다 미약하다. 아래로 확 내려온 얼굴이 아니고 입도 덜 돌출됨. 측면에서 하악골각이 더 둔각이고 입이 더 돌출(빠드렁니) 되어야 소음인이 확실해진다(감별방 1044번 관련하여...)

체격

- 소음인 태양인 중에 마른 사람은 대개 한증이다.
- 어깨가 좁다.
- 소음인은 흉곽을 양옆에서 눌러 놓은 모양이므로 뼈밖에 없고 새가슴인 경우가 많다.
- 유방이 작다. 흉곽이 작고 좁다. 유방도 붙어있다. 상대적으로 엉덩이가 대단히 크다. 치골이 대단히 발달함. 성기가 크다.
- 골반이 벌어졌으므로 다리가 떨어져서 내려온다.
- 소음인의 엉덩이는 평퍼짐하다. 넓적하다. 골반이 넓으므로 엉덩이가 납작하고 평퍼짐하다. 허벅지 사이가 넓다. 역삼각형의 하체. 반면에 소양인은 골반이 작고 튀어나옴.
- 소양인이 가장 근육이 발달함. 반면에 소음인은 뼈. 마르고 근육이 없는데다가 뼈가 발달했으므로 뼈가 딱딱하다.
- 소음인들이 뼈다구가 쪽 뻗었으므로 사람이 늘씬하게 보인다. 동양인 중에서 소음인이 가장 다리길이가 길고 몸매가 가장 좋다.
- 다리힘이 가장 세다. 살이 엉덩이와 다리에 찢다.
- 소음성이 발이 크다.
- 소음인은 엉덩이가 크면 덜 벌어지고 태음인은 엉덩이가 크면 중대둔근이 발달한다.
- 체격에 비해 발이 작으면 우선 소음인은 아니다. 발이 작으면 소양인일 가능성이 높다. 소음인은 먹으면 다리로 가고 소양인은 먹으면 전부 팔과 어깨로 간다.
- 갈비뼈 각도가 넓으면 소양성, 좁으면 소음성. 치골각과는 반드시 반비례. 치골이 큰 것, 다리가 길고 늘씬한 것은 소음성. O, X 다리는 소양성.
- 소음인 한증도 어깨가 올라간다. 하지만 흉금지세는 약하다.

맥

- 진폭도 크고 굵기도 굵다. 그러다가 浮中沈에서 일정 깊이까지 내려가면 맥이 안 느껴진다. 맥에서 사라지는 것이 뼈에서 그리 떨어져 있지 않다. 무신하지만 길고 굵다.
- 소음인의 맥이 태음인의 맥보다 훨씬 길다.

약과 음식에 대한 반응

- 소음인약을 소양인이 먹으면 기능항진이 온다. 기능항진이란 자다가 중간에 깨고 새벽에 일찍 깨거나 대변이 잘 안 나오는 증상이다. 잠과 대변의 양상에서 기능항진과 기능저하를 판단한다.
- 소양인이 마황을 먹으면 잠 못 자고 살이 빠진다. 소변적삼. 입이 쓰고 마르고 눈이 충혈되고 인간을 초긴장상태로 만든다.
- 매운 음식이 대단히 안 좋다. 카레도 소음인 음식이다.
- 음식물에서 제일 문제가 소양인이다. 소양인에게 맞는 음식이 별로 없다. 보리밥 돼지고기 참외 오이....이런 것 정도가 맞다.
- 약을 써서 체질을 판별하려면 태음인 약을 써야 한다. 태음인 약을 써서 변비가 되거나 기능항진이 오면 소양인이고 기능저하가 일어나고 힘이 없이 설사를 계속하면 소음인이다. 한열이 맞을 경우에 한한다.
- 소음인에게 태음인 약을 주면 늘어지고 땀이 난다. 힘이 없어져서 자꾸 자려하고 아침에도 못 일어난다. 소양인약을 먹어도 기능저하가 일어난다.
- 약을 써서 체질을 판별하려면 태음인 약을 써야 한다. 태음인 약을 써서 변비가 되거나 기능항진이 오면 소양인이고 기능저하가 일어나고 힘이 없이 설사를 계속하면 소음인이다. 한열이 맞을 경우에 한한다.
- 감자는 소음인 음식이다. 많이 먹어도 소화에 무리 없는 경우가 많다.
- 麻黃(太陰人약) 먹으면 少陰人은 기능저하. 기운 빠지고, 기와, 다면, 설사. 망양. 太陽人은 기능저하와 항진 동시. 설사하면서 잠도 안 오고 가슴 뚫다. 少陽人은 기능항진. 대변 굳고, 잠 줄거나 중간에 깨거나. 심계, 안면홍조. 망음.
- 태음인약을 먹고 피로감이 늘고 몽롱하며 나른해지면 -무력해지면- 소음인일 가능성을 검토한다.
- 少陰人은 보리 먹으면 속이 끓고 돼지고기 먹으면 설사. 참외, 오이는 사하지 제. 少陽人은 참쌀음식 먹으면 소화가 오래 안되고 쓰리다. 닭고기, 굴, 사과. 少陽人 아기는 굴 소화 안되고 그대로 나온다고.
- 太陰人은 토마토 오래 먹고 장출혈. 초콜렛 먹으면 안 좋다.
- 뱀, 뱀장어는 少陰人약.

2. 소음인 한열, 표리, 병위, 처방의 관계

청피 (곽향정기산)	
대복피(곽향정기산)	
익지인(곽향정기산)	
향부자	인진
자소엽	석곡
충백	익모초
오약	적석지
후박	앵속각
지각	현호색
목향	두충
사인	골쇄보
소자	빈랑
침향	목별자
남성	감송향
지실	정향
빈랑	신이
양강	천초
건강	애엽
백두구	백두구
창출	초과
고양강	소목
쿨피	홍화
신곡	도인
정향	
삼릉	
봉출	
오수유	
파고지	

소회향	
-----	--

한열

열증에는 위장병이 없고, 한증에는 위장병이 있다.

열증		한증	
유한	황기계지탕 보중익기탕 승양익기탕	무한	곽향정기산 향사양위탕 관중탕류 이중탕류
무한	천궁계지탕 향소산 궁귀향소산 팔물군자탕	혹유한	계지반하생강탕 관계부자이중탕
건강이 없다. 위장병이 없다.		황기 당귀 천궁이 없다 위장병이 있다.	

- 소음인이나 태양인은 위가 약하다는 식으로 유도심문을 해야 한다. 그 유도심문과 전기고문에 살아남은 자만이 열증이다. 열증은 배터지게 먹고 그대로 누워 자도 그 다음날 아침에 아무 증상이 없어야 한다. 그래야 열증이 된다.

한증

한증은 원래 땀이 없는데 병이 너무 심해지면 땀까지 나기 시작하는 것이다. 즉 한증은 기본적으로는 무한인데 설사를 오래오래 하니까 원기가 상해 탈진상태로 가다보니 땀까지도 잡아주지 못하는 것이다. 땀이 안 나는 사람인데 헛땀까지 나기 시작하니까 부자를 쓰고 관계부자이중탕을 쓰고 하는 것이다. 한증에 땀이 새는 경우는 계지반하생강탕, 관계부자이중탕 두 개밖에 없다. 위가 나쁘면서 땀이 난다고 하면 관계부자이중탕이나 계지반하생강탕으로 가는 것이다.

태음병- 곽향정기산, 향사양위탕, 관중탕류, 이중탕류(무한이면서 위가 나쁜 경우)

소음병- 계지반하생강탕, 관계부자이중탕(유한이면서 위가 나쁜 경우).

열증

1. 망양- 유한

황기계지탕, 보중익기탕, 승양익기탕(울광이었는데 오치를 해서 망양으로 유도된 경우에 쓴다).

2. 울광- 무한

천궁계지탕, 팔물군자탕.

소음인에게 망양은 많은데 울광은 많지 않다.

* 소양인 열증의 환자에게 숙지황, 산수유를 쓸 수 있냐는 물음에 대하여

==> 소증이 열이라도 현증이 한이면 한을 제거해야 합니다. 그래서 열증환자에게도 숙지황 산수유를 쓰는 경우가 있습니다. 그래야만 병증이 제거됩니다.

태음인도 마찬가지입니다. 열증도 현증에서 한이 보이면 마황 의이인 등을 가합니다. 그래서 8상의학이 아니고 4상의학입니다. 한열은 자유롭게 넘나드는 것이어서 4개의 바운더리에서 논해야 됩니다.

곽향정기산

소엽6 소엽4 창출 백출 반하 진피 청피 대복피 계지 건강 익지인 감초 각2 생강 대조

건강 반하 익지인이 들어가므로 한증에 쓴다. 표리를 겸치한다 . 한증이고 위가 약한 사람이 평소에는 비위에 문제가 많다가 감기 걸리면서 표에까지 문제가 생겨 두통 체통 기침 가래 등의 증상이 나타나는 경우.

중풍의 경우에는 남성 목향을 가한다.

한제씩 장복할 때는 백하수오를 한돈 가한다.

감기 초기부터 쓰고 심한 감기까지 다 된다. 소음인 한증에는 곽향정기산으로 감기가 다 해결된다.

천궁계지탕

계지12 백작약8 천궁 창출 진피 자감초 각4 생강 대조

견관절 질환, 어깨 아픈 데 응용을 많이 하는데 한증에 쓰기도 한다. 한증에 쓸 경우에는 천궁이 소화가 안 되므로 소엽으로 바꾸고 당귀를 넣기도 한다. 그리고 양강, 건강을 넣는다. 강황을 가한다.

승양익기탕

인삼 계지 황기 백작약 각8 하수오 관계 당귀 자감초 각4 생강 대조

- 땀이 나면 열증이고 망양인데 또 변이 안 나와 울광인 것 같은 상황.
- 표에서는 땀이 나서 원기가 새고, 리에서는 변이 막혀 열이 극심해지는 상황. 표리가 둘 다 문제가 되었을 때 쓰는 것이다.
- 승양익기부자탕은 원기가 더욱 많이 손상되어 소변적삼이 되었을 때 즉, 망양이 심해져서 소변적삼이 오고 대사가 안 되어 탈수가 왔을 때 쓰는 것이다. 부자는 땀이 새는데 소변이 적삼되는 상황에 쓴다.

보중익기탕

인삼 황기 각12 감초 백출(구) 당귀 진피 각4그램 곽향 소엽 각3-5푼 생강 대조

- 곽향 소엽은 5푼 쓰는 것이 좋다.
- 실제로는 땀이 안 나도 보중익기탕을 쓰면 좋다. 소음인 열증에 보약으로 보중익기탕을 가장 많이 쓴다. 보약을 쓸 때는 땀을 그리 많이 따지지 않는다.

인삼 황기를 한돈반으로 해서 완병에 쓸 수 있다.

궁귀향소산

향부자 8 자소엽 천궁 당귀 창출 진피 자감초 각4 총백5莖 생강 대조

열증비염에 많이 사용. 비염에 총백과 자소엽이 가장 중요하다.

향부자팔물탕

향부자 당귀 백작약 각8 백출 백하수오 천궁 진피 자감초 각4 생강 대조

한증이면 이거 먹으면 바로 설사한다. 소음인 열증이고 위장이 좋은 여자의 갱년기장애 증후군에 사용.

팔물군자탕

인삼 황기 백출 백작약 당귀 천궁 진피 자감초 각4 생강 대조

- 생강 대조가 있으므로 외감약이다.
- 위장증상이 없고 울광에 쓴다. 백하수와 육계를 더하면 십전대보탕.
- 동통성질환에 쓴다. 당귀 천궁 백작약이 있어서 활혈작용이 있기 때문. 팔다리가 당기고 그러면 진교 세신 같은 것을 넣어서 좌골신경통 등에 응용한다. 십전대보탕에 쓰기도 한다. 보중익기탕을 쓰면 몸이 좋아지고 그러는데 증상은 절대 안 낫는다.

향사양위탕

인삼 백출 백작약 자감초 반하 향부자 진피 건강 산사육 사인 백두구 각4 생강 대조

- 외감병을 전제로 한 처방. 그래서 실제로 감기 끝에 설사를 한다, 입맛이 없다 그럴 때 이것이 잘 듣는다. 風과 관련이 있는 처방이기 때문에 두통이 있으면서 설사를 한다든가 아니면 비염 같은 경우도 곽향정기산이나 향사양위탕 등을 생각해야 한다는 것이다. 관중탕을 쓰면 안된다. 여드름이나 피부병 같은 데는 이런 약이 잘 듣는다. 해독하는 인진등을 가한다.
- 외감증상이 없는 일반 위장병에 응용하면 효과 없다(관중탕으로 가야 한다)

적백하오관중탕

백하수오 적하수오 양강 건강 청피 진피 향부자 익지인 각4 대조

후박 지실 목향 대복피 각2를 가하면 **십이미관중탕**

- * 감초가 없다--> 부중에 쓴다
- * 실제 붓는 사람보다 붓지 않는 사람들이 더 많다. 관중탕 쓸 사람이 말증으로 갔을 때 잘 붓는다.
- * 소음인 한증에서 가장 많이 쓰고 효과 좋은 처방이다. 소음인이 한증이 열증보다 더 많으므로 많이 쓴다. 한증이면 덮어놓고 이 처방 써도 사실 된다.

관중탕의 가미법(가미관중탕)

- 옆구리가 아프거나 흉통같은 것이 있으면 지실대신 지각을 넣는다
- 손발 저리고 마비감 있으면 오약을 한돈반
- 얼굴이 누렇누렇하고 피죜죜하고 습으로 인해 얼굴이 얼룩덜룩하고 기미도 생기는 경우에는 **인진을 두돈 세돈** 넣으면 싹 좋아진다

- 여자가 임신 중에 기미가 많이 생기는데 애 낳고도 기미가 잘 안 빠지고 그럴 때 인진을 쓴다. 한달 이상 먹으면 대단히 많이 좋아진다.
- 관중탕 증상이 없는데도 속이 쓰린 경우가 있으면 가미관중탕을 쓰면 된다. 백출이 3돈 있다. 속이 쓰리고 아프고 할 때는 오령지를 넣는다. 가미관중탕은 관중탕 쓸 사람인데 속이 쓰리고 안 좋을 때 쓴다. 그래서 건강 양강 등의 양을 줄이고 백출의 양을 늘린 것이다. 일년에 한두번 쓸 일이 있다.

백하오이중탕

백하수오 백출 백작약 계지 건강포 각8 진피 자감초 각4

백하오부자이중탕은 백작약을 微炒하고 부자를 한돈 가한 것.

백하오이중탕은 태음병이고 아직 소변적삼은 오지 않은 상태. 배아프고 설사하는데 갈증은 없고 이런 식으로 되는 것. 갈증이 없다, 번조가 없다는 말은 아직까지 태음병이라는 말. 번조가 있으면 소음병이 된다.

백하오부자이중탕은 설사를 해서 탈수가 나타나서 소변적삼은 나타났지만 아직 번조는 없는 것. 번조가 나타나면 소음병이므로 관계부자이중탕을 쓴다.

관계부자이중탕은 땀까지 나기 시작한다. 태음병까지는 땀이 없다. 원래 한증은 땀이 없는데 관계부자이중탕부터는 땀이 나기 시작한다.

관계부자 이중탕에 대한 논의

소음인 소변적삼 등으로 이 처방을 썼는데 구토 설사 오한 등이 3일간 계속 난다고 합니다. 체질 감별이 안 된 경우일까요. 아니면 부자의 부작용인가요?

체질은 안봐서 모르겠습니다만 관계부자이중탕은 콜레라 장티푸스 등의 급성 전염병으로 인하여 설사가 심해진후 소변이 적삼해졌을때 사용하는 처방입니다.(설사가 심해서 탈수가 된 경우입니다.) 이정도면 텔레비전에 날 정도로 국가적으로 심각한 상황이 됩니다. 외국인 관광객들도 오지않을 것이고요. TV에 콜레라나 장티푸스가 서울에 발생했다는 뉴스를 본적이 없는데요.

==> (안)

보중익기탕과 팔물군자탕의 구분에 대해

소음인의 보중익기탕이나 팔물군자탕에 대해서 우선 알아야할 것은 이 두 처방이 모두 외감약이라는사실입니다. 외감의 삼양병에서 표열을 제거해서 망양을 다스리는 처방이 보중익기탕이 되고 양명의 열을 인삼을 이용해 사하해서 외감열을 다스리는 처방이 팔물군자탕이라는 것입니다. 팔물군자탕은 소양인의 지황백호탕이나 태음인의 갈근승기탕과 작용이 같습니다. 08.02.29 18:27

[답글](#)

 [안준철](#)

그래서 비염에 외감과 관련있고 표열을 제거하는 보중익기탕 가미방이 잘 들을 수 밖에 없습니다. 08.02.29 18:

3. 소음인 약물의 가감 및 질환별 처방운용

대강

1. 열증

- 소화가 잘 되면서 땀이 나는 사람: 망양증- 보중익기탕, 황기계지탕, 계지탕류
- 소화가 잘 되면서 땀이 안 나는 사람: 열증이고 무한. 울광, 천궁계지탕, 팔물군자탕. 울광은 대변 자가중독증이다.

2. 한증

- 소화가 안 되면서 땀이 안 나는 경우; 태음병(밥을 먹으면서 설사함), 백하오이중탕. 백하오부자이중탕(소변적삼이 있음). 태음병은 설사로만 수분 손실이 있음
- 소화 안 되면서 땀이 나는 경우: 소음병(밥을 못 먹으면서 설사함), 관계부자이중탕. 오수유부자이중탕(소음병이 진행되어 두통 극심)
소음병은 설사외에 피부로도 물이 나가는 상황. 급격한 탈수.

- 소음인은 하여간 수분이 나가면 안 된다. 피부로도 나가면 안 되고 설사로도 나가면 안 된다. 소변은 잘 나가야 한다. 소변적삼이 왔다는 것은 양기가 그만큼 부족하다는 말이고 수분을 대사할 양열이 없다는 뜻이다.

- 설사로 인해 수분손실이 생기는 것은 삼음병에 속하는 것이고, 피부로 열이 너무 많아서 수분이 손상되는 것은 열증이다. 열이 너무 많아도 수분의 손실이 일어나서 황기계지부자탕, 승양익기부자탕 이런 쪽으로 간다.

- 소음인병에 울광은 거의 없는 거 같다. 진짜 고열이 나면서 변폐가 되어 무한이 되는 울광증을 거의 본 적이 없다.

- 사상의학 최대의 강점은 소증에 근거해서 판단하는 것이다. 원래 변비였던 사람이 지금 설사를 하는 것인지, 설사를 했던 사람이 지금 변비증상을 보이는 것인지.... 열증인 사람이 한증 증상을 보이면 열증처방에 근거해서 한증약을 가미하고, 한증 증상이 사람이 열증의 증상을 보이면 한증 처방에 열증약을 가미한다.

* 소음인은 어떻게 하면 수분의 손실을 막을 것인가가 관건이다. 수액대사의 문제. 땀이나 설사로 인한 수분의 손실을 막고자 하는 것이다.

* 승양익기탕은 울광과 망양이 겹친 상황. 여기서 소변적삼까지 나타나면 승양익기부자탕.

* 관계부자이중탕은 소변과 땀으로 모두로 수분이 손실되고 있는 상황

* 부자는 소변적삽에 쓴다. 부자는 대체로 소변적삽, 습의 제거, 통증의 관리 등을 위해 쓰는데 통증을 다스리는 데는 부자보다는 천오가 낫다. 따라서 부자를 쓸 일이 그리 많지 않다. 부자를 몸을 덥히는 데 쓰는 것이 아니다. 수액대사가 잘 안될 때 쓰는 것이다.

* 삼양증은 열이 극심해서 탈수가 되어서 부자를 쓰는 것이고(망양), 삼음증은 寒이 극심해서 설사로 탈수가 되는 것이다. 여기에도 부자를 쓴다(음양에 모두 사용). 즉, 부자는 수액대사를 조절하는 약이다.

* 소음인은 기허나 양허를 치료하는 약물이 주를 이룬다. 인삼 황기 백출 등..... 숙지황 등을 쓸 일이 없다.

*** 소음인 열증이면, 땀이 많으면 보중익기탕을 쓰고요, 땀이 적어도 보중익기탕을 쏙니다. 소음인은 어차피 땀을 막아야 될 사람이기 때문입니다.**

* 율광은 대변자가중독, 망양은 탈수

* 팔물군자탕을 쓸 일이 그리 없다. 조금이라도 위장이 나쁘고 위장증상이 있으면 거의 관중탕이다. 관중탕에 백하수오 적하수오 들어가면 변비가 해결이 된다. 팔물이다 싶으면 관중탕을 쓰면 된다. 거의 95프로. 팔물인 경우가 극히 드물다.

- 한증은 기본적으로 삼음병으로 흘러간다. 수분이 설사로만 나가면 그래도 여유가 있는 것이고 땀까지 수분에 손상이 이루어지면 더 위험해지는 것이다. 다음에 소변까지 안 나오면 물을 기화시킬 수 있는 陽熱이 전혀 없는 상태이므로 부자를 가한다.

- 제대로 된 처방은 항상 온보하고 청열을 동시에 해야 한다. 명방들은 모두 온보하고 청열하는 약들이 다 같이 들어가 있다. 병을 고치려면 무조건 청열을 포기해서는 안 된다. 따라서 소음인의 경우에는 어떤 증상을 제거할 목적을 가졌다면 인삼이 안 들어가면 안 된다는 말이다. 인삼을 적극적으로 쓴 처방들은 전부 청열을 적극적으로 하겠다는 의지가 들어있다.

- 부자는 소변이 안 나올 때 쓰고 인삼은 땀을 막아주기 위해 쓴다.

- 인삼이 외감약이고 보중익기탕이 외감약. 팔물군자탕에서의 인삼은 사하작용이 있는 것이고, 보중익기탕의 인삼은 청열한다.

- 생강 대추가 모두 외감약이다. 생강 대추가 안 들어가는 것은 외감약이 아니다. 삼양병에만 생강 대추가 들어간다.

- 비염, 중이염, 인후통, 안구건조증, 각종 오관과와 위(上)의 염증성질환들은 전부 인삼이 대량으로 들어가야 제대로 낫는다.

- 황기는 補氣하는 것보다 固表하는 작용을 먼저 생각해야 한다. 땀이 새나가지 않으므로 보기가 되는 것이다.

- 어혈이 원인이면 당귀 작약 천궁으로, 신허면 파고지, 근골의 강화는 두충, 술을 많이 먹거나 습이 문제라면 창출 후박.....식적이면 평위산.

- 소음인의 한열은 胃가 좋냐 나쁘냐로 따진다.
- 이 경우, 인삼은 表熱을 제거하는 차가운 약이 됨.
- **열증의 방양: 보중익기탕** (보중익기탕은 기본적으로 열증에 쓰는 처방)
- **한증의 방양: 보중익기탕 + 사인, 건강, 반하**
(이렇게 가미하면 설사하는 부작용 없음)
- 당귀, 천궁, 백작약 같은 약들도 차가운 약
- 부자를 쓰는 것은 모두 水濕대사가 안 되는 경우, 즉 소변적삼의 경우이다.
- 반드시 소변적삼을 확인할 것. 수족냉이라고 함부로 쓰지 말 것.
ex) 소변이 확실히 안 나오는 할아버지의 오십견: 계지가부자탕
- 수족냉은 어느 체질이나 다 있을 수 있으며 특히 소양인은 惡寒이 많음.
어느 체질이나 몸이 약해지면 手足冷이 발생.
어느 체질이나 비만해지면 오한이 적고, 마르면 오한이 많음.
소양인 수족냉에 부자를 쓰게 되면, 소변이 잘 나오고 어깨는 덜 아픈 대신
입이 마르고 심계가 생김. 살이 빠지고 자다가 깬.

소음인 한열의 구분

- 열증에는 위장병이 없고 한증에는 위장병이 있다. “소화가 잘 안 돼서 가끔 소화제도 먹고 좀 체하기도하고 그렇습니까?” “위장은 일년 내내 본인이 특별히 과식하거나 특별히 몸이 안 좋고 그런 경우가 아니면 별 탈이 없습니까?” 환자가 소화에 이상이 없다고 해도 한번 더 확인해 들어가야 한다.
- * **열증**- 지금까지 위장은 문제없다고 말하는 경우. 소음인 열증은 소양인보다 두 배는 잘 먹는다. 대식가인 경우가 많다. 표열병이 온다.
- * **한증**- 특하면 체한다든지 잘 먹는 거 같은데 그래도 속이 좋지 않다고 하는 경우, 문진을 잘 해야 하는데 실컷 드셔도 이상이 없냐고 물었을 때, 소식을 한다고 하면 거의 한증일 가능성이 높다. 리한병이 온다.
소음인들은 한증인데도 2-3일에 한번씩 변을 보는 경우가 많다. 물론 頭燥尾滑하다. 열증인데도 설사를 잘 하고 콕콕한다.

한증이 아무래도 설사가 잘 되는데 또 변비도 잘 된다. 변비가 되었다가 막상 변을 보면 설사처럼 나오는데 頭燥尾滑하고 2,3일에 한번 변을 보는데 보면 설사이고 혹은 앞은 딱딱한데 앞의 마개가 따지고 나면 안의 내용물은 물이 흐른다.

대변이 初硬後溏이면, 걸이 뜨겁고 裏가冷하다고 이해하셔도 큰 무리가 없습니

다. 소음인 중에 이런 사람들이 많아요. 변비인가 싶어서 대변을 보면, 막상 설사인 사람들입니다. 십이미관중탕을 써야 될 사람들이지요. 대변을 더 시원하게 잘 보려면, 지실을 1돈으로 올리면 됩니다. 빈랑도 더 넣으면 됩니다. 하행하는 성질이 있습니다. 목향, 빈랑, 지실을 더 넣으면 됩니다.

가감

◎ 적백하오관중탕

- * 감초가 없다--> 부중에 쓴다
- * 실제 붓는 사람보다 붓지 않는 사람들이 더 많다.
- * 소음인 한증에서 가장 많이 쓰고 효과 좋은 처방이다(십이미관중탕을 가장 다용).

관중탕의 가미법

- 옆구리가 아프거나 흉통같은 것이 있으면 지실대신 지각을 넣는다
- 손발 저리고 마비감 있으면 오약을 한돈반
- 얼굴이 누렇누렇하고 피죜죜하고 습으로 인해 얼굴이 얼룩덜룩하고 기미도 생기는 경우에는 **인진을 두돈 세돈** 넣으면 싹 좋아진다
- 여자가 임신 중에 기미가 많이 생기는데 애 낳고도 기미가 잘 안 빠지고 그럴 때 인진을 쓴다. 한달 이상 먹으면 대단히 많이 좋아진다.

◎ 기타

- 좌골신경통 있고 다리 당기면 세신을 가한다(오적산에서).
- 소음인 요슬질환- 파고지 세신 진교 두충 이런 것들을 적절히 가미해서 활용한다(오적산에서).
- 인진은 여드름이나 음주자에게 쓴다. 두세돈을 가함.
- 初硬後瀉

십이미관중탕을 써야 될 사람들이지요. 대변을 더 시원하게 잘 보려면, 지실을 1돈으로 올리면 됩니다. 빈랑도 더 넣으면 됩니다. 하행하는 성질이 있습니다. 목향, 빈랑, 지실을 더 넣으면 됩니다.

- * 인삼은 외감약이고 청열지력이 강하다. 따라서 삼양병에 쓴다. 하지만 인삼은 한열에 다 쓴다. 백하수오는 온보지제로서 삼음병에 쓴다.
- * 삼릉 봉출을 초해서 쓰면 식욕이 대단히 향진된다.
- * 인삼은 청열작용이 뛰어나서 표열을 제거하고, 백하수오는 온보지력이 뛰어나서 리한을 제거한다. 따라서 삼음병에 백하수오가 들어가고 삼양병에 인삼이 들어감.

- 온보를 하려면 백하수오로 되고 피부, 눈이 깔깔하고 충혈이 된다, 눈의 알려지성결막염 등에는 향사양위탕을 쓰면서 인경약으로 천궁, 그리고 인삼을 쓴다. 따라서 인삼을 적극적으로 써줘야 한다.

- 한증처방에도 표열을 식히기 위해 인삼을 가할 수 있다. 향사양위탕가 인삼. 비염, 피부병, 두통 구갈 등에도 모두 인삼을 쓴다. 전부 청열하는 것임. 소양인에게 석고 쓰는 것과 의미가 동일함. 인동 연교 박하를 써서 청열시켜 염증을 제거하겠다는 생각으로 인삼을 써야한다. 온보하려면 끝까지 백하수오로 가야 한다.

= 변비가 있으면 목향 빈랑을 넣는다.

= 십이미관중탕에서 백하오 적하오 양강은 태양인약이므로 빼고 쓰는 것이 좋다. 중기를 보하면 수족냉은 좋아진다. 회복속도는 소음인의 가장 느리고 다음이 소양인, 가장 빠른 것이 태음인. 불면 심계 안충혈 두통 구갈 인후건조 등의 열증을 겸하고 있으면 인삼을 가하는 것이 좋다. 비습하거나 음주를 하지 않으면 인진도 가하지 않는 것이 좋다.

- 인진 익모초 등으로 거습하고 건강 익지인으로 온증, 창출로 거습한다. 진전에는 오약 지각으로 리기한다.

- 지각과 오약은 향부자와 더불어 소음인의 가장 중요한 리기약 중의 하나이다. 지각은 주로 육부에 작용하고 하기한다. 지각은 식적이나 기체를 위에서 아래로 내려준다. 오약은 주로 오장에 작용하고 신이나 방광을 덥혀서 비폐에까지 영향을 준다. 즉 오약은 밑에서 덥혀서 위에까지 올라간다.

오약과 익지인이 들어가는 축천환은 신방광을 덥혀서 기화시켜주는 것이 목표가 된다. 오약은 신온하고 열을 가해주는 약이기 때문에 피한다. 지각은 신고하고 하행하기 때문에 임신부나 허증에는 신중하게 써야 한다. 그리고 지각은 소음인의 피부질환(두드러기)의 대표약임을 잊어서는 안 된다. 지각은 소음인 피부의 흥분을 가라앉힌다.

* 황기에 대하여

황기에는 이노작용이 있다. 그리고 무너진 위기를 조절한다(외사와 관련이 있는 약이다). 본초에 맥부 오한 한출을 다스린다고 되어있다. 강활 독활 형개 방풍도 위기를 조절하고 표사를 다스린다(表陰降氣). 강활 독활 형개 방풍도 소변을 표사를 제거하는 작용을 한다.

위기를 조절함에 소음인은 황기와 계지가 주약이고 소양인은 강활 독활 형개 방

풍이 주약이다. 즉 황기 계지가 강활 독활 형개 방풍과 같은 일을 하고 있다는 말이다(위기를 조절하고 이뇨함으로써 외사가 소변으로 나가게 된다).

그래서 소양인의 비염치료에서는 패독산에 가감하게 되고 소음인의 비염은 향사양위탕에 황기를 가하게 된다. 황기는 새살을 돋게 하고 배농작용이 있어서 소음인의 비염에 핵심적인 약이 된다. 물론 향사양위탕에 천궁 소엽 당귀 지각 각 한돈, 천초 3푼을 가해야 한다.

황기가 위기를 조절하고 배농하고 생기하며 위기를 조절한다는 사실을 꼭 기억해야 비염 중이염 등을 완치시킬 수 있다.

香砂養胃湯 :

비염 + 川芎, 蘇葉 1돈. (비연 심하면 계지 증량)

人蔘 증량시 빨리 낮는다. 2돈 이상, 중이염은 1냥까지.

위장병약 아니다. 少陰人 위장병은 十二味寬中湯.

外感を 전제로 표에 든 병에 쓴다. 위장 안좋은 五十肩, 피부병, 두드러기, 신경통, 팔다리 쭉시면서 설사, 복통.

여드름에도 茵蘗 가미해서 응용. 덩어리 잡히는 여드름이면 白芥子까지추가.

질환별별정리

■ 감기

1) 한증- 곽향정기산

곽향정기산은 감기 초기부터 쓰고 심한 기침까지 다 된다. 소음인 한증에는 곽향정기산으로 감기가 다 해결된다. 가미할 필요도 없는 천하의 명방이다. 한제씩 장복할 때는 백하수오를 한돈 정도 넣어서 사용한다. 곽향정기산- 위가 약한 사람이 평소에는 비위에 문제 많다가 감기 걸리면서 표

2) 열증

- 황기계지탕은 감기에도 잘 듣는다. 망양인 사람이 감기 걸려서 땀이 좀 난다고 하는 경우에는 한 네첩 정도로 잘 듣는다.
- 천궁계지탕을 감기 쓸 일은 많지 않다. 열증, 울광, 무한이 조건인 감기. 많지 않다. 감기에 망양은 많은데 울광은 많지 않기 때문이다.

열증감기약

有汗(亡陽, 脫水) : 黃芪桂枝湯 => 補中益氣湯(人蔘, 黃芪 3돈)

그래도 안 낫는 기침에 蘇葉 2돈반, 桂枝 2돈, 蒼朮 1돈 등 들어가는 蘇葉桂枝湯. 너무 심해서 잠도 못 잔다면 白芥子 5푼 가미. 黃芪와 白何首烏는 기본적으로 加.

땀 많은 少陰人 상증에 補中益氣湯. 外感에 黃芪桂枝湯.

多汗을 치료하러 왔는데, 裏寒症인 경우 寬中湯(온보)에 人蔘, 黃芪(청열) 가해서 쓸 수도 있겠지만, 補中益氣湯(寒症은 그냥 먹으면 설사)에 乾薑, 良薑, 砂仁, 半夏 가하는 게 더 좋다.

無汗(鬱狂) : 川芎桂枝湯 => 八物君子湯 => 獨蔘八物君子湯. 小便赤澀에 附子 추가. 八物君子湯은 동통성 질환에 응용. 眞교, 細辛 가해서 좌골신경통에 쓴다.

少陰人 熱症 피부병(표열)은 八物君子湯에 가미.

黃芪桂枝湯, 川芎桂枝湯 + 薑黃으로 五十肩 치료에 있다.

寒症에 川芎桂枝湯에서 川芎(消化障礙)을 빼고 蘇葉(當歸) 넣고, 乾薑, 薑黃을 가한다. 熱症에 黃芪桂枝湯에 薑黃을 가한다.

寒症 五十肩에 藿香正氣散+ 桂枝 혹은 黃芪桂枝湯+ 乾薑, 良薑

- 향사양위탕과 곽향정기산은 외감약입니다. 초기에는 물론 곽향정기산원방을 쓰시고 콧물이 문제면 향사양위탕에 천궁 소엽(비염의 경우와 같습니다.) 그리고 기침만 문제가 되면 향사양위탕 원방이나 기침의 정도에 따라서 인삼을 2-3돈으로 증량하시고.....소음인의 기침은 인삼 소엽 반하 지각 감초 건강 등을 향사양위탕에 적절히 응용하시면 됩니다. 결과적으로 지각 소엽만 가하면 되겠습니다. 나머지는 원방에 있는것 같은데요..물론 인삼을 증량하고 가래의 량에 따라서 건강 반하를 증량하는등 요령이 필요합니다.

향사양위탕이 외감약인 이유는 생강 대추가 있기 때문입니다. 동무이제마께서는 외감약에만 생강대추를 사용했습니다. 물론 영기와 위기를 바로잡아서 외사에 대응하기 위해서 입니다. 생강 대추가 없으면 위장약이 되어버립니다

■ 해수

* 소음인 감기에 곽향정기산 쓸 일이 가장 많다.

1) 한증의 기침- 곽향정기산 원방으로 다 된다.

2) 열증의 기침- 땀이 나면 황기계지탕, 안 나면 천궁계지탕. 그렇게 해도 안 되는 경우는 소엽계지탕.

* 소음인의 해수에는 반하와 지각이 핵심이다.

* 허로로 빠지는 경우에는 향사양위탕가 소엽 지각 각 한 돈.

* 망양- 땀이 나는 경우에는 황기계지탕 더 심해지면 인삼 황기가 3돈 들어간 보중익기탕을 쓰는데 이것으로 대부분 해결된다. 망양의 열증해수에 소음인 같으면 땀도 멎고 기침까지도 다 해결이 되는데 오로지 기침만 남는 경우도 있다.

소엽 두돈반, 계지 두돈, 창출 한돈, 진피 반하 소엽 한돈 지각 감초 7푼 외감약이므로 생강 대조 들어가는데 소엽계지탕이라 한다. 통상 황기와 백하수오를 가해서 감기 끝에 기침만 남는 경우에 특효를 볼 수 있다. 너무 극심해서 잠을 못 잘 정도라면 백개자를 5푼 정도 가한다. 소엽 반하 같은 것을 가하기도 하는데 대개는 원방으로 된다. 보중익기탕을 써도 안 낫는 기침, 감기 끝에 기침만 남는 경우에 특효.

* 율광- 천궁계지탕, 팔물군자탕.

* 기침이 잘 안 떨어지는 경우는 소엽계지탕에 소자 백개자 반하 등을 가미해서 쓰는 경우도 있는데 대체로 원방으로 된다.

* 한증의 해수

- 감기 끝에 두달 동안 기침. **향사양위탕가 소엽 지각 각 한 돈**. 식적 식후로 하루에 6봉씩 먹으라 하고 자다가 기침하면 할 때마다 한 봉지씩 추가로 먹으라고 지시함. 이틀만에 기침 소실. 여기서 핵심은 인삼이 소음인 기침의 핵심이라는 것. 인삼이 청열하고 표열을 제거한다. 후세방에도 인삼패독산과 삼소음에 인삼이 들어간다.

곽향정기산은 외감초증의 기침이고 허로로 빠진 경우에는 인삼이 들어간 향사양위탕을 써야 한다. 비염도 외감 후 만성적인 것으로 봐서 향사양위탕에 천궁소엽을 가하는 것이다.

* 20년된 열증의 기침(이삼로 임상례)

64세 남자. 기침(말할 때, 책 읽을 때, 목 간질간질하다가 기침, 치밀어 오름) 안삼

<양격산화탕 거 석고 치자(번조 구갈 심할 때는 그대로 쓴다), 가 전호 과루인 황련> 3제로 20년 된 만성적인 기침을 완치하다.

■ 흉통

- 가슴을 저미는 통증은 지각을 가해서 해울시키면 된다. 향부자도 증량한다. 인삼을 증량해도 좋다.

■ 인후통의 한열 처방 (아래의 처방을 쓰면 10첩 이내로 낫는다)

1) 열증: 蔘桂枌朮湯

2) 한증: 獨蔘관계이중탕(獨蔘이란 말이 들어가면 인삼을 5돈~1냥으로 증량)

- ENT에서 치료 못하는 인후통은 소음인 태양인이 많다.

(태음인 소양인은 후세방으로 청열약을 써도 제법 듣는다. 양격산 정도면 된다.)

- 그런데 소음인에게 양격산화탕을 쓰면 설사만 나지 전혀 해결이 안됨.

- 인후가 아프면 무조건 인삼을 써야한다.

- 인삼은 외감약이다. 인후통이 극심할 때도 인삼을 썼습니다. 삼계팔물탕에 인삼을 1냥까지 쓸 수 있도록 되어 있습니다. 근데 제 경험으로는요, 인삼이 많이

들어갈수록, 청열이 빨리 되고 **인후통**이 빨리 나아요. 소음인 인후통은 이비인후과에서 절대로 못 고칩니다. 그냥 계속 아프면서 삽니다. 항생제를 쓰면, 설사만 나고 안 낫고, 좀 쉬면 덜 아프고 피곤하면 아프고, 계속 반복되어집니다. 절대로 낫지 않습니다. 인삼의 청열작용을 이용해가지고, **한증은 독삼관계이중탕**을 쓰구요, 이거 적어두세요. 1년에 이런 사람이 꼭 옵니다. 꼭 만납니다. 한증은 독삼관계이중탕을 쓰구요, **열증은 삼계팔물탕**입니다. 이 두개를 같이 외워두시면 되요. 근데 이게 인삼이 많이 들어갈수록 빨리 듣습니다. 잘 떨어집니다. 보통 몇첩 이내로, 굉장히 오래된 인후통이 떨어집니다. (질문: 인후통이 목이 아픈건가요? 아니면 목이 쉬고 그런 건가요?) 그냥 통증. 목이 실제로 부었다고 하기도 하고, 이비인후과에서는 후두염이니 이런 병명을 가지고 오기도 합니다. 인후불쾌감, 인후통증, 그런 것으로 나타나죠.

* 삼계팔물탕

인삼 5돈 계지 백출 백작약 황기 당귀 진피 감초 각한돈 생강 3편 대조 2개

* 소음인의 인후통은 생감초 당귀 백작 천궁 지각 등을 응용할 수 있습니다. 이 경우는 한증일 경우가 많습니다.

■ 눈질환

* 안구건조증

한증- 십이미지황탕에서 백하오 적하오 양강은 태양인 약이므로 빼고 인삼을 두돈 가한다. 인삼의 청열기능을 활용하는 것이다. 백하오 적하오 양강을 빼고 약을 쓰니 일제히 배변이 좋아졌다고들 한다.

- 눈 피로 상열감에는 인삼을 꼭 써야 한다. 위장에 조금이라도 자신 없어 하면 한증으로 봐야 한다.

■ 소화기질환

* 십이미관중탕 쓰는 방법

양강, 백하수오 적하수오가 태양인약이라서 빼고 써도 되는지에 대한 답변

- 더 좋습니다. 다른 체질약이 확실하다면 빼기만 해도 약효과 더 좋고 위궤양 등이 있는 환자들은 속이 쓰려서 12미관중탕을 못 먹는 경우가 있었습시다만

지금은 매우 무난합니다. 인삼을 가해서 써보기도 하고 건강을 2돈으로 써보기도 하고 있습니다.

- 소증으로 따져서 원래 위가 나쁜 사람이면 관중탕을 쓰고, 원래 위가 좋은 사람이면 위가 잠시 나쁘다 하더라도 보중익기탕을 쓰면 되고, 그래도 위가 걱정이 되면 양강 건강 사인 반하류를 5푼 정도 넣으면 된다. 대단히 중요한 이야기.

- 소음인 열증의 위장은 웬만한 소양인 위장보다 훨씬 좋다. 평생 위장약 한번 먹어보지 않은 사람도 있다.

- **곽향정기산**이나 **향사양위탕**은 외감이 오래 진행되어 찬물을 조금만 먹거나 찬 음식을 조금만 먹어도 설사하는 경우에 쓴다. 일반적인 완병에 쓰는 약이 아니다. 향사양위탕은 사실 리증에 쓰는 약이고 곽향정기산은 표에서 리까지 다 치료하는 약이다. 따라서 소음인의 위장병이나 복통에는 **관중탕**을 써야 한다. 곽향정기산과 향사양위탕은 외감성질환이 진행되었을 경우에만 쓰는 것이다. 감기 끝에 설사하고 배도 아프고 할 때 향사양위탕을 쓰는 것. 이때는 **관중탕**을 쓰면 안 된다. 으슬으슬 추워서 표병까지 있으면 곽향정기산. 감기 끝에 으슬으슬하지는 않고 설사 나고 배 아프고 몸이 회복이 안 되면 향사양위탕. 감기하고 무관하게 속이 냉하고 잘 체하고 배탈이 나고 감기하고 무관하게 상증으로 온 경우, 즉 완병에는 관중탕을 쓴다.

- 향사양위탕을 온보하는 약이고 위장병에 쓰는 약이라고 생각하면 핵심하고 멀어지는 것. 이는 청열하는 처방이다. 위장병은 온보를 하려면 한증은 관중탕을 써야하고 최소한 하수오가 들어간 처방을 써야한다. 위장병을 고치겠다면 하수오가 들어간 처방을 찾아야 한다. 설사를 하면서 위장이 안 좋다, 배가 차다 그러면 백하오이중탕을 쓰는 것이고 설사를 너무 해서 소변이 안 나온다고 하면 백하오부자이중탕을 쓴다.

- 밥을 잘 먹으면 적백하오관중탕, 잘 못 먹으면 **십이미관중탕**. 하지만 거의 십이미관중탕을 쓴다. 그냥 관중탕을 쓴 적이 거의 없다.

* 향사양위탕

- 상부 표부와 관련된 잡병들을 다스리는데 유용하다. 외감병을 전제로 한 처방이다. 따라서 외감증상이 없는 일반 위장병에 응용하면 효과가 없다. 이런 경우에는 십이미관중탕. 감기 끝에 설사하고 몸도 안 좋고 배도 아플 때 향사양위탕

을 쓰는 것이다. 풍과 관련된 질환에 응용 가능하다

- 두통 여드름 같은 피부병 알려지성결막염. 피부질환에 쓸 때는 해독을 목적으로 인진을 더 넣는다.

- 소음인한증의 피부병(여드름 아토피)

- 위가 대단히 나쁜 오십견

- 여드름의 응용 예; 향사양위탕가 인진. 덩어리가 딱딱하게 잡히면 백개자.

- 관중탕이 위장약이고 향사양위탕이 외감약이라는 것을 알게 된 거죠. 외감약인데, 병의 깊이를 생각해 보면, 향사양위탕은 중간쯤에 있는 거죠. 발한을 시킴으로써 해결하는 건데, 소증이 위장이 나쁜 사람은 감기약도 위가 나쁜 것을 고려해서 쓰는 거예요. 그래서 대복피, 반하 이런 것이 들어가는 겁니다. 여기에 한담이 생겼다고 보는 거죠. 그래서 곽향정기산은 寒을 제거해주고 거담을 해주면서, 곽향 소음을 가지고 해기시켜 주는 거예요. 향사양위탕은 뭐냐면, 입맛도 좀 더 떨어질 수도 있고, 寒邪가 들어와 가지고 위를 더 다친 거예요. 비위손상이 더 많아가지고 병이 더 깊이 들어와서, 비염이라든가 중이염이라든가 실질적인 염증이 생겨버린 상태를 말하는 거예요. 그러니까 이것도 역시나 외감약인 거예요. 중이염같은 경우도 이렇게 비슷하게 써야 되는 거예요. 코가 뚫려져야 귀가 회복될 가능성이 많습니다.

- **삼릉 봉출**에 식초를 뿌려서 초만 해도 약맛이 쓰지 않고 달아진다. 어린이 식적에 그것을 써서 밥맛이 좋아지지 않는 아이가 없다. 소음인약. 寒積 食積에 쓴다. 두 돈까지 쓰는데 한 돈이면 된다.

消穀善飢(많이 못먹고 금방 배고프고), 下肢無力.이면 調胃升清湯에 꼭 녹용 넣자. 허기 못참는 것은 비위허약. 寒症은 太陰調胃湯, 熱症은 葛根調胃湯 쓴다.

少陽人이 허기 못참으면 形防瀉白散+ 黃蓮 1돈, 牡丹皮 3푼.

少陰人 寒症은 十二味寬中湯에 木香, 厚朴, 大腹皮, 枳實.

熱症은 補中益氣湯에 乾薑, 砂仁, 半夏류를 5푼씩 가미. 1돈은 많다.

* 구취

- 보중익기탕가 인진2돈 지실1돈 목향 후박 대복피 각 반돈.

* 속쓰림(한증)

십이미진중탕 거 하수오 양강 지실 목향

가 인삼2 백출 하면 어떨까.....라는 물음에 대해

답) 백출이 중요하다. 초해서 약성을 완화시키는 것이 좋다. 물론 인삼도 중요하

다. 건강은 두돈이 아니고 한돈이면 충분한데 쓰려서 순하게 하는 것이 좋다. 소음인 속쓰림에는 오령지를 초해서 쓰기도 한다.

* 한증, 구순염을 동반하는 만성위염에 십이미지황탕 거 양강 적백하수오를 쓰는 것이 어떻겠냐는 물음에 대해==> 인삼으로 청열합니다(두돈이상). 인진 두돈을 가해서 거습하면 더 좋다.

* 소화곤란, 위액역류, 한증(이삼로 원장)

- 관중탕 거 적백하오 양강 가 백출(대변연)하고자 합니다--> 인삼도 가합니다 (위액역류)

■ 구강질환

소음인의 구순염

- 한증. 관중탕가 인삼 인진 각 2돈.

■ 변비

- 관중탕에 백하수오 적하수오 들어가면 변비가 해결이 된다. 팔물이다 싶으면 관중탕을 쓰면 된다. 거의 95프로. 팔물인 경우가 극히 드물다.

- 소음인의 변비는 寒에서 출발하므로 온중하면 대소변이 모두 잘 나오게 된다. 십이미관중탕으로 변비나 소변불리가 매우 잘 해결된다.

■ 소변

- 소변빈삭은 인삼으로 폐기를 보하여 수기의 상원을 다스려 삼초의 통조수도를 가능케 하여 회복한다. 불금일 때는 부자로써 기화시킨다.

- 소변빈삭에는 오약 익지인(촉천환의 의미)

- 한증. 소변이 시원치 않다. 십이미관중탕에 어떻게 가감하면 될까요? 부자를 쓰면 소변을 수월하게 보게 됩니다.

- 소변불금은 신 방광 폐와 관련이 있다. 물론 허증이다. 폐기를 도와서 통조수 도하는 방향으로 가야한다. 따라서 인삼과 황기가 중요하다. 부자를 쓰면 안 된

다. 부자는 기회가 안 되어 소변이 안 나올 때 쓰는 약이다. 오약 익지인도 많이 써보았지만 일일이 실패했다. 인삼을 써서 폐를 보하고 수기의 상원을 다스려 삼초의 통조수도하는 기능을 회복해야 한다. 인삼이 핵심이고 오약 익지인으로는 안 된다. 땀이 많다면 보중익기탕에 온보약을 가하고 한증이면 관중탕에 인삼을 가한다.

- 소양인의 소변청장에는 구기자 토사자 복분자 그리고 야간빈뇨는 산수유도 아주 좋습니다. 구기자는 소변이 붉으면 쓸 수 없습니다.

* 소변빈삭 임상례(학생원장)

- 7세 남. 소변을 너무 자주 본다. 도한경향. 보중익기탕(인삼3돈 황기2돈) 가 오약 익지인 각 한돈==> 10일만에 도한이 좋아지고 소변 횟수가 현저하게 줄다

■ 설사

* 급성감염성

애기는 아주 작는데 똥을 엄청나게 찐다. 설사 한번 하면 대단하다. 소양인인 것이 확실하면 저령차전자탕을 쓰면 한 첩이면 낮고 두 첩이면 끊어진다. 표열을 끊어주기 때문이다. 태음인은 갈근나복자탕, 소음인은 편법으로 육일산을 쓴다.

* 향사양위탕은 감기 걸려서 속이 안 좋을 때 쓴다. 평소 속이 나쁘면 관중탕을 쓴다. 관계부자이중탕은 외감병이 진행되어 감기 끝에 설사가 안 났을 때 쓰는 것이다.

* 한증의 설사

- 12미관중탕에 건강 두 돈하고 인삼 백출 한 돈 가하고 목향 지실은 빼야 한다. 물론 하수오 양강은 뺀다.

* 열증의 설사(위에서 말한 한증의 십이미관중탕 가감방의 결과가 시원치 못해서 쓰는 대안처방임)

- 보중익기탕에 창출 1.5-2돈, 후박 1-1.5돈 가해서 쓰면 된다. 거습하는 의미다.

■ 간담질환

* 황달

황달은 습열로 인해 생긴다. 소음인에게는 인진을 쓰고 태음인에게는 체질불문하고 무조건 대황으로 사하해야 한다. 소양인에게는 고삼으로 습열을 제거하고 복령 택사 등으로 습을 내보내야 한다. 태양인에게는 초룡담 어성초가 중요하다.

■ 알러지성비염

* 황기에 대하여

황기에는 이뇨작용이 있다. 그리고 무너진 위기를 조절한다(외사와 관련이 있는 약이다). 본초에 맥부 오한 한출을 다스린다고 되어있다. 강활 독활 형개 방풍도 위기를 조절하고 표사를 다스린다(表陰降氣). 강활 독활 형개 방풍도 소변을 표사를 제거하는 작용을 한다.

위기를 조절함에 소음인은 황기와 계지가 주약이고 소양인은 강활 독활 형개 방풍이 주약이다. 즉 **황기 계지가 강활 독활 형개 방풍과 같은 일을 하고 있다는 말이다(위기를 조절하고 이뇨함으로써 외사가 소변으로 나가게 된다).**

그래서 소양인의 비염치료에서는 패독산에 가감하게 되고 소음인의 비염은 향사양위탕에 황기를 가하게 된다. 황기는 새살을 돋게 하고 배농작용이 있어서 소음인의 비염에 핵심적인 약이 된다. 물론 **향사양위탕에 천궁 소엽 당귀 지각 각 한돈, 천초 3푼을 가해야 한다.**

황기가 위기를 조절하고 배농하고 생기하며 위기를 조절한다는 사실을 꼭 기억해야 비염 중이염 등을 완치시킬 수 있다.

- 지각은 피부의 흥분을 막아서 진정시켜 줍니다. 비강이 흥분해서 알러지성 비염인 경우에도 지각이 중요합니다. 항히스타민제 같은 역할을 합니다(혈관수축 흥분억제).

1) 열증- 보중익기탕가 천궁 소엽. 빨리 낮고 싶으면 인삼을 증량하고 콧물 너무 줄줄 흘리면 계지를 가한다. 인삼 황기를 많이 넣으면 빨리 낮는다. 3돈 쓰면 훨씬 빨리 낮는다(급증). 인삼 황기는 한돈반으로, 천궁 소엽은 한돈으로, 중이염은 인삼 두돈으로 출발해서 한냥까지

2) 한증- 향사양위탕가 천궁 소엽하고 줄줄 흐르는 콧물에는 계지를 증량한다. 인삼을 증량하기도...

비염에 향사양위탕을 쓸 때는 백출을 창출로 대신한다. 발산력이 있고 실증인 습을 처리하는 창출이 더 효율적이다.

실패해 본 적이 없다. 콧물이 많으면 계지가 반드시 들어가야 한다.

궁귀향소산- 소음인 열증의 비염에도 많이 사용한다. 총백 자소엽이 대단히 중요하다.

온보를 하려면 백하수오로 되고 피부, 눈이 깔깔하고 충혈이 된다, 눈의 알려지 성결막염 등에는 향사양위탕을 쓰면서 인경약으로 천궁, 그리고 인삼을 쓴다.

* 열증의 비염 치험례(안선생)

주소증은 코가 막혀서 잠 잘 때 소리가 나고 숨을 편하게 못 쉬어서 입을 벌리고 잔다. 보중익기탕 가 지각 천궁 백작약 건강 창출 각 한 돈, 천초 3푼. 소엽은 한돈으로 증량. 10첩 먹고서 증상 소실. 열증이라도 건강 창출을 씀.

寒과 濕이 제거되어야 비염이 치료된다는 사실을 이해하게 되고 소음인은 표열을 제거하고 리한을 다스려야 한다는 당연한 사실을 확인한 것임. 당귀 천궁 백작 지각은 반드시 써야 한다(한열불문). 코가 막혀서 천초를 가함.

■ 소음인의 다한증

- 소음인이 땀이 많은 것은 망양으로 가고 있는 것. 인삼으로 청열해야 표열이 제거되고 땀을 막을 수 있다. 수족에만 땀이 나면 칠정성으로 보여짐. 스트레스를 잘 다스려야 한다. 한증이라도 보중익기탕을 쓰고 리한을 생각해서 건강 반하 익지인 등으로 온중해야 한다. 칠정의 문제가 많으면 향부자 등의 이기지체로 다스린다.

- 보중익기탕은 인삼 황기를 이용해서 피부를 식혀가지고 땀이 안 나게 하는 것이다. 소음인은 피부가 뜨거워서 땀이 나가는 것이므로....

1) 열증: 보중익기탕

2) 한증: 보중익기탕가 건강 사인 반하. 가하지 않으면 변이 점점 묽어지고 설사 쪽으로 약간 기운다. (익지인을 가하기도...)

- 손발에만 땀이 나면 칠정인데 향부자를 쓴다.

多汗을 치료하러 왔는데, 裏寒症인 경우 寬中湯(온보)에 人蔘, 黃芪(청열) 가해서 쓸 수도 있겠지만, 補中益氣湯(寒症은 그냥 먹으면 설사)에 乾薑, 良薑, 砂仁, 半夏 가하는 게 더 좋다.

* 소음인의 도한, 낭습

- (보중익기탕 원방에) 칠정의 문제가 있으면 향부자를 가할 수 있습니다. 변이 굳거나 혈허하면 천궁 백작약 등을 쓸 수도 있다.

■ 소음인열증의 피부병. 여드름

* 모두 표열병. 따라서 신수열표열병에 나오는 약을 쓰면 된다. 팔물을 써서 표열을 제거하는 약을 쓴다. 팔물군자탕에 가미를 한다.

* 열증의 여드름에 보중익기탕가 인진 두세돈 한 임상례도 있음. 음주자.

* 소음인이 속 안 좋은데 피부질환이 있는 경우에는 향사양위탕과 인진을 쓰면 좋다. 두돈. 소음인이 얼굴이 누런 느낌이 들 때는 인진, 상습음주자 얼굴이 노랗거나 관중탕에도 쓸 수 있다. 관중탕가 인진 두돈

☆ 열증의 여드름에 보중익기탕가 천궁 소엽,

한증의 여드름에 향사양위탕가 천궁 소엽

- 피부질환에 (관중탕보다) 향사양위탕이 더 효과적이다. 향사양위탕에 당귀 천궁 인진 황기 지각 등을 가하면 효과적이다. 황기가 배농, 인삼이 청열한다.

- 소음인 한증의 여드름에 관중탕 가 인삼2돈(청열), 인진 1-2돈(습열)하기도 한다.

- 12미관중탕에서 피부질환, 두드러기가 나고 하면 지실을 쓰면 안 되고 지각으로 바꾸면서 지각을 한돈에서 두돈으로 쓸 수 있다. 지각이 두드러기에 대단히 중요한 약이다.

- 여자들 기미, 남자들 술 많이 먹고 얼굴에 때가 올라올 때 인진을 두돈 정도 더 넣어서 쓰면 확실히 피부가 달라진다.

- 소음인의 아토피는 어혈을 고려해서 팔물군자탕을 고려한다. 가 인진하기도.... 단 변이 묽어지고 하는 것을 사전에 이야기해 놓아야 한다.

- 아토피에는 팔물군자탕에 인삼으로 청열하고 인진으로 습열 제거하고 흑호마(참깨)로 피부를 윤택하게 한다.

- 인진으로 거습, 가려움이 심하면 지각, 피부가 검어지고 어혈증상을 보이면 당

귀 적작약 등을 활용할 수 있다. 진물과 습이 많으면 창출도 중요함. 건조가 심하면 당귀 위주로..... 소음인 열증의 피부질환에 보중익기탕보다 팔물군자탕이 더 좋은가요?--> 팔물군자탕에 당귀 작약 천궁 등이 들어가서 활혈작용을 생각한 것인데 별로 재미없습니다.

- 소음인의 피부질환; 인삼과 황기를 써서 청열하고 生肌를 도모한다. 당귀 천궁 백작약도 음혈을 돕고 어혈에 효과가 있다. 산사도 어혈에 작용한다.

*** 소음인 한증의 피부염. 진물, 약간의 소양감에 대한 처방례**

- 십이미관중탕 거 적하수오 백하수오 양강 가 지각 한돈반 창출한돈(거습), 인삼 1-2돈, 인진 익모초 각한돈(습열)

*** 여성의 기미**

- 십이미관중탕 가 인진 1-2돈이면 잘 해결된다.

*** 고기 먹으면 바로 두드러기, 오랜 불면증에 시달리는 영감님**

소음인의 두드러기에는 지각이 핵심. 일반적으로 식적에는 지실을 쓰고 두드러기에는 지각을 쓴다. 흑호마(참깨)도 효과가 있다. 참깨를 갈아 식후에 적정량을 장복할 수 있다. 술을 먹는 사람이면 인진을 쓸 수도 있다. 불면은 인삼으로 청열하고 반하 2-3돈 진피 2돈 정도 써서 거담하는 것이 좋겠다. 천궁 소엽으로 해울시킬 수도 있다. 청열 거담 해울이 핵심이다.

*** 두드러기**

- 한증. 두드러기는 비위를 다스리고 피부를 열어서 호흡을 시켜야 한다. 향사양 위탕에 백출 대신 창출로 습을 발산시키고 천궁 소엽을 피부를 열어주고 지각을 가해 리기시켜야 한다. 술을 잘 먹는 사람이면 인진 한두돈을 가하고 인삼을 증량할 수도 있다. 이 경우 지각과 인삼이 핵심이다. 지각은 단미만으로도 효과가 있다.

*** 여드름에 대해**

소음인 피부질환은 당귀 천궁 백작약 같은 사물탕류와 지각 황기(생기작용)가 중요합니다. 인진을 습을 제거합니다. 피부가 얼룩덜룩하면서 때가 낀 것 같은 상태는 습입니다. 인진을 꼭 써야 합니다. 지각은 피부의 흥분을 막아서 진정시켜 줍니다. 비강이 흥분해서 알려지성 비염인 경우에도 지각이 중요합니다. 항히스타민제 같은 역할을 합니다(혈관수축 흥분억제). 그래서 민간에서 두드러기에 탕

자를 달여 먹습니다.

■ 갱년기증후군

- 소음인 열증이고 위장이 좋은 여자의 갱년기장애 증후군. 향부자팔물탕.

* 한중의 갱년기 증후군

- 인삼을 중용하면 열이 내린다. 12미관중탕에 지각 청피 향부자 등으로 리기한다. 원방에 청피 향부자는 있고....지각 인삼을 가하면 된다. 혈증이 보이면 당귀 천궁 5푼을 가한다. 인삼이 핵심이다.

- 갱년기 장애로 간기울체 등의 증상을 보이면 소음인은 향부자로 이기해울하고 소양인은 목단피로 파혈 활혈 해울한다. 같은 질환은 같은 귀경의 약을 쓰고 처방과 약물은 달라진다.

■ 생리전 증후군

- 十二味寬中湯 加 當歸 川芎 五靈脂(炒) 香附子 烏藥 山楂 艾葉 益母草 소회향 한 돈을 써보려 한다는 데 대해.

- 많이 가미하면 오히려 약효가 떨어진다. 하초허냉이 문제면 애엽 익모초, 리기시켜야 될 것이면 오약 향부자, 어혈이면 당귀 천궁 등등.....

* 한중의 생리통

- 십이미관중탕 가 어혈이면 당귀 천궁 오령지, 습이 원인이면 인진 익모초, 기체이면 지각 오약 청피.....

■ 여성의 회임

- 33세 한증. 임신하기 위해 애쓰는 중

자궁을 보하거나 임신에 도움이 되려면 당귀 천궁 백작약 향부자 등이 중요하다. 당귀 천궁 백작은 한증의 경우에는 한 돈 이하로 써야 한다. 한증은 기본적으로 5푼 정도 쓴다고 생각하면 된다.

■ 통증

대강

- 오십견, 팔다리 쭈시고 아프고 디스크 지절통 사지통 등에도 황기계지탕 천궁계지탕의 등의 약을 쓴다. 위가 좋은지 안 좋은지, 땀이 나는 지 안 나는지 등을 따져야 한다. 예를 들어, 열증인 경우는 천궁계지탕을 쓰면서 당귀나 활혈하는 약, 사물같은 것을 넣고 어혈약도 가미한다.
- 파고지 세신 진교 두충 등을 소음인의 요슬질환에 가미할 수 있다.
- 팔물군자탕을 동통성질환에 쓴다. 당귀 천궁 백작약이 있어서 활혈작용이 있기 때문. 팔다리가 당기고 그러면 진교 세신 같은 것을 넣어서 좌골신경통 등에 응용한다. 십전대보탕에 쓰기도 한다. 보중익기탕을 쓰면 몸이 좋아지고 그러는데 증상은 절대 안 낫는다.

■ 요각통

- 오적산1은 열증, 오적산2는 한증에 쓴다.
- 좌골신경통 있고 다리 당기면 세신 진교를 가한다.
- 소음인 요슬질환- 파고지 세신 진교 두충 이런 것들을 적절히 가미해서 활용한다.
- 다리가 땡기면 천오가 좋다.

* 만성적인 소화불량에 요통 견통의 증상을 보이는 환자에 대해

"찜질방에서 오래 있을 수 있는지" 그것만 물어봐도 체질감별이 되는데요...

"손힘이 특별히 약한지" 돼지고기 먹으면 더 소화가 안 되는지"도 문진해 보는 것이 좋겠습니다.

눈빛이 너무 침착해보이고 눈에 힘은 없고 생각이 많아 보여서 소음인으로 보고 싶습니다. 12미관중탕에 지각 오약 1돈해서 행기시켜 주면 좋을 것 같습니다

* 소음인 한증의 요각통에 십이미관중탕(거 적백하수오 양강)에 파고지 두충 세신 진교 인삼 황기 각 4그램을 고려하는 원장도 있었음.

* 소음인 디스크 임상례

십이미관중탕 거 적백하수오 양강 가 천오 한돈반, 세신 진교 각 한돈으로 70-80% 호전되는 성과를 얻다.

■ 오십견

1) 한증- 곽향정기산 가 계지 혹은 황기계지탕가 건강 양강

2) 열증- 황기계지탕 가 강황

한증감기약은 표에서 리까지 다 작용하는 곽향정기산, 궁귀향소산을 쓰는데 여기에 건강 양강을 넣어서 오십견에도 응용한다.

1) 무한의 오십견- 천궁계지탕가 강황. 어혈약으로 당귀 천궁 작약 을 활용할 수 있다. 세신으로 경락을 뚫어주고...

2) 유한의 오십견- 황기계지탕가 강황.

*** 오십견, 항강증 목디스크, 팔이 저리고 어깨가 결린다..**

1) 한증; 천궁계지탕을 응용. 천궁이 빠지고 당귀 소엽을 넣고 강황 건강을 넣는다. 한증에는 무한에 쓰는 처방을 쓴다. 혹은 천궁계지탕가 당귀 작약 건강 세신 강황

- 한증에 당귀 천궁이 들어가면 벌써 설사를 한다. 건강 등이 반드시 들어가야 한다. 그래야 무난하게 쓸 수 있다. 한증은 당귀 천궁 백작약을 못 먹는다. 건강이 들어가면 끝까지 약도 잘 먹을 수 있고 패증도 없다.

2) 열증; 황기계지탕가 강황 . 열증에는 유한의 처방을 쓰고....

- 관계부자이중탕을 관절질환에 이용하기도 한다. 통증에는 부자보다 천오.

*** 오십견**

소화가 잘 되는 열증이면 천궁계지탕에 강황 한돈, 천오 한돈 반 쓰고... 야간 통증은 어혈이므로 당귀 적작약 오령지를 가할 수 있다. 행기를 목적으로 지각을 가할 수도 있다. 핵심은 천오 강황이다.

■ 류머티스 관절염

당귀미 적작약 천궁등의 활혈제, 지각 오약 등의 리기약, 계지 오령지(파혈) 창출(거습) 등을 활용한다.

* 학생원장의 임상례

어깨관절과 발가락에 류머티스를 앓고 있는 소음인 아이를 태음인으로 판단해서
갈근조위탕가감으로 한달간 치료해도 무효.

그래서 보중익기탕(백출 당귀--> 창출 당귀미) 가 천오 오약 당귀미로 호전시키
다==> 소음인의 관절통증과 부종치료를 위해 어떤 가감이 필요하겠습니까?=>
(안) 당귀 천궁 백작약 등으로 활혈시키는 것이 기본이 되겠습니다.

■ 두통

- 열증- 향부자팔물탕
- 한증- 식적으로 오는 두통에 십이미관중탕가 인삼 인진.
- 두통의 핵심은 청열이고 청열의 핵심은 인삼. 경우에 따라 세신을 쓰기도 한다.

* 이명 두통 현훈(임상례)

거풍산(계지반하생강탕에서 지각 청피 오약을 가한 것으로 해수 중풍에 쓴다는
말이 있음)에서 남성만 빼고 반제로 오랜 시간 동안의 기침감기, 두통, 현훈, 두
명 등의 증상이 일시에 해결되다.

--> (안) 계지반하생강탕은 외감과 담증이 협했을 때 쓰는 약이다. 이 할머니의
어지럼증이나 머리에서 울리는 현상은 모두 담증이다. 그리고 해수는 외감과 관
련이 있다. 소음인의 해수에는 반하와 지각이 핵심이다. 지각 청피 오약은 순기
지제이고 오약순기산의 의미가 있다. 그래서 중풍이라는 이야기가 나오고 남성까
지 쓰는 것이다.

■ 소음인 보약

1) 열증; 보약에 보중익기탕을 가장 많이 쓴다. 곽향 소엽을 5분으로 한다. 보
약으로 쓸 때는 땀이 나고 안 나고를 그렇게 중요시하지 않는다. 보약으로 쓸 때
는 인삼 황기를 한 돈 반으로 쓴다. 급격하게 열을 꺼줄 때는 인삼 황기를 세돈
사용.

- 십전대보탕은 변이 좀 막히고 울광의 경향을 떨 때 쓴다.
- 소음인 열증은 표열로 인해서 양기를 잃고 있기 때문에 표열을 사해서 그 열
이 리부로 들어가게해서 양기의 손상을 막아줘야 합니다. 표열을 제거하는데 인
삼황기가 가장 중요한 약이 되는것이고 그중에 보중익기탕이 핵심이 될수밖에

없습니다

- 소음인 한증은 리한이 문제고 속이냉한것 때문에 흡취지기의 부족이 더욱 가중되기 때문에 설사를 하지 않는다면 십이미관중탕으로 비위를 따듯이 해서 잘 먹게 하는 것이 관건이 되겠습니다

■ 소음인의 정력부족, 조루

- 보중익기탕
- 보중익기탕을 복용하고 변이 단단해지고 보기 힘들어지는 경우에는 팔물군자탕 가미방인 십전대보탕을 쓰는 것도 좋다. 변이 잘 나오고 편해진다.

■ 동맥경화

한증- 십이미관중탕가 인진 두돈(습을 신속하게 제거하기 위한 것)

■ 당뇨

당뇨에는 인삼이 중요하다. 인삼 한돈 가하고 백하오 적하오 양강 빼고 쓴다.

소음인 당뇨 고혈압

十二味寬中湯 + 茵陳으로 치료에 있다.

■ 불면 등의 정신질환

- 인삼을 중용해야 불면이 잡힌다.
- 답답 불안 조바심 등으로 심장이 약하다. 인삼을 쓰면 심장이 안정된다.
- 불면은 인삼으로 청열하고 반하 2-3돈 진피 2돈 정도 써서 거담하는 것이 좋겠다. 천궁 소엽으로 해울시킬 수도 있다. 청열 거담 해울이 핵심이다.

* 무서움을 많이 타는 어린이

반하 남성 진피로 거담하고 청피 지각으로 리기시키면 된다. 인삼의 청열 안신작용도 대단히 중요하다. 천궁으로 해울시키는 경우도 있다.

* 열증의 43세 여성

- 이혼 후 심계 정충 흉통, 현훈, 피로.....==>형방사백산가 치자 황련 영지. 안신 작용에 영지가 최고다. 두통이나 눈 피로가 있으면 해울시킬 목적으로 시호나 박하를 사용할 수도 있다.

■ 이명

이명은 풍열과 담화가 원인. 천궁 창출 진피 세신 반하 등을 응용하고 당귀로 보혈하거나 청피 진피로 리기하기도 한다. 열을 끄는 인삼은 기본.

<소양인>

1.소양인의 판별

성정

- 양인은 미래지향적
- 양인들은 새로운 것을 받아들이는 것을 대단히 좋아한다.
- 소양인은 친한 친구라도 친구가 아무리 자신에게 잘 했어도 마음에 안 들면 가차없이 정리한다. 일단 마음에 안 들면 서로 불편하게 그러지 말고 일단 그만 보자고 한다.
- 과거의 경험을 싹 잊어버리고 생각과 행동이 반사적으로 이루어지는 것이 양인이다.
- 양인이므로 감정적이다. 잘 믿는데 한번 속은 것에 대한 의심이 크다(懼心). 의심이 생기기 시작하면 끝이 없다.
- 아버지가 맘에 안 들면 아버지라도 가만히 안 있는다 면서 지적한다. 눈치빠가 면서 호로자식이 많다.
- 소양인이 제일 민첩하다. 앞뒤가 어떻고 계산적이고 계획적이고 이런 것이 안 된다.
- 물건을 살 때도 즉흥적이다. 지나치게 긍정적이기 때문에 조그만 거 괜찮은 걸로 사버린다. 그리고 후회하고.....남들이 보면 경박스럽다. 신중하지 못하고..
- 뭘 살 때 과하게 산다. 위장이 발달했으므로 부족한 것을 제일 못 견딘다.
- 계획을 잘 세우지도 않지만 세웠어도 지키지 않는다. 계획대로 안 되면 더 좋아한다.
- 중앙처리장치가 크기 때문에 판단에 시간이 걸리지 않는다. 신속하다. 귀가 얇다. 지구력이 없다.
- 전혀 이성적이지 않다. 감정적이다.
- 엉덩이가 작다. 그래서 한군데 오래 못 있다. 직업 변화도 잘 하고 잘 때려치우고, 새로운 직장에 적응도 잘 한다. 눈치가 빨라서 금방 잘 하는데 조금만 지나면 금방 싫증내서 때려치우고 다른 것을 시도한다.
- 소양인이 하는 말을 믿으면 안 된다. 너무도 긍정적이기 때문에 약속도 대단히 잘 한다.
- 소양인은 계산적이지 않아서 한심한 인간이고 소음인은 너무 계획적이라서 돌발상황에 대처능력이 없다. 소양인은 돌발상황을 더 좋아한다. 소양인은 새로운 것을 더 좋아하기 때문이다. 과거지향적이지 않기 때문에 돌발적인 상황을 가지고 더 재미있어 한다.

- 생각자체가 소양인은 어린 아이 같은 성향이 있다. 칭찬하면 금방 방방 뛰고 기죽이면 가라앉고 하는 것이다. 소양인은 80이 되어도 자식들이 칭찬하면 기고 만장하고 자식들이 나무라면 기가 죽는다. 이목구비가 중간으로 물리는데 유치한 아이들의 이목구비가 중간으로 물리는 것처럼 소양인도 유치하다.
- 먹으면 싸우려고 한다(건달들).
- 싸잡아서 단언하듯 말하기 쉽다.
- 소양인은 결정을 빨리 하고 판단력이 빠르다. 판단을 정확하게 한다는 말과는 의미가 다름. 반면에 소음인은 검색해야 할 것이 많으므로 판단이 느리다.
- 소음인은 계산성 사색적 예민성 소양인은 순발력 행동력 모험심 의협심 자유분방함...태양인은 무게획성, 즉각적이므로...태음인은 지구력 계획성. 소음인은 질서, 소양인은 무질서....소음인은 계획이 없으면 불안해 한다.
- 귀가 얇아서 남의 말을 잘 믿는다.
- 태양인은 애교가 없습니다. 못 생겨도 애교있고 착착 달라붙고 약간 오버하고...이것은 소양인입니다. 소양인은 누구하고나 금방 친해집니다

몸의 특성

얼굴윤곽

- 얼굴이 비교적 평평한 느낌
- 소양인은 이목구비가 중앙으로 몰린 듯하다. 오밀조밀하다. 코가 짧기 때문이다.
- 광대뼈가 발달해 있다.
- 이문세같이 말상인 사람은 소양인이다. 유열 이수만 다 소양인.
- 소음인은 광대뼈가 커지기 힘들다. 관골이 큰 경우가 대단히 드물다. 소양인은 관골이 퍼진 느낌이 있다. 태음인도 관골이 퍼졌는데 소양인의 관골은 짝 퍼져서 평면으로 퍼지지만 태음인은 볼록하게 퍼진다. 소양인은 五臟이 납작한듯하고 태음인은 울퉁불퉁하다. 관골은 기세다. 기허한 소음인은 관골이 커지기 어렵다.
- 소양인은 한 쪽으로 물리거나 판판해지거나 아기자기 오목조목해진다. 태음인은 이목구비가 떨어지고 크고 강하고 관골이 볼륨감이 있다.
- 관골이 좌우로 짝 퍼지면 소양인이다.
- 얼굴이 역삼각형으로 좁아져 내려오면 소음성.이마가 좁고 볼록이 크면 소양성.

눈

- 눈이 화사하고 합리적이고 시원하게 생기고 호기심이 많아 보이고 눈에 기운이 있다.
- 소양인의 눈빛이 매서운 것이 아니다. 화사한 새눈 같다는 표현을 쓴다. 태음인이 안검이 두텁고 찌지고 무서워 보이는 눈이 많다. 그러나 막상 말을 해보면 순하고 인정이 많고 사람이 좋다는 느낌을 받게 된다.
- 소양인은 별 긴장을 하지 않아도 눈이 번쩍번쩍한다(빛난다). 脾가 강하기 때문이다. 소양인은 생각이 들어가면 금방 결론이 나고 밖을 살핀다. 소양인은 생각을 안 하고 정찰을 많이 해서 눈이 왔다갔다 한다.
- 소양인은 입이 못 났고 눈이 예쁘다.
- 태음인은 눈꺼풀이 발달하고 태양인은 눈동자가 발달한다. 태양인의 눈은 눈매를 보고 알아야 하는데 이 앞에서 거짓말하다가는 죽겠구나 하는 느낌이 드는 눈매다. 소양인은 안검이 얇고 새눈 같은 것이 양인이다. 소양인은 눈이 그리 강하지 않다. 눈이 아주 화사하고 예쁘고 귀엽고 반짝거린다.
- 소음인의 눈은 축축하다 흐리다는 표현을 씁니다. 음이 발달되었다는 뜻이고 뭘 생각하는지 모르는 눈빛입니다. 관심이 내부에 있어서 그렇습니다. 반대로 소양인의 눈빛은 반짝거리고 관심이 외부에 있고 호기심이 많아 보이고 강해 보인다. 소음인은 세상일이 어떻게 돌아가는지에 대한 것보다 내가 어떻게 할까? 뭐 이런 눈입니다. 안광이 없이 빛이 들어가는 눈입니다. 안구가 움직이는 속도에도 차이가 있습니다. 양인이 빠르고 음인이 느립니다.

이마

- 소양인들은 이마를 보면 좁아진다. 광대뼈가 가장 발달되어 있어서 위로 가면서 좁아진다. 옆에서 눌러봤으니 앞으로 살짝 이마가 튀어 나온다.
- 소양인의 미간은 높고 발달하고 볼륨감이 있는 경우도 있다. 넓게 자리잡고...
- 소양인은 이마가 양미간이 중간으로 물리면서 돌출되어 있다. 소양인은 이마를 양쪽에서 눌러 놓은 모양이다. 소음인은 턱을 양쪽에서 눌러 놓은 모양이다. 태음인은 아래위로 혹은 사방으로 잡아당겨 놓은 모양이다. 소양인은 기운이 위로 올라가므로 입술이 가볍게 약간 들렸다. 소양인 이마는 땀이 많이 흐른다. 전체적으로 보고 이마까지도 확실하구나 하는 식으로 파악한다.
- 코가 작고 이마가 튀어나오고 사실 옆에서 보면 이마가 쏟아져 나올 것처럼 보이는 경우도 있다(김영삼). 이마가 튀어나오고 입이 들어가고 턱이 약간 젓혀진다. 그리고 하관이 밑으로 빠지지 않는다.
- 소양인은 눈 위가 얼굴 전체의 반 이상을 차지한다. 소양인은 눈치를 보면서

까분다.

- 전두용기(이마)가 물리고 돌출한다.

코

- 코가 작다. 산근이 살아있지만 코가 내려오면서 기세가 죽는다. 양인이므로 코가 위가 발달하고 끝이 죽는 것이다. 음허한 것이다. 끝이 뭉뚱해지던가 뽀죽해지면 아주 얇아진다. 뽀죽한 것이 약한 것이다.

- 산근발달. 넓고 높다. 낮아도 넓고 둥글게 자리한다. 준두가 미발달. 코끝도 짧고 뭉뚱하다. 뽀죽해지면 얇고 살점이 전혀 없어 보인다. 넓게 부드럽게 솟아오른 것이 강한 모양이다.

- 얼굴 전체에서 코가 짧은 느낌을 준다(얼굴 전체 길이의 1/3). 기운이 뻗다가 말아버렸기 때문이다. 음이 없어진 거다.

- 소양인들은 길이가 짧고 끝이 뭉뚱하니 화살코가 되기 힘들다. 적어도 소음인은 돼야 화살코가 가능하다. 소양인을 절대 될 수가 없다.

- 태음인 중에 산근이 확 꺼진 사람도 많다. 소양인은 그래도 자세히 보면 뭔가가 있다. 흔적은 남긴다. 소음인은 코끝이 뽀죽해지고 발달되어 있고 산근이 현저하게 약해진다. 코가 올라갈수록 가늘어지고 가늘어지면서 뽀죽해진다. 가늘다는 것은 약하다는 말이다. 소음인은 코가 뽀죽하다기 보다는 끝에 뭔가 여유가 있는 것이다. 태음인도 물론 끝이 발달이 되는데 너무 발달이 되어서 못 생겨지고 태양인은 가다가 죽어버려서 못 생겨지고 소양인은 코가 짧고 기세가 끝까지 안 내려오니까 못 생겨지는 것이다. 소음인은 산근이 팍 죽으면 못 생겨지는 것이다.

- 소양인 중에도 코끝이 뽀죽한 사람이 있다.

- 소음인의 코는 아랫부위(음의 부위)가 잘 매듭지어지고 야무지게 생깁니다. 그리고 산근(양의 부위)은 약해져서 가늘거나 날카로와 집니다. 소양인과 대비해서 생각하면 소양인은 산근이 둥글고 부드럽고 자연스럽다고 말할 수 있습니다. 그러나 소양인의 코는 음허해서 아래가 부실하게 됩니다. 길게 내려오지 못하거나(짧다) 코가 위로 달려있고 끝이 부실해져서 뽕퍼짐하거나 뻗힌 곳이 없어지게 됩니다. 그래서 소양인은 눈과 미간 산근 등 상부는 잘 생기고 하부는 못 생겨 집니다(음허해서 음의 부위가 부실해 집니다).

- 소양인 아니면 태음인인데 산근이 산맥같이 발달해서 소양인으로 볼 수밖에 없습니다.

- 무지 넓게 발달한 산근을 주목하라. 체질감별방 1044번 관련
- 산근은 강한데 코끝의 마무리가 잘 되지 않는다(코의 기세가 위로 치우친 모양)
- 태음인이 확실하다. 소양인으로 보기에 산근이 너무 약하다(소양인의 산근이 태음인보다는 강하다는 말 아닌가!!!).

입

- 입술 아래부분(아래턱부분)이 얇지만 저작근이 있는 부위는 직각에 가깝게 각이 졌다.
 - 소양성은 입이 작다. 그리고 함몰됨. 확실히 입이 작고 웃을 때 보면 입술이 거의 안 보인다.
 - 입술의 윤곽이 거의 흐릿하다. 뺨이 죽었으므로.
 - 입이 들리고 입이 얇다. 기운이 위로 오르기 때문이다.
 - 소양인은 입이 작는데 큰 경우는 정말 얇아진다. 입술이 보기에 안으로 말려 들어간 것처럼 보이는 경우도 있다.
 - 입이 작은 것은 얼굴의 폭과의 상대적인 길이를 기준으로 판단한다.
 - 인중의 길이는 소양인이 가장 짧다.
 - 소양인도 입이 나오는 경우가 있다. 입이 전체적으로 소음인처럼 볼륨감이 있게 커지는 것이 아니고 입에 되게 좁아지고 작아지면서 나온다.
 - 옥니. 이가 빨리 닳는다.
- = 입 양쪽 끝에 여덟팔자가 보이는 것은 입이 약해서 생기는 주름이다. 꺼져있다. 하지만 이런 것이 보인다고 다 소양인은 아니다.

턱

- 아랫입술 끝에서 턱까지의 길이가 짧다. 무턱이 많다. 그리고 험거부위의 저작근 부위가 이루는 각이 직각에 가깝다. 반면 소음인은 아랫입술에서 턱까지의 길이가 길고 저작근 부위의 각이 둔각에 가깝다. 소양인의 턱은 밑으로 빠지지 않는다. 그래서 턱이 안정적으로 잘 생겼다고도 한다.
- 주걱턱은 어느 체질에나 있다. 입이 함몰되면서 턱이 얇아지면 소양인이고, 입이 돌출하면 소음인이다.

체격

- 골반이 취약하고 어깨가 발달한다. 골반이 작으므로 다리가 붙어서 내려온다.
- 대흉근이 발달해 있고 여성의 경우, 유방이 크고 하늘을 향해 있다. 그리고 유방사이의 거리가 멀다. 반면에 소음인 여성의 유방은 붙어있다.
- 허리에 살이 찌도 앞으로 살이 찌다. 태음인은 옆으로 살이 붙는다.
- 팔힘이 세고 흉곽이 크다. 늑골각이 크다. 손아귀 힘이 세다.
- 골반이 좁고 뒤로 오리궁둥이처럼 튀어 나온다.
- 엉덩이를 옆으로 깎아낸 것 같다.
- 다리가 소음인에 비해 상대적으로 짧다. 소음인은 다리가 굵으면서 쪽 뻗었지만 소양인은 짝달막하고 가늘다. 소양인은 근육이 뻣뻣하고 튼실하게 붙는데 소음인은 근육이 얼마 없다.
- 소양인은 먹으면 근육으로 가고 상지로 간다. 따라서 소양인은 근육힘이 세고 팔힘이 세다.
- 오다리 엑스다리 소양인이 제일 많다. 태양인도 하체가 형편이 없다.
- 갈비뼈 각도가 넓으면 소양성, 좁으면 소음성. 치골각과는 반드시 반비례. 치골이 큰 것, 다리가 길고 늘씬한 것은 소음성. O, X 다리는 소양성.
- 태양인은 둔부가 아무리 발달해도 뒤로 볼록해지지 않는다. 소양인은 둔부가 아무리 발달해도 지나치게 옆으로 넓어지지 않는다.

맥

- 소양인은 부맥에서 침맥으로 갈수록 맥이 작아진다. 그래도 계속해서 뛰기 때문에 鼓脈 즉 有神한 맥이 된다. 소양인의 맥은 옆으로는 안 느껴지고 손가락 밑에서만 느껴진다. 맥이 가늘고 질기고 활발한 느낌, 회초리 같다. 침맥으로 갈수록 좁아진다. 반면 태음인은 맥이 굵기가 훨씬 굵고 부중침에서 같이 느껴진다.

기타

- 길이 차므로 반신욕해도 좋다. 사우나에서 비교적 오래 견딘다.
- 소양인이 건강하면 대변이 두껍다. 한 덩어리 푹 떨어뜨리고 끝이다.
- 소양인들은 대체로 머리를 기르지 않는다(양아치들)
- 소양인은 며칠 배설을 못 시키면 심각해진다. 소음인은 밥을 못 먹거나 헛땀 흘리는 것이 큰 병이 되고 소양인은 대변을 못 보면 위급해진다.
- 소양인에게 가장 중요한 것은 熱代謝이다. 열을 신속하게 배설시켜 주어야 환자가 편하게 되고 수액도 정상적으로 되는 것이다. 소양인은 열대사를 정상적으로 하면 대변도 정상이 되고 외감도 낮은 것이다.
- 발목이 가늘어서 잘 췌다. 이 천수는 소양인이다.

- 살찌면 오히려 소양인이 아닌가 생각하라(강호동). 발이 작으면 소양인일 가능성이 높다. 기운이 위로 가므로.... 발이 작으면 소음인은 아니다.
- 뚱뚱한 경우에 사실 소양인인지 태음인인지 잘 모르는데 우악스러워 보이면 소양인이고 미련스러워 보이면 태음인이다. 강호동 이영자는 소양인이다. 뚱뚱한 경우에는 태음인이라기보다 소양인이라고 먼저 생각하는 본다.
- 소양인이나 태양인에게 O, X다리가 많다.
- 소양인이 잘 먹는다.

허만회 선생의 체간측정법

- 상체 체형의 흐름을 보는데 소양인은 위로부터 아래로 내려오면서 역삼각형이나 혹은 깔때기 같은 체형이 나온다. 한편, 태음인은 통형이나 배만 나온 형태가 되고, 소음인은 플라스크형이나 삼각형의 모양을 띈다.
- 측정하는 기준선은 다섯 개로 나뉘는데, 일선(팔과 대흉근이 만나는 지점) 이선(젖꼭지를 연결한 선) 삼선(가장 늑골이 튀어나온 부위를 연결한 선) 사선(배꼽 라인) 오선(장골릉을 연결한 선. ASIS)을 측정했을 때, 소양인은 깔때기형 혹은 역삼각형의 모양을 띈다는 것이다.
- 결국, 양의 기운이 발달하면서 소양인의 상체는 역시 어깨가 발달하고 골반의 발달이 약한 모양을 띈다고 볼 수 있다.

약과 음식에 대한 반응

- 태음인이라 간주한 환자에게 갈근조위탕을 먹었더니 불면, 수족부종, 온몸의 가려움, 두통, 소화곤란 등의 증상을 호소한다--> 갈근조위탕 먹고 잠이 안 오면 기능항진이고 소양인으로 판단할 수밖에 없다(토의사례에서).
- 소음인약을 소양인이 먹으면 기능항진이 온다. 기능항진이란 자다가 중간에 깨고 새벽에 일찍 깨거나 대변이 잘 안 나오는 증상이다. 잠과 대변의 양상에서 기능항진과 기능저하를 판단한다.
- 소양인이 마황을 먹으면 잠 못 자고 살이 빠진다. 소변적삼. 입이 쓰고 마르고 눈이 충혈되고 인간을 초긴장상태로 만든다.
- 매운 음식이 대단히 안 좋다. 카레도 소음인 음식이다.
- 음식물에서 제일 문제가 소양인이다. 소양인에게 맞는 음식이 별로 없다. 보리밥 돼지고기 참외 오이....이런 것 정도가 맞다.
- 약을 써서 체질을 판별하려면 태음인 약을 써야 한다. 태음인 약을 써서 변비

가 되거나 기능항진이 오면 소양인이고 기능저하가 일어나고 힘이 없이 설사를 계속하면 소음인이다. 한열이 맞을 경우에 한한다.

- 麻黃(太陰人약) 먹으면 少陰人은 기능저하. 기운 빠지고, 기와, 다면, 설사. 망양. 太陽人은 기능저하와 항진 동시. 설사하면서 잠도 안 오고 가슴 뒹다. 少陽人은 기능항진. 대변 굳고, 잠 줄거나 중간에 깨거나. 심계, 안면홍조. 망음.

- 少陰人은 보리 먹으면 속이 끓고 돼지고기 먹으면 설사. 참외, 오이는 사하지 제. 少陽人은 찹쌀음식 먹으면 소화가 오래 안 되고 쓰리다. 닭고기, 굴, 사과.

少陽人 아기는 굴 소화 안 되고 그대로 나온다고.

- 太陰人은 토마토 오래 먹고 장출혈. 초콜렛 먹으면 안 좋다.

- 흰 살 생선은 이노작용 있어서 少陽人에게 맞다. 苦寒之劑도 少陽人에게 맞다.

2. 소양인 한열, 표리, 병위, 처방의 관계

* 병의 위치(病位)

밥맛으로 구분한다. 소화가 곤란하거나 입맛의 변화가 있는 경우는 리증이다. 리병은 양명병이다. 병의 위치도 常症으로 구분한다. 맨날 속이 안 좋으면 리병을 갖고 있는 것이다. 소양인인데 상증으로 맨날 감기 걸리고 콧물 나오고 재채기 하면 표병을 갖고 있는 것이다. 이런 사람은 형방지황탕을 쓴다. 만일 표병부터 리병까지 다 걸쳐있으면(신한복통설사) 형방지황탕을 쓰는데, 소양인약에서 차전자가 들어가 있으면 표병에 쓴다고 보면 된다. 완전히 리증이면 독활지황탕을 쓴다.

* 표병 리병

표병이나 리병이나는 감별이 쉽습니다. 밥맛이 정상이면 표병입니다. 리병이면 밥을 잘 못 먹거나 속이 쓰리거나 아프거나 설사가 나거나 그러면 리병입니다. 위장에 아무런 문제가 없으면 리병이 아니라고 생각하시면 됩니다. 이것이 상한론의 정신이고, 이제마 선생님도 그렇게 생각하셨습니다. 감기가 걸렸는데 오한 발열신통두통이 있고, 밥맛이 정상이다 그러면 계속 표증약을 쓰시면 됩니다. 소양인 같으면 패독산을 쓰시면 됩니다. 일주일도 지나도 입맛이 정상이다 그러면 계속 패독산을 쓰시면 됩니다. 그런데 입맛이 떨어졌다 그러면, 감기에 오늘 걸렸는데 오늘 벌써 입맛이 없다 그러면, 패독산 쓰면 안되요. 사백산 이런 걸 써야됩니다. 그래서 리열을 제거해야 합니다. 밥맛이 없다는 것은 열이 위로 들어가서 胃가 손상되었다고 보시면 되요. 그러니까 시간이 몇시간이 지났던 간에 입맛이 있냐 없냐, 위가 정상이나 아니냐로 표병인지 리병인지를 감별하시면 됩니다. 제가 이런 기준을 가지고 임상을 해보니까 너무 쉽고 명료했습니다. 어찌면 옛날 사람들도 이것이 너무 간단하고 쉬운 것이라서 기록을 안한 것 같아요. 표리도 간단하게 감별이 되죠.

표리도 타고 나는 것 같아요. 소양인 한증이라고 하면, 맨날 설사를 하는 사람이 있어요. 변이 단단한 적이 없고, 힘이 없고, 얼굴이 창백하고, 아주 마르고 약하고, 거의 보통 한의원가면 소음인으로 보지요. 그래서 향사양위탕 같은 거 쓰겠죠. 그런데 소음인이라고 하더라도 향사양위탕이 안 들어요. 왜 그렇냐면 향사양위탕은 표증약이에요. 그래서 비염에 향사양위탕을 써야 돼요. 천궁, 소엽을 가미해서요. 열증이라면 보중익기탕에 천궁, 소엽을 가미해서 써야 되구요. 대단히 신속하게 좋아집니다. 보통 한달 정도 하면 됩니다. 물론 수일 내로 좋아는 집니다. 태음인 같은 경우는 마황이 들어가서 그런지 첫날부터 좋아지는 사람이 많고, 늦

어도 3일이면 좋아집니다. 평균적으로 2일이면 좋아집니다. 소음인이면 반응이 좀 느립니다. 3~4일 정도 걸립니다. 그전에 피로감이 덜하고 두통이 없어지면서 증상이 좋아지기 시작하죠. 약 쓰는 것은 너무 쉽죠. 체질감별이 문제고, 한열감별이 문제죠. 병의 위치 따지는 것도 너무 쉽죠. 설사를 많이 하고, 형방지황탕을 써야할 사람은 항상 표증인 거죠. 표한으로 인해서 설사를 하는 거죠. 표한을 제거함으로써 설사를 멎는 거예요. 다르게 보면, 陰虛泄이거든요, 補陰해서 음허가 제거되기 때문에 설사가 낫는다고 보셔도 됩니다. 물론 형방지황탕이 설사약으로 쓰는 약은 아니죠. 피부에 증상이 있으면 표병이니까 패독산이죠. 무슨 말이나면 땀을 날려보내면 나을 병이라는 거죠. 리병이면 사백산에 생지황 석고를 가지고 胃熱을 사해야죠. 그리고 변이 묽고 피부에 문제가 있고 그러면, 표병도 있고 리병도 있는 경우죠. 이런 경우에는 형방지황탕이죠. 형방지황탕은 표리를 겸치하는 약입니다. 그러니까 소음인 같으면 곽향정기산처럼 표리를 雙解하는 약입니다. 소양인 중에 한증이고 맨날 설사하고 배 잘 아프고 이런 사람들 있잖아요, 그런 사람은 항상 리병을 가지고 있는 사람입니다. 태생적이라는 거예요. 형방지황탕 쓸 사람은 항상 형방지황탕 쓸 일이 있는 거죠. 이런 사람이 오한발열두통신통이 있으면 초기에 패독산 쓰는 거예요. 좀 지나면, 형방지황탕으로 가고 그러는 거예요. 그런 사람은 감기에 걸리면 거의 설사를 해요. 표한으로 인한 설사죠. 외감이 겹치면 음허가 더 심해져요. 그래서 설사가 더 심해져요. 배가 더 차가워지고, 추위를 더 타고. 추위는 소양인 한증 중에 형방지황탕 쓸 사람들이 제일 추위를 많이 타요. 수족도 냉하고, 얼음처럼 차요. 다른 한의원가면 소음인으로 오인받는 사람들이예요. 음허를 보충해줘야 배가 따뜻해지고, 뭔가 해결의 실마리를 갖게 되는데, 소음인이라고 했으니 인삼 황기 이런 것을 썼겠죠. 그러면 열의 편차가 더 심해져가지고, 몸이 망가졌겠죠.

* 형방지황탕이 표병과 리병을 겸치한다는 것은, 음~ 겸치, 좋은 말이다, 한번 생각해보자, 겸치. 그것으로 끝나야 되요. 설명을 갖다 붙일수록 왜곡이 되요. 그러니까 패독산은 표약입니다. 피부병에도 쓰죠. 후세방에서 淸肌散 이런 것도 패독산에 가미한 거잖아요? 핵심이 뭐냐면요, 밥맛이 정상이고 위장병이 없는 사람에게 듣는 거예요. 패독산에 선태니 뭐니 가미하는 것이 많잖아요? 옛날에 학교 다닐 때 배웠잖아요? 패독산 加 어찌구.. 국시에도 나왔잖아요? 그런데 가장 중요한 것은 뭐냐면, 위장에 아무런 문제가 없을 때 그 약을 써야지 너무나 잘 낫는다는 거지요. 피부병의 문제는 解肌만 시키면 된다는 뜻이고, 발산만 시키면 듣는다는 뜻이죠. 예를 들면, 매일 배에 가스가 차고 변비가 있다, 이러면 100% 안 듣습니다. 여러분들이 어린이들 피부병, 아토피에 후세방을 쓰시더라도, 대변이 정상이고, 잘 먹는 아이 같은 경우는 패독산 같이 표약을 쓰시면 될 것이고,

변비가 있고 맨날 배가 아프고 그런 아이라면, 패독산을 써도 안 듣는다는 얘깁니다. 표약을 쓰면 안 된다는 겁니다. 이것이 가장 중요합니다. 감기에 걸리면 첫날부터 입맛이 딱 떨어지는 사람이 있어요. 그러면 패독산 쓰면 무조건 안 듣습니다. 脾에 영향을 준 거예요. 이런 사람은 사백산 같은 석고 들어가는 것을 써가지고 胃熱을 제거해 줘야돼요.

* 표리에 대한 논의에서...

- 외감병에 있어서 표증이면 오한 발열 신통이 있고 음식여고하면 표병입니다. 소양인 같으면 패독산 태음인 한증이면 마황발표탕을 쓰면됩니다. 그리고 치료시기를 노치거나 시간이 경과해서 병사가 양명리부로 진입하게 되면 밥맛을 잃게 되고 리병이 되는 것입니다. 이때 소양인 같으면 양명리부의 열을 사하는 지황백호탕이 쓰이게 됩니다.==>신평하게 잘 듣습니다.

- 만약 오한 발열 신통 단계에서 지황백호탕을 쓰게 되면 중기의 하함으로 외감병이 오히려 더 오래갑니다.(표병이고 양명리부로 진입하기 전에 위열을 사하는 약을 썼기 때문에 이것은 오치입니다.==>반듯이 땀가가 따릅니다. 1-2일 만에 회복될 감기가 5-6일은 갑니다.)

- 결론적으로 말씀드리면 ...입맛이 있고 없고로 표병이나 리병이나를 따지는 것은 외감급증에서의 이야기입니다. 상기의 비염 피부 동통은 외감급병이 아니고말하자면 내상잡병에 속한다고 말할 수 있습니다.

- 비염은 표병도 리병도 아니고 반표반리병이면서 그 위치는 상부에 속합니다. 피부도 동통성 질환도 대부분 반표반리의 부위에 있는 증들이라고 생각하시면 됩니다. 제가 질문을 잘못 이해 했으면 다시 질문해주세요.

- 물론 위나 장의 병은 양명부의 병이고 리병입니다. 혹시 미진하면 다시 질문 바랍니다.

- 네 그렇다면 다시 질문 드립니다. 선생님께서는 비염은 반표반리 부위에 있는 것이다 라고 하시면서 동시에 내상잡병에 속한다고 말씀하시네요. 그렇다면 표리와 내상 외감은 어찌 차이가 나는 건지요? 지금까지는 내상병이라면 표병이 아닌 리병으로 생각해왔는데.. 그게 아니고 내상병도 표리로 나뉘지는 건지요? 외감병에도 표리로 나뉘진다? 내상 외감과 표리가 뒤섞인듯해서 헷갈립니다.

- 비염은 외감에서 출발한 잡병이고 외감이 대미지(damage)를 입히고 난 뒤의 잔재들입니다. 그래서 급증이 아니고 외감병도 아닙니다. 다만 외감이 남긴 잔재들입니다. 외감이란 전쟁중인 것을 말합니다. 성벽에서 성을 넘으려는 외적과 성을 지키려는 정기 사이의 전쟁입니다. ==>이 상태는 외감이고 급병입니다. 그러나 전쟁에서 성은 무너지고 벽돌이 깨져서 나뒹굴고 있다면 이것은 전쟁상태가 아니죠. 전쟁으로 인한 폐허이고 이것을 복구하는 것은 급한 문제는 아니죠. 성벽을 복구하는 데는 시간도 많이 걸리고 전쟁상태에 비하면 급한 것은 아니죠. ==>완병. 동무 이제마도 무인이었고 정사가 싸우는 전쟁에 비유한 대목이 많이 있습니다

- 외감으로 밥맛을 잃은 경우==>리증 .
음식이나 칠정으로 인한 비위의 손상==>리증. 리증이 외감에서도 생기고 내상에 의해서도 생깁니다. 리증이라고 반드시 내상이라고 생각하면 안 됩니다.
외감으로 인해서 오는 리증과 내상으로 오는 리증이 있다고 알아두시면 좋겠습니다.

* 한증 열증

- 소양인의 한열은 대변으로 구별한다. 대변을 하루 내지는 이틀에 한번 보면 열증이고, 하루에 수회를 보면 한증이다. 하지만 예외가 있으므로 이것으로 일반화 시키기는 곤란하다.

- 한증은 위액이 부족한 것으로서, 가스가 많이 생기는 증상을 보이고(독활지황탕증), 열증은 소화기에 이상이 생기면 속이 쓰리거나 통증을 느끼는 증상이 나타난다(형방사백산증?).

- 과식하면 배에 가스차면 한증이고 안 차면 열증이다. 과식하면 배가 부풀어와서, 많이 먹고 싶어도 먹지 못하면 한증이다. 혹은 많이 먹고 아침에 일어났을 때 더부룩하면 한증이다.

- 대변에서 며칠에 한번 보면 열증경향, 하루에 몇 번 보면 한증경향, 단단하면 열증경향, 무르면 한증경향이다.

- 소변에서 소태가 있으면 열증경향이다.

= 소양인의 한열구분은 복부에 가스가 차는지의 여부이다. 변비 소화 설사로는 확실하지 않다.

- 배가 더부룩한 것이 가스차는 증상이다. 한증이다.

= 장의 상태로 한열을 가리는 것이 아니다. 위의 상태로 가린다. 가스가 많이 차

서 뽕뽕하고 더부룩한 한증의 증상은 상복부로서 위장의 증상이지 대장의 증상이 아니다. 한증이 오히려 변비가 더 많으므로 설사가 많으면 한증, 변비가 많으면 열증이라 말할 수 없다.

- 한증의 사람이 양격산화당을 먹으면 설사와 무기력해지는 기능저하증상이 생긴다. 반면, 열증인 사람이 신한복통설사에 쓰이는 형방지황탕을 먹으면 변비 때문에 곤란을 겪게 된다. 한열을 반대로 쓰면 기능저하와 기능항진의 문제가 생긴다.

- 태음인의 한열이 틀리면 체질이 틀린 이상으로 심각한 부작용이 생긴다.

- 소양인 배에 가스 안 차면(배가 더부룩하거나 뽕뽕하지 않으면) 심한 위장병도 열증이다. 가스 차는지의 여부가 한열판단의 핵심이다. 소양인이 아무리 위장이 약해도 가스가 차지 않으면 열증이다. 이를 확실하게 알아야 한다.

- 가스 차지 않으면서 방구가 많이 나온다면 이도 열증이다. 가스차는 것은 한증 소양인의 소증이다.

- 가스 차는 것을 제대로 표현하지 못할 때의 한열구분

태음인 비슷하면 한증이고 태양인의 특성이 있으면 열증이다. 즉 태음인처럼 둔부에 살집이 많으면 한증이고, 중대둔근의 발달이 미약하면 열증이 되는 것이다. 80%이상 맞는다.

*** 소양인 열증의 환자에게 숙지황, 산수유를 쓸 수 있냐는 물음에 대하여**

==> 소증이 열이라도 현증이 한이면 한을 제거해야 합니다. 그래서 열증환자에게도 숙지황 산수유를 쓰는 경우가 있습니다. 그래야만 병증이 제거됩니다.

태음인도 마찬가지입니다. 열증도 현증에서 한이 보이면 마황 의이인 등을 가합니다. 그래서 8상의학이 아니고 4상의학입니다. 한열은 자유롭게 넘나드는 것이어서 4개의 바운더리에서 논해야 됩니다.

<<소양인 처방 요약>>

표 한	형방폐독산: 강활 독활 시호 전호 형개 방풍 적복령 생지황 지골피 차전자 각 한돈. - 완전히 표로 가는 것(오한발열), 상초 외감과 관련 있음. 裏없는 피부병이나 비염에는 인동 연교 박하 우방자 금은화를 가미한다. 피부병으로서 속에 문제가 있으면 형방지황탕(혹은 형방사백산 독활지황탕)에 위의 본초를 가미한다. 폐로 가므로 부종은 다스리지 못한다. 감기몸살, 피부병, 위염에도 응용을 하는데, 전제조건은 밥 잘 먹고 입맛의 변화가 없고 위장병의 변화가 없어야 한다는 것이다. 병이 裏로 전변되지 않고 표에 있다는 말이다. 裏로 전변된 경우에는 형방지황탕을 쓴다. 열증에는 석고가 들어가야 한다. 적복령을 한돈 쓰면 상초, 두돈 쓰면 하초로 작용한다. - 초기 기침까지 쓴다. 오한발열 신통이 있을 경우에... - 적복령 차전자는 표열을 소변으로 신속하게 빼는 것이다. - 소양인 신경통에 강활 독활 형개 방풍도 쓰이지만 사실은 지골피가 반드시 들어가야 한다.
	형방도적산: 생지황3돈 목통2돈 현삼 과루인 한돈반, 전호 강활 독활 형개 방풍 각 한돈. - 한증약으로 되어 있으나 한열에 다 쓴다. 열증에 쓸 때는 석고를 한돈 넣는다. 천식에 응용가능. 목통 두돈으로 심열을 빼고 과루인 전호는 기관지에 현삼은 인후에 작용한다. 형방지황탕에서 산수유 빼고 전호 과루인 넣고 생지황 넣었는데도 안 되는 기침, 숨까지 차고 천식기가 있는 기침은 도적산을 넣어야 해결된다. 열증이면 석고를 넣고 한증이면 원방대로 쓴다. 천식에 꼭 들어가야 하는 것은 전호와 과루인, 현삼 이 세가지다. 생지황 목통은 기관지의 물을 빼는 작용을 한다.
	형방지황탕: 숙지황 산수유 복령 택사 각 두돈, 차전자 강활 독활 형개 방풍 각 한돈. - (소음인의 곽향정기산, 태음인의 태음조위탕과 같이) 표병과 리병을 겸치한다. 숙지황 산수유(2전)은 裏寒에 쓰고, 복령 택사(2전)은 보신한다. 음허설에 쓰는 약. 변이 묽고 설사가 잦은 사람에게 쓰는 것이다. 쓰다보면 변비가 될 수 있다. 숙지황 산수유가 장의 진액을 점점 말리기 때문이다. 보신을 목적으로할 때는 원래 두돈인 숙지황을 세돈으로 올리고 지모 황백을 더 넣는다. 열이 뜨면 생지황 한돈을 넣을 수 있다. 감기가 매일 걸린다고 하면 생지황을, 허약하고 밥맛이 없고 배가 아프고 위가 나쁘면 식적을 없애주는 목단피를 넣는다. 강활 독활 형개 방풍은 상부와 표에 작용한다. 표로 날려 보내주고 소변으로 빼주니

	한증의 부중에 사용한다(피부가 열리지 않아서 붓는 것. 심장성부중에 목통 두돈을 가함. 심장병에 목통 넣고 치료하면 불면 심계, 부종 등을 치료한다). - <u>혈증이 있으면 가 현삼 목단피</u> 하여 자궁병이나 불임 등에 쓴다. - <u>심장병에는 목통 황련 치자 등을 가해서 사용. 변비 오면 인동 연교</u> 가함(생지황 석고를 쓰면 절대 안 됨). 보통은 한돈 심하면 두돈까지. 요컨대 표부터 리까지, 두부터 자궁까지 온갖 잡병에 응용가능하다. - 위장이 좋으면 숙지황을 두돈에서 한돈으로 줄인다. 위장이 약하고 설사하면 두돈 그대로 사용함. - 기침을 할 경우에는 전호 과루인을 넣고 외감과 관련된 생지황을 넣는다. 이때 하초로 귀경하는 산수유를 빼는 것이 포인트. 전호,과루인은 가래의 양상에 따라 양을 조절한다. 형방도적산(?)에 폐열을 사하는 현삼을 가미하는 것도 아주 좋은 방법이다. 전호 과루인 현삼이 해수의 주요 군약이다. 폐독산보다 더 많이 쓰인다. 활석고삼탕: 택사 복령 활석 고삼 각 두돈, 천황련 황백 강활 독활 형개 방풍 각 한돈 형방지황탕의 급증에 사용. 신한복통설사. 완병에는 형방지황탕. 저령차전자탕: 택사 두돈, 복령 저령 각 한돈반, 차전자 지모 석고 강활 독활 형개 방풍 각 한돈. 형방지황탕보다 저령 차전자가 강화(1-->1.5전). 급성부중에 사용. 급증 외감 열성설사에 쓴다. 신열 두통 설사에 급증에는 저령차전자탕, 완증에는 형방사백산. 저령 차전자는 표열을 급하게 끄기 위해서 들어간 것이지 소변을 내보내기위해 쓴 것이 아니다. 형방사백산: 생지황 세돈, 복령 택사 각 두돈, 지모 석고 강활 독활 형개 방풍 각 한돈. - 열증의 표병과 리병을 겸치한다. 자궁 이상으로 갱년기처럼 상초증상이 있는 경우에는 인동 연교 목통 치자 황련을 가해서 쓴다. 목통이 하초의 습열을 빼준다(질 건조증과 번조감있는 여성). 두돈까지 쓴다. 자궁어혈성 통증, 덩어리 등의 열증에 현삼 목단피 3분-5분씩 가해서 쓴다(한증일 경우에는 방지황탕에 쓴다). 목단피를 한돈 쓰면 열증이므로 변비가 된다. 감기가 속으로 들어가서 입맛이 없다. - 사백산 증에 다리 허리가 아플 때나 좌골신경통에도 지골피 한돈, 우슬 반돈 加 - 열증인데 기관지 간질간질하고 가래 없으면 과루인 넣고, 물가래 있으면 전호까지 가미한다. 비염에도 전호 정도만.... - 인후통이 있으면 현삼 형개(두돈) 넣는다. 열 제거하는 인동 연교 박하
--	--

	치자까지 넣으면 양격산화탕의 의미가 된다. 육미지황탕- 강활 독활 형개 방풍이 없으므로 표와 상부에는 쓰지 못한다 독활지황탕- 숙지황4돈 산수유2돈 복령 택사 한돈반, 목단피 독활 방풍 각한돈 - 독활 방풍만 있고 복령 택사도 1.5돈만 있어서 중초에 작용. 숙지황 산수유는 위산분비자극. 소양인 위장병. 배에 가스차고 방귀가 많이 나온다. 비위음허증. 소화불량도 아니고 잘 먹고 과식하고 나면 속이 안 좋고 금방 배고프기도 하고, 위가 양적으로 항진된 것이다. 숙지황 산수유가 비위음허를 도와 기능항진을 막아줘야 한다. 독활지황탕 쓸 사람은 코가 잘 말라서 코딱지지가 잘 생긴다. 이때 목단피가 쓰인다. 비위에도 쓰지만 이때도 좋다. 코속이 축축해져서 마르는게 없어진다. - 독활지황탕을 원방만 써서 병이 좋아지는 경우는 거의 없는듯 하다. - 요슬질환에는 독활지황탕가 강활 지골피/ 어혈이 의심되면 우슬도 넣을 수 있다. - 변비(한증이면서 이상발효, 두통)에는 독활지황탕가 인동 연교 각두돈, 독활지황탕만 써도 좋다.
한	숙지황고삼탕- 숙지황4돈 산수유2돈 백복령 한돈반, 택사 지모 황백 고삼 각한돈 - 상소. 소변이 쌀 뜨물처럼 나올 때. 고삼의 청열거습작용을 이용한다. 소양인의 만성적 고질적 피부병에 꼭 써야한다. 혈중의 습을 없앤다. 골반내부의 장기질환에 잘 듣는다. 냉 대하, 방광염, 소양인 남자의 낭습증, 여성의 백음백탁 등... 십이미지황탕- 혈증이나 전립선비대증의 노인성질환에 사용한다. 육미보다는 보허하는 작용이 강함
리	
	양격산화탕- 생지황 인동등 연교 각 두돈, 산치자 박하 지모 석고 방풍 형개 각한돈. - 형개 방풍만 있다. 따라서 상초에 작용. 頭나 咽喉등의 질환을 치한다. - 갱년기증후군이나 상열감 등에 사용. 냉대하나 질염이 있는 갱년기증후군에는 복령 택사 목통을 가해서 하초로 가게하고 습열을 제거하게 한다. - 복령 택사 5분 가하면 약효가 옆구리까지 내려오고 이때 시호를 가하면 대상포진등으로 옆구리의 발열종창이나 협통이 심할 때까지 응용가능하다. - 열증이면서 입안 혈고 붓고 하는 구내염일 경우에는 생지황 치자 박하 심하면 황련까지 넣을 수 있다. 인동등지골피탕- 중소 지황백호탕- 독활 방풍--> 중초에 작용. 석고 생지황-> 열을 꺼뜨림. 소양인 변비에 절대 안 듣는다. 양독백호탕. 양독발반시. 석고 생지황-> 변비/ 형개 방풍 우방자-->피부병.
열	

--	--	--

형방지황탕과 독활지황탕의 구분에 대해

먼저 알아야 할것은 형방지황탕은 陰虛泄에 쓰이고 있다는 사실입니다. 즉 소양인의 설사는 음허가 원인이고 소음인의 설사는 양허가 원인입니다. 설사의 원인이 음허이고 보음하는 숙지황 산수유로 그 설사를 막았다는 위대한 사실을 이해하고 가야겠습니다. 숙지황 산수유로 설사를 치료했다.==>너무나 충격적 사실이고 음허설을 보음해서 치료하는 동무공의 위대함을 엿볼 수 있는 대목입니다. 숙지황 산수유 복령 택사가 보음해서 우선 설사를 다스렸고 그후 장복해서 보음했습니다. 수세보원에 수백첩을 먹어서 음허를 막으라는 대목이 나오니다. 08.02.29 17:59

[답글](#)

안준철

차전자가 들어가는 처방은 모두 외감과 관련이 있습니다.(패독산 형방지황탕 저령차전자탕) 그리고 설사와도 관련이 있습니다. 止咳작용도 있습니다. 강활 독활 형계 방풍은 외감과 관련될 뿐만 아니라 음허를 다스립니다. 대보방광진음하고 표음을 강기시킵니다. 즉 표리를 동시에 다스리고 보음하고 설사를 다스리고 외사의 문제를 정리해 줍니다. 절묘한 처방입니다.08.02.29 18:07

[답글](#)

안준철

독활지황탕은 식체비만을 다스리는 약입니다. 즉 양명경의 처방이고 리병약입니다. 외감과 무관하고 비위의 음허를 숙지황 산수유의 보음하는 효과를 방풍 독활로 중초로 인정하는 처방이 되겠습니다. 형방지황탕은 외감과 관련되고 표리를 동시에 다스리지만 독활지황탕은 외감과 무관하고 리증을 다스리는데 그 주증을 식체비만이라 했습니다.08.02.29 18:13

[답글](#)

 안준철

그렇다면 우리가 일반적으로 한의원에 특별한 주소증이 없이 피로회복이나 보약을 달라고 환자가 왔을 경우....음허설이나 외감과는 무관해 집니다. 독활지황탕으로 중기를 회복시켜야 됩니다. 후세방 보중익기탕의 의미입니다. 즉 중기하함을 다스리는것이 피로회복이나 보약의 관건이 되겠습니다. 그렇나 보약을 쓸 경우에도 과민성 대장증후군이 있다거나 변이 묽고 장이 무력하다면 이건 형방지황탕으로 보음을 해줘야 해결됩니다. 하초 즉 대장부위에는 형방지황탕이 작용하고 비위의 중기에는 독활지황탕이 우선합니다. 08.02.29 18:21

3. 소양인 약물의 가감 및 질환별 처방운용

대강

- 소양인은 열대사가 가장 중요하다. 어떻게 열을 빼줄 것인가가 관건. 表의 열을 소변으로 빼고 裏의 열은 대변으로 뺀다.
- 소양인은 裏熱이 피부를 덥혀야 한다. 이 작용을 하는 것이 강활 독활 형개 방풍. 표의 寒邪를 소변으로 빼는 것이다. 강활 독활 형개 방풍 모두 이노작용이 있다. 더욱 신속히 표의 한사를 제거하기 위해 소변으로 나가게 하는 것이 적복령 차전자 생지황 등이다. 독활은 이노작용이 그리 강하지 않은 것으로 보임. 목통대안탕에는 독활이 없다.
- 열 소양인이 추위를 많이 타는 경우에는 인동 연교 박하 치자 이런 약들을 써야 추위가 몰아내진다. 소양인이 寒에 상했을 때 비위의 寒을 몰아내는 약은 목단피이다. 1돈-7푼으로 가미해서 3일에서 5일 쓴다. 즉시 설사가 변비로 된다. 만약 이때에 건강 양강을 쓰면 속이 따뜻해지는 거 같다가 더 나빠진다. 소양인에게는 목단피가 따뜻한 약이다. 식적을 없애는 작용을 한다(독활지황탕)
- 소양인의 표열은 소변으로 해결하고(저령 차전자), 리열은 대변으로 해결한다(석고 생지황)
- 소양인은 陰虛나 火熱을 치료하는 약물을 쓴다. 숙지황 산수유 석고..... 산수유는 소화제로서 위장약이다. 위액이 증가되고 장액이 줄어들고 변이 묽고 소화가 안 될 때 쓰는 약이다. 숙지황 산수유가 들어가면 위액은 증가되고 장액이 말라 버린다. 그 다음에 생지황 석고를 쓰면 위액이 줄고 장액이 늘어난다. 그래서 변비나 소화기능이 항진되었을 때 쓴다.
- 여자분들 같은 경우에 보약을 지으러왔다 그러면요, 남자분들 같은 경우는 비위를 좋게 해줘야 되거든요? 비위가 남자들에게 제일 중요하거든요. 피로해도 비위를 다치고, 스트레스를 받아도 비위를 다치고 과식을 해도 비위를 다치니까 그것을 회복시켜주는 것이 중요하고, 여자분들 같은 경우는 **자궁**을 좋게 해줘야 되요. 현삼하고 목단피가 들어가 줘야 됩니다. 현삼 목단피를 이때도 3푼 정도 써줘야 되요. 옛날에는 5푼 정도 썼는데, 5푼을 쓰니까 1제를 다 먹기 전에 변비가 와서 못 먹겠다고 그러더라고요. **열증에는 사백산에다가 현삼 목단피를 3푼 정도 넣어서 쓰면 됩니다.** 목단피가 남자한테는 식적, 여자한테는 어혈, 이렇게 기본적으로 생각하시면 되요. 물론 둘다 식적에도 쓰고 어혈에도 쓸 수 있지요. 그게 목단피가 간약이고 어혈약이죠. 간의 어혈을 제거한다 이렇게 생각하셔도 됩니다. 자궁같은 경우에 생리가 제대로 안나온다. 색깔이 검다, 덩어리가 진다는 경우에도, 이 정도만 써도 거의 다 해결됩니다.

- 소양인의 모든 약은 補陰하는 약이고 瀉陽하는 약이다. 보음하는 약은 한증약이고, 瀉陽하는 약은 열증약이다.

가감

- 석고 치자를 빼야 표로 작용한다. 위열이나 심열이 있을 때 이를 없애기 위해 석고 치자를 넣어 쓴다. 기침은 외감이고 이는 表이므로 석고 치자를 뺀다.

- 목통은 열증은 두돈, 한증은 한돈

- 비위의 寒을 제거해주는 약이 목단피거든요. 저는 목단피를 3푼까지도 넣을 수 있어요. 1돈까지 넣으면 변비가 되구요. 목단피가 그만큼, 소음인으로 보면은 건강이나 양강처럼 뜨거워요.

- 복령 택사를 패독산에는 1돈, 독활지황탕에는 1돈 반, 하초로 가는 사백산이나 형방지황탕에는 2돈을 써야되요. 1돈, 1돈 반, 2돈 이렇게 써야되요. 패독산, 독활지황, 형방지황 이렇게 다른 겁니다. 형방지황탕이 음허설에 쓰는 거잖아요. 보신을 해서 설사를 멈추기 때문에 복령 택사가 2돈씩 들어가야 됩니다. 설사를 할 때는 복령 택사를 2돈 쓰는 것이 핵심이구요, 감기에 쓸 때는 산수유를 빼는 것이 keypoint입니다. 산수유를 쓰면 절대로 안 낫습니다. 산수유는 무릎으로 가는 약입니다. 허리보다도 더 밑인 무릎으로 갑니다. 그래서 요슬산통 이런 데에 쓰는 겁니다.

- 산수유를 빼고, 복령 택사는 1돈으로 감하고, 전호 파루인을 넣어주고, 외감에는 또 생지황이 들어가야 되거든요, 생지황이 기관지 같은 데에 외감약에 넣거든요, 패독산에도 생지황이 들어가고, 사백산에도 들어가고, 생지황이 안 들어가면 외감과 관련된 질환들은 잘 못 고칩니다. 방풍, 독활 들어가는 것은 무조건 중초로 들어가요, 독활지황탕이 그렇구요, 지황백호탕이 그래요. 비위의 열을 신속히 사해주기 때문에 인경약으로 방풍, 독활을 쓰는 거예요. 진짜 상초로 가야되는 양격산화탕 같은 경우에는 형개 방풍만 씁니다. 강활 독활 같은 것은 관절염이 있고 이런 데에도 조금 작용이 되거든요, 그러니까 진짜 상초에 써야 되는 경우에는 형개 방풍만 씁니다. 그리고 형개 방풍은 열증약이고, 강활 독활은 한증약입니다. 이것도 아셔야 합니다.

- 사실은 補腎하는 데에는 육미지황탕보다 형방지황탕이 훨씬 빠릅니다. 表寒을 제거하면서 腎을 보하는 거예요. 그 때는 **숙지황**을 1돈 더 넣어야 해요. 3돈을 쓰거나 4돈을 써야 돼요. 2돈을 쓰면 표리를 겸치하게 되고, 4돈을 쓰면 하초로 들어가는 거예요. 그리고 **지모 황백**을 쓸 경우도 있고 안 쓰는 경우도 있거든요, 지모 황백을 어떤 때에 쓰는지 진짜 중요합니다.

- 지모 황백 두개가 정기탕이에요. 진액문에 나옵니다. 여러 군데 나오는데, 핵

심은 손발에, 혹은 전신에 땀이 많을 때, 특히 손발에 땀이 많을 때 쓰는 거예요. 손발에 땀이 없고 건조한 사람에게 지모 황백을 쓰면, 오히려 버리는 거예요. 진액을 다스려주는 겁니다.

- 태음인 같은 경우라면 빈맥에 청심연자탕 쓰든지, 조위승청탕에 산약, 백자인을 더 넣어서 쓰라고 했지요? 이래도 안 나으면 수술해야 된다고 했지요? 소양인이라면, 빈맥, 협심증에 황련 치자를 써야 합니다. 목통을 꼭 가미해야 합니다. 도적산의 의미입니다. 목통을 열증은 2돈쓰고 한증은 1돈 쓰거든요, 한증은 형방지황탕에다가 쓰고, 열증은 사백산에다가 씁니다. 그러니까 한증이면, 형방지황탕에 황련 치자 목통1돈을 쓰시면 되구요, 열증이면 사백산에 목통2돈, 황련1돈 치자1돈을 쓰시면 됩니다. 그리고 수족의 땀 상태를 봐서 지모 황백을 써야합니다.

- 황련은 약효가 광범위하고 실제로 염증을 없애준다. 결막염, 비염, 인후염, 구내염, 위염, 식적, 자궁질환, 피부염.....등에도 쓴다. 염증성질환에는 황련이 없으면 안 된다.

- 소양인은 열을 제거하는 것이 치료

- * 폐열: 인동, 연교
- * 심화: 황련, 치자, 목통(도적산의 의미-소장을 통해서 심화를 사함. 열증은 두돈, 한증은 한돈)
- * 간열: 목단피(간 안에서 열을 꺼줌), 간 밖에서 疏肝시키는 시호. 피부에서 열을 발산시키는 박하.
- * 심장열: 복령, 택사
- * 심신의 복화: 지모, 황백
- * 위열: 석고

- 소양인 관절질환에, 사백산에서 형개(위로 올라간다)를 빼는 것이 핵심. 강활, 독활을 증량시켜서 아래로 내려가도록 한다.

- 사백산이나 형방지황탕에서 관절통 있을 때는 형개를 뺀다. 팔다리 쭈시고 아플 때 형개를 빼는 것이 중요하다. 독활 강활 방풍은 당연히 관절통에 쓰는데 형개는 관절통에 쓰지 않는다. 사백산 쓸 때도 형개를 쓰지 않는다. 관절질환에는 형개를 빼고 방풍을 더 넣어주면 훨씬 빨리 낫는다.

- 계속 업그레이드 중. 목단피를 열증에 5푼 썼는데, 요즘은 3푼을 쓴다.

- 지골피가 형방패독산에 들어가는데 이것도 발산작용이 있다.

- 하지통에 지골피(강의 들은 원장의 말. 안선생의 說일듯)

- 설사 잘 하면 형방지황탕이고 잘 चे하면서 소화 안 되면 독활지황탕. 형방지황

탕은 설사인 사람이 먹는 약이므로 변비가 되기 쉽다. 그럴 때 인동 연교를 넣는다.

- 사백산에 독활지황탕의 목단피만 가하면 변비가 되기도 한다.
- 사백산을 피부에 쓸 때는 방풍 한 돈을 더 넣어서 쓰고 고삼도 가미한다.
- 인경약을 쓰면 병위가 달라지는데 사백산에 과루인을 쓰면 기관지로 가고 아래에 좋고 목단피를 쓰면 비위로 간다. 갈근해기탕도 나복자 들어가면 열다한소탕이 되어 나복자 하나 때문에 裏로 가는 것이다.
- 강활 독활 형개 방풍이 있는 상태에서 기침에 쓸 때는 형개를 한 돈 더 넣는다. 목구멍이 아프면 현삼.
- 현삼이 목에 작용을 한다. 목에 작용할 때는 형개와 현삼을 쓴다. 한돈을 가한다. 형방사백산 등을 쓸 때 무릎이 아프거나 할 때 형개를 빼야 한다. 위로 작용하기 때문이다. 강활 독활 방풍을 다 관절질환에 쓰지만 형개는 안 된다.
- 형방도적산은 심화를 내리는 약이다. 목통 2돈으로 심장의 화를 내리고 과루인 전호는 기관지에 작용한다.
- 형개 방풍은 열증약이고, 강활 독활은 한증약이다. 따라서 열을 제거하려면 형개 방풍을 더 넣어야 한다.

- 소양인 같으면 독활지황탕을 쓸 것이고, 열증같으면, 사백산에다가 황련, 목단피를 가하는데, 목단피를 3푼이상 쓰면 안되요. 급증에는 1돈까지 쓰기도 하는데, 3푼을 써야되요. 황련은 1돈. 열증이니까 열증약은 1돈 써도 되고, 한증약은 많이 쓰면 5푼, 3푼이하로 써야되요. 많이 쓰면 바로 변비가 와요. 1제를 다 못 먹어서 변비가 와요. 목단피가 비위를 온보하는 약이거든요, 그래서 열이 너무 많이 생기기 때문에 변이 굳어져서 문제가 발생된다는 거죠.

- 생지황의 용도: 외감성질환, 어혈, 청열
- 소양인의 어혈약: 생지황 우슬 목단피 현삼/ 시호
- 고삼은 피부병에도 들고, 청열하고 조습하고, 진통한다(활석고삼탕). 피부병, 복통, 가려움증, 중기 복막염 등에 광범하게 활용한다.
- 차전자는 補腎, 利濕, 표열제거, 해수 등에 작용한다.
- 구기자는 온성, 변이 굳지 않다는 것을 확인하고 쓴다.
- 치자 황련 관련해서; 상부의 질환에는 한돈 이상 쓰지 않는다. 위장병이면 1.5-2돈까지 사용합니다. 대상포진 같은 극심한 통증에는 고삼이 핵심이다.

소양인 약리

心火 : 黃蓮, 梔子, 木通

후세방 導赤散의 의미

熱症에는 形防瀉白散에 2돈, 寒症에는 荊防地黃湯에 1돈.
빈맥, 불면, 고혈압, 당뇨, 관상동맥질환, 갑상선기능항진, 불안, 심계, 정충.

荊防導赤散

喘息(結胸). 木通 2돈 들어가 있다. 前胡, 瓜蒌仁, 玄蔘 등.

물가래는 前胡 1돈반, 瓜蒌仁 5푼, 완담에는 前胡 5푼, 瓜蒌仁 1돈반.

前胡는 下行하며 喘息에 꼭 써야 한다.

上氣되어 생기는 喘息에 肺의 肅降之氣를 도와 치료.

玄蔘은 補陰과 引火歸元.

太陰인의 물가래는 桑白皮, 딱딱한 가래는 杏仁.

木通은 胸中 水毒. 荊防導赤散의 핵심.

茯苓, 澤瀉가 안들어가는 이유는 腎과 관련 없기 때문.

심장비대에 黃蓮, 梔子로 흥분 가라앉히면서 木通 쓰면 작아진다.

기관지의 물기를 없애준다. 감기보다 깊은 천식에도 잘 듣는다.

외모로 보아 등이 불룩하면 形防瀉白散, 가슴이 불룩하면 도적산.

한열에 다 쓰나, 熱症은 石膏를 추가하고, 寒症은 원방대로.

黃蓮은 心火를 직접 내리고, 木通은 소장을 통해서 방광으로, 梔子は 몸전체로 작용. 高血壓, 糖尿患者도 黃蓮 혹은 黃蓮+ 梔子만加해도 안정된다.

少陽人 심근염 : 形防瀉白散 + 木通(寒症 1돈, 熱症 2돈) + 梔子, 黃蓮

肝火 : 牡丹皮, 柴胡, 薄荷.

熱症에는 3푼 이하. 寒症에는 1돈.

간속에서 직접 肝火 제거는 牡丹皮.

간과 간밖 소통으로 열 제거는 柴胡,

피부를 열어서 肝火를 사하는 것은 薄荷.

腎火 : 知母, 黃柏(正氣湯) - 반드시 땀 있을때 (手足有汗)

少陰人 補中益氣湯에서 人蔘, 黃芪 쓰는 경우. (청열, 망양.)

形防瀉白散과 涼膈散火湯의 知母는 有汗에 쓴다고 추리할 수 있다.
少陽人 관절염에 黃栢이 가장 중요하다. 羌活, 地骨皮 1돈 이상 가미.

胃火 : 石膏, 生地黃, 黃蓮

胃寒 : 牧丹皮 표리, 상충하초

貧者는 黃蓮, 澤瀉 빼고 富者는 黃蓮, 澤瀉 쓴다?

黃蓮은 少陽人의 녹용. 涼膈散火湯 + 黃蓮으로 결막염도 치료.

속쓰림, 胃腸병에도 黃蓮. 대개 한열 협착이므로 牧丹皮 3푼 추가.

肺火 : 黃蓮 등 위에서 골라 쓰라고.

荊芥, 防風은 熱症藥, 羌活, 獨活은 寒症藥으로 피부온보. 이중 獨活만 이뇨작용
별로 없다. 茯苓, 澤瀉 1돈=>上焦(荊防地黃湯) 1돈반=>中焦(獨活地黃湯) 2돈=>
下焦(六味地黃湯)

羌活, 獨活, 荊芥, 防風 =>상초. 獨活, 防風=>중초. 안넣으면=>하초.

形防瀉白散에는 茯苓, 澤瀉 2돈 있고 - 하초와 관련.

熱症 관절염으로 形防瀉白散에 羌活, 獨活을 2돈씩 높여쓰는데 변비되는 경
우 있다. 비염에 쓸때 형방 5푼씩 증량하는 이유도 熱症藥이기 때문.

낭습, 슬관절염, 자궁질환. - 羌活, 獨活을 1돈반(大羌活湯의 분량)으로 올려
서 하행.

涼膈散火湯에는 茯苓, 澤瀉 없다 - 하초와 무관. 표 또는 상부의 문제 해결.

형방 있고 강독 없다=> 소변으로 열 제거하는 것이 아니라 피부(땀)로 열
제거.

獨活은 향이뇨작용이 있다해서 부중에는 빼고 쓴다. 목통대안탕.

荊防 大清胸膈散風, 羌獨 大補膀胱眞陰. 형방은 熱症藥, 강독은 寒症藥.

피부로 열발산, 소변으로 표음 내리고.

大補膀胱眞陰은 小便으로 나쁜 거 나가게 한다는 뜻.

진짜 熱症에는 형방만 - 涼膈散火湯, 陽毒白虎湯.

진짜 寒症에는 강독만 - 熱症에는 대변을 굳혀서 변비가 된다.

十二味地黃湯에 荊防만 1돈씩 들어간 것은 上焦의 熱 발산.

拘杞子, 覆盆子, 車前子. 五子중에 세 개 들어갔다.

기본적으로 寒多者에 熱症 동반되었다고 보고. 陰虛午熱. 血症(衄血, 吐

血)

노인이라면 전립선 비대로 인한 小便不利. 환약으로 장복.(黃栢 추가)

六味地黃湯의 枸杞子는 溫性, 補陰. 小便清長에 쓴다.

六味地黃湯이 동의보감에 복통에 쓴다는 구절 있다. 牡丹皮 있으므로 少陽人 복통에. 토사자는 하지부실(주색상). 복분자도 소변과다(노인 전립선 비대나 소변 빈삭)

* 목단피

- 어혈이 확실하면 목단피를 다량으로 쓴다(산후에 두돈까지). 목단피는 식체와 어혈이 가장 대표적인 목표로 된다. 그리고 복화를 사한다. 따라서 속이 편하고 원기가 회복된다. 하초의 문제라면 한돈 반, 중초라면 한돈이 들어간다. 그래서 육미지황탕에 한돈반이 들어간다. 항상 용량이 많을수록 아래로 내려간다. 목단피를 한돈이상 쓸 것이라면 육미지황탕을 쓰는 것이 낫다. 어차피 하초에 작용하기 때문이다.

- 면열에는 황련 치자를 쓰고 심계에는 목통(도적산의 의미. 그런데 목통은 소양인약이 아니라는데.....), 땀이 많거나 소변이 붉으면 지모 황백을 가한다.

- 통증이 있는 소양인으로 비습한 경우에 차전자를 가해도 좋다.

질환별 정리

■ 감기

- 대강: 입맛의 변화가 없는 표증의 경우에는 형방패독산 혹은 형방패독산 가감을 쓰지만, 입맛의 변화가 있는 경우에는 표리를 겸치하는 형방지황탕, 형방사백산을 쓴다. 그리고 기관지 천식의 증상이 주된 증상일 때는 형방도적산가감을 활용한다.

- 겨울이 되면 감기를 달고 지내는데요==> 오한이 있으면 패독산, 오한이 없으면 지황백호탕을 써 보시죠.

- 소양인같으면, 소양인 감기 초기에 패독산 쓰는 것은 다 아시는 애기고, 그 다음에 좀 깊어지면, 형방지황탕에 전호, 과루인 넣고 쓰면 기침에 듣는다고 하잖아요. 죽었다 깨어도 안 듣습니다. 한번 써보세요. 절대로 안 듣습니다. 산수유때문이에요. 산수유는 하행하는 약이기 때문에 약효가 밑으로 가버려요. 산수유는 빼고 써야돼요. 그것이 핵심입니다. 그리고 중요한 것이, 복령 택사를 2돈씩 쓰면 안 돼요, 2돈씩 쓰면腎으로 가버려요, 補腎하는 겁니다. 1돈 반을 쓰면 비위로 가거든요, 1돈을 써야돼요.

- 열증; 형방패독산가 석고(1-2돈). 원래 열증에 쓰고 한증에는 안 쓰는데 석고를 넣는 게 좋다. 기침이 심하고 가래가 많은 경우에는 형방도적산. 소양인인데 가래 끓는지가 3일 됐다. 아직까지 몸이 추시고 아프다 하면 패독산, 그 다음에 소양인인데 열흘이 넘었는데 가래가 많고 기침이 엄청나다 가슴도 답답하다 그러면 도적산 3일치. 소양인으로 감기는 다 나았는데 입맛이 없다 그러면 형방사백산. 위열이므로....

- 소양인 약 가감법

상중초에 따른 가감법			
	상초	중초	하초
약물	복령 택사 한돈	복령 택사 한돈 반	복령 택사 두돈
임상응용	천식: 형방지황탕에서 복령 택사를 한돈으로 줄이고(원래 두돈) 거 산수유(하초로 작용)가 생지황(외감)		육미지황탕 원방

	가 전호 과루인 위장이 나쁘면 숙지황 두돈 그대로 넣고 소화 잘 되면 한돈으로 줄인다.		
약물	강활 독활 형개 방풍	독활 방풍	아무것도 넣지 않음
임상응 용	형방지황탕	독활지황탕	육미지황탕

물가래가 많으면 물을 말릴 목적으로 전호를 더 늘려서 한돈반, 과루인은 오피.
완답, 딱딱한 답일 때는 과루인을 한돈반으로 하고 전호를 오피으로 한다.

한증 감기약

形防敗毒散 원방(寒) + 石膏(熱) 1~2돈.

形防敗毒散의 車前子는 小便으로 表熱 除去. 羌活,獨活,荊芥,防風은 피부로 발산.

形防敗毒散의 地骨皮(骨蒸熱)는 하지불안증에. 止痛 작용 강하며 神經痛에 꼭 쓴다. 후세방의 獨活寄生湯에서 獨活 2돈으로 증량, 나머지는 1돈으로.

石膏 1돈 넣어서 달여 놓았다가 少陽人 熱症 감기나, 컨디션 안 좋을 때 드링크 처럼. 피부 가려움에는 牛蒡子, 金銀花, 忍冬, 連翹 가미. 脾胃문제 있으면 荊防地黃湯에 가미.

荊防地黃湯(寒) + 前胡, 瓜蒌仁 1돈. (김주) + 生地黃(1.外感 2.청열 3.어혈)

山茱萸(요슬)는 빼고. 茯苓과 澤瀉는 1돈으로 감량.

- 감기에 형방패독산은 하루이틀 쓰고 지황백호탕으로 마무리한다.

- 태음인은 오한 발열 신통단계에서 인후통 가래 기침 등으로 까지 병이 진행된 경우까지 한열불문하고 모두 갈근승기탕으로 해결됨. 하지만 소양인의 경우에는 오한이 있을 경우에는 (한열불문하고) 패독산을 먼저 쓰고 오한이 사라지고 나면 한열불문하고 지황백호탕을 쓴다. 오한이 있을 때 지황백호탕을 쓰면 표한이 있는 상태에서 리열을 제거해서 증기의 하함을 가져와 감기가 더 오래 가는 것이다.

*** 소양인 열감기에 지황백호탕. 발열 40도이상. 편도 붓고 목소리 쉬어서 안 나오고....**

■ 해수

1) 열증

양격산화탕 去 석고 치자 ; 하지만 물을 엄청 먹는 기침이나 번갈이 있을 때는 넣는 (석고 치자를) 넣는 것이 효율적

加 전호 과루인(기침), 황련(기관지열 제거), 현삼(인후통),

增 인동 연교 두돈반

소양인 열증 같은 경우에는 양격산화탕을 쓴다. 기침일 경우에는 석고와 치자를 빼고 전호 과루인 황련을 넣고 인동 연교를 2돈반을 쓴다. 석고를 쓰면 胃로 인경을 하기 때문에 빼야 표로 작용을 한다. 치자를 빼야 심장으로 작용을 안 하고 외감에 더 잘 듣는다.

소양인이 감기에 걸려서 며칠 지나서 목이 따갑다면 석고 치자를 빼야 하는데 만약 허번이 있으면 석고를 넣어야 한다. 근데 대부분 허번이 없으므로 석고 치자를 빼는 것이 좋고 전호 과루인을 넣고 심할 때는 목이 많이 따가우므로 인동 연교를 두돈반이나 세돈 넣는다. 하루이틀만에 목 따가운 것이 없어진다. 급증에 이렇게 쓴다.

- 소양인 목 아플 경우에는 형개 현삼을 쓴다. 관절통에는 형개를 쓰지 않는다. 약효가 상부로 인경이 되기 때문이다. 사백산 쓸 때도 형개를 빼야 한다. 빼주는 것이 훨씬 약효가 좋다. 형개를 빼고 방풍을 더 넣어줘서 쓴다(독활 아닌가?). 다른 것은 다 좋아졌는데 관절염이 딱 안 떨어질 때는 형개를 빼고 방풍을 넣어주면 딱 떨어진다고(이 역시 독활인듯...방풍은 위로 작용한다고 했는데....). 기침도 전호와 과루인 한돈 정도가 기본이고 따가우면 인동 연교를 한돈 내지 5푼 더 넣는다.

2) 한증기침- 형방지황탕가감(위에서 정리함)

소양인의 기침은 위의 두 개로 다 된다.

3) 형방도적산 가감방

- 위의 것보다 더 극심한 기침으로서 물가래가 끊임없이 올라오면서 숨이 차고, 숨아 안 차도 물가래가 끊임없이 올라오면 도적산을 쓴다.

식체성해수에 가미독활지황탕. 패독산 합 독활지황탕을 고려하기도..

* 열증의 폐농양

- 양격산화탕은 발산약으로서 補腎할 수 없다. 복령 택사가 補腎한다. 사백산에 가미하는 것이 좋다. 특이증상이 없다 해도 양방에서 오래 치료했으면 항생제로 속을 다 버렸다고 봐야한다.--> 사백산 가 황련 한돈 인동 연교 5푼 목단피 3푼 정도 써보겠습니다(원성연).

* 소양인 한증

- 형방지황탕 가감방, 형방도적산으로도 기침이 낫지 않는 한증의 소양인 아이에게 독활지황탕 가 인동 연교 치자 황련 시호 박하 등을 5푼 정도 가할 것, 변비가 없으면 설사가 날 것으로 미리 말하고 변이 묽으면 3푼 이하로 가미할 것을 지시함. 지황백호탕을 며칠 써보면 기침이 쉽게 해결되기도 한다.

■ 천식

1) 한증- 형방도적산

2) 열증- 형방도적산 가 석고 한 돈

- 도적산이 소양의 대표적인 천식약이다. 형방지황탕에서 산수유 빼고 전호 과루인 넣고 생지황 넣었는데도 안 되는 기침, 숨까지 차고 천식기가 있는 기침은 도적산을 써야 해결된다. 열증이면 석고를 넣고(한돈) 한증이면 원방대로 쓴다. 대단히 잘 낫는다. 천식에 꼭 들어가야 하는 것은 전호 과루인 현삼 이 세가지다. 도적산에 생지황3 목통2 현삼 과루인 한돈반 전호 강활 독활을 넣는다. 생지황 목통은 기관지의 물을 빼는 작용을 한다. 물가래의 정도에 따라 전호 과루인의 양을 조절한다. .

- (형방지황탕?, 형방사백산?)에 폐를 사하는 현삼을 가하는 것도 정말 좋은 방법이다. 폐독산보다 더 많이 쓰인다. 전호 과루인 현삼이 소양인 해수의 주요 군약이다.

- 도적산에 복령 택사가 안 들어간 것은腎과의 관련성이 적기 때문이다.

- 고질적인 경우는 봄 가을로 계속 세재씩 써준다. **가래기침이 나오면 형방지황탕으로 조리한다. 열증이면 사백산을 쓴다.** 목통이 기관지의 물기를 제거하고 과루인 현삼이 허번을 처리하는 도적산은 천식약임을 숙지하라.

- 열증인데 기관지 간질간질하고 가래 없으면 **사백산에 과루인 넣고 물가래 있으면 전호까지 가미한다.**

■ 인후염, 중이염

* 열증

- 형방사백산에 전호 과루인 현삼 형개(인후통에 1돈) 인동 연교 박하를 잘 사용하면 된다.
- 인후통이 있으면 현삼 형개(두돈) 넣는다. 열 제거하는 인동 연교 박하 치자까지 넣으면 양격산화탕의 의미가 된다.

* 한증의 인후염

- 만성적인 인후염이면 독활지황탕에 인동 연교 우방자를 가한다. 설사가 날 수 있다고 사전에 이야기해 두는 것이 필요하다. 급성일 경우에는 양격산화탕을 일시적으로 쓸 수 있다.

* 진주종 치험례(안성생) - 중이염

한증. 40대 여성, 귀에 진물이 흐르는 상태로 내원. 진주종이라 진단. 독활지황탕가 인동 연교 치자 황련 시호 박하 차전자 각 한 돈. 15일 후 진물이 나지 않는다고 함. 요즘은 찬 바람만 쐬면 귀가 아프고 어지럽다 한다. 진물은 없음. 외감과 관련있는 패독산에 가미해서 처방.

■ 비염, 축농증, 인후통

- 대강: 한증으로 보아 형방지황탕을 기본으로 활용하지 않을까 생각된다.
- 소양인의 한증의 비염, 축농증- 형방지황탕가 인동 연교 한돈, 박하 생지황 황련 5푼이면 한증은 이것으로 다 된다(이것은 올드 버전).

☆ 소양인한증의 알리지성 비염, 축농증, 눈병의 통치방(알리지성결막염, 눈병, 콧병...) = 독활지황탕가 인동 연교 각 4그램. 대변이 정상이거나 하루에 두 번 보던 사람은 하루에 3-4번을 보고 설사가 된다. 불가피하므로 사전에 그럴 것이라 이야기해 놓아야 함(최신버전)

◎ 더 최신버전

독활지황탕 가 인동 연교 각 한돈, 황련 치자 시호 박하 각 5푼!!!

- 임상례; 독활지황탕가 인동 연교로 오래된 비염증상 상당히 개선. 하지만 냄새 못 맡는 것이나 아침의 재채기 등은 여전함. 변비도 없고 변도 물러지거나 하지 않음. 기존의 처방에다 황련 치자를 3-5푼 가해보세요.

- 열증의 축농증 비염에는 방풍통성산에 변의 상태나 농의 상태를 보아 인동 연교를 한돈에서 두돈 넣어주고 황련을 줌 넣어도 된다. 이 정도면 인후통도 낮는다. 농이 심하거나 변비가 심하면 인동 연교를 2돈 쓰고 나중에 한돈으로 조리한다(올드버전).

☆ 소양인 열증 비염의 통치방- 형방사백산가 형개 방풍 각6 인동 연교 각4(-8), 박하 치자 시호 황련 각4, 목단피 1. 목단피는 대변이 묽고 위장이 안 좋은 경우에만 1-2g 대변에 이상이 없으면 목단피는 안 넣는 것으로 한다(최신버전). ==> 이제는 사백산을 비염에 쓰지 않습니다(용도폐기된 통치방). 아래의 것으로 변경!!!!

◎ 열증 통치방의 변경- 형방패독산 가 지모 석고 인동 연교 치자 박하 시호를 가한다. 누런 농이 심하면 황련을 가한다(아래 비염에 대한 최신 버전 참고).

형개 방풍을 증량한 것은 사백산의 약력을 상초로 인정한 것.
누런 코에는 황련을 가한다. 코가 막히면 박하증량, 치자는 상초의 열을 내린다.
비위가 약하면 목단피 1-3푼 추가.

- 소양인 비염이 제일 치료하기 어렵습니다. 특히 열증이 더 치료하기 어렵습니다. 왜 그런냐면, 청열약을 쓰는데, 소양인 약은 대부분 열을 제거하는 약이지요. 그 중에 더욱 열을 제거하는 약을 쓰고, 코로 인경하는 약을 써야 되거든요. 참 어려워요. 그래서 코하고 관련되는 청열약을 골라야 됩니다.
- 코안에 피딱지가 생기는 경우는 소양인이 많은 것 같습니다. 독활지황탕을 쓸 사람이 더 많아요. 콧속에 피딱지는 어느 체질에나 생길 수 있습니다.

- 소양인이 콧물이 많을 때는 형개 방풍을 증량한다. 태음인에게 마황, 소음인에게 계지를 증량하는 것처럼....

* 비염에 대한 최신 버전(황기의 약성에 대한 설명과 관련하여...)

소양인 비염의 기본방은 이제 패독산이 되는 건가요?=> 표한을 다스리는 것이 우선인 것 같습니다. 그리고 리열을 사하는 지황백호탕을 응용하면 됩니다. 치자 박하 황련 연교 등도 증에 맞게 써야 합니다.

* 비염에 대한 추가논의

어제 코비한의원 강의를 정리하다가 의문이 생겨서 질문드립니다.

소양인의 감기에서 형방패독산과 지황백호탕 합방에 형개연교탕의 소양인 약물을 추가하는 처방을 가르쳐주셨는데요, 이 처방을 일시적인 감기증상에 대응해서 쓰라는 이야기셨는지, 아니면 일반 비염 환자도 이 처방으로 쓰니까 더 좋더라는 이야기셨는지 좀 애매하네요. ^^;

소양인 열증인 경우 형방패독산, 한증인 경우 독활지황탕을 쓰면서 비슷한 맥락으로 가미를 해서 쓰라는 말씀이신지, 아니면 소양인 열증인 경우 패독산과 지황백호탕 합방해서 지모를 두 돈 쓰고, 한증이 경우 지모 한 돈으로 해서 쓰라는 말씀이신지 확인 좀 부탁드립니다.

(안)소양인의 감기에 오한이 있으면 패독산이고 오한의 단계를 지나서 오한은 없으면서 상기도 감염의 제증상은 지황백호탕으로 잘 해결된다는 뜻입니다.

(안) 감기에 지황백호탕과 형방패독산을 합방하지 않습니다. 오한의 유무에 따라서 엄밀히 가려서 써야됩니다.

비염의 경우에 패독산은 맑은 코가 제거되거나 누런 코는 제거되지 않는다는 사실을 임상에서 발견하게 되었으며 이것은 패독산은 외사로 인한 寒은 제거되거나 열은 제거 되지 않는다는 뜻입니다. (맑은 코는 한으로 인한 것이고 누런 코는 열이 원인이라는 관점에서 말하고 있는 것입니다.) 물론 외감에서 오한이 있을 때는 오한이 잘 풀리고 맑은 코도 잘 없어집니다.

비염이나 감기나 모두 지황백호탕을 쓰게 되면 누런 코가 제거되게 되고 맑은 코는 여전하다는 사실을 발견하게 되었습니다. 이것은 지황백호탕은 리열은 제거할 수 있지만 표한은 제거 할 수 없다는 사실을 의미합니다. 즉 맑은 코인 표한을 제거하려면 패독산을 써야 되고 리열로 인한 누런 코는 리열을 제거하는 지황백호탕을 써야 된다는 뜻입니다.

일반적으로 비염은 아침에 찬 바람을 쐬게 되면 맑은 코가 흐르고 저녁에는 누런 코로 변하는 양상을 가지게 됩니다. 또는 기상시에 누런 코가 활동을 하면서 맑은 코가 흐르기 시작합니다. 이것은 한열이 협착되어 있다는 것이며 표한과

리열을 제거하는 패독산과 지황백호탕을 동시에 써 주어야 된다는 결론에 이르게 됩니다.

그래서 두 처방을 합방해서 (패독산에 석고 지모만 가하면 합방이 됩니다.)사용한 결과 누런 코와 맑은 코를 동시에 해결할 수 있게 되었다는 뜻입니다.

그러나 이것은 만성적인 경우가 아닙니다.

이상호

아, 답변 감사합니다. 감기의 경우는 확실하게 두가지를 가려서 써야 되는군요. 비염의 경우는 기존처럼 열증에는 형방사백산과 한증에 독활지황탕을 쓰면서 상황에 따라 패독산과 지황백호탕을 합방해서 쓰는 경우도 생각해 볼 수 있다... 라고 이해하면 되는 건가요?==> 요즘은 비염에 사백산으로 하지 않습니다

안준철

(안) 만성적인 (비염의) 경우는

- 1) 열증의 경우 패독산에 석고 지모를 1돈씩 가하고 시호 박하 치자 인동 연교를 1돈씩 가하면 됩니다.
- 2) 한증은 독활지황탕에 인동 연교 1돈씩 시호 박하 황련 치자를 5푼씩 가하면 됩니다. 변비가 있으면 인동 연교를 더 많이 쓸 수도 있습니다. 변이 묽은 경우는 인동 연교를 5푼 정도로 용량을 줄여야 되는 경우도 있습니다.

(학생원장)

열증비염인 경우 기존과는 달리 형방사백산이 아닌 형방패독산이 기본이 되는군요. 답변 완전히 접수되었습니다. ^^ 감사합니다. ^_^

어제 강의 내용에서는 녹취록을 반복해서 들었는데, 한열 비염의 경우 이와 같이 명확하게 정리를 안 해주신 거 같네요. 아마 다른 원장님들도 비슷한 혼돈이 있을지 모르겠군요. 그리고 열증의 경우에는 석고, 지모 가미에서 지모를 두 돈으로 한다고 하셨는데 위와 같이라면 한증, 열증 구분에서의 열증이 아니라, 소양인 열증 비염에 일반적으로는 석고, 지모를 한 돈씩 가하되 열로 인한 증상이 심하면 지모를 두 돈까지 증량할 수 있다고 보아야 되겠네요.

(안) 일단은 그렇게 생각해도 됩니다. 다만 지모가 열증약이라는 사실을 인식하고 한증에도 응용해야 된다는 뜻입니다.

■ 눈병

少陽人 눈병은 荊防地黃湯(반표반리) + 忍冬, 連翹. 여드름도 마찬가지. 黃蓮.

- 안구건조증의 핵심은 황련. 피로나 위도 함께 좋아진다.

* 안구건조증, 한증

독활지황탕에 인동 연교 각 한돈 하고 칠정의 문제가 있으면 황련 치자 시호 박하를 5푼씩 쓴다. 쉽게 치료될 수 있는데 대변횟수가 중요한 관건이 된다. 변비가 심하면 인동 연교를 2-3돈으로 쓰고 황련도 한돈으로 해야 한다. 변비가 좋아지지 않으면 근본적으로 해결되지 않는다. 비위는 온보하고 병은 청열하는 원리이다. 인동 연교 치자 박하 등은 발산작용이 있다. 대변이 무르거나 설사경향이면 약 복용 후 변이 물러질 수 있다고 미리 이야기를 해 놓아야 한다. 복부 불편감이나 주소증 피로감 등은 잘 해결될 것이다.

* 한증의 안구건조. 때로는 통증. 식후 더부룩, 가스 차고...대변은 이틀에 한번, 빨리 본다.

독활지황탕 가 인동 연교 각 한돈. 치자 시호 박하 각 반돈. 황련 5푼 가하면 대변도 매일 보고 안구건조증도 좋아진다. 안구건조증의 핵심은 황련. 피로나 위도 함께 좋아진다.

■ 급성감염성설사

- 소양인의 만성적인 설사는 형방지황탕이 아니면 못 고친다. 음허에서 오는 것이므로 보음을 시켜야 한다.

- 열증인데 설사하는 경우가 더 많다. 열을 빨리 빼기 위해서...

- 애기는 아주 작는데 똥을 엄청나게 쏜다. 설사 한번 하면 대단하다. 소양인인 것이 확실하면 저령차전자탕을 쓰면 한첩이면 낮고 두첩이면 끊어진다. 표열을 끊어주기 때문이다. 태음인은 갈근나복자탕, 소음인은 편법으로 육일산을 쓴다.

- 신한복통설사에 급병에는 활석고삼탕, 완병에는 형방지황탕

신열복통설사에 급병에는 저령차전자탕, 완병에는 형방사백산.

- 황련청장탕. 이질 임질에 사용. 장염에 황련이 없이는 치료가 안 된다. 아메바성이질, 세균성장염, 황련이 주약이다. 체질불문하고....

■ 소양인의 심장병. 심계 불안 정충 협심증 심장이 빠르하다든지..

* 태음인의 심장병과 소양인의 심장병.

열증에는 청심연자탕에 갈근 승마 대황을 가하고 한증에는 조위승청탕에 산약 백자인을 가한다. 소양인의 심장병은 열증에는 사백산에 치자 황련 연교 등을 가하고 한증에는 형방지황탕에 치자 황련 연교를 가한다. 태음인은 피부가 두텁고 발산력이 없어서 수분과 담음이 정체되기 쉽다. 따라서 태음인의 심장병은 거담 거습이 위주가 된다. 산약 연자육도 보신하고 수분의 배출을 도와서 담음의 발생 근원을 차단한다. 맥문동 천문동 원육 원지 석창포 백자인 산조인 등의 약미가 모두 거담하거나 심음을 돕는다.

반면 소양인의 심장병은 모두 화열의 결과이므로 청열하는 방법으로 갈 수밖에 없다. 똑같은 증상의 심장병이라도 습담이 잘 쌓이는 태음인은 거담위주로 치료하고 화열이 주로 발생하는 소양인은 청열시켜야 한다는 말이다. 심장병뿐 아니라 모든 질환이 마찬가지라서 태음인은 거담위주, 소양인은 청열위주이다. 소양인은 청열하면 거담이 되고, 태음인은 거담하면 청열이 된다. 어떤 것이 더 근본적인 출발점인가를 파악하는 것이 관건이다.

소양인의 담음치료에서 거담약이 없다고 걱정할 필요가 없다. 청열하면 거담이 되는 것이다(熱生痰).

- 1) 한증; 형방지황탕가 목통 두돈, 황련 치자 한돈.
- 2) 열증? 형방사백산가감방?

소양인이라면, 빈맥, 협심증에 황련 치자를 써야합니다. 목통을 꼭 가미해야 합니다. 도적산의 의미입니다.

* 여성. 소양인 한증. 심계 정충 불안 불면 소화곤란 부종 피로 수족한 상열 식은땀 피로 몸이 무겁고 추위를 탄다. 현훈 구역감 소변빈삭 야간뇨...=> 형방지황탕에 치자 황련 각 한돈이면 심계 정충 불안 전신부종 피부문제가 해결되고 위장이 안 좋으니 목단피도 가한다. 칠정에 문제가 있으면 영지가 좋다. 한돈 내지 한돈반을 가한다. 식은땀이 주소증이면 지모 황백을 반돈 내지 한돈씩 가한다.

* 한증의 여성

피로, 체중증가, 땀 주위의 여드름 가려움, 잦은 상열감, 가끔 심계, 다한, 기상시의 눈꺼풀 부종, 잘 चे하고 가스 차며 대변은 일주에 한번 힘들게 본다.

독활지황탕가 인동 연교 각 두돈, 치자 황련 각 한돈. 황련 한돈이면 통변에 많은 도움을 준다.

■ 소양인의 변비

- 한증의 변비는 잘 듣지만 열증의 변비는 최고로 찬 약이 자기에게 맞는 사람이기 때문에 그것으로는 설사가 되지 않는다. 따라서 윤장을 시키는 방향으로 가는데 보신을 하면서 윤장을 하는 육종용, 그리고 망초를 생각할 수 있지만 결과가 신통치 못하다.

- 청열로 안 되면 윤장한다. 동규자 과루인을 추말로 해서 가한다.

1) 한증이면 독활지황탕가 연교 인동(매일 보지만 힘들면 5푼, 이틀에 한번이면 한돈, 삼일에 한번 힘들면 두돈 이상).....

2) 열증이면 양격산화탕가감으로.....

3) 외감과 관련된 경우는 지황백호탕.

- 독활지황탕 쓸 사람은 변비가 더 많다(한증에 변비가 더 많다). 변비 있으면 연교를 가해서 2돈 넣어도 해결이 안 되면 열증으로서 한증이 아니다. 양격산화탕을 써야한다.

- 변비(한증이면서 이상발효, 두통)에는 독활지황탕가 인동 연교 각 두돈(혹은 두돈 한돈), 독활지황탕만 써도 좋다. 독활지황탕에 생지황 석고를 넣어서는 변비가 해결되지 않는다.

- 사백산은 변비에 쓰면 안 된다. 이뇨약을 넣으면 대변이 덜 빠지기 때문이다. 독활지황탕이 음허에 초점이 맞추어져 있다면 지황백호탕은 비위열을 없애주는 청열제이다.

- 지황백호탕에 대해(감기에 걸려서 변폐가 생긴 경우에 쓴다)

열증변비에 쓴다는 지황백호탕 같은 것은 그것도 변비에 쓰는 것이 아니다. 동의수세보원에 나오는 약은 모두 외감약이므로 감기에 걸려서 便閉되었을 때 쓰는 약이다. 혹은 리열이 극심해가지고 밥맛이 모래를 씹는 것 같고 그럴 때 쓰는 약이다. 변상태와 관계없이 극심하게 입맛이 떨어졌을 때, 감기에 걸려서 고열로 인해서 밥을 전혀 못 먹는 경우가 있을 때 쓰면 밥을 잘 먹을 수 있고 회복이 된다. 외감으로 인한 열에 지황백호탕을 쓴다.

- 형방지황탕은 신한 복통 설사에 쓰는 것이므로 변비가 있을 때 써서는 안 된다.

- 대황을 먹고 변을 못 보면 기능항진이고 소양인으로 봐야한다.

獨活地黃湯은 裏寒病藥. 表熱을 제거하는 忍冬, 連翹를 추가해야 변비도 치료.
매일 보나 힘들면 5푼, 이틀에 한번이면 1돈, 삼일에 한번 힘들면 2돈 이상.

* 비염과 관련된 변비 임상례

- 4년간 지속된 알러지성비염. 2-3일만에 한번 보는데 항문이 찢어질 듯 하다. 한증으로 보고 독활지황탕가 인동 연교 각 한돈으로 비염증상의 현저히 개선. 그러나 대변은 여전한데 인동 연교를 늘려야 하는지..

답) 열증이면 인동 연교를 아무리 써도 좋아지지 않는다. 인동 연교가 열증약이므로 한증인 사람이 먹으면 열이 빠지면서 대변이 통하는 것이다. 용량을 많이 써도 좋아지지 않는다. 장복해야 한다. 양병부는 몸에서 가장 깊은 곳에 있으므로 다른 것이 다 해결되고 나서 나중에 좋아진다. 그래서 가장 시간이 많이 걸리고 완치에 장시간이 소요되는 것이다. 변비를 대장만 생각하면 안 된다. 청열만 할 것이 아니라 음허를 해결해야 한다. 숙지황 산수유 등을 오래 먹어서 음허가 회복될 기회를 주어야 한다.

* 소아변비

- 한증이면 독활지황탕가 인동 연교. 열증이면 사백산에 황련 과루인(윤장의 목적)을 쓰는 것이 좋다.

■ 소변

열증; 방광염이 있으면 황백을 가하고, 방광염이 있으면서 열이 나면 저령차전자탕.
한증; 방광염에 활석고삼탕.

- 방광염에는 (기본방에) 저령 차전자 황백을 가한다.
- 소변이 너무 잦으면 방광열을 사하는 황백을 쓴다.

* 야뇨증

- 소아의 야뇨는 비뇨기가 충분히 발달되지 않아서 생기는 것으로서 시간이 지나면 다 좋아진다. 보신하는 것이 원칙이다. 소양인은 산수유 복분자. 혈허하면 구기자를 쓴다. 태음인은 산약 연자육.

* 소변빈삭에는 신양을 돕는 가루자를 쓴다. 소양인 열증.

* 소변백탁을 확인하고 숙지황고삼탕을 쓰는 것이 좋겠습니다--> 소변백탁이 없으니 형방지황탕에 목단피 구기자 넣어도 되겠습니까?-->상기와 같이 쓰시면 되겠습니다(소변을 자주 보고 하복부에 냉감이 있는 한증의 여성에게....)

■ 소화기질환

1) **한증**- 숙지황과 목단피가 들어가는 **독활지황탕**(가스가 많은 이상발효현상이 주 증상. 가스가 차서 조금만 먹어도 배가 똥똥해진다고 호소)

2) **열증**- 지모 석고가 들어가는 **형방사백산**(숙이 쓰리다는 식으로 표현한다)을 주로 쓰는 것으로 보인다. 황련 한돈, 목단피 3푼.

- **소양인 열증에 형방사백산가 황련 한돈, 목단피 3푼.** 식곤증이나 비위의 증상이 다 없어진다. 목단피의 양은 처음에는 5푼 다음에는 3푼 다음에는 1그램 정도로 줄어나간다. 나중에는 황련만 써도 된다. 목단피는 독활지황탕의 의미.

- **한증에는 독활지황탕.**

- 독활지황탕가 인동 연교 하고나서 속쓰림이 심한 경우에는 황련이나 치자를 5푼 가할 수도 있다. 대변이 묽은 경우에는 미초한다.

- 모든 식적의 끝은 寒으로 간다. 수족이 쫄냉해지고 배가 차지고 추위를 타게 되고...특히 추위를 탄다, 손발이 냉하다 라고 하면 볼 것 없이 위장약을 써야 한다. 소양인 한증 같으면 독활지황탕을 쓸 것이고 열증이면 형방사백산에 황련1돈, 목단피 3푼을 쓴다.

- 위염에도 황련 목단피 쓴다. 소양인 열증의 위장증상에 황련과 목단피를 같이 쓰면 좋다. 황련을 두돈까지 쓸 수 있지만 목단피를 3푼 이하로 내린다.

- 숙지황 산수유는 비위를 따뜻하게 하고 생지황 석고는 비위를 차게 한다. 따라서 숙지황 산수유는 설사를 해결하기 위해 쓰는데 반해 생지황 석고는 설사를 유발하기 쉽다.

- 소양인 열증은 조잡증이 많다. 쓰리고 아픈 것 같으면서도 아프지 않고 배고픈 것 같으면서도 고프지 않고 그게 조잡증이다. 소양인 한증은 아예 소화불량이거나 가스가 많이 차고 배가 똥똥해지고 즉 이상발효가 많다. 열증은 형용하기 힘든, 이상하게 배가 아픈 거 같고 당기는 거 같고 그러는데 위산이 많아서 그렇다. 한증은 위산이 부족해서 그런 것이고.....숙지황 산수유가 위액을 많이 나오게

한다. 소양인은 위열로 인한 위산과다가 많은 만큼 위산분비를 줄여서 위장치료를 해야 한다. 따라서 형방사백산.

- 위장병이 대부분 한열을 협착하기 때문에, 황련 목단피를 같이 써줘야 돼요. 이것이 굉장히 중요한 겁니다. 황련을 1돈쓰고, 목단피를 3푼을 써주면 대단한 효과가 있습니다. 대변이 먹는 날부터 대단히 굵어지고요, 심한 경우에는 5푼 정도 썼다 하면은 항문출혈까지 나는 거예요. 목단피를 3푼 혹은 1g넣었다는 것은 독활지황탕의 의미가 들어간 것으로 이해하면 된다.

* 消穀善飢(많이 못먹고 금방 배고프고), 下肢無力.이면 調胃升清湯에 꼭 녹용 넣자. 허기 못 참는 것은 비위허약. 寒症은 太陰調胃湯, 熱症은 葛根調胃湯 쓴다.

少陽人이 허기 못참으면 形防瀉白散+ 黃蓮 1돈, 牧丹皮 3푼.

少陰人 寒症은 十二味寬中湯에 木香, 厚朴, 大腹皮, 枳實.

熱症은 補中益氣湯에 乾薑, 砂仁, 半夏류를 5푼씩 가미. 1돈은 많다.

* 소양인한증의 속쓰림에 가미할 약재- 독활지황탕 가 치자 황련 각 5푼

■ 소양인의 식욕부진

1) 한증- 독활지황탕 쓰시고 변비있거나 대변 매일 못 보면 인동등 연교 가하시면 됩니다.

2) 열증- 형방사백산에 목단피 3-5푼 가하시면 됩니다.

(목단피는 비위를 따뜻하게 한다.) 단 열증에 목단피를 많이 쓰면 변비가 되므로 주의요망.

- 열증 소양인이 밥맛이 없으면 사백산에 황련 목단피를 넣어야 한다(안).

■ 간담질환

* 황달

황달은 습열로 인해 생긴다. 소음인에게는 인진을 쓰고 태음인에게는 체질불문하고 무조건 대황으로 사하해야 한다. 소양인에게는 고삼으로 습열을 제거하고 복령 택사 등으로 습을 내보내야 한다. 태양인에게는 초룡담 어성초가 중요하다.

■ 소양인의 부종

- 대강: 표와 리를 모두 열어 수분의 배출을 활발하게 하는 **형방지황탕(한증)**을 주로 쓰는 것으로 판단됨. **열증의 경우에는 형방지황탕에 석고를 넣어서** 활용하는 것도 좋을 것으로 보인다.
- 형방지황탕을 쓴다. 피부가 열리지 않아서 그렇다. 따라서 큰 땀구멍(방광)과 작은 땀구멍으로 나가게 한다. 이것이 형방지황탕. 붓고 심장성부종 등이 와서 목통을 가하는 것도 형방지황탕에 가미해야지 다른 처방에 하면 안 된다.
- 심장병도 형방지황탕에 목통 두돈 넣고 치료하면 불면 심계 부종 등을 치료한다. 목통 황련 치자 등을 가한다. 변비가 오면 인동 연교를 가한다. 변이 점점 굳어지면 오피 한돈 두돈까지 쓴다. 형방패독산은 폐쪽으로 가므로 부종을 다스리지 못한다. 부종에 독활지황탕 패독산을 쓰지 않고 형방지황산을 쓰는 이유는 부종이란 표나 리만의 문제가 아니라 조직간의 수분저체이기 때문이다.
- 목통대안탕. 생지황도 이뇨와 관련이 있다. 목통과 생지황이 각5돈. 독활이 빠짐. 독활은 이뇨에 별로 관계 없음.

= **식적성의 부종은 독활지황탕으로 좋아지는데** 식적이 아니라면, 형방지황탕에 생리통이 있으면 현삼 지골피, 여드름이 있으면 인동 연교로 표열을 제거하는 것이 좋다. 원래 부종만 보고 쓰면 형방지황탕이지만 식적으로 인한 경우는 독활지황탕이 우선이다(임상례).

- 부종에 이수시킨다는 것은 한심한 생각이다. 원인치료를 해야 한다. 식적과 칠정(스트레스)이 가장 큰 이유가 된다. 술을 마시는 것도 酒滯 즉 식적의 일종이다. 이것이 없어야 부종이 없어진다. 소양인의 경우, 황련 치자로 스트레스가 해결되고 목단피 산수유로 식적이 해결되어야 한다. 후세방 도적산에 목통이 있는데 이것의 리수작용으로 부종이 해결되는 것이 아니다. 목통은 심소장열을 소변을 통해 배출하는 약이다. 목통을 통해 칠정(스트레스)으로 인한 심화가 제거되었기 때문에 부기가 내리는 것이다. 목통을 심 소장화를 사하므로 부기를 치료한다.

= 浮腫에는 荊防地黃湯에 가미. 心臟性 浮腫등에 木通, 黃蓮, 梔子 추가.

부중에 獨活地黃湯, 形防敗毒散 쓰지 않는 것은 表나 裏만의 문제가 아니기 때문.

■ 피부질환

아토피

- 한증에는 독활지황탕가 고삼 차전자를 넣고 형개 방풍은 한돈 반으로...

- 대강: 표리의 판단이 대단히 중요한 질환으로서, 입맛에 변화가 있거나 소화가 잘 안 되는 등의 리증이 있을 때는 형방지황탕(혹은 독활지황탕, 형방사백산) 등에 가감해서 활용할 수 있다. 위장을 겸해서 치료하고자 하는 것이다. 하지만 표증이 주로 있을 때는 형방패독산에 청열약을 가감해서 활용하는 것이 원칙이다.

열증일 때는 전적으로 표에 작용하는 양격산화탕이나 방풍통성산, 혹은 양독백호탕 등을 활용할 수 있을 것이다.

- 전적으로 표에 작용하는 것은 형개 방풍이다. 이것이 들어가는 것이 양독백호탕(우방자)과 양격산화탕. 따라서 한열불문하고 피부병에 양격산화탕을 쓴다. 한증이라도 피부병 같은 열증이 있으면 열증약을 쓴다. 양격산화탕이 차가운 약이므로 한증 소양인이 양격산화탕을 복용하여 배가 아픈 경우에는 인동 연교를 가한 독활지황탕을 주어서 달래고....배 아픈 증상이 좋아지면 다시 양격산화탕을 쓴다. 독활 방풍이 있어서 중초로 작용하는 독활지황탕은 피부병에 쓸 수 없다(?).

- 비염이나 피부질환에 형방지황탕을 쓰고 싶은데 절대로 그렇게 하면

안 됩니다. 특히 비염은 외감과 관련이 있다고 생각하기 때문에 더더욱 형방지황탕을 쓰고 싶은데 저도10년 이상 그렇게 했는데 결론은 독활지황탕입니다. 피부도 마찬가지로입니다. 형방지황은 재발이 잘되고 효과가 지속적이지 않습니다.

- 형방사백산을 피부질환에 쓸 경우에는 방풍(옥병풍산, 방풍통성산)을 한돈 더 넣고 고삼(두드러기)도 가미한다.

1) 한증의 경우, 위장병이 없으면 형방패독산이 잘 듣는다. 형방패독산에 인동

연교 박하 우방자 금은화 같은 것을 넣고 속에 문제가 있으면 형방지황탕에 가미한다. 보통은 비위 문제가 거의 다 있으므로 형방지황탕에 넣어 쓰게 된다(바로 위에서는 한열불문하고 양격산화탕을 쓴다고 했는데.....). 오래가는 피부질환(여드름)은 해로운 것을 많이 먹었다고 봐야한다. 인스턴트 식품이나 튀긴 거라든지....닭고기...등으로 비위열이 생긴 것이므로 패독산을 써서는 안 된다.

2) 열증의 경우, 위장장애가 없으면 양격산화탕, 속에 문제가 있으면 방풍통성산을 쓴다. 축농증에도 잘 듣는다.

- 황금 황련 황백은 청열하지만 조습한다. 따라서 습성피부질환에는 좋지만 건성 피부에는 도움이 되지 않는다. 맥문동 천문동으로 윤조한다.

- 한소양인의 아토피 치료 임상례- 양격산화탕을 쓰면 증상 호전. 하지만 3일 복용하면 복통. 독활지황탕을 주면 복통은 좋아지는데 병세가 후퇴함. 독활지황탕에 인동 연교를 넣어주면 배 아픈 것도 낫고 병세도 후퇴 안 한다. 그러다가 배가 안 아파지면 다시 양격산화탕으로...이런 식으로 양격산화탕을 운용한다.

- 대상포진에도 양격산화탕

- 체력이 약한 어린이의 경우는 사백산가 우방자하는 것이 좋고 심열이 극심한 경우에는 양격산으로 갈 수도 있다. 성인에게는 양격산이 좋을 듯. 밥을 잘 안 먹고 위가 좀 나쁘면 사백산 쓰는 것이 낫다고 봐야 한다.

독활지황탕에 가감할 때는 독활지황탕가 인동 연교 박하.....소양인 피부병에는 고삼이 중요함. 독활지황탕에 가할 때도 인동 연교 박하...이런 것들은 넣고 싶으면 넣되 고삼하고 차전자는 빠뜨리면 안 된다. 차전자가 들어가야 거습이 되고 짓무르던 것이 꾸덕거리며 굳기 시작한다. 고삼도 마찬가지로. 고삼은 소양인의 항히스타민제. 별절게 짓무르고 혈관이 팽창된 경우에 쓸 수 있다.

* 한증에는 독활지황탕가 고삼 차전자 (황백 우방자. 형개 방풍)/ 형방지황탕을 쓰지 않는다.

* 열증에는 사백산.....

* 건선 임상례

건선은 류마티스처럼 자가면역질환이란 사실을 알아야합니다. 이와는 다르게 아토피는 알레르기질환입니다. 아토피는 대체로 빨리 호전을 보입니다.그러나 건선의 경우 치료시간도 몇배 걸리고 깨끗이 마무리되지 않는 경우가 많습니다.

상증의 한열을 가리기 이전에 병증자체가 풍열이므로 양독백호탕을 가장 먼저 쓸 수 있습니다. 나중에는 역시 독활지황탕에 풍열약 또는 청열지제를 가해야 됩니다. 인동 연교 생지황(어혈 청열의 개념) 우방자등. 아마 양독백호탕이 가장 좋을 것 같습니다. 열증도 먼저 양독백호탕을 먼저 쓰고 양격산화탕에 가미하는 것이 좋을 것 같습니다. 건선은 본인도 실패한 경우가 많았습니다.

* 소양인의 여드름

대강

- 치자 황련 박하 인동 연교등을 생각해서 가미하세요

독활지황탕에 인동 연교. 인동 연교를 넣으면 변이 물러질 것이라 사전에 이야기 해야 한다. 박하 우방자를 넣기도 한다.

- 초기에는 한증에 형방지황탕의 사용을 권했지만 최근에는 그것을 안 쓰고 독활지황탕으로 통일한 듯함.

- 한증의 비만환자, 여드름 있음. 여드름을 고려해서 독활지황탕에 연교 시호 박하 5푼, 고삼 차전자 각 한 돈 가하면 좋겠습니다.

1) 한증

- 소양인의 여드름에 독활지황탕가 고삼 차전자를 많이 쓴다. 고삼은 피부의 흥분을 가라앉히는 듯 하다.

- 한증이면 형방지황탕. 형방지황탕을 쓰고 상부의 열을 없애줘야 하니 인동 연교를 쓴다. 인동 연교는 태음인의 갈근 승마하고 비슷한 역할을 한다. 형방지황탕은 위와 장을 따뜻하게 하고 태음조위탕도 위와 장을 따뜻하게 한다. 갈근 승마도 열을 내려준다. 인동 연교도 열을 내려준다. 우방자 박하도 피부질환에 좋다. 여드름이 많이 나면 생지황도 좋다. 한증이면 생지황을 추가한다. 허리가 아프고 신허 증상이 있으면 숙지황 세돈, 지모 황백을 가하고....강활 독활 형개 방풍이 있는 상태에서 기침에 쓸 때는 형개를 한 돈 더 넣는다. 목구멍이 아프면 현삼.

2) 열증? 사백산을 피부에 쓸 때는 방풍 한 돈을 더 넣어서 쓰고 고삼도 가미한다.

* 소양인 한증의 지루성 피부염 환자 임상례

독활지황탕가감방을 쓰려하는 데 대한 언급

- 습을 제거하기 위해서 차전자를 쓰는 것도 좋습니다. 소증의 한열과 무관하게

양독백호탕으로 피부의 풍열을 치료할 수 있습니다.

문) 선생님, 한증환자가 양독백호탕을 한제씩 복용해도 잘 견디어낼 수 있습니까?

경험이 적어서 여쭙어봅니다.

답) 피부의 풍열증이 확실하고 심할 때는 아무 문제없습니다. 그러나 어느정도 치료가 되고나면 독활지황탕으로 조리해야 합니다.

* 지루성 피부염 임상례

- 소양인 한증으로 보고 독활지황탕가 인동 연교 고삼 우방자 차전자 했는데 증상이 더 안 좋아지더라, 대변이 더 잘 안 나오고... 열증으로 보고 형방사백산에 고삼 차전자 우방자 우방자 각 한돈을 써야할지 양독백호탕을 써야할지...

답) 소증의 한열에 상관없이 양독백호탕을 쓸 수 있습니다. 한증의 심각한 아토피나 피부질환에 양독백호탕이 듣습니다. 원래 열증약이지만 현증이 열이기 때문에 한증에도 쓸 수 있습니다. 지황백호탕은 주로 감기에 쓰인다.

* 지루성 피부염 임상례(열증)

- 지황백호탕(석고 5돈)으로 만성적인 지루성피부염이 3일만에 좋아지더라.

하루에 4-5봉씩 복용....=> 지황백호탕은 주로 감기에 쓰인다는 선생의 말에 반대.

* 술마시는 사람의 주사비에 양독백호탕(안준철). 술에 취해사는 소양인 열증의 사람에게 형방사백산가 황련으로 술이 잘 안 취하고 피로감이 줄더라(변재석)....

* 두드러기

- 한증. 독활지황탕가 인동 연교(변비의 정도에 따라 0.5-2돈)

* 가려움증. 붉은 색의 발진. 양독백호탕. 766번 질문 관련.

* 한증 미혼 여성의 뽀루지- 독활지황탕 인동 연교로 뽀루지가 좋아진다는

임상결과 ==> 이에 대해 상동 처방에 치자 황련을 각 5푼씩 추가로 가하는 것이 좋겠다는 안선생의 견해

* 두드러기

소양 한증인데 급해서 양독백호탕을 5봉 주고 그 후 독활지황탕에 인동 연교 가감했습니다. 하지만 10일 동안 변화가 없습니다. ==> (안) 고삼 차전자를 쓰는 것이 좋겠습니다. 시호 박하가 중요합니다(표를 열어줄 수 있습니다), 황련 치자도 생각해봐야 하겠습니다.

■ 다한증

* 임상례

- 열증. 식은 땀 숨갑갑, 스트레스로 인한 우울증, 식욕저하, 천면, 몸이 갈아진다, 혈당 높음--> 형방사백산 가 지모 황백 치자 황련--> 한봉을 먹으면서 식은땀이 그치고 일년간 숨차던 증상이 호전되다.

* 열증의 수독다한

형방사백산 가 지모 황백 각 한돈, 긴장을 잘 하면 황련 치자도 가한다.

■ 자궁병(여성질환)

- 열증에는 형방사백산, 한증에는 형방지황탕. 둘 다 복령 택사가 두 돈 들어가
고 꺾과 관련이 있다. 어떤 갱년기의 아주머니. 방광염에 질 건조증, 번조감...처
음에 형방사백산에 인동 연교하고 심장이 안 좋아서 목통 넣고. 황련 치자--->
냉도 없어짐. 냉도 질염. 목통이 하초의 습열을 제거한다. 두돈까지 쓴다.

- 자궁소증(유산이 여러 번 된 뒤에 찬데 앉지도 못하고 많이 허로해진 경우)

김주선생 말로는 양격산화탕 써야 한다고 하지만 사백산을 써야한다. 복령 택사
가 들어간 補腎하는 약을 써야 하기 때문이다. 양격산화탕에는 복령 택사가 없으
므로 보신하는 기능이 없다. 현삼 목단피 우슬을 가한다. 한증이면 형방지황탕에
현삼 목단피 우슬을 써야 한다.

- 어혈로 인한 자궁질환

형방사백산에 현삼 목단피 3분- 5분. 한 돈 쓰면 변비가 된다. 보통은 3푼 사용.
초기에는 5푼을 쓰고 두 번째는 3푼으로 줄여야 한다.

- 낭습 슬관절염 자궁질환 등에는 강활 독활을 한돈반(대강활탕)으로 올려서 하
행시킨다.

* 대계 소계에 대해(영경귀)

대계 소계 없이는 자궁하혈 못 고친다. 놀라운 효과가 있다. 쌍코피에도 잘 듣는
다.

1) 한증: 형방지황탕가 현삼 목단피 각1돈

2) 열증: 형방사백산 가 현삼 목단피(3-5푼)

- 자궁질환이나 어혈에도 생지황을 꼭 써야 한다. 현삼 목단피로 될 수도 있지만

생지황을 써주는 것이 훨씬 효율적이고 좋다.

- 자궁질환에는(어혈) 토우슬(과혈)을 가한다. 천우슬은 보신작용이 더 강하다.

* 빈발월경에 대한 논의

한증. 한달에 두 번 생리. 하초로 집중하기 위해 숙지황고삼탕에 인동 연교 각8그램, 현삼 목단피 각4그램 처방예정이라는 질문에 대해
답)

- 소변상태가 어떤지 궁금합니다. 소변이 탁하고 적백탁이 있으면 숙지황고삼탕이 의미가 있을 것 같고요. 소양인의 혈열의 증상입니다. 대게 소계등을 응용하시는 것이 가장 좋습니다. 淸熱 涼血藥을 써야 합니다.

- 현삼 목단피는 생리통이 있거나 덩어리가 있을 때 또는 자궁수술 후 어혈제거에 쓰는 약입니다. 이 경우는 거리가 좀 있습니다.

* 생리불순에 대한 논의

두 달에 한번이면 혈열이 아니고 자궁의 허냉입니다. 온보해야 되는 상황입니다. 이때는 현삼 목단피가 맞습니다. 한달에 생리가 두번이거나 하혈이 계속되면 혈열이므로 대게 소계 같은 혈열을 끄는 약이나 지모 황백같은 약으로 신에 있는 화를 사해야 됩니다.

* 자궁수술후 봉루에 대해

독활지황탕보다는 보신을 할 수 있는 형방지황탕이 낫다. 독활지황탕은 비위를 보하고 중기를 다스리는 처방이다. 현삼 목단피가 수술 후에 좋다. 봉루에는 대게 소계 등의 청열 양혈약이 좋다.

* 한증, 하혈을 일년 넘게 하는 여성

- 독활지황탕에 인동 연교로 청열하고 대게 소계로 자궁출혈의 문제를 해결한다.
사례)

독활지황탕가 인동 연교 대게 한 돈 해서 소화상태 호전되고 자궁출혈이 멎은 사례 있음. 잠도 잘 자고 살도 빠지고....

* 한증의 불임에는 독활지황탕에 가감한다.

* 한증의 갈색 냉

독활지황탕에 가미한다. 갈색냉은 혈증. 대게 소계를 쓴다. 냉대하에 습열을 다스리는 고삼도 좋은 약이다.

* 한증여성. 생리시작일에 현훈 오심 소복통이 매우 심해 정상생활곤란. 독활지황탕에 현삼 한돈, 시호 5푼 처방. 한달 지나서 보름만에 하던 생리는 정상으로 돌아오고 소화 컨디션은 좋아졌으나 생리통은 여전하다. 독활지황탕에 시호 박하 유향 몰약을 가할까 하는데 어떨까요?--> 생리가 보름만에 있다는 것은 혈열 혹은 간열입니다. 대게 소계를 쓰는 것이 좋습니다. 시호 박하 생지황도 응용합니다. 흉요연접부에 침 시술을 병행하면 좋습니다. 시호가 어혈에도 작용합니다.

■ 갱년기증후군

- 얼굴이 술 먹은 거 같은 갱년기여성. **양격산화탕** 원방. 다른 것은 다 좋아졌는데 냉대하가 더 못함. 복령 택사 목통이 없어서 하초로 가는 약이 없어서인 것으로 판단. 질염이나 대하 같은게 안 좋아지면 복령 택사 목통을 생각해야 한다. 양격산화탕에 복령 택사를 한돈 두돈씩 쓸 것이면 차라리 **형방사백산**으로 가는 것이 좋다. 그러니 양격산화탕에 (복령 택사를)5분만 가한다. 글면 작의 작용범위가 비위까지 내려간다. 원래는 상초와 기관지에만 작용.
- 소양인의 협통에 양격산화탕에 복령 택사를 5分. 이를 모르면 옆구릴 못 고친다. 여기에 시호를 한돈 가하면 흉협부까지 완전 정리가 된다.
- 갱년기 장애로 간기울체 등의 증상을 보이면 소음인은 향부자로 이기해울하고 소양인은 목단피로 파혈 활혈 해울한다. 같은 질환은 같은 귀경의 약을 쓰고 처방과 약물은 달라진다.

1) 열증- 사백산에 가미. 양격산화탕 쓰면 안 된다. 복령 택사가 보신하고 하초와 관련이 있으므로 사백산을 써야하고 땀이 많으면 지모 황백을 생리불순에는 현삼 목단피(한증은 1돈씩, 열증은 3-5푼)을 쓴다. 한열이 동반되는 경우에는 시호 사용가능. 스트레스성이거나 심화로 인한 것이면 황련 치자 목통으로 심화를 제거한다. 풍열까지 뜨면 형계 방풍의 용량을 더 높인다. 지절통이 심하면 지골피를 가하고 강활 독활을 5푼 정도 더 증량하면 된다

2) 한증- 형방지황탕에 가미. .

* 갱년기증후군에 임상례

소양인 독활지황탕을 쓰는 환자. 형방지황탕에(부종), +생지황,석고(변비),
황련 목통 치자(수면장애) 로 쓸려고 함.

평소 피곤해지면 한열왕래, 또 가끔 저혈압이 되어 식은땀을 흘리면서 어지러움을
素症으로 가짐. 후세방에 시호가 들어갔을 때 어지럽다고 하는 경우를 경험을 해서
한열왕래를 잡기위해 시호를 넣을 경우 평소의 저혈압이 더 떨어지지 않을까
우려되고, 형소에 저혈압이 소증이므로 구기자나 복분자 등 소양인 보신하는
약을 더 넣어도 될런지요?

답)

황련 치자 목통을 가하시면 혈압이 더 떨어집니다. 피곤할 때 한열이
왕래하면 이때 패독산을 쓰는 겁니다. 5-10분후 바로 한열이 없어지고
컨디션이 좋아집니다.(패독산에 시호가 들어있음) 이 경우 형방지황탕을 쓰시면
변비가 더 심해집니다. 생지황 석고를 넣어도 변비가 별로 해결되지 않을
것 같습니다. 변비에는 독활비황탕에 인동 연교를 가하시고 보할 목적이라면
형방지황탕에 숙지황을 1-2돈 더 넣고 식은땀을 흘리는 증상에는 지모 황백을
가해야 합니다.

* 열증 소양인의 갱년기증후군 처방례

상열 다한 피로감 안면홍조....형방사백산가 치자 황련 지모 황백 각 한돈. 한증
에도 동일하게 가감해도 되지만 열이 극심하지 않으면 양을 조절해야 하는 경우
도 있다.

■ 소양인의 구내염, 구강질환

- 열증이면서 입안 혈고 붓고 하는 구내염일 경우에는 양격산화탕에 생지황
치자 박하 심하면 황련까지 넣을 수 있다.

* 열증. 입이 타는 듯한 갈증. 하루에도 10회 정도 소변

사백산에 치자 황련 연교를 가해서 심소장열을 사한다. 소변이 잦으면 방광열을
사하는 황백이다.

* 베체트병

과민성대장증후군이 있으면서 불면 베체트병이 있다. 형방지황탕에 비염도 있어
인동 연교 치자 등을 가하려 합니다==>(안)황련이나 고삼으로 청열 조습하는
것이 좋겠습니다. 불면이 있다 하니 황련 치자 연교는 같이 써야 하겠습니다.

■ 소양인의 심장병- 심계 정충 불면 불안 초조 빈맥 흉통 협심증...

1) 열증- 사백산 가 목통2돈 치자 황련 각1돈

2) 한증- 형방지황탕가 목통1돈 치자 황련 각1돈.

한증에 목통을 두돈 이상 쓰면 처진다. 양격산화탕의 의미를 살려서 인동 연교를 넣기도 한다(임상례).

수족의 땀을 상태를 보아서 지모 황백을 가할 수 있다.

* 혈압도 떨어지고 혈당도 떨어진다.

* 인후통 있으면 인동 연교 가미 가능함.

* 소양인의 관상동맥질환의 임상례에 대한 언급

- 식욕항진만 보면 독활지황탕으로 비위의 음허를 해결해 줘야 되겠습니다.

그러나 심장의 문제는 형방지황탕으로 해야 되고 황련 치자는 리열을 사하기 때문에 식욕항진에도 도움이 될 것입니다.

땀이 많거나 소변이 붉으면 지모 황백으로 신 방광의 열도 사해야 겠습니다.

목통은 태음인약으로 확인됐으므로 빼고 쓰시길.....

- 목통을 썼을 때는 처음 한제는 무지 좋고 두번째는 약효가 못하다는

반응이 많았는데 이제 그 의문이 해결되고 있습니다. 체질에 맞지않는 약을 빼기만 해도 약효의 지속성이나 효과의 신속성이 비교할 수 없는 것 같습니다. 정말로 재미(?)있습니다.

* 심계와 식사후 배가 자주 똥똥해진다는 여학생

- 독활지황탕가 치자 황련 시호 박하 각 오피온. 한증에게 한돈은 설사를 유발할 수 있다.

■ 갑상선기능항진증

갑상선기능항진증이면 열증이라고 볼 수 있는데 소증을 소양인한증에

열증약 가미가 좋나요? 황련 치자 등등

- 소증이 열증이면 열증약에, 소증이 한증이면 한증약에 청열약을

가하시면 됩니다.(증에 따라서). 체질과 한열이 맞으면 갑상선 질환은 치료효과가 매우 좋습니다. 교감 부교감의 발란스를 잡아주는 느낌입니다.

- 치자 황련으로 裏熱을 瀉한다.

* 한증의 갑상선기능항진증.

- 형방지황탕에 황련 치자로 심화를 사하고 땀이 많거나 소변이 붉으면 지모 황백 음허가 심하면 숙지황을 3-4돈으로 증량. 어혈이 있으면 숙지황을 가하면 신속하게 좋아진다.

■ 소양인의 상열감과 번조

1) 한증- 형방지황탕을 쓰되 補腎해야 하므로 숙지황을 3돈으로, 지모 황백을 넣고, 상열이 있으므로 생지황도 가한다.

2) 열증- 양격산화탕을 쓰는데 상초 격상의 질환이므로 약효가 위로 올라가지 않도록 석고를 빼고 지모는 그냥 쓰거나 더 넣기도 한다. 두 돈으로 올릴 수도 있다. 인동 연교는 두돈반으로 한돈반을 더 넣는다. 박하 치자는 원래 있으니 그냥 쓰고 번조가 있으면 치자를 더 높일 수도 있다.

- 상부 표부의 처방이므로 심장과 연관해서 심번 정충에 황련 치자를 가해 쓴다.

상열감과 번조에 쓸 때는 補腎이 목적이므로 熟地黃을 3돈 넣는다. 知母, 黃柏, 生地黃. 熱症에는 涼膈散火湯. 石膏 빼고, 知母는 그냥 쓰거나 2돈으로 올리고, 忍冬, 連翹는 2돈반으로, 梔子, 薄荷는 그대로, 번조 있으면 梔子 증량. 荊防地黃湯+ 木通2돈, 黃蓮, 梔子1돈으로 고혈압, 불면 치료에.

여기에 忍冬, 連翹 1돈씩 추가하는 것은 涼膈散火湯의 의미.

* 한증의 상열한출에 대한 토의, 가스 찬다고 한다. 심한 변비. 호르몬치료

- 독활지황탕 가 인동 연교 각 두돈, 황련 치자 시호 박하 각 5푼. 약간 호전

==> 독활지황탕가 생지황 인동 연교 각 두돈, 형개 한돈반, 황련 치자 시호 박하 각 한돈. 대변이 이틀 일회로 호전되고 상열 한출도 비교적 호전

==> (안) 한증이 맞습니다. 가스 차는 것도 그렇지만, 만약 열증이라면 이 약을 먹고 대변량이 늘지 않습니다. 산부인과에서 호르몬 치료를 5-6년 했으면 몸이 제대로 망가졌다고 봐야합니다. 호르몬치료(화공약품)를 안 했으면 경과가 훨씬 양호할 것입니다. 홀몬치료를 하게 되면 몸속의 잔여에너지를 다 썼다고 봐야 합니다.

■ 소양인의 고혈압

- 치자 황련 목통을 쓰면 혈압이 떨어진다.
- 어지럼증은 남자는 신허, 여자는 담음 또는 식적으로 보면 된다.
- 1) 한증- 형방지황탕에 인동 연교 지모 황백 목통 황련 치자 등을 가한다. 소변으로 뚫어줘야 할 때는 복령 택사가 아니면 안 된다. 소변이 붉거나 땀이 많으면 지모 황백을 가하고 구취가 있으면 목단피를 가한다.
- 2) 열증- 형방사백산가 인동 연교.

고혈압, 협심증에는 木通, 黃蓮, 梔子, 知母, 黃栢, 忍冬, 連翹 가미.
知母, 黃栢은 有汗. 忍冬, 連翹는 두통, 안면홍조에 가미.

■ 두통

두통에 인동 연교를 쓴다. 하지만 대변이 묽어진다. 이 내용을 사전에 환자들에게 이야기 해주어야 한다. 5푼 정도로 약하게 쓴다.

- 1) 한증- 위장증상을 겸하는 심한 두통에 독활지황탕가 인동 연교를 쓴다. 인동 연교(0.5-2.0. 대변상태 봐가면서). 변비가 없으면 변이 묽어질 수 있다고 사전에 이야기한다. 대변으로 열이 빠지는 것이다.
- 2) 열증- 사백산가 치자 황련. 잠도 잘 잔다.

* 한증. 만성두통, 항강증, 잘 चे하고 상열감 한출 등의 갱년기증상 2-3년

- 독활지황탕 가 강활 지골피 한돈반, 인동 연교 각 0.5-한돈.

■ 현훈

- 어지럼증은 심허 담화 신허로 이해한다. 특히 여성은 심화 담음, 남성은 거의 신허로....
- 한증이고 변비가 약간 있으면 독활지황탕 가 인동 연교 치자 황련 5푼씩만 가한다. 열증이면 사백산에 황련 치자 한 돈씩

■ 구안와사

* 한증의 구안와사(안)

- 평소 배에 가스 자주 차는 한증의 아줌마. 독활지황탕을 자주 지어감. 감기 후 유증으로 유양돌기의 통증과 두통. 국물을 흘릴 정도의 구안와사. 독활지황탕 가 인동 연교 황련을 이주 먹고 매일 침을 맞았는데 95% 회복됨. 面大胃大 면병은 위병이다. 양명경.....이런 이유로 황련을 쓴다.

* 삼차신경통

- 완치가 가능하다. 열다한소탕에 전충 5푼 조각자 백질려 등을 가미함. 이 병이 어혈이라는 것을 이해하게 됨. 소양인 한증의 경우 독활지황탕(가 인동 연교 황련 각 한 돈-- 질문자의 가미법. 안선생도 무방하다 함)에 가미하면 되는데 시호 자초 목단피 대계 등의 어혈약도 생각해 봐야 한다. 삼차신경통은 신경의 이상이 아니라 혈관의 이상이다. 어혈로 볼 수 있는 대목.

■ 정신질환(불면, 심계, 흥분.....)

1) 한증- 형방지황탕가 목통 1-2돈, 황련 치자

2) 열증- 형방사백산가 목통(목통이 태음인약?) 두돈, 황련 치자.

- 열증이면 사백산가 치자 황련. 머리 아픈 것도 좋아지고 잠도 잘 잔다.

* 돈 떼이고 잠 못자는 사람을 형방사백산 혹은 형방지황탕가 황련 치자 목통으로 치료한 바 있다.

* 칠정이 있으면 치자 황련을 가한다.

* 우울증에 대해

협심증 우울증 심계 흥통 불면 등에는 양격산화탕을 쓰면 안 됩니다. 표부 상부의 열이면 양격산화탕으로 합니다. 그러나 우울 심장 심계등의 문제는 리열입니다. 그래서 리열을 사하는 사백산을 사용해야합니다. 사백산에 황련 치자 각1돈 위경련이 있으므로 목단피 3푼도 가해야 됩니다.

* 어린 아이의 야경증(한증의 비염동반)

독활지황탕(가 인동 연교 각 한 돈) 가 치자 황련으로 심화를 사해 보세요 ==> (독활지황탕가 인동 연교 각 한 돈) 加 치자 황련 시호 박하 각 오피온으로 현저한

효과를 보다.

■ 腰膝疾患

- 중기가 회복되면 사지의 냉증은 따라서 좋아진다. 강활 지골피를 한돈반 가하면 사지의 증상이 없어지고 인동연교를 한돈 가하면 대변을 매일 보게된다.
- 소양인 관절염에 황백이 가장 중요하다. 강활 지골피를 한돈 이상 가미한다.
- **슬관절 질환에 강활 지골피**를 쓰는데 한돈반을 쓰는 것이 좋다.
- 열증 관절염에 형방사백산에 강활 독활을 두돈씩 높여 쓰면 변비되는 경우도 있다.
- 낭습 슬관절염 자궁질환 등에는 강활 독활을 한돈반(대강활탕)으로 올려서 하행시킨다.

1) **한증- 독활지황탕가 강활 지골피 1.5/** 어혈이 의심되면 우슬도 넣을 수 있다/ 인동 연교(변비의 정도에 따라서0.5-2.0 청열목적. 임상례에서)

2) **열증- 사백산가 지골피**가 열증의 소양인의 하지통에 좋다. 신통에 강활 독활도 잘 듣지만 지골피가 좋다. 패독산에도 지골피가 있다. 형개를 빼야 한다. 지절통과 관계가 없고 위로 작용하도록 하기 때문이다. 반대로 인후통이 있을 때는 형개 현삼을 반드시 넣어야 한다(임상례에서).

* 소양인 통증일반

강활 독활로 거습 지통하는 작용을 노리고....생지황으로 청열 활혈... 저령 차전자로 청열 이습..황백이 소양인의 붓는 관절염에 가장 잘 듣습니다. 증에 따라서 적복령 택사 방기 등도 사용합니다. 방기는 유독하므로 사용에 신중을 기하시고 웬만하면 요즘나오는 방기는 쓰지않는것이 좋습니다.
관절이 부었을때 방기 황백이 가장 효과적이긴 합니다. 방기 썼다가 패증난 적이 좀 있습니다.

* 열증 네 번째 발가락의 통증, 좌측 종아리가 밤마다 저리다, 야간뇨 3회.

형방사백산을 기본방으로 하고, 종아리가 밤마다 저린 증상은 강활 지골피 각 한돈반, 독활 두돈이면 충분하다. 야간의 소변빈삭은 토사자 가구자(구기자?)로 신을 따뜻하게 해주면 된다. 신기의 허한이 원인이다. 모두 하초의 증상을 보이므로

형개를 거하는 것이 좋다. 형개는 상부로만 작용하고 지절통과는 무관하다.

*** 한증. 관절류머티스**

- 장이 안 좋고 가스가 찬다. 소화 안 되면 관절이 더 안 좋아짐. 독활지황탕가
강활 지골피 각 한돈반, 인동등이 지절통에 좋다. 인동등을 1-1.5돈 금은화도
한돈 쓸 수 있다.

■ 수족냉증

- 1) 열증- 형방사백산가감방으로 이열을 다스려야
- 2) 한증- 脾主四末. 독활지황탕.

*** 열증, 수족냉증, 오한**

소화는 잘 되고 대변은 이삼일에 한번. 불면, 지속적인 피로, 음부소양,
피부건조==> 수족냉증은 중기의 문제이다. 사백산에 불면이 있으므로 황련
치자 박하도 각 한 돈씩 가한다. 이삼일에 한번씩 변을 본다 했으므로 목단피는
가하지 않는다.

*** 한증**

소화곤란을 동반하는 수족냉증. 심계. 목이 잘 뭉치고 어깨통증.
독활지황탕 가 강활 지골피 각 한돈 반

■ 수지동통

소양인 한증의 류머티스관절염에 형방지황탕가 지골피 치자 황련 인동 연교의
가감여부에 대한 물음에 대해

- 황련은 심화 위화를 사하고 치자는 심화 삼초의 화를 사합니다. 즉 이것은 쉬운 말로 내부 장기의 열을 사하는 것이고 인동연교는 피부 경락등 표부의 열을 사하는 약이 됩니다. 관절에는 황백이 가장 중요하고 생지황도 열과 염증을 내려줍니다. 그리고 강활이 중요한 약이 되겠습니다. 독활지황탕에 강활 지골피 1돈반 황백1-2돈 금은화 등을 가하시는 것이 좋을 듯 합니다. 그리고 시호도 어혈의 개념에서 중요합니다.(1.5돈) 생지황도1돈정도 꼭 가하시는 것이 좋겠습니다.

* 소양인의 통풍

강활 독활로 거습 지통하는 작용을 노리고....생지황으로 청열 활혈... 저령 차전자로 청열 이습..황백이 소양인의 붓는 관절염에 가장 잘 듣습니다. 증에 따라서 적복령 택사 방기 등도 사용합니다. 방기는 유독하므로 사용에 신중을 기하시고 웬만하면 요즘나오는 방기는 쓰지않는것이 좋습니다. 관절이 부었을때 방기 황백이 가장 효과적이긴 합니다. 방기썰다가 패증난 적이 좀 있습니다.

■ 오십견

한증의 경우, 독활지황탕가 인동 연교 각 한돈, 강활 지골피 각 한돈반을 쓰고 싶다는 의견에 대하여
==> 야간통이 심하면 어혈약(시호 자초)등을 가한다.

* 임상례

65세의 여성. 극심한 좌측 견관절 통증. 한증. 독활지황탕 가 강활 지골피 시호 각 한돈 반. 한제로 잠도 못 자고 입도 부르틀 것 같이 심하던 통증 소실.

■ 소양인 보약

- 소양인도 열증인데도 보신할 목적으로 육미지황탕을 쓰는 경우도 있다. 그런 경우는 물론 다른 찬 약을 더 넣어야 한다. 가미육미지황탕은 방로 주독 외감이 겹친 경우.
- 열자의 경우는 형방사백산가 치자 황련으로 이열을 사하고 변이 묽으면 목단피를 0.3-0.5가한다. 한자의 경우는 독활지황탕으로 중기를 회복한다. 하초가 허한하면 구기자 복분자 토사자를 쓴다.

* 무기력에 대한 언급

근래 신경을 많이 쓰고 피로가 있는 후 기력이 많이 저하되어 왔습니다.

가끔 어지러움이 있고 심계, 불안이 있습니다. 잠도 쉽게 못 듭니다.

변은 1일 1회씩 무르게 봅니다. 가스가 뽀글뽀글 찬 적이 있습니다.

독활지황탕 원방만 쓸까요? 아니면 심장약을 좀 써주는게 좋을까요?

답)
소양인이 확실합니다. 대변이 무르면 형방지황탕에 황련 치자 각1.0 가하시고 목통은 쓰지 마세요. 보를 더 적극적으로 하려면 숙지황을 1-2돈 더 가하시면 좋습니다. 땀이 많으면 지모 황백0.5씩 가하세요. 소화장애도 있으면 목단피 1.0가하세요.

■ 혈증

십이미지황탕. 코피 나는 경우. 형개 방풍이 위로 작용하므로 들어간 것임.

■ 당뇨병

- 당뇨병의 핵심은 황련 치자. 황련 치자가 심화를 사해준다. 어떤 약을 쓰더라도 황련 치자를 쓴다. 안 쓰면 일단 혈당이 떨어지지 않는다. 태음인은 대황.
- 남자의 낭습증, 여자의 백음백탁, 골반내부질환에 숙지황고삼탕(하소).

소양인 당뇨 고혈압

열: 形防瀉白散 + 木通2, 黃蓮, 梔子. 荊芥, 防風을 1돈반으로 증량하는게 좋다.

열 조장이 두려우면 羌活, 獨活 뺄 수 있고, 땀 있으면 黃栢 (지모) 추가.

涼膈散火湯이 들을것 같지만 茯苓, 澤瀉 있어야 되므로 形防瀉白散을 쓰는 것이다.

한: 荊防地黃湯 + 木通1, 黃蓮, 梔子.

黃蓮 단미로도 혈당 조절 가능하다. 장복하면 혈압도 떨어진다.

■ 비만

- 소양인 비만의 핵심은 위열을 사하는 황련

■ 이명

잘 붓고 설사까지 잘 하면 (변이 묽으면) 형방지황탕이 제격인데 보신하려면 숙지황을 1돈 증량할 수 있고 땀이 많고 소변이 붉으면 지모 황백을 가합니다. 이명도 풍열이 뜨거나 신허가 원인이기 때문에 형계방풍을 5푼 더 증량할 수 있고 황련 치자 목통 등으로 심화를 직접 사해야 하는 경우도 있습니다. 소화상태가 나쁘면 목단피를 가합니다.(목단피는 식적과 어혈에 작용) 형방지황탕을 보음해서 설사를 치료 합니다(음허설에 사용)

<태음인>

1. 태음인의 판별

性情

- 태음인에게는 好好之心이 있다. 하고 싶은 것을 못하게 하는 것을 참지 못한다. 하지만 싫은 것을 잘 참는다. 하고 싶은 것을 하게만 하면 관계가 위기에 빠지는 않는다.
- 태양인은 솔직하고 시원시원하다. 노골적이고, 필요한 것이 있으면 집에 와서 내 놓으라고 하는데 한번 거절하면 다음부터는 그 말을 안 한다. 태음인의 경우는 노골적으로 표현을 못한다. 마음은 굴뚝같아도 차마 말을 못한다. 음인이기 때문에 자기 마음을 드러내지 않는다. 그래서 태음인이 미덕도 있고 답답하기도 하다. 빙빙 돌리면서 핵심적인 말을 잘 하지 못한다.
- 태양인은 쓸데없는 이야기를 하면 기분 나쁘는데 태음인은 직설적이면 기분 나쁘다고한다.
- 음인은 과거지향적. 과거에 이렇게 할 걸 하고 뗄어버리지 못한다.
- 태양인이 시원시원하고 노골적인데 비해 태음인은 자신이 원하는 것을 노골적으로 내색을 못한다. 마음은 굴뚝같아도 차마 말을 못한다. 자기 마음을 드러내지 않는다. 미덕도 있고 답답하기도 하다.
- 생각 노출이 잘 안 된다. 포커페이스가 가능하다.
- 시간성, 공간성, 침착하게 과거의 실수를 기억해서 다시 반복하지 않는 것이 음인들이 잘 하는 것이다. 태양인은 생각하는 순간 바로 행동과 연결되고 소양인은 약간 눈치를 본다.
- 바탕이 자본주의자. 있는 사람을 인정하는 것이 태음인이다.
- 경험해보지 않은 것에 대한 막연한 두려움이 있어서 예를 들어 한의원에 처음 들어오면 쫓아 있는 모습을 보인다(怯心)
- 예의가 발달. 아버지가 잘 못 했는데도 차마 지적을 못한다. 소양인은 지적을 하고 태양인은 호로자식과 같을 때도 있다.
- 소양인 태음인은 비위가 발달했으므로 부족한 것을 못 참는다. 따라서 물건을 사도 많이 사고 음식을 만들어도 많이 만든다.
- 재물을 탐하는 경향.
- 好好之心. 똑 같은 부하가 있으면 고향후배에게 점수를 더 준다. 반면, 태양인은 대단히 공평무사하다.
- 지구력이 대단하다. 노름하면 제일 오래 할 수 있다. 굶은 허리에서 나오는 힘이다.

- 새로운 환경에 적응을 잘 못하고 몇 년 지나서 손에 잡히면 그때부터 잘 한다. 시간이 갈수록 잘 하는 것이 태음인.
- 태양인은 이야기하면 화끈하게 하고 안 되면 얹어버리지만 태음인은 저 사람이 언제 얘기하면 내 얘기를 들어줄까 하고 죽치고 기다린다.
- 태음인은 기를 죽여도 별 변동이 없다. 꾀꾀하게 엉겨 붙는다.
- 태음인은 수영을 하는 것이 별로 좋지 않다. 땀이 안 나고 열을 안으로 축적하기 때문이다.- 소음인은 계산성 사색적 예민성 소양인은 순발력 행동력 모험심 의협심 자유분방함...태양인은 무게확성, 즉각적이므로...태음인은 지구력 계획성. 소음인은 질서, 소양인은 무질서....소음인은 계획이 없으면 불안해한다.

몸의 특성

1. 얼굴의 윤곽

- 이목구비가 다 크고 짝 찬 느낌이다.
- 이목구비가 오밀조밀하지 않고 멀다. 원심력을 받아 이목구비가 멀리 퍼져있다.
- 목이 두꺼워서 머리의 폭과 목의 폭이 일치하는 경우도 있다.
- 아래위로 다 발달하고, 좌우로도 발달한다.
- 생긴 모양이 고무마처럼 중간이 볼록한 스타일이 많다. 태음인이 몸매가 중간 허리가 발달하는 것처럼 얼굴도 중간이 발달하기 때문이다.
- 얼굴이 음양이 다 성하기 때문에 이마가 짝 찬 모양으로 끝까지 짝 퍼진 느낌이다. 소음인은 짝 찬 느낌은 안 준다.
- 이목구비가 다 크고 짝 찬 느낌이다.
- 소음인은 광대뼈가 커지기 힘들다. 관골이 큰 경우가 대단히 드물다. 소양인은 관골이 퍼진 느낌이 있다. 태음인도 관골이 퍼졌는데 소양인의 관골은 짝 퍼져서 평면으로 퍼지지만 태음인은 볼록하게 퍼진다. 소양인은 五臟이 납작한듯하고 태음인은 울퉁불퉁하다. 관골은 기세다. 기허한 소음인은 관골이 커지기 어렵다.
- 소양인은 한 쪽으로 물리거나 판판해지거나 아기자기 오목조목해진다. 태음인은 이목구비가 떨어지고 크고 강하고 관골이 볼륨감이 있다.
- 머리가 작다(상대적으로 목과 허리가 굵다)
- 얼굴이 상하로 길다
- 코메디언 정선희는 태음인이다.

2. 이마

- 태음인의 이마(미간?)는 돌출되어 있다. 태음인의 이마(미간?)는 우산이다.
- 이마가 돌출하고 넓적하고 사방으로 짝 퍼져있다. 소음인 이마는 넓으면 둥글면서 순하게 넘어간다. 소양인은 딱 물려 순하지 않다.
- 태음인은 이마가 가장 넓적하다.
- 이마가 처음부터 주저앉으면서 뒤로 넘어간다.
- 미륵골이 나오면 태음인. 미륵골이 발달.
- 복간형 이마(간을 덮어놓은 것 같은 각지지 않은 라운드한 이마. 각지거나 모난 것이 없이 매끈하게 깎아놓은 듯한 모양).
- 미간에 500원짜리 동전이 놓인 듯

3. 눈

- 소양인의 눈빛이 매서운 것이 아니다. 화사한 새눈 같다는 표현을 쓴다. 태음인이 안검이 두텁고 찌지고 무서워 보이는 눈이 많다. 그러나 막상 말을 해보면 순하고 인정이 많고 사람이 좋다는 느낌을 받게 된다.
- 눈빛이 강렬하지 않다. 소 눈
- 웃으면 대단히 마음 좋아 보이기도 하고 화를 대단히 엄하게 무서워 보이는 특징을 가지고 있다. 실제로 성격도 그렇다.
- 태음인은 눈꺼풀이 발달하고 태양인은 눈동자가 발달한다. 태양인의 눈은 눈매를 보고 알아야 하는데 이 앞에서 거짓말하다가는 죽겠구나 하는 느낌이 드는 눈매다. 소양인은 안검이 얇고 새눈 같은 것이 양인이다. 소양인은 눈이 그리 강하지 않다. 눈이 아주 화사하고 예쁘고 귀엽고 반짝거린다.

- 눈빛이 흐리고 코가 약하지 않습니다. 태음인이 확실한 것 같습니다. 눈빛이 흐리고 뭘 생각하는지 모를 듯한 눈빛이 태음인의 눈빛입니다. 안광이 없으면서 안검도 매우 두껍군요. 소양인의 눈은 이렇게 갑갑하지 않습니다. 경쾌하고 명량한 눈빛입니다. 하여튼 태음인이 확실해 보입니다. 안검이 두텁고 찌어진 몽골리안 눈이 태음인의 눈꺼풀이라고 생각 하시면 됩니다

- 태음인입니다. 두터운 안검, 찌진 눈 태음인 열증입니다.

4 코

* 샤프한 것은 산근이 강한 것이 아니다. 둥근 것이 강한 것이다. 이는 턱이나 다른 부분도 마찬가지다.

- 소양인 태음인은 돼지코가 많은 듯하다. 열발산에 유리하므로.
- 태음인은 코가 크다. 작아도 코가 뾰족하거나 작으면서도 넓게 생겼다.
- 태음인의 코가 뭉툭한 경우는 잘 없다. 코의 아래위가 다 발달한다. 코가 길고 강하고 발달되고 코가 잘 생기면 태음인이 가장 잘 생겼다. 눈치 안보고 쪽 뺏는다.
- 모양이 통통하고 전체 비중에 비해 차지하는 비중이 크다.
- 산근이 완전히 없어지는 경우도 있다.
- 태음인 중에 산근이 확 꺼진 사람도 많다. 소양인은 그래도 자세히 보면 뭔가가 있다. 흔적은 남긴다. 소음인은 코끝이 뾰족해지고 발달되어 있고 산근이 현저하게 약해진다. 코가 올라갈수록 가늘어지고 가늘어지면서 뾰족해진다. 가늘다는 것은 약하다는 말이다. 소음인은 코가 뾰족하다기 보다는 끝에 뭔가 여유가 있는 것이다. 태음인도 물론 끝이 발달이 되는데 너무 발달이 되어서 못 생겨지고 태양인은 가다가 죽어버려서 못 생겨지고 소양인은 코가 짧고 기세가 끝까지 안 내려오니까 못 생겨지는 것이다. 소음인은 산근이 확 죽으면 못 생겨지는 것이다.
- 산근은 중간 정도. 전체 크기는 얼굴 전체 길이의 절반 정도. 전혀 없다가 갑자기 시작되는 코모양은 태음인. 작아도 기세가 있다.
- 화살코는 太陰人이 많으며 적어도 少陰人이 가능. 少陽人은 없다.
- 산근이 소양인보다는 약하지만 소음인 만큼 약하지는 않다.
- 산근도 강하고 코끝의 기세도 약하지 않다.

5 입

- 입술이 흑인처럼 뒤집어진 사람은 태음인이 많다. 태음인이 입을 다물면 다문 입이 아주 강하다. 소음인은 아무리 꼭 다물어도 맵시있고 차분하게 닫히는데 태음인이 입을 닫으면 안 열릴 것처럼 보인다. 음양이 俱盛하므로 의지가 강해 보인다.
- 입술이 발달된 태음인이 많다. 두툼하다.
- 상하순이 아주 비슷한데 보기 싫을 정도로 아주 두툼한 사람도 있다.
- 구봉서(서경석?) 같은 화살코는 태음인이 많다. 길게 내려와 끝이 그렇게 된 경우는 태음인이 많다. 적어도 소음인은 꽤야 화살코가 가능하다. 소양인은 길이

가 짧고 뭉툭하니 화살코가 절대 될 수가 없다.

- 인중의 길이는 아무래도 소음인 태음인이 강하다.
- 태음인도 입술이 들리지 않는다. 두텁고 의지가 강해보이는 입.
- 소음인은 입이 크더라도 잘 매듭이 지어지고 자연스럽다. 입이 너무 커서 못 생겨지면 태음인이다.

6 턱

- 下顎이 厚하지 않은 편이다. 밑으로 빠졌기 때문에 밑으로 내려왔으니까 厚하지 않다.

7 체격

- 가슴이 나왔지만 소양인처럼 대흉근이 시원하게 어깨까지 흐르는 것이 아니고 중부 부위에서 함몰된다.
- 목이 잘 쉰다.
- 태양성은 어깨가 넓고 태음성은 어깨가 좁다.
- 가슴을 위에서 보았을 때 앞이 불룩하면 태음성이고 뒤가 불룩하면 태양성이다.
- 뚱뚱한 경우에 우악스러워 보이면 소양인이고, 미련스러워 보이면 태음인이다.
- 목이 굽고 어깨가 처짐
- 어깨가 좁고 뒷등이 평평하다.

8 기타

- 발목이 굽은 편이다. 발목이 가늘어도 살이 있는 듯이 보인다.
- 태음인은 중대둔근이 발달되어 오래 앉아 있을 수 있다.
- 엉덩이의 중대둔근이 발달되어 허리띠가 흘러내리지 않는다. 청바지를 입으면 엉덩이가 딱 달라붙고 불룩하다. 보기 좋게 위로 달라붙은 것이 태음인이다. 태양인은 여기가 헐렁헐렁하다. 여기가 기혈의 탱크이다.
- 소음인은 엉덩이가 발달하면 딱 벌어지고, 태음인은 엉덩이가 발달하면 위쪽의 중대둔근 있는 부위가 발달한다.
- 반신욕이나 사우나를 하면 좋다.
- 살이 찌도 허리 옆 방향으로 살찐다.
- 피부는 얇은데 피하는 제일 발달되어 있다. 도톰한 느낌을 준다. 피부는 매끄럽고 질기지 않은데 지방층이 발달해서 도톰한 느낌을 준다. 땀구멍이 보인다. 피부를 집으면 넓게 집어야 잡힌다. 피부를 잡으면 돼지껍질같이 두텁게 잡힌다.

단, 너무 마른 사람이 비만한사람은 제외한다.

- 태양성은 목소리가 고음이고 아주 실하고 유력하지만 태음성은 태음이므로 목소리가 무력하고 시원시원하지 못하다. 답답하다. 음역이 좁고 톤이 낮다.
- 목욕탕에서 오래 건딘다.

9 약과 음식에 대한 반응

- 소양인 약을 먹으면 기능저하와 함께 취한 반응이 온다.
- 소음인 약을 먹으면 기능향진과 함께 취한 반응.
- 태양인 약을 먹으면 대체로 변비가 온다. 가장 심한 것이 소양인.
- 태음인이 링게르를 맞으면 중독되는 경우도 있다.
- 태음인은 배추 상추를 먹지 않는다. 담즙배출이 되지 않기 때문이다.
- **수박과 배는 태음인 음식이다.**
- 고기를 먹이는 것이 좋다. 특히 소고기.
- 토마토는 먹지 않는다. 장출혈이 생기는 경우도 있다.
- 태음인은 잎야채만 안 먹어도 좋아진다. 비린거, 포도 등이 안 좋음. **조개와 해물이 해롭다. 등 푸른 생선(고등어)도 안 좋다. 소고기는 좋음. 등 푸른 생선은 태양인에게 대단히 좋다. 누에는 태양인에게 좋은데 태음인은 번데기만 먹고도 체한다.**
- **소고기 콩 두부 등이 좋으니 이것을 집중적으로 먹으라고 한다. 고추 마늘...태음인에게 유익하다.**
- 少陰人은 보리 먹으면 속이 끓고 돼지고기 먹으면 설사. 참외, 오이는 사하지 제. 少陽人은 찹쌀음식 먹으면 소화가 오래 안 되고 쓰리다. 닭고기, 귤, 사과. 少陽人 아기는 귤 소화 안 되고 그대로 나온다고.
- 太陰人은 토마토 오래 먹고 장출혈. 초콜렛 먹으면 안 좋다.
- 태음인에 사백산 쓰면 설사만 한다.

* 체질별 약물에 대한 반응(유주열)

소양인은 태음인약 소음인약 태양인약을 먹으면 기능이 향진한다.

태음인은 소음인약을 먹으면 기능향진한다.

태양인은 소음인약을 먹으면 기능향진한다.

소음인은 태음인약, 소양인약, 태양인약을 먹으면 기능저하한다.

태양인은 소양인약 먹으면 기능저하한다.

태음인은 소양인약 먹으면 기능저하한다.

태음인약을 태양인이 복용하거나 태양인약을 태음인이 복용하면 항상 기능항진 반응과 함께 기능저하 반응으로 역작용이 나타난다.

그렇다면 강한 순서가 소음인 < 태양인 = 태음인 < 소양인의 순서인가?

기능항진 반응은 不眠 胸煩 便秘 頭痛 口乾

10. 맥을 통한 확인

- 부침에서 똑같이 느껴진다. 소양인은 갈수록 맥이 작아진다. 그래도 계속해서 뛰기 때문에 有神한 맥이 된다. 태음인 맥은 기타줄을 만지는 느낌으로 옆으로도 느껴지는데 소양인은 옆으로는 안 느껴지고 손가락 밑에서만 느껴진다. 태음인의 맥은 굵기가 훨씬 굵고 두툼하고 튼실한 동아줄처럼 느껴진다. 소양인은 가늘고 질기고 활발한 느낌, 회초리 같은 손가락 바닥에서만 느껴지는 느낌.

태음인 소양인 맥에도 가는 맥이 있는데 그래도 有神하면서 沈에서도 같으면 태음인이고 갈수록 좁아지면 소양인이다. 척맥은 끝까지 느껴져도 無神에 해당된다.

- 소음인의 맥이 태음인의 맥보다 훨씬 길다.

* 유주열선생

2. 태음인 한열, 표리, 병위, 처방의 관계

태음인의 한열

- 한증은 마황을 쓰면 괜찮은 사람이고, 열증은 마황을 먹으면 안 되는 사람이다.
- 태음인의 한열은 대체로 대변의 양상으로 잘 구별된다. 한증은 평생에 변을 못 본 적이 없다. 아니면 변을 이삼일에 한번 본다 해도 별로 문제가 안 된다 혹은 거의 하루에 한번 내지 두 번은 본다 라고 한다. 열증은 하루에 한번 보던가, 건너뛰다. 두 번 보는 날은 거의 없다 술 많이 마시고 나서 설사하는 거 빼고는.... 이라고 말한다.
- 한증이 감기에 잘 걸리는 것은 맞다. 걸리면 대체로 기침 가래가 많다. 열증의 경우는 편도선이 붓는 경우가 많다.
- 한태음인은 12시에 커피를 먹어도 잘 잔다. 마황 먹어서 잠을 못자는 사람은 커피를 먹어도 잠을 자지 못한다.
- 태음인의 한열이 틀리면 체질이 틀린 이상으로 심각한 부작용이 생긴다.
- 커피 마시고 속이 쓰린 것은 위가 약한 것이지 한열과 무관하다.
- 변비의 기왕력이 없으면 한증이다.
- 속에서 안 받는 것은 한열과 무관하다.
- 커피마시고 아무 문제없다고 믿으면 안 된다. 과거 변비의 기왕력이 확실하면 열증이다. 대변상태로 재삼 확인해야 한다. 커피만 믿지 말고 변비의 기왕력이 있으면 열증이다.
- 커피 반응이 없는 듯이 보여도 평소 대변을 하루 이틀에 한번 힘들게 봐 왔다고 한다면 열증이 가능성이 월등히 높아진다. 매일 변을 보지 못한다면 열증일 가능성이 높다는 말이다.
- 평생 하루에 두 번씩 변을 본 사람이 중풍 걸리고 난 후 이삼일에 한번씩 대변을 본다면 이는 한증에 열이 낀 경우다. 소증은 한증이고 현증은 열증이다. 한증처방에 열증약을 가한다. 결론적으로 한증이다. 커피 반응이 없으면 한증이고 평생 하루에 두 번씩 변을 봤으면 이것도 한증이다.
- 한번이라도 커피에 대해 불면의 반응을 보였거나 대변을 매일 못 보거나 대변을 오래 보면 열증이다.
- 커피 반응과 변비 중 하나라도 포지티브라면 열증이다. 변비라는 말에 구애받지 말고 대변을 매일 보는지가 한열판단의 관건이다.
- 대변을 2-3일에 한번씩 내내 봐 왔는데 커피에 대한 반응이 없다면 한증으로 볼

것인가, 열증으로 볼 것인가?--> (안) 열증으로 보아야 한다. 한증도 예외적으로 2-3일에 한번씩 보는 경우가 있지만 일시적인 것이고 장기적이지는 않다.

- 마황에 부작용이 나면 태음인 한증이 아니다. 불면증이나 다한에도 마황을 빼면 안 된다. 마황을 원방대로 써야 한다. 태음인 한증에 마황을 빼면 약효가 확 줄어든다.
- 커피가 수면에 영향을 주지 않더라도 변비의 기왕력이 있거나 현재 매일 변을 안 보면 열증이다.

* 소양인 열증의 환자에게 숙지황, 산수유를 쓸 수 있느냐는 물음에 대하여

==> 소증이 열이라도 현증이 한이면 한을 제거해야 합니다. 그래서 열증환자에게도 숙지황 산수유를 쓰는 경우가 있습니다. 그래야만 병증이 제거됩니다. 태음인도 마찬가지입니다. 열증도 현증에서 한이 보이면 마황 의이인 등을 가합니다. 그래서 8상의학이 아니고 4상의학입니다. 한열은 자유롭게 넘나드는 것이어서 4개의 바운더리에서 논해야 됩니다.

주요처방 정리

한 증 인	처 방	처방의 활용(처방량의 단위는 錢)
한	마황 발표 탕	길경3 마황1.5 맥문동 황금 행인 각1돈 태음인 한증의 오한발열, 표증 초기감기 에 사용. 가래 기침이 나올 때는 쓰지 않는다. 이럴 때는 반표반리 상부까지 들어온 상태로서 한다열소탕 을 써야한다.
	한 다 열 소 탕	의이인3 나복자2 맥문동 길경 황금 행인 마황 각1돈 건울7개(3돈). 오한발열을 지나 가래 기침 으로 넘어간 상태에서 사용함. 표와 리에 걸쳐진 처방이다. * 숨이 차거나 자지러지게 기침하면 은행(백과)이 숨찬 정도에 따라 한돈에서 세돈 들어간다. 은행은 반드시 초해야 한다. * 오십견, 목디스크, 팔다리 저린데 조각자 위령선 녹각 해동피 상지....홍화 등의 어혈약이 들어간다. 녹각이 좋다 * 열증의 오십견에는 갈근해기탕에 석창포 조각자 마황으로 피부를 열어주고 땀을 내야 낫는다.

	태음조위탕	의이인 건을 각3, 나복자2 오미자 맥문동 석창포 길경 마황 각1돈 리병에 해당, 비위에 국한되어 태음인 한증의 내부를 다스림(나복자 두돈), 有食後痞滿, 有泄瀉病 表寒證泄瀉 표에서 병이 더 깊어져서 입맛이 없고 가래 기침은 있을 수도 없을 수도 있는데 이때 쓰는 것이 태음조위탕. 여기에 갈근2돈 승마 한돈을 넣어서 양명으로 확실하게 인정시켜 주는 의미로 많이 쓰는데 이것은 갈근해기탕이나 열다한소탕의 의미로 한열이 협착되었을 때 쓴다. 이렇게 쓰는 것이 90%, 왜냐하면 염증성 질환을 동반하는 경우가 많기 때문. 비염이나 알러지성 결막염은 갈근 승마로 충분히 해결된다. 중이염에는 약을 월등히 세게 쓴다. * 비위의 문제로 인한 두통 등은 비위를 다스리는 태음조위탕에 갈근 승마를 쓸 수도 있고 황금을 넣어서 쓸 수도 있다. * 눈병에는 건을1.5 갈근2 승마1 포공영1돈. 熱症加 대황(정상이면 반돈, 변비끼 있으면 한돈), 황련(눈병에는 황련이 좋다) * 한증의 여드름에 의이인 건을 줄이고 갈근 두돈 승마 한돈, 황금을 가하기도 하고, 깊이 생긴 여드름에는 조각자, 포공영을 가함
	조위승청탕	의이인 건을 각3 나복자1.5 마황 길경 천문동 오미자 석창포 원지 천문동 산조인 용안육 각1전. 태음조위탕에 용안육 산조인 천문동 원지가 들어가고 나복자가 1.5돈으로 감량(비위문제가 기본적으로 있으면서 심장까지 작용) * 심계 불안 정충 두통 불안 초조 스트레스로 인한 심인성질환 乘-비위기능을 다스리고, 淸-심장의 기능을 淸해준다. * 부종을 다스리고 배가 갑자기 부르고 또 금방 배고픈 듯한 느낌이 있는 소화장애 * 눈병에는 가 포공영 갈근 승마. 양명경의 열을 없애준다. * 실제적인 심장질환(관상동맥협착, 심계, 빈맥)에는 가 산약 백자인
	갈근 열해기탕	갈근3 황금 고본 각1.5 길경 백지 승마 각1돈. 열다한소탕에서 나복자가 안 들어간 것. 나복자가 안 들어가 있으므로 이증이 없는 경우에 쓴다. 감기에 걸려도 밥맛이 여전하고 위장장애나 설사 변비 등이 없을 때 이 처방을 쓴다. 만약 리병이 있으면 나복자 한 돈을 가해서 쓴다. 표에만 작용한다. * 열태음인의 기침에 마황 행인 상백피를 넣고 숨이 차거나 가래를 뱉어도 안 나오는 경우에는 백과를 쓴다. 변비가 있으면 대황을 가한다. * 열증 태음인의 오십견

	갈근4 황금 고본 각2 나복자 길경 승마 백지 각1돈. 육부의 병이다. 따라서 위장병에 이 처방을 쓴다. 물론 갈근조위탕이 더 잘 듣는다. 소양인같이 다리가 굵고 짧은 사람. 裏에만 작용하므로 위장관에 문제가 있는 사람에게 쓴다. 고본을 빼고 대황을 넣으면 갈근승기탕이 된다. 열다한소탕은 대변이 묽고 시원하게 안 나오는 사람에게 쓴다(대변후중). 고본이 대변을 단단하게 한다. 따라서 진짜 변비에는 고본을 빼야 한다. 熱설사를 하면 저근백피 한돈 가한다. * 열증의 여드름이 있으면 대황을 가하는데 대변이 정상이면 대황을 오피, 매일 못 보고 후중경향이 있다 하면 한돈을 가한다. 깊은 여드름에는 조각자 포공영을 가함 ◎ 다음의 질환에만 열다한소탕을 쓴다(불면). * 정신병에 대황을 가해서 쓴다. 잠을 잘 잔다 * 갱년기장애에 승마를 한돈반- 두돈을 쓴다. 다음이 황금. 승마는 면역을 잘 다스린다. * 자궁질환- 고본이 있으므로(대하?) * 비염 ===== * 열다한소탕은 청열하는 약이고 燥濕한다. 그러니까 짓무르고 습이 많은 피부병에는 잘 듣고, 가루가 떨어지고 건조한 피부병에는 잘 안 듣는다. 왜냐하면, 고본이 조습하고, 황금도 조습하기 때문이다. 참고로 황련도 조습한다. 그래서 황금 황련을 쓸 때에는 건조한 피부병에는 별로 재미를 못 보지만 짓무른 피부병에는 대단히 잘 듣는다. 따라서 질 건조증에는 쓰면 안된다. 콧물이 흐르고, 콧속이 짓무르고 하면 이 처방이 맞다. 알러지성비염이나 누런코 나와도 좋고 멀건코 나와도 좋고 콧물이 많이 나오고 습해져 있을 때 이 처방 쓰면 좋다. - 열이 있는 상태, 예컨대 열을 제거하면 낫는 비염 등에는 듣지만, 내상질환에는 안 듣는다. 내상에는 갈근조위탕을 쓴다.
청심연자탕	오장의 병(심장, 신장). 소음인 같이 다리가 미끈한 사람. 청심연자탕증인데 대변이 후중할 때는 갈근2돈 승마 한돈을 가한다. * 실제적인 심장의 질환(관상동맥협착, 빈맥, 심계...)에 쓴다. 필요에 따라서는 가감해야 하는데 변비 있으면 대황, 열이 있으면 갈근 승마를 가한다. 한증의 심장질환에는 조위승청탕에 산약 백자인을

	가한다.
갈근조위탕	갈근4 나복자2 대황 길경 오미자 맥문동 행인 각4 한열이 협착된 처방. 대황을 더 넣으면 변비까지 치료. 대황 한돈이 건비작용을 한다. 한돈 이상이 되면 사하작용. 열증이고 대변이 묽은 사람에게는 오피온. 오미자 맥문동 행인이 열을 발생시키므로 대황 한돈을 넣어야 정상이 된다. * 부기의 90%이상은 식적에서 온다. 이때 갈근조위탕이 탁월하다. 청심연자탕에 비해 훨씬 빠르게 호전된다. * 설사 과민성대장 증후군 등에도 잘 듣는다. 설사하면 대황을 일그램으로 쓰는데 안 쓰면 안 된다. 인경을 못하기 때문이다. 대황이 이담작용이 있으므로 피로회복에 대단히 좋다. - 대변을 매일 보면 원방을 쓰고, 이틀 사흘에 한번 보면 대황을 두돈, 매일보더라도 시원치 않고 더 대변을 시원하게 봤으면 좋겠다고 하면 대황량을 한돈반으로 올림. 대황을 증량하면서 설사가 날 것이라는 말을 사전에 해야 함.

주요처방 내용(용량단위는 錢)

1. 마황발표탕

길경3 마황1.5 맥문동 황금 행인 각1

2. 한다열소탕

의이인3 나복자2 맥문동 길경 황금 행인 마황 각1 건울0.7

3. 갈근해기탕

갈근3 황금 고본 각1.5 길경 승마 백지 각1

4. 태음조위탕

의이인 건울 각3 나복자2 오미자 맥문동 석창포 길경 마황 각1

5. 조위승청탕

의이인 건울 각3 나복자1.5 마황 길경 오미자 석창포 원지 맥문동 천문동 산조인 용안육 각1

6. 청심연자탕

연자육 산약 각2 맥문동 천문동 원지 석창포 산조인 용안육 백자인 황금 나복자 각1. 감국0.5

7. 연자회생탕

연자육5 맥문동3 건울 산약 각2 의이인 나복자 오미자 길경 여정실 사상자 췌양 각1

8. 열다한소탕

갈근4 황금 고본 각2 나복자 길경 승마 백지 각1

9. 갈근승기탕

갈근4 황금 대황 각2 승마 길경 백지 각1

10. 마황정천탕

마황3.5 행인1 황금 나복자 상백피 길경 맥문동 관동화 각1 백과초황 21枚.

11. 갈근조위탕

갈근4 나복자2 대황 길경 오미자 맥문동 행인 각1

12. 녹용대보탕

녹용2-4 맥문동 의이인 각1.5 산약 천문동 오미자 행인 마황 각1

3. 태음인 약물의 가감 및 질환별 처방운용

대강

- 태음인 치료에서의 관건은 조습의 대사의 조절이다. 한증은 습을 빼주는 것이고, 열증은 燥熱을 어떻게 해결할 것인가가 관건이다.
- 대부분의 동통약은 반표반리나 표약이다.
- 태음인 한증의 대표방: 태음조위탕
태음인 열증의 대표방: 갈근조위탕 (피로개선의 효과가 있다)
(비염 등 열을 제거할 때는 황금이 들어있는 열다한소탕이 더 좋다)
- 대황을 써서 설사가 나면 그 처방을 그만 써야 한다. 대황을 감량한다.

가감

- 예를 들어, 태음인 한증인 경우에 누런 콧물이 있으면 태음조위탕에 승마 갈근을 가한다. 감기가 자주 걸리지만 비위에 전혀 문제가 없으면 한다열소탕을 쓴다.
- **진윤**은 조습하는 작용이 대단히 강하다. 창출 같은 약. 동통성 질환이 있을 때는 3돈을 안 쓰고 1.5돈으로 줄인다(위장으로의 작용성을 약하게 하기 위해).

- 갈근 승마의 활용에 대해

* 보통 갈근 두 돈 승마 한 돈의 비율로 쓰면 된다.

- 1) 축농증-- 축농증이나 비염에도 된다. 태음조위탕에 갈근 승마만 딱 넣어서 써 봐도 거의 다 된다. 코 말고 콧속이 건조해서 죽겠다는 경우
- 2) 여드름-- 얼굴에 여드름 나는 것에 대해 기본은 태음조위탕가 갈근 승마로 하지만 포공영을 넣어야 한다. 깊으면 조각자를 넣어야 하고....
- 3) 구갈 두통-- 구갈, 두통에도 쓴다. 한증구갈에도 쓴다.
- 4) 대변-- 대변이 시원하게 안 나올 때도 활용. 양명부의 열을 없애주기 때문이다. 모두 양명경의 열을 없애준다는 개념에서 활용하는 것이다.
- 5) 피부질환-- 피부질환에 쓸 때 진물이 흐르면 **백선평**(백선평는 조습작용), 가렵다고 하면 **선평**...등을 가한다.
- 6) **다한증**- 다한증에도 갈근 승마를 넣어야 한다. 그것도 열이기 때문이다. 다한증에 주의해야 할 점은, 마황을 빼서는 안 된다는 것. 마황을 써야 폐의 선발지기가 강해지기 때문에 신속히 땀이 그치고 좋아진다. 갈근 승마를 쓴다는 것은, 태음조위탕에다가 열다한소탕을 반첩 넣는 의미라고 생각하면 된다.

그렇다면 태음인 열증의 다한증은?

열다한소탕, 갈근조위탕가 황금 승마 포공영등을 가한다. 대개는 갈근조위탕. 변이 힘들면 대황을 증량하고 신경증상 있으면 황금. 포공영 승마. 암보다 치료하기 힘든 것이 다한증.

* 갈근 승마를 쓰면 변이 잘 나온다. 양명열이 빠지니까.. 피부병, 두통, 상초열, 장출혈 장염....저근백피 오픈 하고 같이 써주면 대장출혈 설사 등에 잘 듣는다.

* 술 먹는 사람들은 대개 변이 좋지 않다. 태음인 한증이라면, 태음조위탕에 갈근2돈 승마1돈을 넣어서 써야한다. 황금은 되도록 조심해서 써야 하는데 왜냐하면 황금은 주로 심장열을 내리는데 쓰는 것으로서 腸과는 거리가 멀기 때문이다. 대부분 갈근, 승마를 써야 해결된다.

* 갈근보다 승마가 염증에 대단히 중요하다. 승마의 귀경이 양명경이고, 腸에도 듣고 胃에도 듣고 얼굴에도 듣는다. 안구건조증, 비염, 구갈, 구건에 다 듣는다. 갈근 승마를 써야할 경우가 많다는 것은, 쓸데없는 열이 생기면, 그것을 제거해줘야 한다는 뜻이다. 노인들의 경우 고혈압이나 당뇨약을 좀 먹었다 하면, 이미 속이 망가져 있고, 쓸데없는 열이 생겨져 있는 것으로 보면 된다. 그걸 제거해주는 의미도 된다.

- 승마에 대해

관절염에도 승마를 쓰면 듣는다. 한돈반 정도 쓴다. 얼굴질환에 쓸 때는 한 돈 정도 쓴다. 염증으로 인해 조직이 손상되었을 때 가라앉혀 주는 것이다.

- 아이의 경우에는 어렸을 때의 소증을 확인해야 한다.

- 석창포에 대해

석창포는 목소리 쉴 때 한 돈에서 세 돈까지 쓴다. 급성으로 쉴 때는 다섯 돈까지 쓴다. 보통은 한 돈에서 세 돈까지 쓰는데 보약을 지을 때 목이 잘 쉰다고 하면 한 돈 정도 넣어주면 목이 덜 쉰다고 한다.

- 언어장애(언어불통, 중풍, 언어불리....)에는 **석창포**를 반드시 가한다(연자청회탕)

- 당뇨의 경우에는 포공영을 꼭 넣는다.

- 포공영은 상중하초의 열을 모두 다스리는 역할을 한다.

- **해동피 상지 속단 포황** 이런 것들은 모두 태음인약이다. 산후어혈이면 포황을

쓴다. 허리 아프면 속단 두돈. 신경통에 중요한 것은 **위령선**. 상하지 다 잘 듣는다. 오십견 목디스크 팔 저린데 무릎 쭈시고 아플 때 쓴다.

- **대황**(갈근조위탕에서)

한 돈이면 건비작용을 한다. 한 돈 이상이면 사하작용. 대변이 묽으면서도 열증인 사람에게는 오피온으로 줄인다. 변비가 있으면 두돈 이상 쓰기도...왜냐하면 오미자 맥문동 행인 이 세 가지가 열을 발생시키므로 대황 한돈을 넣어야 정상이 된다. 변비 있으면서 하초에 어혈이 있을 때는 과혈작용을 한다(포황보다 더 중요하다).

- 열증약에 한증약 마황 행인 상백피 등이 들어갈 때 대황을 5분을 가미한다. 변비가 있으면 한돈

- 태음인 어혈에 **조각자**. 삼황탕.

- 여성들의 자궁질환에 **여정실, 사상자, 쇄양**을 반드시 가한다. 한증에는 태음조위탕이나 조위승청탕에 가미할 수 있다. 남자들의 경우에는 낭습에 쓴다(연자회생탕).

- 산약 연자육으로 補腎하면 소변이나 잠의 문제가 해결된다.

- 호장근은 태음인의 습열을 사한다.

- 라복자는 추말해서 사용한다. 한증의 경우는 초해서 추말하는 것도 좋다. 행인은 거침하고 거피하는 것이 원칙이지만 거침만 한다. 도인은 추말. 대황은 후하지 않고 끓고 한 시간으로 제한하고 있다. 기본적으로 마황이 든 약은 한시간 이상 다리면 안 된다.

- **대황에 대해**

당고특대황은 사하작용이 강하므로 변비에 쓴다. 장엽대황은 이담작용이 강하므로 피로에 쓴다.

- **녹용**은 한증약이므로 열증에는 5푼 이하만 쓴다.

질환별 정리

■ 감기

* 감기 걸렸을 때

1. 열증인 아이: 열나고, 목붓고, 인후통
2. 한증인 아이: 가래, 기침으로 진행
3. 한열착잡: 설사하면서 편도선은 부음. 한증약에 열증약을 가미

* 감기증상이 가래 기침만 있고 축고 떨림이 없다고 할 때 한다열소탕을 쓴다. 오한 신체통이 없고 잠 못 잘 정도로 기침을 하고, 밥도 잘 먹고 아무 문제도 없는데, 가래 기침이 간질거리고 견디기 어려우면 한의원에 오는데 그때 쓰는 것이 한다열소탕이다. 오한이 있을 때 쓰는 처방은 마황발표탕.

한다열소탕은 한증이고, 열증 즉 커피 먹고 잠이 안 온다고 하면, 열증에 쓰는 자완이 들어간 처방(?)을 쓴다.

1) 한증- 한다열소탕(기침이 심하면 백과초 1-3돈을 가한다)

2) 열증- 갈근승기탕(중초를 고려해서 나복자를 넣으면 더 좋다).

특히 기침에 좋다. 병이 있으면 많이 먹어도 설사를 안 한다. 감기로 인한 가래 기침 인후통 또는 한열감등. 갈근승기탕을 1-2일 쓰고 갈근조위탕에 녹용을 쓰는 것이 좋다. 외감이 완전히 정리됐으면 바로 갈근조위탕으로 가면 된다.

* 급증의 경우에는 한열불문하고 갈근승기탕을 쓴다. 몸살 오한 발열 두통 비색 후비루 가래 기침 등의 증상에도....한증인 경우에도 實邪가 있으면 쓸 수 있다. 설사가 나면 치료가 끝난 것이다. 초기의 오한에도 (갈근해기탕 가감방보다는) 갈근승기탕이 낫다. 갈근승기탕으로 몸이 따뜻해진다. 가래 기침 콧물 모두 해결. 심지어 천식환자의 경우, 천명음도 사라진다. 갈근승기탕에 승마 백지 갈근 등이 있어서 처음부터 피부를 열어서 표사를 다스릴 수 있는 것 같다.

* 태음인은 오한 발열 신통단계에서 인후통 가래 기침 등으로 까지 병이 진행된 경우까지 한열불문하고 모두 갈근승기탕으로 해결됨. 하지만 소양인의 경우에는 오한이 있을 경우에는 (한열불문하고) 폐독산을 먼저 쓰고 오한이 사라지고 나면 한열불문하고 지황백호탕을 쓴다. 오한이 있을 때 지황백호탕을 쓰면 표한이 있는 상태에서 리열을 제거해서 중기의 下陷을 가져와 감기가 더 오래 가는 것이다.

■ 고열

고열이 나는 어린이들이 원인불명으로 열이 나는 경우가 많다. 이럴 경우에 갈근승기탕을 사용함. 열이 대단히 빨리 떨어짐. 열이 떨어지면 약을 중단하고 조리하는 방향으로 약을 쓴다. 열증이면 열다한소탕, 한증이면 태음조위탕가 갈근승마(로 조리한다?). 갈근승기탕은 외감약, 따라서 대변이 정상인 사람에게 쓰는 것이다. 설사를 하기 시작하면 그때부터 열이 다 떨어진 것으로 보면 된다.

■ 해수

1) **한증해수**- 기침가래 나올 때는 한다열소탕. 이는 병이 기관지까지 들어온 상

태이므로 한다열소탕을 써야한다. 이 처방은 천식까지 가능하고 **백과 초한 것을 1-3돈** 넣으면 가래 들러붙어 안 떨어질 때 토출시킨다.

2) 열증해수

☆**열증해수에 무조건 넣는 처방(자원청폐탕)**-- 자원 백부근 두돈, 행인 상백피 포공영 각 한돈반, 갈근 황금 길경 맥문동 각 한돈, 승마 백지 마황 각반돈. 변비기가 있는 태음인, 커피를 먹어서 잠을 못자는 태음인에게는 무조건 쓴다.

☆더 심하고 천식끼로 가는 경우에는 한증에는 녹용대보탕, 열증에는 녹용대조탕.

☆**갈근승기탕**- 자원청폐탕은 감기와 무관한 사시감모. 갈근승기탕은 외감과 관련된 모든 기침 감기 증상이 잘 듣는다. 따라서 자원청폐탕을 쓸 일이 별로 없다.

* 허로성 기침에는 녹용대보탕. 노인성기침이고 만성적인 기침이고, 예컨대, 겨울 내내 두달 했다, 3달 기침했다 하는 경우.

* 폐농양, 폐결핵, 기관지 확장증 등 실제적으로 폐조직이 손상되어가는 질환에 보폐탕. 폐가 손상된 것이 아닌데도 외감성이 아닌 가래가 노인성 가래 같은 것이 누렇게 계속 나오는 경우에, 그야말로 고름에 가까운 농에 가까운 가래가 나올 때 쓴다.

* 허로성 노인성 기침은 녹용대조탕.

* 허로로 인한 기침에 중기를 회복하는 갈근조위탕가 녹용하기도 한다.

- 열증이면서 가래가 있는 경우에는 비위와 관련이 있는 갈근조위탕을 쓸 수 있다. 갈근조위탕은 내상약이다.

- 양약 알려지가 기침을 유발하기도 한다. 특히 고혈압약이 알려지성 기침을 일

으키는 경우가 많다. 이런 경우는 양의사와 의논해서 고혈압약을 바꾸는 것이 필요하다. 기침 처방을 써도 안 나올 경우에는 양약 알려지도 염두에 두라.

* 열중해수

장기간 동안 반복되는 기침감기를 갈근승기탕으로 고친 다음 폐기를 돕는 처방으로 갈근조위탕에 가감하려 하는데 어찌하면 좋을지...

==> 갈근조위탕 자체가 폐기를 돕는 약이다. 오미자 맥문동 길경 행인이 모두 보폐한다. 녹용을 가하는 것이 최고다(특별히 가감할 필요 없다는 뜻으로 보임)

寒症 慢性 虛勞性 기침에는 녹용대보탕 (鹿茸 2~4돈)

熱症 慢性 虛勞性 기침에는 녹용대조탕.

* 폐결핵으로 인한 한증태음인의 각혈 처방례

- (태음조위탕보다는) 거담약이 많은 조위승청탕에 가감하는 것이 좋을 듯. 맥문동 천문동(윤폐), 갈근 승마(청열), 황금 5푼. 포공영은 쓰지 않는 것이 좋을 듯.

* 가래가 없으면 비위와 무관한 기침이고 남자는 신수부족이나 음주가 원인이라 생각하면 된다.

* 만성 기침 가래에 안선생님이 말한대로 태음조위탕가 백부근으로 저효를 보인 학생 원장의 사례.

* 기침을 10년 넘게 하는데 코가 늘 막힌다. 평생 시원하게 뚫려본 적이 없다. 코가 나오거나 넘어가거나 하지는 않는다--> 비염에 준해서 치료한다(안)

■ 천식

1) 한증

마황정천탕을 열첩 이내로 쓴다. 다음에 한다열소탕에다가 은행을 꼭 초해서 가해 써서 조리한다. 심하지 않은 것에는 한다열소탕에다가 은행 넣어서 쓴다. 은행은 초해서 3돈.

- 천명음이 있으면 마황정천탕을 먼저 쓰고(5-10일), 천명이 사라지면 한다열소탕(가래가 있으면 은행초(1-3돈)를 가함)으로 조리한다(다음에 태음조위탕으로

조리해서 재발을 막아야 한다). 천명음보다 기침이 더 심하면 진짜 천식이 아닌 것으로서 한다열소탕에 은행초 1-3돈.

2) 열증

1) 갈근해기탕가 마황 행인 상백피 비파엽 한돈, 대황오푼. ... 비위에 문제가 있으면 나복자를 써야한다. 행인 상백피가 한증약이니 열이 생기니까 대황을 넣어도 설사를 안 한다. 은행은 세돈을 넣고 행인은 볶아서 넣는다. 초기에 심한 경우에는 마황은 한돈반까지 쓰고 두 번째 쓸 때는 보통 한돈 쓴다.

2) 기침은 갈근승기탕으로 잘 해결됩니다. 그러나 천식은 좀 달라집니다. **열다한소탕에 행인 상백피 마황 대황 각 1돈 그리고 백과(은행)초 1-3돈**으로 하면 된다. 반드시 대황이 들어가야 한다.

3) 천식 정도로 심한 것이 아니므로 갈근조위탕에 녹용을 가해서 폐를 보해주면 되기도 한다. 갈근조위탕은 태음인의 리열을 제거하는 것이기 때문에 리열이 제거되면 표한은 저절로 없어지게 된다. 표한이 기침의 원인이다.

@ 임상례

태음인 열증으로 보여집니다. 처음2-3일간 갈근승기탕 쓰시고 설사시키고 난 뒤에 열다한소탕에 행인 상백피 마황 대황 각1돈씩 가하시고 증상이 사라지면 갈근조위탕에 녹용5푼 써서 중기를 회복하고 재발을 방지합니다

@ 임상례

역시 태음인이 맞는 것 같습니다. 비는 생담지원 폐는 저담지기이므로 갈근조위탕으로 변비와 소화기증상을 회복시키면 가래가 생기는 근원이 치료되는 것입니다. 자원청폐탕은 사시감모로 인한 해수에 주로 씁니다. 대황을 3-4돈 가해야 합니다.

* 허로성 노인성 기침은 녹용대조탕.

* 숨차는 것이 여전하다.

한증. 태음조위탕가 갈근2 승마1로 기침 가래 많이 좋아졌는데 맑은 콧물과 숨 차는 것이 여전하다. 천명음은 없다. 그래도 천식으로 보고 한다열소탕가 백과(초)를 하는 것이 어떨까요?--> 맑은 콧물이 많으면 마황을 두돈으로 올리고 숨이 차서 백과를 쓰는 것이 좋다. 몸이 너무 약하고 병이 오래 되었으면 태음조위탕에 황금 행인을 가하고 마황을 증량하고 백과도 가해서 쓰면 좋다 (안)--> 태음조위탕을 기본방으로 해보겠습니다.

* 열증의 천식 임상례(학생원장)

51세 여성. 기침(낮<밤), 가래가 그르렁, 숨이 차다. 감기가 작용했다고 보고
갈근승기탕, 갈근승기탕가 백과초 3돈, 맥문동4돈, 행인 상백피 각 한돈으로 별
무효. ==> 감기 치료에서 천식 치료로 전환하여, 열다한소탕 가 행인 상백피
각 두돈, 마황 대황 각 한돈, 백과초 두돈. 밤에 하는 기침이 줄어들고 숨찬 증상
호전. 가래는 잔존. ==> 명절 후로 날씨가 추워지니 다시 기침 숨찬 증상이 심
해져서 심장을 보강하고자(청심연자탕으로 숨찬 증상을 호전시킨 많은 예에서 착
안) 열다한소탕 가 행인 상백피 각 두돈, 마황 대황 각 한돈, 백과초 세돈, 산약
연자육 포공영 각 한돈 씀. 재발한 기침, 숨찬 증상, 가래 등의 모든 증상이 깨끗
하게 없어지다.

■ 비염

- 태음인에게 길경이 비염이나 축농증 중이염에 응용할 때 가장 핵심이 되는 약
물이다. 태음조위탕에 갈근 승마 포공영 비파엽 백부근 대황을 가하고 마황을 증
량하는 방법을 쓰는데 길경도 증량해야 효과가 신속하다. 열증에도 갈근조위탕에
가미할 때 길경이 가미되어야 신속한 배농효과를 얻을 수 있다.

태음인의 알려지 비염, 결막염

- 1) 한증- 태음조위탕가 갈근2 승마1 콧물이 많으면 마황5푼 추가(최종안).
- 2) 열증- 열다한소탕+ 비파엽, 포공영, 백부근1돈+ 마황(콧물을 말린다), 대황 5
푼. 백부근이 핵심(폐열을 사한다). 축농증 알려지성비염 만성비염 상관없이 다
듣는다. 맑은 콧물의 양이 많으면 마황을 증량. 포공영 백부근은 두돈까지 쓸 수
있는 듯하다. 포공영은 열증약이므로 한증에 쓰면 패증난다.

* 열다한소탕보다 갈근조위탕에 가감하는 것이 낫다!!!. 이것이 원칙으로 됨

* 태음인 한증 비염(최신버전)

태음조위탕 가 갈근2돈 승마1돈 백부근 한돈, 포공영 5푼, 비파엽 한돈, 마황
5푼(혹은 3푼) 추가. 대황3푼- 한증이라도 대황 3-5푼으로 이열을 풀어주어야
드라마틱하게 좋아지는 경우가 많다. 대변이 묽거나 여러번 보더라도 대황을 넣
어서 이열을 풀어야 한다.

- 황금은 리열을 꺼서 속을 차게 하므로 쓰지 말고, 갈근, 승마 쓸 것.
- 맑은 코가 많으면 寒이 문제이므로 마황을 더 쓰고, 누런 코가 많으면 열이 문제이므로 대황을 더 쓴다.
- **열증에 갈근조위탕에 상기의 약재를 가할 수도 있지 않을까????=>better!**
- 콧물이 많지 않으면 마황량을 5푼으로 한다.

* 소증은 열증인데 증상이 한증인 경우

-- 태음조위탕가 갈근 승마, 한다열소탕가 갈근 승마로 호전되다. 커피반응을 보고 사후에 열증이라 판단하고 열다한소탕가 비파엽 포공영 백부근 각한돈, 마황 7푼 대황 오푼을 썼는데 무효. 무엇이 문제인가? 소증이 열증이라도 현재의 증상이 한증이므로 일단 한증처방으로 효과를 낸 것. 寒이 문제인 상황이므로 대황을 거하고 마황을 한돈으로 쓰는 것이 적절해 보인다. 갈근조위탕으로 체력을 회복시키던가 열다한소탕으로 표사를 물리치던지 해야 한다. **갈근조위탕가 비파엽 포공영 백부근 마황 각 한돈**으로 써보려 한다....====> 효과가 대단히 좋다는 반응을 확인함. 평소에는 술을 조금만 먹어도 많이 취했는데 약을 먹으면서부터는 술을 마셔도 취하지 않고 약을 먹을수록 잘 듣는다는 느낌이 팍팍 온다고 한다. 새로운 포맷으로 인정할만한 임상례!!! 지속적으로 확인해보아야 할 포맷으로 보인다!!!!

- (열증일지라도)마황을 최소한 5푼을 넣어라. 마황이 폐기를 선발한다.
- 축농증도 비염과 같이 가미를 하면 됩니까? ==> 맑은 콧물인가 누런 콧물인가에 따라서 가미하는 용량에 차이를 보이게 된다. 맑은 코가 심하면 마황이 중심이 되고

* 태음인 열증이지만 현증은 한증이다. 마황이나 비파엽 포공영 백부근도 중요하지만 길경을 꼭 써야 한다(1109).

* 안선생의 사례; 한증. 비색. 맑은 콧물이 아침에 마구 쏟아진다. 가래도 많음

- 태음조위탕가 갈근 두돈 승마 한돈, 마황 한돈 추가. 비파엽 포공영 백부근 각한돈. 대황 5푼. 약 먹은지 5일 지나고 나서 코가 뺨 뚫리고 아무런 불편이 없다 함. 한증은 마황을 두돈으로 써야 충분한 것 같다. 마황량이 많아지면 대황량도 늘어야 한다. 마황은 온성약재이므로 대황으로 열을 사해야 하는 것이다. 온보와 청열을 동시에 한다는 의미도 된다.

* 열증의 태음인 비염에 갈근조위탕에 마황1돈 대황5푼 추가. 비파엽 포공영 백부근 황금을 각 한돈 가해서 쓴 사례 있음. 혹은 갈근조위탕가 승마 비파엽 포공

영 백부근 마황 황금을 쓴 사례도 있다. 마황을 써야 표한이 풀린다.

* 열증의 태음인 아이에게 **갈근조위탕 가 승마 포공영 비파엽 황금 행인 각 한 돈, 백부근 두돈, 대황 반 돈**으로 저효를 보다.

* 비염과 안구건조증이 병존하는 경우에는 비염이 더 표증이므로 비염을 먼저 해결한다.

* 열증의 비염. 콧물은 없으니 코가 잘 막히고 후비루. 목에 가래가 끓는데 잘 뱉어내지를 못한다. 비점막이 마르고 부어있는 상태. 대변은 이틀에 한번. 열감기....==> (임상결과 방에서 확인해서 약을 쓰되) 황금을 한 돈 가하는 것이 좋습니다.

■ 인후염

임상례에서 태음인 한증인 아이가 고열을 보이고 편도선 부음. 평소에는 태음조위탕(태생적 寒)에 **갈근, 승마(허열)**와 녹용을 가함. 감기 걸리면 한다열소탕.

- 혹은 황금길경탕. 편도선염에 사용.
- 인후통에 포공영

* 매핵기

- 매핵기는 대부분 위장병, 쓰리지 않으면 갈근조위탕 원방으로...

■ 목설 때

- 태음열증; 열다한소탕가 석창포 1-2돈
- 태음한증: 석창포탕.
- 말을 많이 해서 목소리가 쉬었으면 석창포.

■ 구강질환

- 입이 쓴 데는 대황을 조금 가해주면 효율적이다(안).

* 구내염

- 열증. 피곤하면 바로 염증이 생긴다.

답) 내상이므로 갈근조위탕을 쓴다. 입안이므로 승마 한돈으로 습을 제거해야 한다. 피로 후에 오는 것이므로 내상으로 보고 갈근조위탕을 쓰는 것이다. 열다한 소탕으로 축농증 치료를 해주는데 대황만 가하면 구내염이 좋아질 수 있다.

* 한증의 수족냉증과 구취

구취는 위나 간의 문제이다. 태음조위탕에 갈근 두 돈 승마 한돈으로 위열을 사하고 대황 3-5푼, 울금이나 청호로 이담시켜야 한다.

* 소화곤란과 구내염. 혀바늘이 잘 나고 입술 안쪽에 염증이 잘 생긴다--> 청열 조습하는 승마, 청열 해독하고 간해독과 관련이 있는 포공영이 효과적이다(안)--> 갈근조위탕가 산약 연자육 각두돈, 승마 포공영 한돈, 녹용 반돈으로 구내염도 좋아지고 소화곤란증상도 해결되다. 위장문제에 포공영으로 거의 좋아지는 것 같다. (학생원장).

* 열증의 구취(학생원장)

갈근조위탕에서 대황 5푼 증량하고 황금 승마 한돈씩 가함. 한제 복용 후 구취가 반 정도 줄고 비염증상도 호전됨==> 동의보감의 구취문을 참고해서 황금 승마를 가하셨군요. 이렇게 하면 반드시 듣습니다. 대단히 모범적인 사례입니다

■ 눈병

* 대강- 나복자가 들어가냐 안 들어가냐에 따라 비위에 작용하는가 안 하는가가 결정이 된다. 그래서 태음조위탕을 쓸 사람이 눈병이 왔다 그러면 비위에 문제는 그래도 있다고 보고 조습하는 작용이 강한 건울을 절반으로 줄이고 갈근 두돈 승마 한돈 포공영 한돈 이정도면 된다.

열증 같으면 갈근해기탕에 갈근 승마 그냥 있으니까 포공영에 대황도 속열을 꺼줘야 하니까 써야 한다. 약간 변비끼가 있다고 하면 한 돈 쓰고 정상이라 하면 반돈 쓴다. 대신 설사가 있을 것이라고 사전에 이야기해주어야 한다. 비염이나 눈병이나 엇비슷하다. 눈병은 황련이 강조된다. 눈병에는 황련을 꼭 써야한다.

- 안구건조증을 고려하여 승마 한돈 감국 5푼을 가한다.

*** 한증의 사례**

태음조위탕- 건울 1.5돈 갈근2돈 승마1돈 포공영1돈 열증이면 가 대황
조위승청탕 가 포공영 1.5 갈근2 승마1 양명경의 열을 없애준다.

*** 열증의 사례**

갈근해기탕가 포공영 1.5 대황(변상태 확인)- 알리지성결막염.
열증약에 한증약 마황을 가미할 때는 대황을 5푼 혹은 그 이상을 가한다.

알리지성 결막염. 葛根調胃湯+ 蒲公英 등속으로 호전은 되는데

자꾸 재발하는 케이스에 熱多寒少湯 가미로 쾌속 치료한 예 있다.

이후 補藥 지으러 왔을 때 다시 葛根調胃湯으로 마무리.

- 태음의 눈 질환에 감국을 가하기도 한다. 두통이 있어도 감국이 잘 듣는다.

- 눈충혈에 감국 5푼.

*** 열증. 변비. 볼이 빨갛게 올라오고 가렵다. 눈 피로 눈이 뻑뻑하다. 어깨결림.**

공부를 너무 열심히 하는 6학년 여학생

- 갈근조위탕(대황 한돈반) 18첩==> 얼굴에 올라오는 것과 소양감 소실. 대변이 상대적으로 편해짐==> 갈근조위탕(대황 한돈반)가 승마한돈==>눈의 피로 여전함.==>(안) 대황을 더 써서 대변을 하루에 2-3회 보아야 한다. 약 먹을 때 하루에 세 번 보면 약 끝나면 하루에 한번 본다고 생각하면 된다. 눈에는 감국과 포공영이 좋다. 감국은 간경의 풍열을 없애주고 포공영은 간에 작용하고 식물을 없앤다. 이래도 좋아지지 않으면 공부양을 줄여야 한다. 경추의 긴장이 눈의 피로에 직접 관련된다. 경추에 침을 놓는 것도 아주 좋다. 감국은 표에 더 작용하고 포공영은 리에 더 작용한다.

@ 태음인의 다크서클 임상례

태음인 열증인 건 틀림없습니다. 다크 써클은 담음이 원인입니다. 담음은 식적과도 관련이 있고 해서 갈근조위탕에 산약 연자육 2.0 썩 가해서 신장을 도와서 수분배출에 도움을 주어야겠습니다. 변비가 있으면 대황량을 늘리세요

*** 한증의 결막염**

지난번에 말씀하신 것처럼 태음조위탕가 갈근2 승마1 포공영 백부근 비파엽 마황 각 한돈, 대황 0.5돈을 써보려 합니다==> 한증이 확실하면 황금 행인도 한돈씩 가해서 쓰세요==> 여기서의 행인은 어떤 의미로 쓰여진 것이고, 갈근 조위탕에는 행인이 들어가는데 태음조위탕에는 행인이 들어가지 않는 이유가 무엇인지요?==> 행인은 안이비인후 치통까지 다스립니다. 목위의 모든 증상에 활용가능합니다. 특히 귀에 진물이 나는 경우(중이염)에 주효합니다. 태음조위탕은 비위의 한습이 목표가 되고 갈근조위탕은 조열이 목표가 된다고 하겠습니다.

■ 중이염

태음인에게 길경이 비염이나 축농증 중이염에 응용할 때 가장 핵심이 되는 약물이다. 태음조위탕에 갈근 승마 포공영 비파엽 백부근 대황을 가하고 마황을 증량하는 방법을 쓰는데 길경도 증량해야 효과가 신속하다. 열증에도 갈근조위탕에 가미할 때 길경이 가미되어야 신속한 배농효과를 얻을 수 있다.

- 행인은 안이비인후 치통까지 다스립니다. 목위의 모든 증상에 활용가능합니다. 특히 귀에 진물이 나는 경우(중이염)에 주효합니다.

* 열증

급성에는 갈근승기탕을 쓰고 만성에는 비염에 준해서 열다한소탕가 백부근 포공영 비파엽 각한돈, 마황 대황 각5푼을 가한다. 지금은 설사할 때까지 갈근승기탕을 쓰는 것이 좋다. 만성으로서 진물이 심하면 마황이나 백부근을 두배로 쓰기도 한다.

* 열증

갈근승기탕을 2-3일 먼저 쓰고 (열다한소탕보다) 갈근조위탕에 가미하는 것이 좋다. 진물이 많으면 마황을 증량하고 대변을 매일 못 보면 대황을 증량한다. 치료되고 나서 일년에 4번 환절기 때마다 3년간 약 먹으라고 지도한다.

* (안선생) 한증 중이염

중이염 수술 후 20년간 재발이 없다가 최근에 과음으로 재발. 귀에 진물. 태음조위탕가 갈근2 승마1 백부근 비파엽 포공영 각한돈. 대황3푼, 마황5푼 추가. 약 먹을 때는 없다가 약 끊고 해물 먹으면서 재발.

약을 세게 써야겠다 싶어서 마황을 두돈으로 대황을 5푼으로 올리고 외감과 관

런있는 황금 행인을 가하고 만성적 허로라서 녹용을 가함. 귀의 진물이 급속도로 마르더라.

황금 행인이 중이염이나 심한 비염에 중요한 약이다. 한다열소탕에 들어가는 약이고 외감과 관련된다.

■ 소화기 질환

消穀善飢(많이 못 먹고 금방 배고프고), 下肢無力.이면 調胃升清湯에 꼭 녹용 넣자. 허기 못 참는 것은 비위허약. 寒症은 太陰調胃湯, 熱症은 葛根調胃湯 쓴다.

少陽人이 허기 못 참으면 形防瀉白散+黃蓮 1돈, 牡丹皮 3푼.

少陰人 寒症은 十二味寬中湯에 木香, 厚朴, 大腹皮, 枳實.

熱症은 補中益氣湯에 乾薑, 砂仁, 半夏류를 5푼씩 가미. 1돈은 많다.

* 태음인 열증의 속쓰림- 갈근조위탕가 유근피

* 태음인 한증의 속쓰림- 태음조위탕에 갈근 승마로 열을 사하고 유근피를 5푼 쓴다. 유근피는 열증약이므로 한증에는 5푼만 쓴다.

* 속쓰림에 한증이면 유근피 5푼, 열증이면 한 돈.

* 태음조위탕은 비위의 한습이 목표가 되고 갈근조위탕은 조열이 목표가 된다고 하겠습니다.

1) 열증; 갈근조위탕

이거 아니면 태음인 열증은 절대 안 낫는다. 태음인 열증의 위장병의 갈근조위탕에서 갈근4돈, 나복자2돈을 넣어 약이 비위로 가게하고 대황은 비위의 열을 없애주는 건위제이다. 맥문동 오미자 길경 행인은 간대폐소한 한태음인의 폐경을 돕는 약이다. 열증인 사람이 찬 것을 많이 먹어 속이 냉해져서 병이 왔을 때도 쓴다. 대황은 변비에는 2돈 넣고 설사에는 5푼을 넣는다.

2) 한증; 태음조위탕.

@ 열증의 위궤양 환자 임상례

65세 여성분으로 갈근조위탕 가 포공영 황금1 유근피1.5로 처방하였습니다.

속이 편하고 변도 잘 나오고 잠도 더 깊이 잔다고 좋아하시는데요,
원래 주소였던 속쓰림은 여전하다고 하십니다. 처방구성을 어떻게 하면 좋을지요?
유근피를 더 가한다면 얼마까지나...

안선생의 답

물론 포공영이 식적을 풀어내는 작용이 있다. 하지만 약효를 분산시키지 않게 하기 위해 포공영을 빼고 **유근피 한돈만 가하는 것이 좋을듯하다**. 그러고도 쓰림이 계속된다면 용골을 가할 수 있다. 이때 황금은 무조건 쓰면 안 된다. 위열을 사하기 때문이다. 대황은 위열을 사하면서 건위작용이 있지만 황금은 식욕이 줄고 배가 아픈 경우도 있다. 황금만 안 썼어도 훨씬 더 좋을 뻔 했다. 처방을 간단하게 쓰는 것이 잘 쓰는 것이다. 선수들 처방은 간단하고 명료하여 처방의 의도가 뚜렷해진다. 간단해야 파악할 수 있다. 이 경우는 황금 때문에 깨끗이 듣지 않은 것이다.

- **속쓰림**에는 유근피 한 돈을 쓴다. 한증의 경우에는 반돈 이하로 사용.

- **역류성 식도염**은 부위가 위완 심장부근이다. 황금 승마로 청열조습한다.

이때 한증에는 황금을 5푼 이하로 사용한다.

= 한증의 속쓰림에는 태음조위탕 가 갈근 승마 각 한 돈, 유근피 반 돈.

* 한증 속쓰림의 임상례

- 십수년간의 속쓰림. 태음조위탕 가 갈근 승마 한돈, 유근피 5푼, 마황 반 돈.

이것으로 속쓰림이 훨씬 덜 하다고 함.

* 소화곤란과 구내염. 헛바늘이 잘 나고 입술 안쪽에 염증이 잘 생긴다-->

청열조습하는 승마, 청열 해독하고 간해독과 관련이 있는 포공영이 효과적이다(안)

--> 갈근조위탕가 산약 연자육 각두돈, 승마 포공영 한돈, 녹용 반돈으로

구내염도 좋아지고 소화곤란증상도 해결되다. 위장문제에 포공영으로 거의 좋아지는 것 같다. (학생원장).

* 소화곤란, 수족냉, 수면곤란, 심계, 소변빈삭....등이 갈근조위탕가 산약 연자육 각 두돈, 포공영 한돈으로 현저하게 좋아지다(학생원장).

* **역류성 식도염**

오심 구역이 심해서 자다가 깰 정도. 식후 심하고 쓰리거나 하지는 않는다.

대변은 주 2-3회 굵게 본다. 갈근조위탕에 승마 한 돈 황금 5푼 쓰면 효과가 좋다.

역류성 식도염은 대부분 가족력을 가진다. 만성이며 재발이 잘 된다. 술 담배 스트레스를 피하도록 티칭을 잘 해야 한다. 황금은 0.5-1돈 이하로 써야 한다. 위열을 사해서 식욕저하를 유발한다. 위완이 식도나 기관지를 의미한다. 식도나 기관지의 질환에는 황금 행인 등이 필수다. 기침도 위완(기관지)의 질환이다.

■ 식욕부진

위암수술로 심하게 여원 환자. 갈근조위탕 원방으로 대변을 잘 보고 머리카락도 남. 하지만 여전히 심한 식욕부진--> **오미자 맥문동을 5푼씩 가한다.** 대변이 시원치 않으면 대황도 증량하고 허로이므로 녹용도 좋다. **오미자 맥문동 길경 행인은 위완을 덥히고 대황은 위열을 사한다.**

■ 변비

- 갈근승기탕. 열이 날 때는 이것을 써도 설사가 안 나고 열이 내리고 나면 설사가 난다. 이때는 약을 중단해야 한다. 외감약이기 때문이다. 열이 있을 때 대황을 쓰면 열만 내리고 사하작용은 못한다.
- 대장열은 대황으로, 대장무력은 녹용으로....

1) 열증

- 대변이 묽고 후중감이 있을 때 → **열다한소탕** 정증. 고본이 거습하여 대변을 굳힌다. 특히 태음인이 술 먹어서 대변이 溏便이고 후중할 때 고본.
- 실제로는 **갈근조위탕-김주선생님처방**. 태음인 열증의 식체-이 더 좋다. 맥문동, 오미자, 행인, 길경이 온보. 위완을 돕는다. 대황이 리담작용. 빌리루빈수치저하
- cf) 진짜 변비가 있을 때는, **갈근승기탕-감기에 걸려서 열로 인해서 대변을 못보는 급증에 쓴다-을 쓴다고 알려져 있는데, 급증에만 쓰고 일반변비에는 거의 듣지 않는다.** 감기로 인한 고열과 변비에 쓰면 변비는 안 풀리고 고열만 바로 떨어졌던 사례도 있었다. 열이 떨어지고 나면 설사를 하는데, 설사를 하면 약을 중단해야할 시점이다.
- 일반적인 변비에는 갈근조위탕에 대황을 증량해서 쓴다(4돈까지). 갈근조위탕으로는 100%되고 갈근승기탕으로는 100% 안 된다.
- 녹용을 가미해서 써야 대변이 잘 풀리는 경우도 있다.

* 열증의 변비에 갈근조위탕(대황 3돈)에 상열을 고려하여 승마 황금을 각 한 돈씩 가하겠다는 말에 대하여==> 대황을 4돈까지 써보았지만 결과가 별로였다. 갈근이 4돈인 처방에서 대황을 4돈까지 올리니까 약맛도 별로고 군신좌사가 흔들리더라.... 원래 변비는 시간이 걸린다. 천천히 나아가야 재발도 없고 제대로 낫는 것이다.

* 열증의 변비. 피로. 얼굴 부종. 갑상선 기능저하증. 갈근조위탕가 조각자 승마 녹각 각 한 돈. 대황 반돈 증량하니 변비가 더 심해지더라.....==> 대황을 증량해도 변비가 해결되지 않는 것은 실증이 아니므로 하초를 보해야 한다. 녹용 산약 연자육 여정실 등으로 보한다. 대황으로 안 되면 허증임에 틀림이 없다. 녹용을 써서 대장에 힘이 생기게 해야 한다.

* 열증의 변비. 갈근조위탕으로 상당히 호전. 불면이 있다고 해서 황금을 가했는데 증상이 악화되더라==> 한열이 착잡되는 경우에는 가감을 하지 않고 기본방을 쓰는 것이 좋다. 황금을 가하지 않아도 변비는 풀린다. 식적과 변비가 풀리면 장내의 자율신경이 안정되면서 잠을 잘 자게 된다. 황금이 위장에 부담을 주었다고 생각하면 된다.

* 열증. 변비가 극심하고 얼굴의 뽀루지가 심하다. 일주까지 변을 못 보기도 함. 손발과 아랫배가 차다. 생리시 뽀루지. 갈근조위탕가 대황 3돈으로 변을 잘 보고 뽀루지도 줄었는데 아랫배와 손발이 찬 것이 여전하다-->(안) 승마로 상기를 막아주면 그 열이 복부와 사지로 갈 것입니다-->갈근조위탕가 대황3돈, 승마한돈 처방--> 상기 상열감은 많이 좋아짐. 손은 더 이상 냉하지 않고 발과 아랫배는 가끔 냉하다. 하지만 뽀루지가 다시 조금 늘고 변비가 다시 생김. 갈근조위탕가 대황 3돈, 녹용 5푼 처방--> 약 안 먹으면 다시 변비 생겨서 그냥 대황만 주면서 다려 먹으라 하니 환상적으로 대변을 보더라....

2) 한증

- 태음조위탕가 갈근 승마. 혹은 조위승기탕(진짜 변비가 아니고 감기로 인해 고열이 나서 변폐되는 경우에 일시적으로 쓴다).

갈근조위탕관련해서..

便秘는 大黃을 4돈까지 증량해서 쓴다.

大便 1주에 1번이면 4돈까지. 3~4일에 한번이면 2~3돈.

2일에 한번이면 1돈반. 매일 보면 1돈(원방 그대로) 大黃 쓴다.

처음에 소변량 늘고, 다음에 대변량 늘다.

설사해도 커피 먹고 잠 못 자면 熱症이므로 大黃을 반돈 이하로 줄이고 쓴다. 大黃 1돈은 健脾, 그 이상은 瀉下. 熱症인데 변 묽으면 五分.

* 변비에 대황을 사용하는 것과 관련해서

- 대변이 시원치 않다고 대황을 계속 늘리면 장이 냉해져서 해결이 안 된다. 울금을 한 돈 가하면 해결된다. 대황은 **장염대황**을 써야만 한다. 국산대황은 대황이 아니다. 사하작용이나 이담작용이 없다. 5돈을 써도 대변이 풀리지 않는다. 장염대황을 반드시 확인해야 한다. 중요!!! 금문대황이 장염대황의 이명(학생한의사). 피로의 호전에도 울금의 이담작용이 도움이 된다.

■ 설사

- 급성감염성설사

애기는 아주 작는데 똥을 엄청나게 싸다. 설사 한번 하면 대단하다. 소양인인 것이 확실하면 저령차전자탕을 쓰면 한 첩이면 낫고 두 첩이면 끊어진다. 표열을 끊어주기 때문이다. 태음인은 갈근나복자탕(열설), 소음인은 편법으로 육일산을 쓴다.

- 열증의 설사에 갈근조위탕에서 대황을 확 줄여서 써야 한다. 이열이 빠지면서 설사가 멎고 후증이 없어진다.

- 갈근 승마를 쓰면 변이 잘 나온다. 양명열이 빠지니까.. 피부병, 두통, 상초열, 장출혈 장염....저근백피 오픈 하고 같이 써주면 대장출혈 설사 등에 잘 듣는다.

- 설사 자주 하면서 후증감 있는 사람에게 태음조위탕 가 갈근 승마 고본

- 과민성대장증후군에 갈근조위탕을 쓴 임상례.

1. 열증

(과민성대장증후군. 아랫배 묵직...)

갈근조위탕을 쓰면 변이 또아리를 틀면서 보기 좋게 나온다. 설사가 심하면 일그램 쓰는 경우가 있더라도 대황을 안 쓰면 안 된다. 인경이 안 되기 때문이다. 반 돈 이하

2. 한증

태음인 한증인 사람이 설사가 안 뚫으면 **태음조위탕**을 쓰고 안 나오면 저근백피 한 돈을 넣는다. 가미해서 오래 쓰면 안 좋으므로 10첩 정도만 쓰고 그 후에는 5분으로 줄인다. 혹은 열증에 저근백피 한 돈, 한증에 5푼.

* 술 많이 먹는 한증 태음인의 식후 대변. 하루에 3, 4회까지 배변에 태음조위탕 가 갈근2 승마1. 울금도 괜찮을까요? 라는 데 대해

- 울금 청호(개똥쑥)가 이담작용이 탁월하다. 청호는 기본적으로 한증약이다.

* 한증이면 태음조위탕, 열증이면 갈근조위탕에 대황을 감량한다. 설사를 여러번 하더라도 후중감이 있으면 태음조위탕에 갈근 승마를 꼭 가해야 한다.

■ 소변질환

- 태음인 한증 할머니, 소변불리로 아랫배 아픈 경우의 임상례

태음조위탕에다가 하초의 습열이므로 포공영 황금을 가하고 산약 연자육도 2.0으로 한다.

- 한증의 소변빈삭 임상례

태음조위탕에 산약 연자육으로 補腎하고, 한증이라도 갈근 승마는 꼭 넣는다.

- 산약 연자육으로 補腎하면 소변과 잠의 문제가 해결된다.

- 太陰人 전립선 비대에는 山藥, 蓮子. 기본 1돈에서 1돈반, 심하면 3돈.

蓮子回生湯 설명에서 蓮子肉(補腎) 5돈 가미하라고 언급. 寒症은 太陰調胃湯에 가. 女貞實(補腎), 蛇床子(去濕. 囊濕에 4돈), 鎖陽(補腎陽)으로 女性 냉대하에.

* 태음인 열증의 소변빈삭 임상례(전립선)

- 과거의 변비기왕력이 있으면 열증이고 대변을 5분 이상 오래 보는 것도 열증입니다. 산약 연자육 쇄양(신양을 도움) 여정실 등으로 보신해야 합니다. 가능하면 녹용도 쓰시고 낭습이 있으면 사상자도 중요합니다.

- 산약 연자육을 가하면 신을 도와 소변빈삭에 좋다. 쇄양 여정실 사상자도 신을 돕는다. 허로가 있으면 녹용을 쓴다.

태음인 열증으로 판단하여 갈근조위탕 가 산약 연자육 각2돈, 승마 황금 포공영

각1돈(청열해독)씩 가미하였습니다.

현재 복용후 10일쯤 지난 상태인데 통증이나 농뇨가 현저히 개선되었다고 합니다.
전립선 치료시에 혹시 다른 가미할 약이나, 주의사항이 있는지 궁금합니다.

만일, 태음인 한증의 경우라면 태음조위탕에다가 위의 약물들을 가미하면
되겠습니까? 한증에 황금을 쓸 경우는 위가 차져서 식욕을 떨어뜨리고
안 좋게 한다고 강의때 말씀하신 것 같습니다. 한증에도 포공영을 1돈까지는 쓸 수
있는지도 궁금합니다.

전립선에 패장 하고초를 더 가해보시길.... 소증이 한증일 때는 뚜렷하게 열증을
협했을 때만 황금을 씁니다. 예를 들면 외감과 같은 경우입니다.
한증에는 포공영을 기본적으로 황금처럼 함부로 쓰지 않는다고 생각하세요.

*** 열증의 소변빈삭**

- 72세의 할머니. 변비. 평소 잘 चे하고 속 쓰림. 야간뇨 5회. 입이 쓰고 마르고
늘 가슴이 두근두근. 식은땀. 위장장애를 해결하기 위해 갈근조위탕을 기본방으로
하고 대변이 힘들니까 대황 증량, 하초가 약하니 산약 연자육 각 두 돈을 가미하고,
식은 땀과 입이 마르는 것을 열로 보아 승마 황금 각 한 돈을 가미해도 될런지..
--> 그래도 됩니다. 심계 불면은 황금이 핵심이고 열독이 올라서 그런 것이므로
포공영으로 청열해독 하면 된다. 황금 하나가 청심연자탕 반첩이라 생각하면 된다
갈근조위탕에 황금만 추가해도 심계가 멎는다.

*** 야뇨증**

- 소아의 야뇨는 비뇨기가 충분히 발달되지 않아서 생기는 것으로서 시간이 지나면
다 좋아진다. 補腎하는 것이 원칙이다. 소양인은 산수유 복분자. 血虛하면 구기자를
쓴다. 태음인은 산약 연자육.

- 열증의 야뇨증. 10세.

칠정이면 청심연자탕이 좋겠지만 그 외 허약이나 과로상으로 보여지면 갈근조위탕에
산약 연자육을 쓰는 것이 좋다. 판단기준은 엄마가 얼마나 별난 사람인가의 여부인데
애를 가만히 안 두는 사람이면 청심연자탕을 쓰고 나머지의 경우는 갈근조위탕을 쓰면
된다. 칠정과 허로가 겹쳤으면 갈근조위탕에 황금을 가하면 청심연자탕의 의미가 더해
진다.

*** 여자분 열증의 오줌소태.**

- 갈근조위탕에 산약 연자육으로 보하는 것을 잊어서는 안 된다. 변비의 정도에 따라 대황을 늘려야 이열이 빨리 제거된다.

*** 소변불리에 대한 의논사례.**

하루에 서너번 대변 보는데 소변이 시원찮고 야간뇨가 심하여 전립선약 복용. 커피에 무반응. 태음조위탕으로 변비 생겨서 갈근조위탕 쓰니 대소변이 시원해졌다고 함. 입맛이 좋고 체중이 늘었다고 해서 갈근조위탕가 산약 연자육 각 두 돈, 황금 한 돈 거 오미자 함. 대변은 좋아졌으나 소변과 입맛은 요지부동.==> 나이가 많고 비습한지가 궁급함. 신허라면 산약 연자육 4돈까지. 여정실 쇠양 등을 쓸 수 있다. 심소장열 등이면 등심 목통 호장근 포공영 천문동 등으로 심화를 사해서 소변 문제를 해결할 수 있다. 65세 남. 172/85킬로그램. 심계는 없는데 같은 자세로 누워있으면 갑갑해서 견디기 어려워한다. 잘 때 몸부림이 심함.==> 이 정도면 심장이 부담이 있는 것으로 간주해야. ==> 갈근조위탕가 산약 연자육 4돈, 여정실 쇠양 한돈, 포공영 천문동 목통 한돈, 등심 5푼을 써도 별 다른 효과가 없다. 하루 7-8회 대변을 찢끔땀. 전에 갈근조위탕 만으로 대소변이 다 좋았던 적이 있었는데 갈근조위탕가 녹용으로 깔끔하게 가야 할까요?==> 날씨가 추워지면 전립선 비대가 더 심해지는데 갈근조위탕에 산약 연자육 각 두돈 승마 한돈반을 쓰는 것이 좋겠습니다. 승마는 청열 발산 거습합니다. 환자가 매우 비습합니다. 녹용은 꼭 씹니다.

*** 열증의 배뇨후 통증**

갈근조위탕 가 산약 연자육 두돈, 포공영 승마 황금 각 한돈. 여기서 황금이 가장 중요. 소변의 문제는 대부분이 심열이 원인이다. 특히 여자들의 경우....

*** 한증. 소변이 빈삭하면서 정력이 딸리는 듯 하다는 남성. 피부 가려움.**

태음조위탕가 갈근2 승마1 산약 연자육 각 한돈. 한증에는 산약 연자육을 한돈씩 가한다. 연자육이 특히 소변문제에 중요하다.

*** 한증의 혈뇨.**

남아, 13세. 태음조위탕에 산약 연자육으로 보신하고 승마 포공영으로 청열한다. 칠정이 원인이면 황금도 중요하다.

*** 열증의 소변빈삭**

- 여성. 흉통 복만통 소변빈삭 견비통 슬통 등의 증상을 호소. 갈근조위탕가 산약 연자육 각2돈, 포공영 황금 녹각 목통 등심 각 한돈으로 속도 편하고 대변도 잘 보고

흉통도 거의 없다고 하는데 소변빈삭은 전혀 좋아지지 않았다--> (안) 소변문제는 심화와 가장 관련이 깊다. 목통도 심소장열을 사한다. 청심연자탕의 산약 연자육이 심장과 신장을 돕는 약이다-->(학생) 산약 연자육을 3돈으로 올리고 목통도 두돈으로 올려 보겠습니다.

* 태음인 단백뇨. 열증

- 갈근조위탕가 산약 연자육 쓴다. 거담할 목적으로 석창포를 쓰면 좋다. 소변백탁의 대표방인 비해분청음에 석창포가 쓰인다.

* 열증의 신우신염에 갈근조위탕가 산약 연자육 각 두돈, 녹용 5푼(녹용은 한증약이므로 열증에는 5푼 이하만 쓴다)

■ 간담질환

- 대황 포공영 같은 약이 아니면 간을 씻어낼 약이 없다. 胸悶이 있으면 황금을 쓴다. 황금은 청심연자탕의 핵심이 되는 약이다.

- 간염 간경화 등에 포공영으로 완치되는 사례도 봄

- 어혈의 양상입니다. 조각자나 홍화 등의 파어약을 적극적으로 써야 하겠습니다. 어혈의 치료는 어혈약 만으로는 어렵습니다. 간이 좋아져야 해독기능이 회복됩니다. 이담작용이 있는 울금 대황 그리고 간기능을 회복하는 오미자 등도 중요합니다(여드름에 대한 설명에서).

- 당고특대황은 사하작용이 강하므로 변비에 쓴다. 장염대황은 이담작용이 강하므로 피로에 쓴다.

* 열증으로 간수치 높으면서 만성피로

- 갈근조위탕가 포공영 한돈, 녹용 5푼. 간수치 콜레스테롤 피로 혈압도 좋아진다.

* 황달

황달은 습열로 인해 생긴다. 소음인에게는 인진을 쓰고 태음인에게는 체질불문하

고 무조건 대황으로 사하해야 한다. 소양인에게는 고삼으로 습열을 제거하고 복령 택사 등으로 습을 내보내야 한다. 태양인에게는 초룡담 어성초가 중요하다.

- 태음인 한증에 태음조위탕을 쓰더라도 대황을 5푼 정도 쓰고 갈근 승마를 가하면서 설사가 날 수 있다고 사전에 이야기해야 한다. 승마도 거습하는데 핵심은 대황의 사하작용이다.

- 대황을 한돈으로 올려서 써 보시고 설사를 안 하면 한돈반으로 올려서 설사가 나야 한다. 설사가 나도록 대황을 써야 한다. 검사수치에 너무 일희일비하지 말고 환자가 편해하고 얼굴색이 돌아오면 수치는 따라서 좋아진다(급성간염으로 인한 황달환자에 대한 토의에서...)

* 지방간, 열증

- 갈근조위탕에 울금을 가하면 지방간이 좋아지겠습니다.

* 한증, 설사와 간수치저하

- 간수치가 낮은 것은 간의 효소부족이고 간기능의 활성이 떨어졌다는 뜻입니다. 태음조위탕에 갈근 승마 청호를 쓰면 좋겠습니다. 수치가 회복되지 않더라도 조바심 치지 마십시오. 몸이 완전 회복되고 정상화된 후에도 수치는 2-3개월 후에 정상치로 됩니다.

■ 피부질환

- 맥문동 천문동이 태음인 피부에 중요한 약입니다. 건조하고 까칠하면 꼭 가해야 합니다. 유근피도0.5가할 수 있습니다.(유근피는 종기에 쓰는 약입니다.)

- 승마는 관절의 습도 제거하지만 몸 전체의 습도 제거한다. 피부병으로 진무는 경우에는 승마. 마르고 인설이 떨어지는 경우에는 맥문동 천문동....조습을 항상 생각해야 한다.

- 피부는 관리하기 나름. 음식 생활습관. 뱃속이 깨끗해야 피부가 깨끗해진다.

- 가려우면 풍, 진물면 습, 붉어지면 열이다. 증에 따라 가감한다.

* 소양증

1) 열증- 갈근조위탕 원방으로 호전. 간청소가 되고 대소변으로 습열이 빠지고 해독이 되기 때문. 가미하는 것보다 원방이 좋다.

열증이면서 이틀에 한번 대변을 보는 경우에 대황을 2돈 가해서 하루에 두 번

정도 변을 보게만 해도 피부와 기타증상이 좋아지는 경우도 있다.

2) 한증- 태음조위탕가 갈근2돈 승마1돈, 대황5푼. 원리는 동일함.

* 태음인의 덩어리진 여드름처방

1) 한증; 덩어리가 잡히면서 큰 것. 시커멓게 딱딱하게 덩어리진 것.

조위승청탕가 조각자 갈근 승마 황금 포공영

태음조위탕을 쓸 경우에는 의이인 건율을 줄인다. 비위로 인정하는 효과를 줄이는 것이다. 다음에 갈근 두돈, 승마 한돈 쓰고 황금도 좀 넣고...깊이 생긴 여드름에는 조각자와 포공영을 써야 한다. 여드름 만져보면 거뭇거뭇하고 찢아 찢어지듯 되어있고 덩어리도 만져지고 왕여드름인 경우, 이런 데에 조각자를 꼭 써야한다.

- 한증 여드름은 태음조위탕보다 조위승청탕이 더 좋다. 조위승청탕에 갈근2.0승마1.0 황금0.5 조각자1.0정도 가한다. 한증에는 황금을 0.5로 하는 게 더 좋다. 1돈 쓰면 변이 더 묽어지고 좋지 않다. 포공영도 한증에는 함부로 쓰지 않는다.

- 여드름은 음식 또는 칠정과 가장 관계가 많기 때문에 조위승청탕을 쓰는 것도 좋은 방법이 됩니다. **맥문동 천문동이 태음인 피부에 중요한 약입니다.** 건조하고 까칠하면 꼭 가해야 합니다. 유근피도 0.5가할 수 있습니다.(유근피는 종기에 쓰는 약입니다.)

- 한증의 여드름에는 포공영을 기본적으로 안 쓴다고 생각해야 한다. 여드름에는 배농하는 백지 등을 쓸 수 있다. 한증이라도 대황을 3-5푼 가하는 것이 좋다.

- 조위승청탕을 써 보는 것도 좋다. 상부로 작용하고(여드름 천면 정충) 칠정에 쓰이고 거담한다. 갈근 두돈 승마 한돈 가해서 청열조습하고 술을 자주 먹으면 대황을 2-3푼 가하는 것도 좋다.

2) 열증; 오돌도돌(뽕죽)하고 빨갛게 돋은 것이다. 열증에는 조각자 쓰지 않는다(? 아래 임상례에는 쓰는 것으로 나와 있는데?). 깊이 있는 것이 아니므로 발산해야한다.

열다한소탕가 포공영 대황(정상5푼, 변비 한돈), 조각자

☆ 열증의 여드름에는 갈근조위탕가 황금, 백지, 포공영(청열 해독), 조각자(어혈), 승마(양명경 면열을 제거) 한 것이 훨씬 낫다. 2-3년전만 해도 열다한소탕 썼는데 요즘은 갈근조위탕을 쓴다. 갈근조위탕에 승마 백지 같이 배농하는 약, 포공영같이 청열해독하는 약, 딱딱한 것을 깨주는 조각자같은 어혈약, 빨개지는 것에는 황금을 가한다.

- 피부가 검은 어혈증을 갖고 있습니다. 조각자 1.0 홍화 0.3-0.5정도 가해야 좋을듯 합니다.

- 좁쌀여드름에도 갈근조위탕가 승마 포공영 황금한 임상례 있음.
- 울금을 가하기도 한다.
- 여드름에 황금이 중요하다.

* 열증의 여드름에 갈근조위탕 가 대황 승마 포공영 조각자 천문동 울금 각 한 돈 한 학생원장도 있음. 상당한 효과를 얻음.

* 한증여드름의 임상례

- 조위승청탕 가 갈근2 승마1 포공영 황금 각 한 돈. 현저한 호전.

* 열증의 여드름에 대한 설명에서(1139)

- 갈근조위탕만 장복해도 좋아지겠지만 건조하면 천문동을 가하고 포공영으로 청열해독 승마는 청열조습한다. 피부에는 너무 신경 쓰지 말고 대소변 땀 피로 신경안정 음식 등이 더 중요하다. 검은빛이 많아서 어혈약인 조각자가 필요해 보인다. 텅어리진 여드름에도 어혈을 깨는 조각자를 쓴다.

* 열증의 두드러기-잘 낫지 않는 것에 대한 설명

일차로 갈근조위탕 가 포공영 승마 한 돈, 조각자 5푼

이차로 열다한소탕가 대황 조각자 한 돈, 포공영 한돈 반으로 효과가 없다.

==> 식이지도 잘 되고 있는지 궁금합니다. 인스턴트나 MSG가 첨가된 음식, 트랜스지방산 등이 가장 문제가 된다고 합니다. 외식을 자주 해도 치료가 잘 되지 않습니다. 피부색이 상당히 검습니다. 어혈의 양상입니다. 조각자나 홍화 등의 파어약을 적극적으로 써야 하겠습니다. 어혈의 치료는 어혈약 만으로는 어렵습니다. 간이 좋아져야 해독기능이 회복됩니다. 이담작용이 있는 울금 대황 그리고 간기능을 회복하는 오미자 등도 중요합니다.

* 태음인의 두드러기와 알러지증상.

1) 열증- 갈근조위탕에 대황을 두 돈 가하여 이열을 식히면 피가 맑아지므로 두드러기가 호전된다. 다음에 열다한소탕으로 알러지를 해결하면 된다. 복합증상은 순차적으로 해결한다.

2) 한증- 추정하건대 태음조위탕가감이 아닐까....

임상례) 태음조위탕에 갈근2 승마1 대황3-5푼. 설사가 날 수 있다고 사전에 이야기 할 것

- 열증의 두드러기

두드러기는 비위의 병이다. 갈근조위탕에 승마 한돈만 가해서 써도 충분하다. 급증에는 갈근승기탕을 준비해 두었다가 증상이 있을 때마다 급하게 복용하는 것도 좋은 방법이다. 갈근승기탕도 위열을 사하는 처방이다.

* 햇볕 알러지

갈근조위탕으로 內熱을 없애는 것이 중요함. 대황량을 충분히 쓰고 황금 승마 포공영을 가한다. 대황으로 이담시켜서 피를 맑게 해준다고 생각하면 된다.

* 여성의 기미

- 열증. 갈근조위탕.

* 열증의 여드름

- 여드름의 색이 붉습니다. 붉으면 열증입니다. 갈근조위탕에는 온보하는 약물이 많다(오미지 길경 맥문동 행인 모두 온보하는 약물이다). 온보하는 약을 쓰면서 열이 제거되기를 기대하면 안 된다. **갈근승기탕**으로 먼저 사하한다(원방으로....나복자는 쓰지 않는다. 나복자가 없는 경우가 열을 제거하는데 더 효율적이고 가래가 많아서 거담해야 할 경우에는 나복자를 가하는 것이 좋다. 나복자는 원래 강기거담하고 소식하는 약이다. 이는 표본완급과 관련된 것으로서 급하면 표를 다스리고 급증이 해소되고 나면 근본을 다스려야 한다는 의미이다). 그 다음에 **열다한소탕**으로 조리하고 마지막으로 **갈근조위탕**으로 정리한다. 설사가 나더라도 물러서면 안 된다. 열증이면 설사가 나아 확 좋아진다. 피부는 붉으면 열로 보고 가려우면 풍이고 진물이 흐르면 습이다. 붉고 가려우면 풍열이고 진물이 흐르면서 가려우면 풍습이다. 붉고 진물면 습열이다. 풍열 풍습 습열을 가리고 이에 맞추어 약을 써야 한다.

* 열증의 여드름

갈근조위탕가 승마 포공영 조각자. 여자들의 일반적인 여드름은 이와 같이 하면 대체로 호전된다. 심지어 갈근조위탕 원방만으로도 탁월한 효능이 있었던 적도 있었다. 승마는 청열조습하고 포공영은 식울을 풀고 청열해독한다. 조각자는 어혈약이면서 덩어리를 깨준다. 대체로 여자들은 식울과 어혈 칠정 등으로 여드름이 생기게 되므로 갈근조위탕에 이런 식으로 가미하게 된 것이다. 물론 피부가

지나치게 건조하면서 검게 변하면 천문동을 반드시 가해서 윤조해야 한다. 검은 것은 어혈이다.

* 여드름

- 조각자의 과혈작용이 덩어리지고 뭉치는 여드름에 좋다. 먼저 갈근조위탕가 대황으로 간 위 대장 등의 독소를 제거하는 것도 좋은 방법이다. 산약 연자육 승마 등을 가해서 거습할 수도 있다. 고본은 대변을 굳게 하므로 대황과 같이 쓰면 곤란하다.

* 열증의 여드름

가스, 잘 체하고 피로 두통 불면경향 심게 조열...소화곤란을 동반하는 3개월된 여드름==> 갈근조위탕가 승마 백지 포공영 한돈. 위장도 좋아지고 여드름도 좋아지다(학생원장).

* 한증의 자반증

태음조위탕가 갈근2 승마1 대황 3-5푼. 대황이 어혈약이기도 하고 이열을 사한다. 피를 맑게 한다. 식올도 없애서 건위작용을 한다.

* 아토피

- 葛根調胃湯 + 升麻 1~1돈반, 蒲公英 1돈반.

인설에 麥門冬, 天門冬으로 皮膚 潤澤하게 하고, 진물 나면 白蘚皮로 말리고, 黃芩, 黃蓮, 黃柏

- 가피가 형성되고 인설이 생길 때 백선포를 쓰면 심해진다. 조습하기 때문이다.

- 질문원장의 가감법; 포공영(청열) 천문동(인설) 백선포(진물)

- 태음인 아토피에 열을 내리기 위해 갈근승기탕을 먼저 쓰는 경우도 있다(질문원장). 아토피 환자에게 갈근승기탕을 5일분 투여했는데 피부가 더 심해지는 경우가 있더라는 질문에 대해==> “리열이 확실하지 않는 상태에서 승기탕을 쓰면 중기가 하함됩니다. 그러면 병이 교착상태에 빠져 회복될 기회를 잃어버립니다”

1) 열증

- 갈근해기탕을 응용해 본 적도 있었지만 요즘은 갈근조위탕이 더 좋은 듯하다.

- 갈근조위탕가 승마 황금 포공영. 처음에는 원방으로도 잘 된다

- 갈근조위탕 원방으로도 많이 좋아진다. 진물이 있으면 승마(거습) 황금이 좋다. 의이인도 중요하다.

2) 한증

- 태음조위탕에 갈근2.0승마1.0 맥문동 천문동 1.0 진물이 있거나 습열이 보이면 황금 1.0을 가한다.
- 한증이라도 대황을 3-5푼 가한다. 그래야 肝燥熱이 없어지고 병이 나올 수 있는 조건이 된다.
- 태음조위탕에 갈근2 승마1 천문동1 대황 0.3-0.5가하고 마황 한 돈을 추가하기도

* 태음인 한증의 아토피 임상처방례

태음조위탕가 갈근 승마 포공영 황금. 한증에는 황금 포공영을 5푼만 쓰는 것이 좋고 대황을 3푼 가해서 이열을 다스리는 것도 좋다.

* 태음인열증 여성의 발목의 피부건조, 통증, 가렵지는 않음.

갈근조위탕가 천문동 한돈 전충 홍화 5푼 쓰고 발이 붓는 것이 호전되었는데 피부증상이 여전하다. 어떻게 할까요?

답) 피부건조에 천문동이 효과가 있었을 것이고...만성이고 하부의 문제이므로 산약 연자육으로 보하고 수액대사를 정상화시켜보는 것이 좋을 듯. 상처가 잘 낫지 않으면 승마 포공영 황금 각 한돈씩.

* 태음인 한증의 소양증에 태음조위탕가 갈근 두돈 승마 한돈, 녹용한돈, 대황을 3푼에서 5푼 한돈까지 올리다----> 대황을 쓰는데 있어서 용량의 한계를 어떻게 잡아야 할까요? 설사가 날 때까지 이열이 제거된 것이다. 아직 한참을 더 써서 설사가 나면 대황을 그만 쓸 시점이다.

* 태음인 한증의 수장각화증 처방례

- 생리할 때의 하복통. 줄넘기할 때의 요실금. 그래서 태음조위탕가 산약 연자육 갈근 각2돈, 승마 녹각 천문동 각1돈, 전충 홍화 각 3푼으로 하려는데 어떨까요? ---> 전충 홍화는 관절질환의 어혈에 쓰인다. 자궁의 어혈은 포황. 하지만 지금은 건조가 문제이므로 어혈에 신경쓰지 말고 맥문동 천문동으로 윤조하는데 집중해야 한다. 녹각도 무의미하다. 사실은 의이인이 가장 중요하다. 濕이 나가야 潤이 들어온다.

* 건조한 피부

비듬이나 인설이 떨어지는 피부질환에는 맥문동 천문동으로 윤조한다.

한증이면 태음조위탕에 갈근 승마 맥문동 증량, 천문동을 가한다.

열증이면 갈근조위탕에 포공영 승마 맥문동 천문동을 가한다.

■ 동통질환

☆ 태음인의 부종성관절염에는 의이인과 삼백초가 반드시 들어가야 한다.

- 극심한 통증에는 마황을 두돈으로 올린다(견비통에서...).
- 갈근조위탕에 **요슬통**이면 승마1.5돈 가하는 것 잊지 마세요 물론 위령선 1돈
관절통이 심하면 전충 홍화 각3-5푼 가하세요. 고혈압이 주소증이되면 청심연자에
갈근승마 대황(대변상태 봐서)으로 청열해야 합니다.
- 승마는 거습해서 통통 부은 관절염에 특효가 된다. 마른 관절염에는 아무리
써도 효과가 별로 없다. 거습이 먼저이고 그 결과로 부종이 빠지면서 치료가 되는
것이다. 관절에도 효과가 있고 몸 전체의 습도 제거된다.
- 갈근조위탕가 대황 반돈 위령선 전충 녹각을 태음인 열증의 목 디스크에
사용한 사례가 있음.
- 무릎이면 전충(소금기 없는 것), 홍화3푼, 승마를 1.5로, 부으면 삼백초를
가해야 한다.
- 조위승청탕은 요슬질환에 쓰면 안 된다. 승하고 청하는 약이고 하행하지
않습니다. 건율이 조습하고 의이인이 이뇨 이습합니다. 다발성관절염에도
전충홍화를 3-5푼 사용합니다.
- 비증에 속단 상기생등으로 허증을 보할 수도 있습니다.
- 태음인 관절질환에 강활승습탕(동의보감), 승마를 1.5돈 쓰고 있음.(백지를
관절약으로 쓰는 경우도 있다)
- 지절통: 위령선, 조각자 녹각 속단을 가한다. 제일 핵심은 전충과 홍화를
3푼-5푼 넣는 것. 계단 오르내릴 때 새큰거리고 무릎 아프며 그럴 때

전충 홍화가 핵심. 한증에도 이렇게 쓰면 된다.

습성으로서 통통 붓고 열나고 벌개지고 하는 경우에는 승마가 들어가야 한다.

한돈 반 정도. 승마가 열을 잘 꺼준다.

- 태음인의 부종이 있는 관절질환에는 삼백초가 반드시 들어가야 한다.

의이인도 반드시 들어가야 하고....원방에 들어있는 경우에는 증량해야 함.

어성초와 성질이 흡사해서 리습 청열해서 간염에도 듣는다.

전충이나 홍화같은 어혈약을 3푼씩 같이 쓰기도...

- 관절의 어혈에는 전충 홍화. 자궁의 어혈에는 포황.

- 변비경향이면 열증이 확실하고 갈근조위탕에 위령선(비중), 상지(사지에 작용 이뇨작용도 좀 있음), 녹각 조각자(어혈약), 디스크 등으로 하지가 저리거나 뻣기면 전충5푼을 가하시면 됩니다(전충은 소금기가 없는 것으로).

- 위령선은 비중에 녹각 조각자는 어혈에 포공영은 청열해독이 목적입니다.

하지전근은 간신허약에서 비롯됩니다. 상기생이 가장 좋습니다.

- **위령선**은 신온한 약이라서 열증에 쓸 때 한돈을 초과하지 않습니다. 약맛도 맵고 아립니다. **수족냉증은 비위의 문제이므로 갈근조위탕 원방만으로도 충분합니다.**

하지의 문제가 더 심하면 신허이므로 산약 연자육이 중요해집니다. 위령선은 온경 통락해서 풍습으로 인한 비증을 치료합니다. 지통약류에 속해서 관절 등에 사용하고 수족냉증에는 사용하지 않습니다. 신온하고 유독하므로 풍한습의 실사가 없거나 허약자는 주의를 요합니다. **비습자나 실증성 관절염에 쓴다고 생각하면 된다.**

- 무릎이면 전충(소금기 없는 것) 홍화3푼, 승마를 1.5로 증량, 부으면 삼백초를 가해야합니다

- 요통에 산약 연자육을 두돈씩 가하기도(신허)

- 전충은 다발성관절염이나 슬관절염에 사용한다. (요통에는) 쓰지 않는다.

1200과 관련한 답변에서...

- 관절통에는 전충 홍화를 3-5푼 반드시 쓴다. 관절통이 아니면 전충 홍화를 쓰지 않는다. 장딴지 통증에는 곡기생이 좋다. 현재 상기생으로 유통되는 모든 약재가 곡기생이다.

- **갈근조위탕에 대한 설명에서**

關節疾患에는 전충, 紅花 3~5푼을 阜角子, 鹿角, 위령선과 같이 쓴다.

太陰人 關節炎에 가장 잘 듣는 약은 升麻(청열) 1돈반.(大羌活湯의 의미)
갱년기 장애. 안면홍조에도 升麻! 가슴 뛰면 黃芩 추가.
腰脚引痛에는 전충 5푼으로 증량. 그래도 안 나으면 麻黃 시도해보자.
부으면 삼백초 1~2돈 추가. 食積이므로 熱症에는 大黃, 寒症에는 薏苡仁, 乾栗.

* 한성태음인하지부마목감에 대한 용약례

아래쪽이므로 조위승청탕은 아니고, 태음조위탕에 가미를 한다.
전체적 열이 좀 끼있으면 갈근승마를 일단 가미하고,
비증, 관절에는 위령선을 가미해라...위령선은 온성약이고 냉비에 좋다.
추가로 어혈을 풀기위해서 조각자와 녹각을 넣으면 더욱 좋을 수 있다.
만약에 요각통의 증상이 심하게 나타나면(디스크가 진짜로 터졌거나)
전충을 가하여 쓸 수도 있다

* 오십견, 목 디스크, 팔다리 저린데....

- 극심한 통증에는 마황을 두돈으로 올린다

1) 한증- 한다열소탕가 조각자 녹각 홍화 등의 어혈약이 들어간다. 태음인 신경통 관절통에 녹각이 들어가는 것이 좋다. 오십견 같이 제대로 굳어지는 병은 소양인 같으면 패독산, 태음인 같으면 마황발표탕으로 표를 열어주고 한다열소탕으로 활용한다. 조각자 위령선 녹각을 가미한다.

☆ 한다열소탕 가감방은 올드버전이고 요즘은 태음조위탕에 가감을 많이 한다.
비위를 온보하는 약을 쓰고 가미는 비슷하게 한다. 위령선 조각자, 거담하는 석창포, 오십견으로 인한 통증이 극심할 경우 홍화 전충(3-5푼), 녹각도 어혈약.

* 오십견을 목표로 하는 경우에는 (조위승청탕에?) 마황을 한 돈 더 추가하면 통증제거에 효과적이다. 야간 통증을 잠을 못 자는 야간 통증의 경우에 마황 한 돈 추가(마황의 지통작용)

2) 열증- 갈근해기탕에 석창포(거담할 목적으로) 조각자 마황으로 피부를 열어주고 땀을 내서 풀어줘야 낫는다. 혹은 오십견에 녹각 석창포 마황 해동피 위령선(위령선은 신경통에 꼭 가미한다) 등을 가미한다. 위장에 문제가 있으면 나복자

를 가한다.

건윌을 동통성질환에 쓸 경우에는 세 돈을 안 쓰고 한돈반으로 줄인다. 줄여 쓰는 것은 조습하는 작용이 강해서 비위쪽으로 치중이 되니 적게 써줘야 동통을 다스릴 수 있기 때문이다(건윌을 줄이는 것은 약효가 비위로 가지 못하게 하는 것이 목적이고....관절이 붓고 습이 많을 때는 거습하는 건윌을 그냥 쓴다고 이해하면 된다)

海桐皮, 鹿角, 威靈仙, 阜角子 등을 가미해 五十肩 치료. 혹 紅花도 加.

熱症에는 葛根解肌湯+ 威靈仙, 麻黃, 鹿角, 阜角子, 石菖蒲.

대변상태 따라 大黃 가감. 威靈仙은 太陰人 아니면 소화장애 온다.

* 항강증의 처방례(태음인열증)

- 갈근조위탕 가 위령선 전충 홍화 녹각(학생 한의사). 해동피가 경항부와 상지 질환에 좋다. 협척혈을 쓴다(안선생).

* 한증. 손가락관절 통증, 어깨통증, 화병이 있으면서 관절이 부음. 비염, 감정 불안정. 조위승청탕 가 승마 한돈, 전충 홍화 3푼, 위령선 한돈.

* 무릎이 너무 시리다는데

태음인 열증으로 보여지고 갈근조위탕에 승마1.5 위령선1.0 무릎이 걸을 때 아프면 전충 홍화 0.3-0.5 잠 잘 못자면 심화를 사하기 위해서 황금1.0 가하시면 좋겠습니다. 갈근조위탕 원방도 리열이 제거되기 때문에 잠 잘 오고 피로 덜 하고 눈 편해집니다. 승마 넣는 것 잊지 마세요

* 손마디의 통증

열증- 갈근조위탕 쓰시고 손마디마디 통증은 위령선1.0 전충 홍화0.3 그리고 녹각이 좋습니다(사실 저는 녹각교를 씁니다). 발 뒷꿈치 아픈 건 족저근막염인데 0.4mm 굵기 침으로 아시혈에 깊이 박아 넣고 침체를 가열하면 즉시 좋아집니다. 이것도 요추와 관련이 있습니다.

* 열증의 슬관절통

갈근조위탕가 삼백초 승마 한돈반, 위령선 한돈, 홍화 전충 반돈/ 열다한소탕 동일가감을 썼는데 붓기만 빠지고 통증은 그대로이며 무릎이 여전히 잘 펴지지

않는다는데 대해

답) 부기가 빠졌으면 소기의 목적을 달성한 것이고 관절의 변형이 온 것은 아무리 약을 잘 써도 짙은이처럼 되지는 않는다. 닳아서 없어져버렸기 때문이다. 다리가 펴지지 않는 것은 관절조각이 관절사이에 낀 것으로서 내시경으로 제거해야 한다. 부종에는 삼백초가 좋다.

- 갈근승마를 써야 표열이 제거되면서 땀이 줄어든다. 무릎이면 전충(소금기 없는 것) 홍화 3푼, 승마를 1돈반으로 증량하고 부으면 삼백초를 쓴다.
- 열증의 슬관절통; 갈근조위탕가 전충 홍화 5푼, 위령선 한돈, 녹각교.

* 태음인 열증의 통풍처방

관절염처방에 청열약을 좀 더 넣어

갈근조위탕 + 승마1.5 황금, 유근피, 삼백초, 포공영, 조각자, 녹각 1 이

어떨런지요? 통풍질환은 어떻게 접근해야 할런지요?

- 유근피는 쓰지 마시고 위령선을 한돈 가하고 전충 홍화를 3푼 가하면 신속히 증상이 개선됩니다. 습열로 보고 접근해야 합니다. 황금도 쓰지 않는 것이 좋습니다. 상지도 이뇨작용이 있고 도움이 됩니다. 습열을 더하는 음식은 피해야 합니다.

* 태음인 열증의 요각통 임상례

- 갈근조위탕에 위령선 녹각 조각자 1.0 전충 홍화0.3-0.5 (삼백초1.0가하고 대황을 최소한 2돈으로 해야 할 것 같습니다). 비습한 경우는 거습하는 승마를 가한다.
- 요통도 습이 원인이기 때문에 승마를 써야 한다. 요슬을 보해서 요통을 치료 하는 것보다는 거습하는 것이 더 중요하다.
- 갈근조위탕에 승마 녹각교 전충 홍화 3-5푼이 가장 효과적이다. 위령선은 관절에 더 효과적이다.

* 발목의 무력과 통증

- 열증. 체중이 원인으로 보임. 갈근조위탕에 위령선 조각자 녹각 등을 쓰고 대소변이 잘 나오면 좋아진다고 말한다. 요추의 협착혈에 6cm침으로(0.4mm이상)

협척혈에 자입해서 횡돌기까지 도달되도록 침 놓으면 즉시 좋아진다. 요추의 문제

* 열증의 허리 슬관절통증에 갈근조위탕가 위령선 녹각 조각자 등을 써보겠다는 말에 대해서-- 승마를 한돈반 쓰시기 바랍니다. 관절의 어혈에는 전충 홍화를 0.3-0.5돈 넣으시면 통증이 매우 신속하게 좋아집니다.

*** 열증. 수지관절통. 간염**

- 갈근조위탕에 승마 한돈반 위령선 녹각 조각자 각한돈, 전충 홍화 각 3-5푼 (포공영?) 어떨지요?

==> 간염 간경화 등에 포공영으로 완치되는 사례도 본 적이 있다. 위령선도 한돈 이하로 쓸 것. 전충은 유독하므로 일단 쓰지 말고 승마 위령선 녹각 조각자 등으로도 충분히 좋아진다. 포공영! 청열해독하는데 정말 좋다.

갈근조위탕에 승마 위령선만 써도 관절염 통증은 잡힌다. 승마는 거습하고 위령선은 온경통락함으로써....

* 손의 다발성 관절염에는 전충 홍화 3푼, 위령선 한 돈을 가한다.

*** 한증. 거의 매일 음주해서인지 아침에 일어나면 얼굴이 붓고 슬관절이 안 좋다.**

- 태음조위탕. 승마는 하지관절통에 한돈반 쓴다. 위령선도 한돈 꼭 써야한다. 전충 홍화를 3-5푼 가하면 더욱 신속히 통증이 없어진다. 상지에는 3푼으로 충분. 하지에는 심하면 5푼 심하지 않으면 3푼. 부종의 정도에 따라 삼백초 삼백피를 가한다. 부종이 없으면 삼백출 쓸 일은 없다. 얼굴의 부종에는 삼백초까지 쓸 필요가 없다. 식적으로 인한 것이므로 태음조위탕으로 충분하다.

*** 열증의 요슬통. 변비 20년. 허리는 누워있을 때만 아프다.**

- 변비가 20년 넘었으면 일단 식적을 끼고 있는 것입니다. 구취가 심하고 대변에 냄새가 심하면 식적입니다. 갈근조위탕에 대황 2-3돈이면 충분히 좋아지겠습니다. 누워있어서 아픈 것은 어혈로 볼 수 있습니다. 갈근조위탕에 대황 두세돈으로 하시고 속단으로 어혈을 다스리고 요슬도 보강하면 좋겠습니다. 위령선으로 온경통락하는 효과도 노려야 하겠습니다. 대황은 한 돈 이하면 건위작용을 하고 한 돈 이상하면 사하하고 파혈작용을 합니다.

* 한증. 교통사고로 전방십자인대 파열로 수술대기중, 사고 후 두통 복만 과식하면

가스 찬다. 태음조위탕 원방에 갈근 두돈 승마 한돈반(슬관절은 한돈반) 전충 홍화 반돈 위령선 한돈이 좋다. 부으면 삼백초. 건울을 줄이지 않는다. 조습한다. 건울은 소음인의 백출같은 약. 건비 보비 조습....

* 수전증과 하지의 통증을 동시에 호소

머리와 손이 떨리는 환자를 조위승청탕가 산약 백자인 승마를 써서 많이 호전되었는데 2제째 복용하던 중에 야간에 다리가 뻣뻣해지면서 통증이 발생이 되더라. 그래서 기존 처방에 갈근 두돈 승마 한돈반을 가해서 써도 별 무효----> 손떨림은 심허증입니다. 그래서 조위승청탕에 효과가 있었습니다. 하지의 야간통은 음허입니다. 상부에 작용하는 조위승청탕을 쓰면 안 되겠습니다. 태음조위탕에 갈근 승마 산약 연자육 녹각 조각자 상기생을 쓰면 좋겠습니다. 상기생이 핵심입니다. 시중에 유통되는 것은 상기생이 아닌 곡기생입니다.

* 태음열증의 교통사고 후유증. 전신의 통증. 소화곤란

- 갈근조위탕에 통증이 있으므로 승마를 한 돈 반, 어혈로 홍화 3-5푼, 조각자도 한 돈 쓸 수 있다.

■ 손저림, 수족냉증

-목디스크로 인한 경우가 대부분이다(위령선 상지), 어혈약(조각자 녹각)

- 변비. 수족냉. 하복냉. 생리주기 길고 생리 시 입가의 뻣록지. 소화 잘 되고 커피 먹으면 불면. 갈근조위탕가 대황 3돈 처방. 변비 풀리고 뻣록지 1/10로 감소. 수족냉과 하복냉이 해결되지 않음. 가끔 얼굴과 목에 열이 오른다.
==> 승마로 상기되는 열을 막아주면 하복부와 수족으로 간다. 얼굴로 가서 병이 되던 것이 방향만 바뀌어 아래로 가면 이것이 원기가 된다. 밥 먹은 것은 모두 열이 되는데 갈 곳으로 가면 원기가 되고 잘못된 길로 가면 병이 된다. 우리는 한약으로 열의 교통정리만 하면 되는 것이다.

- 갈근조위탕으로 손발이 따뜻해지기는 하는데 저림증이 좋아지려면 위령선이

있어야 한다.

*** 열증의 팔저림**-- 한 달 이상 지속된 양팔의 팔저림. 커피를 먹으면 가슴이 뻐다. **갈근조위탕 가 위령선** 한 돈으로 호전. 脾主四末.

*** 수지진전, 열증**

동의보감에 의하면 손을 떠는 것은 심허다. 원지 석창포가 주약이 된다. 청심연자탕이 좋다. 수전증은 심허. 청심연자탕.

임상례)

84세 할아버지. 사시나무 떨 듯 다리와 손을 떠다. 숨이 심하게 차고, 구고==> 청심연자탕(맥문동 천문동 각 두돈으로)가 갈근2 승마1 녹용5푼. 15일만에 손떨림. 구고, 숨참 모두 없어짐==>“동의보감에 수전증은 심허로 나와있습니다. 숨찬 것도 심허입니다. 폐의 문제가 아닙니다. 입이 쓴 것은 대황을 조금 가해주면 효율적입니다.

*** 한증의 수족비증**

목 어깨 팔 다리 등이 왼쪽만 아픈지 일년이 넘음. 피곤하면 더 심해지고 가끔 안면 경련, 양손이 떨리기도 한다. 태음조위탕가 갈근 두돈, 승마 한돈 반, 위령선 한돈으로 별 무효==> **목 디스크인 것 같습니다. 포공영을 가하고 해동피도가 할 수 있습니다. 전충 홍화도 효과는 있습니다.**

*** 수전증과 하지의 통증을 동시에 호소**

머리와 손이 떨리는 환자를 조위승청탕가 산약 백자인 승마를 써서 많이 호전되었는데 2제째 복용하던 중에 야간에 다리가 뻣뻣해지면서 통증이 발생이 되더라. 그래서 기존 처방에 갈근 두돈 승마 한돈반을 가해서 써도 별 무효----> 손떨림은 심허증입니다. 그래서 조위승청탕에 효과가 있었습니다. 하지의 야간통은 음허입니다. 상부에 작용하는 조위승청탕을 쓰면 안 되겠습니다. 태음조위탕에 갈근 승마 산약 연자육 녹각 조각자 상기생을 쓰면 좋겠습니다. 상기생이 핵심입니다. 시중에 유통되는 것은 상기생이 아닌 곡기생입니다.

*** 팔저림 하지저림 환자. 교통사고 경력.**

- 한증으로 보고 전충 등을 가할까 합니다==> 승마를 꼭 쓰세요.

■ 부종

* 대강- 부종 부기의 90%는 식적에서 온다.

1) 한증- 조위승청탕을 써야 한다. 흉곽에서 복강까지다 듣는 처방으로 범위가 가장 넓다. 소양인 부기에는 형방지황탕(한증), 태양인 붓기에는 쌍해산을 쓴다.

2) 열증- 갈근조위탕.

* 열증의 부종

- 원래 다리가 붓고 아프다. 기상시 얼굴과 손이 부음. 피곤하면 두통. 피곤 스트레스 소화불량. 스트레스 있으면 변비가 되고, 평소에는 매일 보지만 후중. 소변빈삭. 한출. 심계. 누런 냉대하에 가려움....==> 갈근조위탕가 승마 황금 포공영 한돈씩 가해서 습열을 없애고 심화를 사한다. 산약 연자육 2돈씩 가해서 보신하면 모든 것이 해결된다.

* 열증의 안면부종에 갈근조위탕을 쓰다.

* 고혈압을 동반하는 손의 부종에 청심연자탕가 갈근2 승마1 목통 2돈

* 하지부종, 열증 임상례

슬관절 수술 후 슬통이 생기고 오후에 하지부종 심해짐. 누르면 들어갔다 다시 나오지 않는다. 위장이 안 좋고 변비경향. 갈근조위탕 가 승마 1.5, 위령선 삼백초 녹각 각1 전충 홍화 0.5 어혈로 보고 처방한 것임==> 부종 다소 감소. 눌러서 들어가는 증상은 호전되었으나 육안으로는 비슷함==> 속이 불편하고 소변이 시원치 않다 하여 전충 홍화 대신 간신을 보하고 신양을 돕는 상지 채양을 처방함==> 대소변 소화가 모두 편해지고 약이 더 좋아졌다 함.

■ 고혈압

산약 백자인이 좋다.

1) 열증- 청심연자탕에 갈근2 승마1(변비 있으면 대황 쓰고...). 관상동맥질환도 한달 내에 회복된다.

- 심 소장화를 빼내는 목통을 두 돈 가하면 효과가 빠르다.

2) 한증- 조위승청탕 원방. 산약 백자인 한 돈 가하기도....땀이 있으면 갈근2 승마1/ 감국도 5푼 쓸 수 있고 비습한 체질이면 승마도 한 돈 가할 수 있다.

- 조위승청탕가 산약 백자인 한 돈 감국 5푼, 한증이면 울금을 한 돈 가해도 좋다.

* 갱년기증상과 고혈압을 동반하는 태음인열증 여성에 대한 처방례

- 뒷목 빠근, 얼굴이 벌겋고 열감이 있으며 혈압이 200. 전에는 변비가 있었지만 요즘은 변비 없음. 청심연자탕가 갈근 승마 포공영(삼초의 열을 사하고 식물을 없애는 작용을 한다. 혈당에도 좋다). 대황을 가하는 것이 월등하게 좋다. 단 변이 묽어질 것이라고 사전에 이야기해야 함.

* 한증, 고혈압, 소화곤란, 10년전 뇌경색. 협심증, 현재 당뇨약 복용 중. 마황을 써도 되는지...

마황을 쓰면 폐기가 선발되어 결국은 울체가 풀리게 된다. 마황을 안 쓰면 효과 보기 어렵다. 조위승청탕에 산약 백자인 한돈 감국 5푼을 가한다. 한증이면 마황을 꼭 써야 한다. 다한증에도 마황을 쓴다. 승마도 한돈 가하는 것이 좋다.

■ 심장병(빈맥, 심계, 관상동맥협착)

* 태음인의 심장병과 소양인의 심장병.

열증에는 청심연자탕에 갈근 승마 대황을 가하고 한증에는 조위승청탕에 산약 백자인을 가한다. 소양인의 심장병은 열증에는 사백산에 치자 황련 연교 등을 가하고 한증에는 형방지황탕에 치자 황련 연교를 가한다. 태음인은 피부가 두텁고 발산력이 없어서 수분과 담음이 정체되기 쉽다. 따라서 태음인의 심장병은 거담 거습이 위주가 된다. 산약 연자육도 보신하고 수분의 배출을 도와서 담음의 발생 근원을 차단한다. 맥문동 천문동 원육 원지 석창포 백자인 산조인 등의 약미가

모두 거담하거나 심음을 돕는다.

반면 소양인의 심장병은 모두 화열의 결과이므로 청열하는 방법으로 갈 수밖에 없다. 똑같은 증상의 심장병이라도 습담이 잘 쌓이는 태음인은 거담위주로 치료하고 화열이 주로 발생하는 소양인은 청열시켜야 한다는 말이다. 심장병뿐 아니라 모든 질환이 마찬가지로 태음인은 거담위주, 소양인은 청열위주이다. 소양인은 청열하면 거담이 되고, 태음인은 거담하면 청열이 된다. 어떤 것이 더 근본적인 출발점인가를 파악하는 것이 관건이다.

소양인의 담습치료에서 거담약이 없다고 걱정할 필요가 없다. 청열하면 거담이 되는 것이다(熱生痰).

- 손이 떨리거나 머리를 흔드는 증상은 기본적으로 심장을 회복시켜야 한다.
- 가슴이 조이는 느낌은 심장이 약한 것인데 황금 승마 포공영으로 청열하면 된다. 태음인 열증.
- 태음인 열증이 확실하다. 백자인이 아니라 연자육을 써야 심장이 좋아지고 잠을 잘 자게 된다. 산약 연자육이 신장에도 작용하지만 심장에도 탁월하다. 물론 백자인도 심장에 작용한다.
- 산약 연자육은 補腎하는 약이지만 청심연자탕에서 군약으로 쓰인다. 산약 연자육이 腎虛에 효과가 탁월할 뿐만 아니라 심계나 칠정의 문제가 동시에 해결되는 것을 관찰할 수 있다. 腎이 회복되어 水氣凌心하지 못하게 해서 신장과 심장을 동시에 좋아지게 한다. 고로 신허나 칠정의 증상이 있으면 반드시 가한다. 심계가 있으면 황금을 꼭 가한다. 심계보다 신장이 중요하면 산약 연자육만 가해도 된다.
- **심계 불면은 황금이 핵심이다. 심장약인 청심연자탕에 12개 약미가 있지만 황금이 가장 중요하다. 갈근조위탕에 황금만 가미해도 심계가 멎는다.**
- 심계가 있으면 황금을 가할 수 있다. 그러나 갈근조위탕으로 변비와 식적만 없어져도 심계가 사라진다. 엄청난 이유가 있다. 그 이유???? **심장병이나 심혈관계질환의 원인이 식적. 따라서 소식을 하면 심장병이나 심혈관계 질환이 상당히 좋아진다.**
- 심계에 황금을 쓸 수도 있지만 심하지 않으면 산약 연자육으로도 좋아진다.
- 가슴 답답한 데 산약 연자육을 가한다.
- 흉통이 주된 증상이면 청심연자탕가 갈근 승마 대황이고 소화와 소변이 주된 문제라면 갈근조위탕.
- 심계가 없으면 황금을 빼는 것이 좋다.

1) 열증: 청심연자탕, 가미를 제대로 해야 한다. 변비 있으면 대황, 열이 있으면 갈근 승마. 위장증상이 더 심각하여 속이 쓰리면 갈근조위탕에 유근피1.0 가하면 좋다.

심장병(협심증).心悸, 怔忡, 不整脈, 胸痛. 계단 오를 때 숨찬거.

葛根, 升麻, 蒲公英. 便秘 있으면 반드시 大黃. (간청소, 간수축, 담즙배출)

고혈압에도 葛根, 升麻 등 청열약에 大黃 5푼.

心腎이 다 傷한 경우, 蓮子肉은 心臟, 山藥은 腎臟. 腎虛로 浮腫 오면 山藥으로 利尿. 虛煩 많고 不安, 焦燥, 不眠이면 蓮子肉 3돈, 山藥 2돈. 頭痛에는 甘菊. 전립선 비대로 小便不利면, 山藥을 3돈으로.

龍眼肉, 柏子仁은 補하고, 遠志, 石菖蒲, 酸棗仁은 去痰의 의미. 調胃升清湯도 同. 酸棗仁은 生用.(熱症藥이므로)

2) 한증: 조위승청탕가 산약 백자인

* 한증의 홍민 심계 상열감

조위승청탕가 산약 백자인 승마 각 한돈

* 한증, 여성. 요각통 심계 불면 안면부종---조위승청탕가 황금 1돈 산약 연자육 각2돈 이면 주증상 외에 피로 소화 대변까지 다 좋아진다. 요각통이면 거습을 위해 승마 한돈반을 쓴다.

* 열증의 심계에 갈근조위탕가감방 처방례

열증. 심계 정충, 소화곤란, 음식이 완전히 내려가지 않은 상태에서 자면 아침에 두중이 심함==> 갈근조위탕가 산약 연자육 각 두돈. 심계가 있으면 황금 1돈. 심계가 없으면 황금을 쓰지 않는다. 소화장애를 유발한다.

* 열증. 불안 불면을 동반하는 심계. 여성

관절통 소화불량과 변비로 오랫동안 고생. 혈압 당뇨 콜레스테롤약 복용==> 전반적인 컨디션 회복에는 갈근조위탕에 가감하는 것이 좋다. 혈압 당뇨 콜레스테롤 등의 문제에는 갈근조위탕이 좋다.

==> 심장문제를 봐주기 위해서 황금한돈을 더 가하는 것이 좋지 않을까요, 산약

연자육 각 두돈을 가하는 것이 좋을까요? 이분은 소변도 시원찮고 위장장애가 잘 와서 산약 연자육 쪽으로 가는 것이 좋을 것 같습니다마는...==>황금은 소화 장애를 유발하므로 산약 연자육 쪽으로 쓰시고 포공영 승마도 한돈씩 가하고 감국 5푼 정도 쓰면 청심연자탕의 의미가 충분히 가미된다 할 수 있다.

*** 열증. 결대맥. 심장이 뛰면서 목을 치받는다는 여성.**

청심연자탕이 좋다. 땀이 많거나 대변이 비조하면 갈근 승마를 가하고 변비가 확실하면 대황도 가해야 효과가 빠르다.

*** 심계, 불면증, 피로, 밥을 잘 못 먹어서 대변을 하루에 한번 보기 힘들다**

- 대변을 10분 이상 오래 본다고 하면 열증일 가능성이 높다. 청심연자탕에 갈근 두돈 승마 한돈으로 피부를 열어줘서 열을 신속하게 제거하는 것이 효과적이다. 만약 청심연자탕 복용 후 변이 점차 묽어지고 설사경향을 보이면 조위승청탕에 산약 백자인 한 돈씩 가한다.

- 사례; 태음인 협심증. 심계 심장에 전기가 흐르고 탈영 실정, 고혈압.....불면.... 청심연자탕가 갈근 두돈, 승마 한돈, 대황 한돈, 녹용 5푼으로 제반증상 완전 해결. 안선생.

* 한증. 폐결핵경력. 이감모 손설. 과식하면 답답하고 트림과 방구. 입이 마름. 숨이 쉽게 차고 잠이 잘 안 오고 쉽게 깬다. 아침에 특히 피로하고 낮에 열이 좀 오른다. 안구건조증. 구취..감기 오면 목증상과 발열
= (태음조위탕가 갈근2 승마1보다는) 조위승청탕에 심장을 보할 목적으로 산약 백자인 각 한 돈, 안구건조증을 고려하여 승마 한돈 감국 5푼을 가한다.

*** 한증**

뇌경색 협심증, 당뇨병. 소화가 잘 되지 않고 10년전 뇌경색. 협심증. 높은 수치의 당뇨병. 한약을 먹고 속이 울렁거려 다 버렸으며 침만 맞고도 어지러움, 구토 감...마황을 써도 될까요?---> 마황을 쓰면 폐기를 선발시켜 울체를 풀리게 한다. 마황 안 쓰면 효과 보기 어렵다. 조위승청탕에 산약 백자인 승마 한돈 감국 5푼 한다. 한증이면 마황을 꼭 써야 한다. 다한증에도 마황을 써야 한다.

* 한증. 54세 남자. 수년간 계속된 부정맥. 가슴 답답하고 아픈 증상을 수시로 호소. 대학병원에서 세균성 확장성 심근증이라는 진단. 숨이 차다 보면 폐에 물이 차서 누워서 자지도 못하는 급사의 위험성이 있다고 한다. 조위승청탕가 산약

백자인 각 한돈, 녹용 투여. 약 복용 후 가슴 답답함이나 통증이 전혀 없고 부정맥 증상도 없어짐.

■ 열감 냉감 上衝 상열

* 등이 불같이 뜨겁다는 70세의 할머니. 한증

- 치료 잘 된다. 핵심은 마황을 써야 된다는 것. 태음조위탕에 갈근 승마 신허가 있기 때문에(소변빈삭을 보고) 산약 연자육을 가하면 된다. 심계나 심장의 증상이 없어서 황금을 쓰면 안 된다.

* 여성, 주소증이 상열감. 한증.

머리 뒤통이 뜨겁다고 한다. 스트레스 받고 긴장하면 그러함. 목이나 이목구비가 움찔거리는 미세한 경련도 있음==> 조위승청탕에 승마 한 돈, 감국 5푼.

* 안면홍조

- 갈근 승마가 안면홍조의 핵심. 갈근조위탕에 가한다.

* 수족다한 안면홍조(상열감), 심하비만

여성. 안면부에만 홍조가 오면 조위승청탕에 승마 한돈, 감국 5푼을 가한다.

■ 안검경련

열증- 갈근조위탕 원방이 좋다.

안면경련은 승마 백지(양명경) 포공영등을 가할 수 있습니다.

경추에 자침도 즉각적 효과가 있다

■ 구안와사

* 대강

- 초기 1-2주에 관가름이 나는 병인데 4-6주가 지나면 약의 효과가 1/10도 안난다. 도저히 안 되면 경추에 봉독을 쓰면 99% 회복된다. 구안와사가 오래 가고 만성적 경과를 보이면 반드시 경추를 치료해야 한다. 얼굴에 침을 놓으면 뺨점. 경추에 놓으면 100점이다. 면부의 신경분포와 영양공급은 경추에서 이루어진다. 안면의 경련도 경추에 자침한다. 만성으로 가면 녹용을 쓰는 것도 좋다.
- 안면부의 질환은 경추를 다스려야 한다.

1) 열증

초기에는 외감약을 2-3일 먼저 쓰고 증에 맞는 처방을 써야 됩니다.
그러므로 갈근승기탕을 먼저 3일정도 설사가 날 때까지 쓴 후에 갈근조위탕에 승마 포공영 백지등을 가해서 쓰면 결과가 좋습니다(감국 5푼을 가하기도..).
그리고 경추의 협착혈에 꼭 황돌기까지 자침해야 됩니다. 협착혈에 3-4cm깊이로 측와위에서 침을 4-5개 자침한다. 갈근승기탕 쓸 때 설사 나면 좋은 증상이라고 꼭 말하세요. 잘 붓고 심장이나 신장에 문제가 있어 보이면 산약이나 연자육을 가할 수도 있다. 빠른 효과를 원하면 경추에 봉독을 쓰기도 한다.

2) 한증

처음에는 한다열소탕으로 2-3일 쓰고난 뒤에 태음조위탕에 갈근 승마등을 씁니다. 포공영은 한증에 잘 쓰지 않습니다

- 초기에는 외감약으로 만성기에는 내상약에 표증약을 가미해서 사용한다.
경추의 협착혈에 3-4cm자침해야 안면의 문제가 신속하게 좋아진다.
열증에 갈근조위탕에 승마 한돈 가해서 사용한다.

* 한증의 중추성 구안와사

- 일반적으로 태음인 한증의 구안와사에는 한다열소탕을 먼저 2-3일 먼저 쓰고 난 다음에 태음조위탕에 갈근 승마 등의 청열약을 가해서 쓴다. 하지만 이 경우는 중추성으로서 외감과 관련된 구안와사와는 다르고 중추성이면서 우반신 저림이 있으므로 조위승청탕에 승마 감국을 가해서 치료하는 것이 좋다. 간조열이 있으면 갈근을 써도 좋고, 태음조위탕을 써도 무방하다. 조위승청탕은 거담약이 주이다. 감국은 간경의 풍열에 쓴다.

* 삼차신경통

- 완치가 가능하다. 열다한소탕에 진충 5푼 조각자 백질려 등을 가미함. 이 병이 어혈이라는 것을 이해하게 됨. 소양인 한증의 경우 독활지황탕(가 인동 연교 황련 각 각 한 돈-- 질문자의 가미법. 안선생도 무방하다 함)에 가미하면 되는데 시호 자초 목단피 대계 등의 어혈약도 생각해 봐야 한다. 삼차신경통은 신경의 이상이 아니라 혈관의 이상이다. 어혈로 볼 수 있는 대목.

■ 중풍

蓮子回生湯은 腎氣無力, 早漏, 腸脫.

蓮子清回湯은 中風, 言語不利. 처방의 핵심은 석창포(목 쉬었을 때도 응용, 석창포탕) 保命湯은 중풍과 연관된 불면. 설사 있으면(寒) 酸棗仁 炒, 淸薑으면(熱) 生用.

* 열증. 변비, 커피반응 있음

뇌출혈이 있어서 피 뽑아내고 생활하는데 어둔하고 기운이 없다 함. 손발 떨림, 심계, 숨차고 밥맛 없으며 무릎 힘 없음.----> 청심연자탕에 가미하세요.

■ 경기

* 한증- 8세 남아. 일년간의 양약 복용. 조위승청탕 가 복용 한 달로 치료--> 기본방을 거담하는 조위승청탕으로 한 것은 잘 한 것이다. 다만, 경련은 풍열이므로 간열을 사하는 감국 한돈, 대황 3푼 정도는 가미했을 것이다. 청열하는 승마도 효과가 있을 듯...

=> 다른 사례(권승만 원장)

비슷한 케이스의 청심연자탕 아이가 있었습니다. 주로 밤에 깨서 화장실 갈 때 자기도 모르게 어둠에 대한 불안증으로 경련, 恐悸(태음인의 恐)를 했습니다. 거담하는 석창포, 야간임을 고려해 안신안면의 백자인 등을 약간 증량한 것만으로도 좋았던것 같습니다. 물론, 갈근, 승마를 가미하면 더 좋았을 거라 생각합니다. 아.. 녹용도 같이 넣었으면 좋았을 뻔 했군요

■ 이명(귀의 질환), 현훈

- 열증; 노인으로서 원기를 도와야 하기 때문에 갈근조위탕에 녹용이 좋다.
수증가감한다.

- 귀는腎이므로 보신한다. 산약 연자육 녹용 여정실 쇠양.... 거풍하는 경우도 있지만 그것은 실증이다. 젊은이의 경우...

- 한증; 이명의 원인은 여자는 담화, 남자는 신수부족. 이 여자분은 조위승청탕에 갈근 승마 황금(3푼)을 가한다. 조위승청탕 전체가 거담하는 약이라고 생각하며 된다.

- 열증 태음인의 이명에 청열거습하는 승마 한돈이나 거풍하는 감국 5푼도 쓸 수 있다. 약미가 많을수록 효과가 떨어진다.

* 귀가 딱 막힌 것 같다고 하는 태음인열증 여성

- 갈근조위탕가 산약 연자육 각 두 돈, 승마 황금 포공영 각 한 돈.

* 이명 난청 불면 현훈 가끔 몸이 후끈한다. 메니에르병. 칠정의 문제가 있고

상부의 문제가 가지고 있어서 조위승청탕가 승마 산약 한돈, 감국 5푼. 조위승청탕은 조위하고 승하고 청한다. 위를 조절하면서도 하함된 중기를 끌어올리고 상부의 열기를 식혀준다.

* 한증. 기립성현훈- 조위승청탕 가 감국.

* 열증. 병원에서는 돌발성 난청이라 함. 최근 몇 년간 엄청나게 스트레스 받음. 원인을 담화로 보아서 청심연자탕을 쓰는 것이 어떨지요. 한증이라면 조위승청탕가 갈근2 승마1 황금 5푼 정도면 어떨지요==> 담화가 원인으로 보이면 승마 한돈 감국 5푼 가하는 것이 좋다. 청심연자탕에 승마한돈 감국 5푼을 가해서 쓴다. 이명은 경추를 치료해야 하는 경우가 많다.

* 현훈에는 거풍하는 감국이 중요하다(5푼)

■ 태음인의 음성턱장애, 언어관련 장애

원인에 따라 달라진다.

식욕부진 소화불량 변비 등의 증상이 있으면 갈근조위탕,
심허증이 있으면 청심연자탕에 가미하고,
열이 극심하면 열다한소탕이나 갈근승기탕으로 열을 다스려야 한다.

* 3세 아이의 어지증

- 한열 불문하고 석창포가 핵심. 조위승청탕에 가감할 경우에는 두돈으로 증량한다.

■ 현훈

열증- 갈근조위탕에 산약 연자육2.0씩 가하시고 녹용5푼
심장성이면 청심연자탕으로.....

◎ 태음인 열증 할머니의 당뇨병 임상례

- 갈근조위탕가 포공영. 당뇨병의 원인이 식적이기 때문이다. 소양인은 치자
황련으로 청열해독해야 함. 대황이 식적 어혈 등을 해결한다.

* 한증의 현훈관련..

- 조위승청탕에 승마 한돈 감국 5푼이면 어지럼과 눈의 문제는 잘 해결될 것이다.

■ 두통

* 열증의 임상례

- 2년 이상 지속된 두통. 47세의 여성. 늘 양어깨와 뒷목이 빠근. 불면. 수면제와
고혈압약. 온몸이 자주 붓고 심장이 두근두근 불안. 신경쓰면 체한다. 청심연자탕으로
호전되다.

* 열증

- 전두통이면 양명경이고 양명경이면 승마 백지를 쓴다. 질척거리는 변일지라도
대변을 매일 못 보는 것도 식적으로 인한 경우가 대부분이다. 갈근조위탕 원방으로
식적만 없어져도 두통이 해결된다.

■ 당뇨

대황이 핵심이다. 리담을 시켜서 간이 청소되면서 간기능이 좋아지면서 회복되는 듯.

◎ 태음인 열증 할머니의 당뇨병 임상례

- 갈근조위탕가 포공영. 당뇨병의 원인이 식적이기 때문이다.

소양인은 치자 황련으로 청열해독해야 함. 대황이 식적 어혈 등을 해결한다.

- 당뇨는 허로이고 내분비계질환으로서 녹용이 가장 중요하다. 갈근조위탕에 대황을 한돈반 이상 쓰고(이열제거) 산약 연자육 두돈(보신), 포공영 한돈(청열해독 하고 식울을 푼다)쓰면 좋다. 당뇨의 원인은 여러 가지지만 식울이 가장 중요하고 내열 심화등의 원인이 있다. 녹용을 안 쓰면 효과가 늦어진다.

- 콜레스테롤이나 당뇨 수치는 잘 떨어진다. 대황량은 급증이 아니면 대변량을 보고 용량을 결정하는 것이 좋다. 하루에 2-3회 정도 대변 볼 용량이면 충분하다. 콜레스테롤이나 당뇨수치는 일단 잘 떨어진다. 입춘 입하 입추 입동 일년에 4번 약을 먹으라 티칭한다.

- 유전적 당뇨도 있을 수 있지만 젊은 사람의 당뇨는 스트레스가 가장 큰 요인이 된다. 조위승청탕가 산약 백자인 목통 한돈 가하고 리열을 사하기 위해 대황을 3-5푼 쓰고 대변상태에 따라 대황량을 조절하는 것이 좋다. 보조적으로 포공영을 단미로 장복할 수도 있다.

당뇨, 고혈압

태음인

열: 葛根調胃湯 + 蒲公英 1돈반, 녹용 5푼.

하루 2회 대변을 목표로 大黃량을 증감. 설사할 수 있다고 미리 고지.

蒲公英 단미로만 달여서 계속해서 먹어도 혈당 조절 된다.

한: 太陰調胃湯 + 葛根, 升麻 + 蒲公英(熱症藥이므로 5푼에서 1돈이하) + 大黃 5푼.

* 당뇨에 대한 설명에서.

당뇨에 무슨 처방이 듣는다 이런 것은 없다. 원인에 따라 약을 쓰면 된다. 칠정인 원인이라면 조위승청탕에 가미한다. 식적이 원인이었다면 당연히 태음조위탕이나

갈근조위탕에 반응이 있었어야 한다.

당뇨는 소모성 질환이다. 즉 허로라는 뜻이다. 녹용을 반드시 쓴다. 당뇨에 실패한 적이 별로 없다. 약 한제 쓰면 2-3개월은 정상혈당으로 지낸다(특히 스트레스나 과로 과음하지 않는 한). 일년에 4제 정도는 녹용을 쓰라고 지도한다. 입동 입춘 입하 입추 등 사립에 쓰는 것이 좋다.

■ 칠정(조증 불면 발광 등)

1. 한증에는 조위승청탕

2. 열증에는 청심연자탕(갈근 승마를 써야 신호하다)

* 정신병은 열다한소탕이고 심장병은 청심연자탕이다(안).

- 본인이 이상이 있다는 것을 알면 청심연자탕, 모르면 열다한소탕.

- 위장질환이 있는 지체장애아. 열증 음식을 보면 참지를 못하고 분노조절을 못한다
==> 갈근조위탕으로 위가 회복되면 열다한소탕으로 끝까지. 열다한소탕은 정신질환의 성약이다.

(열성태음인의) 정신병에 절대로 청심연자탕을 쓰지 않는다.

청심연자탕은 빈맥 관상동맥경화증 등 실제적인 심장질환에 쓴다.

이때는 열다한소탕에 대황을 가해서 설사를 시켜주면 힘이 빠지면서 자는 경우가 있다.

- 上熱에는 승마.

- 마황에 부작용이 나면 태음인 한증이 아니다. 불면이나 다한증에도 마황을 빼면 안 된다. 마황을 원방대로 써야 한다. 마황을 빼면 효과가 확 줄어든다.

@ 공황장애 한증 임상례

조위승청탕에 산약 백자인 각1.0가 하시고 녹용도 쓰시면 매우 좋을것 같습니다.

- 소변이나 하초에 문제가 있으면 산약 연자육, 칠정의 문제는 산약 백자인 황금.

- 上熱에는 승마.

@ 태음인 열증의 우울증에 대한 안선생의 설

--우울한 기분 외에 불안 흥민감 수면중 자주 깨고 손발이 저린 느낌도 있다고 함.

평소 체하는 느낌도 있다고 함. 청심연자탕으로 심장을 보해야 할 듯.
물론 갈근 승마를 가해서 열도 날려야 하고요, 심장이 나빠지면 손도
저리게 됩니다.

*** 열태음인의 불면- 열다한소탕으로 불을 꺼야 한다.**

* 불면과 하지시림을 호소하는 환자에게 태음조위탕과 갈근조위탕을 중심으로
가감하라는 처방례 있음.

* 불면에 마황을 쓰면 안 좋다.

*** 우울증(열증)**

- 10년. 위장이 안 좋아서 구역 오심 전두통 안구자통 식욕이 없고 잠이 너무 많이
오고 자도 자도 피곤하다. 아래로는 힘이 없고 위로 열이 오르는 느낌. 하루에 세 번
배변 --> 위장을 고치는 것이 다른 것보다 우선한다는 원칙을 고수해야... ‘담미심규’
에서 보는 것처럼 정신질환의 기저에는 담음과 어혈이 있다. 소화기를 다스리면
예상치 못한 결과를 얻을 수 있다. 이제마 선생의 모든 처방에는 칠정의 문제는
기본적으로 내재된 병인으로 봐야 할 듯하다. 잠을 못 자면 열다한소탕으로 열을
꺼야 하겠지만 이 경우는 최악한 것이 문제이므로 갈근조위탕에서 대황만 줄여서
쓰는 것이 좋을 듯하다. 가능하면 녹용도 5푼. 황금이나 포공영은 쓰지 않는 것이 좋다.

*** 열증 스트레스 과다. 불면증 이명**

청심연자탕은 心腎을 돕고 거담하는 약으로 구성됨. 감국은 평간식풍한다.
담화로 여겨지는 심계 불면 정충 등이 있으면 청심연자탕이 좋다. 청심연자탕에
갈근 두돈 승마 한돈해서 피부를 열어주고 청열하는 작용을 노리는 것이 효율적.

*** 불면관련..**

- 황금대신 포공영을 쓰는 것도 좋다. 포공영은 식을을 없애고 청열해독한다.
불면에도 효과가 있다. 감국도 5푼 가해서 평간식풍작용을 노린다.

* 열증. 발병 양상은 허리의 통증이 심하게 나타나면서 얼굴에 식은땀이 나고
가슴이 두근거리며 어지러워 쓰러질 듯 해진다. 팔다리가 조여들면서 수전증처럼
떨리고 뜨거운 기운이 위에서 아래로 퍼지는 것 같다고 한다. 서너시간 정도 지나면
이런 증상이 저절로 가라앉는다. 구건 안구충혈, 안구통증 ==> 담음의 증상으로
보인다. 청심연자탕에 가미한다.

■ 갑상선기능항진

-갑상선기능항진이면 철정의 문제도 있을 것이다. 조위승청탕에 가미하는 것이 좋다.
산약 백자인을 한돈씩 가한다.

한태음인이라도 대황을 3-5푼 써서 리열을 사한다. 소양인은 치자 황련으로 리열을 사한다.

-병명에 구애받지 말고 증에 맞게 쓴다. 호르몬 관계질환이므로 녹용을 쓰는 것이 좋다.

* 소화불량 심계 불면 구고 두통 등이 자주 있음. 갑상선질환

=> 심계 불면이 있으면 청심연자탕을 먼저 쓰는 것이 좋겠습니다. 내분비계의 문제에는 녹용이 확실히 효능이 있습니다(안)=> 청심연자탕가 갈근2 승마1 녹용 0.5=> 심계 불면이 기대만큼 좋아지지 않는다. 몸이 너무 무겁고 뒷골이 땀기고 머리로 열이 오른다. 가슴 부근에 여드름 같은 것도 많이 올라옴(학생)=> 심허보다 열이 더 문제라고 봐줍니다. 열다한소탕을 씁니다. 열이 어느 정도 제거되고 나면 갈근조위탕으로 중기를 회복시키면서 승마 포공영 등으로 청열도 겸해야 합니다.

■ 열증의 비만

- 갈근조위탕에다 오미자를 빼고 황금을 1.0-2.0 가해야 합니다.
오미자는 식욕을 항진시키고 황금은 위열을 사해서 식욕을 줄여줍니다.
대황도 높여야 됩니다.

- 갈근조위탕에서 오미자를 빼야 식욕을 줄일 수가 있습니다.
위열을 사할 목적으로 황금도 1돈 가해야 합니다. 물론 대황2-3돈으로.
몸상하지 않고 비만치료가 쉽지 않습니다.

비만에 응용

- 1) 한증; 의이인(거피하지 않은 누런 것이 이뇨작용이 강함) 증량, 대황 5푼 가해서
- 2) 열증; 갈근승기탕에 대황 증량해서 적용함.

* 스트레스를 받은 후 건강이 나빠지기 시작. 하루 이틀에 대변. 소변 시원치 않고 소화불량, 심계, 불면, 구고, 두통이 자주 있음. 갑상선이 커지기 시작한다

--> 심계 불면이 있으면 청심연자탕을 먼저 써보는 것이 좋겠습니다. 내분비계의 문제는 녹용이 확실히 효과가 있습니다. 김주선생은 갑상선에 녹용 必用이라 함.

■ 태음인 탈모

열증- 탈모는 두피의 열이나 염증이 있다고 생각해야 됩니다. 소화불량이 있기 때문에 리증약인 갈근조위탕에 청열약으로 승마 황금 포공영등을 각1돈씩 가하시고 속이 좋아지고 나면 열다한소탕으로 피부를 직접 치료할 수 있습니다. 사실 이때도 녹용이 상당히 중요할 것 같습니다.(모근에 영양을...) 비듬이나 인설이 떨어지면 맥문동 천문동을 생각해야 합니다.

- 탈모는 두피의 혈행을 개선시켜 줘야 합니다 .

경추와 측두부(측두근의 TP를 깨야합니다.) 그리고 후두부의 각혈을 자극해서 두피의 혈행을 개선해주는 것이 좋습니다. 6개월 이상 걸립니다. (주2회시술)

- 태음인 열증의 새치; 승마가 의미가 있다.

- 원형탈모증은 피부가 건조해서 인설이 날리는 경우가 아니라면 황금을 쓰는 것이 좋다.

■ 땀

* 액한의 임상례

긴장하면 심계, 불안, 소변빈삭(10회/일), 땀은 더 나고....갈근조위탕으로 해알지, 청심연자탕으로 해야할지....

==> 갈근조위탕으로 이열을 사하되, 반드시 황금으로 심열을 사해야 한다. 승마 포공영으로 청열하고, 소변이 이렇게 잦으면 산약 연자육 각 두돈, 허로이기 때문에 녹용을 쓰는 것도 좋다. 울금도 간울에 중요함.

= 자한에는 꼭 마황을 써야 한다(한증?)

- 땀 많이 흘리는 寒多者에도 마황빼지 않고 함께 쓴다.

- 마황에 부작용이 나면 태음인 한증이 아니다. 불면이나 다한증에도 마황을 빼면 안 된다. 마황을 원방대로 써야 한다. 마황을 빼면 효과가 확 줄어든다.

* 한증의 수족다한증

- 태음조위탕가 갈근두돈 승마 한돈을 생각한다. 소양인의 다한에 지모 황백 쓰는 것처럼 태음인에게도 쓸 만한 것이 있지 않을까?

답) 그것이 바로 갈근 승마, 승마는 청열하기도 하지만 거습한다. 승마가 관절염에 탁월하게 듣는 것도 바로 청열하기 보다는 거습하기 때문이다.

- 태음조위탕가 갈근 두 돈, 승마 한 돈, 녹용. 술을 많이 먹으면 대황을 3푼 가할 수 있다.

* 수족다한증

- 수족다한은 칠정으로 인한 것입니다. 청심연자탕에 갈근 승마를 가하는 것이 좋겠습니다. 대황도 ?푼 정도 쓰는 것이 열이 더 빨리 해결됩니다. 심한 다한증을 암보다 치료가 더 어렵다고 합니다. 그만큼 자율신경의 조절이 어렵다는 말이 되기도 한다.

* 식은땀 흘리면 승마를 가한다.

* 열증, 두한출 무기력.

갈근조위탕가 산약 연자육 두돈. 승마 한돈(청열조습)

* 열증 여학생의 다한

- 갈근조위탕에서 대황 한돈반으로 증량, 가 산약 연자육 각두돈, 승마 황금 포

공영 각 한돈 하겠다는 학생원장의 의견에 대하여==> 심계가 없으면 황금을 빼는 것이 좋습니다. 황금이 이런 부작용을 일으키는 경우가 있다(배가 아프고 대변이 자주 가늘게 나온다). 양으로 항진되어 땀이 난다고 볼 수 있다. 산약 연자육으로 음을 보충하는 것이 좋다. 칠정이 다한의 원인이라면 청심연자탕에 가미할 수도 있다.

*** 수족다한 안면홍조(상열감), 심하비만**

여성. 안면부에만 홍조가 오면 조위승청탕에 승마 한돈, 감국 5푼을 가한다.

*** 열증의 다한증 임상례**

- 갈근조위탕가 산약 연자육 각 두돈(심계), 승마 포공영 각 한돈(표열), 마황 녹용 각 반돈을 한제 복용한 후, 아이의 수족다한증과 껍질 벗겨지는 증상이 치료되다. 마황이 없이는 다한증을 절대로 고치지 못한다 해서 열증이지만 마황을 5푼 가했다고 함.

*** 한증의 다한(임상례)**

당뇨가 있는 할머니. 태음조위탕가 갈근2 승마1 대황 0.3==> 표열을 제거하고 내열도 같이 해결해주니 다한증이 신속하게 좋아지더라.

■ 출혈

* 94세의 태음인 열증 남성. 치질수술 받고나서부터 대변 볼 때마다 항문출혈한다. 대변은 일주일에 한두번. 소변은 한두시간에 한번--> 비습하고 술을 잘 먹는 사람인가요? 지혈시키는 것보다 거습 보신하는 것이 더 중요해보입니다. 산약 연자육 승마가 중요해보입니다. 연자육이 수렴 지혈합니다. 코피 날 때도 연자육입니다.

■ 태음인의 보약

1) 한증- 태음조위탕

2) 열증- 갈근조위탕(가 산약 연자육 각2.0 녹용0.5돈. 허로의 경우).

- 태음인 열증은 리열이 문제이고 리열이 제거되면서 식적에 잘 듣고 중기를 회복하는 갈근조위탕이 태음인 열증의 내상약의 핵심이 되겠습니다. 후세방에서 보중익기탕이 중기를 회복하듯이 갈근조위탕이 태음인열자에게 중기를 회복해 줍니다. 여기에서의 핵심은 대황이 리열을 빼낸다는 것입니다. 태음인열자의 외감도 대황(갈근승기탕) 내상도 대황(갈근조위탕)이라는 사실을 짚고 넘어가야합니다. 즉 태음인 열자는 표리병에 모두 대황입니다.

이토록 리열이 문제라는 것입니다.

- 그리고 태음인의 경우 보신하려면 산약 연자육을 가하면 하초의 문제나 소변 자궁 등의 문제가 해결됩니다. 보는 주로 보비 보신을 생각해야합니다.

- 蓮子回生湯은 腎氣無力, 早漏, 腸脫.

* 태음인 열증의 성욕저하

- 4년 동안 하루 한 병씩 소주 먹음. 천명 다몽. 갈근조위탕 가 포공영(태음인 간질환에 탁월. 당뇨에도 좋고 식적도 푼다. 다만 한증에는 쓰기 곤란) 산약 연자육 각 두돈(보신), 쇠양 여정실(신양을 돕는다), 녹용(온보). 무엇보다 갈근조위탕의 대황이 간을 회복시켜준다.

- 소변이나 하초에 문제가 있으면 산약 연자육, 칠정의 문제는 산약 백자인 황금.

* 한증의 보약

- 스트레스가 많은 태음인 한증. 태음조위탕가 갈근 승마 스트레스가 많아서 산약 연자육 녹용을 쓸 수 있다.

* 감기 후 보약

갈근조위탕에는 오미자 길경 행인 맥문동 등 폐를 보하는 약으로 구성되어 있다. 감기후의 보약으로 적당하다.

* 울금의 이담작용이 피로회복에 도움이 된다.

* 피로가 풀리지 않아서 고민입니다. 녹용을 써볼까 합니다--> 울금의 이담작용이

피로를 풀어줄 것입니다.

*** 술을 많이 먹는 열증의 태음인이 정력을 중게 해달라고 한다.**

녹용은 한증약이므로 5푼 정도 써야 한다. 산약 연자육은 보신에 필수다. 술을 많이 먹으므로 울금으로 이담시켜야 한다. 쇠양은 신양을 돕는다. 낭습이 없으면 사상자를 빼고 쓴다. 여정실은 주증하거나 초해서 쓰지 않으면 변이 묽어질 수 있다.

* 한증의 태음인 여학생의 총명탕으로 조위승청탕가 산약 백자인 녹용 어떨까요?

* 한증의 기력저하에 태음조위탕. 중기를 보한다는 개념으로 쓴다.

*** 낭습(임상례)**

50세 남자. 낭습 소변삭, 족열 위장불편.

갈근조위탕가 산약 연자육 각2 승마 포공영 사상자 쇠양 각1

=> 발이 답답한 느낌이 줄고 과로해도 잘 지냄. 속이 편하고 입맛이 좋아 잘 먹음
낭습은 없어지고 소변은 비슷

*** 소아의 오지 오연증(발달장애, 소화곤란)**

오지 오연증은 補腎이 기본입니다. 갈근조위탕에 산약 연자육 여정실 쇠양 등으로 보신합니다. 그리고 언어발달이 늦은 경우나 발음이 안 좋은 경우에는 거담해야 한다. 거담하는 석창포를 쓴다. 산약 연자육은 腎도 보하지만 心도 보한다. 여정실 쇠양보다는 산약 연자육이 좋겠습니다. 그리고 수액대사도 촉진해서 담이 생기는 근원을 차단해서 심장이 좋아집니다. 비는 생담지원입니다. 먼저 갈근조위탕에 가미해서 담의 근원을 회복시킨 다음에 청심연자탕으로 보심 거담 하는 것이 좋을 것 같습니다.

■ 여성질환

- 자궁질환으로서 냉 대하의 습성문제가 있을 경우에 열다한소탕을 쓴다. 황금 고분이 조습하기 때문이다. 식적이나 비위문제를 겸하면 갈근가조위탕가감으로 간다.
- 갱년기장애에도 열다한소탕을 쓸 수 있다. 승마가 있기 때문이다.
- 여정실, 사상자, 쇠양; 여자들 냉 대하에 쓴다. 세트로 가미. 사상자가 습에 가장 중요함. 남자의 낭습, 여자의 냉 대하. 寒濕하고 腎陽부족으로 인한 냉 대하. 낭습.
- 자궁의 어혈은 전충 홍화가 아니라 포황이다.
- 자궁의 어혈에는 포황 한돈, 홍화 5푼, 생리혈에 덩어리가 있으면 조각자 등을 쓰는 것이 좋다.
- 고본을 부인습증(자궁 음부)에도 응용한다. 신온한 약성이므로 火旺 多汗者는忌한다.
- 전충은 어혈약이지만 주로 지절통에 쓴다.

* 태음인 열증의 불임. 수족 아랫배냉증

- 갈근조위탕가 산약 연자육 각 두돈.

* 갱년기증후군

- 심계가 심하거나 우울증(디프레션)증상이 보이면 청심연자탕에 가미합니다.
- (상열감이 있으면 갈근 승마로 표열을 제거해야함) 전신적 허로가 심하면 갈근조위탕에 산약 연자육2.0씩 가해서 보신하고 녹용을 5푼씩 넣어야죠(허로). 열이 극심하고 심계가 있으면 승마(면열) 포공영(청열해독 간울 식적) 황금(심화를 보고)를 가해야 합니다. 잘 듣습니다. 녹용을 써야 더 잘 듣습니다. 황금 포공영 승마는 땀을 그치게 한다. 열다한소탕은 별로다. 대황과 포공영이 아니면 간병을 고치지 못한다. 신장질환도 마찬가지. 서혜부 통증이 있는 경우에는 흉요연접부에 자침하면 즉시 좋아진다.
- 갱년기 증상은 허증이므로 심장 신장을 회복하는 산약 연자육을 쓰는 것이 좋다. 열이 확 오르고 땀이 나면 승마 포공영 등을 가하는 것이 효과적.

* 갱년기증후군 토의사례

갱년기증상으로 피로 견비통. 갈근조위탕가 울금 청호 각 한돈, 감국 5푼-->

평소 대변은 하루 한번 변비경향이었는데 약 먹으면 바로 화장실로 가지만 변 보기는 더 힘들어짐. 복통. 수면곤란. 생리 끝난지 5일만에 다시 생리가 나온다 어떻게 해석해야 할까요?--> 청호가 한증약. 한 돈은 지나친 듯 하다. 생리가 5일만에 나온 것도 열이 지나쳐서 생긴 것으로 보인다. 대변보기 힘든 것도 마찬가지. 열증에는 3-5푼 이하로 써야할 듯하다(안). 자궁문제에서 출혈경향이 있는 경우, 대황으로 인해 출혈이 지속되는 경우도 있다(학생원장)

* 갱년기증후군

- 일년전 폐경이후로 낮에도 열이 오르고 다한출. 밤에는 더 빈번하게 열이 오르고 땀이 많다. 손발시림이 심하고 속이 쓰리고 더부룩==> 갈근조위탕에 승마 포공영을 가한다. 보신은 산약 연자육으로.....갱년기에 녹용을 필수(녹용은 부작용이 전혀 없는 천연의 호르몬제라 생각하면 된다)

* 태음인 대하

- 태음조위탕에 갈근2돈 승마1돈으로 청열하시고 산약 연자육각각 2돈을 가해서 보신하고 포공영5푼-1돈을 가해청열해독작용을 노립니다(한증은 1돈이하). 여정실 쇠양도 보신하고 사상자는 거습해서 치료하는 것인데 이것은 백대하의 경우입니다. 물론1돈씩 가하면 됩니다. 사상자는 남자의 낭습에도 사용합니다.
- 냉이 심하면 산약 연자육 각 두돈, 승마 황금 포공영을 각 한돈씩 쓴다.

- 갈근조위탕 설명에서

太陰人 전립선 비대에는 山藥, 蓮子. 기본 1돈에서 1돈반, 심하면 3돈.
蓮子回生湯 설명에서 蓮子肉(補腎) 5돈 가미하라고 언급. 寒症은 太陰調胃湯에 가. 女貞實(補腎), 蛇床子(去濕. 囊濕에 4돈), 鎖陽(補腎陽)으로 女性 냉대하에.

- 열증의 대하

갈근조위탕에 (승마) 포공영 황금으로 거습하고 산약 연자육도 가한다. 습열로 보아야 하므로 여정실 사상자 쇠양보다는 포공영 황금이 나은 것이다.
생리혈에 덩어리가 많은 것은 과혈제를 써야 한다. 그렇다고 생리통이 줄어들지는 않는다. 생리혈만 깨끗해지고 통증은 또 다른 문제이다.

* 자궁선종으로 일부 적출하고 내원. 부종. 소화불량 불면 피로.

수술 후 생리량 늘음.

- 한열에 따라 태음조위탕이나 갈근조위탕에 승마 포공영 황금 그리고 산약 연자육으로 하초의 문제를 해결하면 된다.

*** 열증의 자궁근종에 대한 문답**

- 갈근조위탕가 산약 연자육 각 두 돈, 승마 포공영 각 한 돈, 녹용 반 돈 쓰려 합니다.==> (안) 황금을 가하는 것이 좋습니다.==> (변) 병인을 심화로 보는 것입니까?==> (안) 심화를 사해야 하혈이 멎습니다. 혈병은 心肝을 염두에 두어야 합니다. 간신을 다스려도 해결되지 않던 경우에 황금으로 하혈을 다스린 예가 많습니다.

*** 열증의 음부소양증에 대한 처방례**

갈근조위탕 가 산약 연자육. 음부 소양증은 습열이다. 승마 황금 포공영을 한돈씩 가한다. 녹용을 써야 좋아지는 경우도 있다.

*** 열증 여성의 배란기 동안의 하혈**

- 생리 시작할 때까지 이주간 하혈. 열다한소탕가감으로 하면 듣지 않는다. 내상으로 보고 갈근조위탕가 산약 연자육 승마 황금 포공영하면 쉽게 치료된다. 여기서 핵심은 황금. 혈병이므로 심화와 간을 다스린다고 생각하면 된다. 녹용을 가하면 훨씬 빠르게 좋아진다. 그렇다면 한증에는 태음조위탕가감으로 해야 하지 않을까...

*** 열증의 잦은 생리 하혈 불임**

- 열증의 태음인. 불임으로 인공수정.... 갈근조위탕가 산약 연자육 각 두돈, 녹용 반돈을 쓰다. 내원당시 생리중이었는데 지금도 여전히 생리중.

답) 열이므로 청열해야 한다. 승마 황금 포공영 각 한 돈으로 쉽게 해결된다.

*** 열증의 생리불순. 2-3개월에 한번. 대변 2-3일에 한번**

갈근조위탕가 산약 연자육 각2돈. 포황 승마 포공영 각 한돈 쓰는 것이 어떨까요?

--> 홍화를 3-5푼 쓰는 것이 좋습니다. 조각자도 파혈작용이 있습니다. 대황도 증량해서 하루에 두 번 정도 변을 보게 하는 것이 좋습니다. 파혈하는 것보다 대소변을 통해서 습담을 제거하는 것이 핵심이 되겠습니다(1106).

* 한증의 무월경에 조위승청탕가 갈근 승마 산약 연자육 포황 홍화를 쓰겠다는 견해에 대하여==> 무월경에 조위승청탕을 기본방으로 쓰면 안 됩니다. 처방의 작용방향이 상부이기 때문입니다. 물론 칠정상으로 인한 무월경이면 사용가능합니다. 태음조위탕을 기본방으로 하는 것이 맞습니다. 허로를 겸하면 녹용을 꼭 쓰도록 하십시오.

*** 2주간 생리를 한다.**

심간을 해결해야 한다. 황금 포공영을 꼭 쓰세요.

*** 열증 태음인의 유산**

갈근조위탕에 산약 연자육을 두돈씩 가한다. 하혈이 많지 않거나 냉이 많거나 하복불쾌감이 있으면 승마 포공영도 한돈씩 가한다. 칠정의 증상이 있으면 황금을 가하고 칠정의 문제가 확실하지 않으면 황금을 쓰지 않는다.

산후나 유산 후의 어혈에는 포황이 가장 중요하다. 그 외에 홍화 녹각(녹각교가 더 좋다), 허리가 아프면 속단을 쓴다. 한돈 이상 쓰지 말 것. 녹각 속단 등도 파어작용이 있다고 생각하고 증에 따라 써야 한다. 파혈보다는 보허가 먼저다. 파혈제를 산후에 남용하지 않는 것이 좋다. 안 선생 같으면 산후에 포황만 쓸 것이다. 요통이나 지절통이 있으면 홍화 속단 녹각 등을 가하는 것도 좋다. 단삼도 산후어혈에 쓴다고 한다. 단삼 하나로 사물탕의 효과를 낸다는 말도 있다.

*** 불임**

한증이면 태음조위탕에 갈근 두돈 승마 한돈 가하고 산약 연자육을 두돈씩 가해서 보신한다. 열증이면 갈근조위탕에 산약 연자육 두돈씩 포공영 승마 황금 한돈씩물론 파어제를 쓸 수도 있다. 갈근조위탕을 쓸 때 대변이 삼일에 한번씩 나오면 대황량을 한돈 추가한다.

- 열증의 사례; 갈근조위탕에서 변비가 있으므로 대황을 증량하고 산약 연자육 두돈씩 냉이 많으면 승마 포공영 한돈씩.

- 진짜 어혈이나 난관폐색 등에는 수질을 활용한다.

- 열증의 사례; 갈근조위탕가 산약 연자육 두돈씩. 냉이 많거나 자궁이 나쁘면 승마 포공영 황금을 가해도 좋다.
- 생리에 덩어리가 있거나 유산한 적이 있으면 포황을 위주로 홍화 조각자 등을 응용해서 어혈을 다스릴 수 있다. 가능하면 녹용을 쓰는 것이 좋다.

*** 시험관 불임시술**

- 열증; 갈근조위탕에 산약 연자육 포공영 승마 황금 녹용. 시험관 시술을 여러번 했으면 하초와 원기의 손상이 엄청나다고 생각해야 한다. 불임시술은 배란을 위해 전신의 에너지를 다 쓴 상태이다. 따라서 녹용이 필수.
- 한증; 태음조위탕에 산약 연자육 두돈, 갈근 두돈 승마 한돈, 황금 포공영 5분. 녹용

<태양인>

1. 태양인의 판별

양약부작용이 많다 간이 나쁘다 제일 단순 제일 솔직 제일 다루기 쉽다
가장 노골적이다 한번 해보자고 할 때 긍정적이다 상체가 발달했다
코끝이 죽어있다 눈치 보지 않고 들이댐 대둔근이 약하다 눈빛이 강하다
애노지기가 있다 일사병 잘 걸린다 허리가 약하다 오래 앉지 못한다
균형이 약간 깨지는 느낌 눈동자 발달(거짓말 하면 안될 것 같은 눈매)
눈동자의 움직임이 빠르다 외후두 융기가 발달 등이 볼록 견봉이 발달
똥싼바지 주관절에서 손끝까지 유독 긴 경우가 많다 귀가 뒤로 붙어있다
입끝에서 귀까지의 거리가 길다 목이 유달리 가늘다 밖으로 강하게 나오는 눈빛
용 눈 오래 앉아있지 못한다(허리가 약해서) 일사병에 취약
코가 못났다(기세가 약하다) 수박 먹으면 탈난다 입술 끝에서 귀까지 거리가 길다
귀가 뒤에 붙어있다 목이 가늘다 때론 목이 길다
엉덩이가 크더라도 옆으로 벌어지고 뒤로 튀어나오지 않는다.
옆 사진에서 보면 코끝이 처져있다.
코의 경골까지는 잘 생겼는데 연골이 시작되는 부위부터 기세가 팍 죽는다.
가분수에 똥싼바지.
- 태양인의 맥폭이 가장 작다.

가오리형 홍곽; 납작하다는 의미. 태음성은 홍곽이 두툽고 태양성은 홍곽이 얇다.
침 맞으러 누워있으면 바닥에 붙어있다는 느낌. 태음인은 둥그렇게 올라옴.

태양인은 둔부가 아무리 발달돼도 뒤로 볼록해지지 않는다(옆으로 퍼진다). 소양인은 둔부
가 아무리
발달해도 지나치게 옆으로 넓어지지 않는다.

(심화)

코끝 처지고 약해짐 코 중간 부위가 넓어지는 경향 눈빛이 사납다(애노지기)
정면에서 코의 허리가 상부나 하부보다 넓다. 코의 기세가 아래 위가 함께 죽은 모양.
원래 목이 가늘고 몸에서 얼굴 쪽으로 올라가면서 더 가늘어지는 경향

더운 목욕탕에서 못 견딘다 매운 음식에 무척 취약하다(고추, 마늘)
술직함+ 빨리빨리 무당 눈 번비에 번데기 먹으면 해소된다

태양인이다 싶으면 고기와 수박에 대한 반응을 체크해야 한다. 어깨가 올라감.
목이 특별히 굵으면 태양인일 가능성은 거의 없다. 태음인일 가능성이 높다.

- 건봉이 발달됨

- 태양인의 코는 마귀할멈이나 무당같은 느낌이 있다.

- 태양인은 허리도 가늘고 목도 가늘어진다. 이는 둔보와 얼굴의 크기에 비례해서이다. 허리가 길다는 것은 허리가 가늘다는 말도 된다. 목이 길다는 것은 목이 가늘다는 말도 된다. 태양인의 허리가 가늘다는 것은 상하에서 중간이 빈약하다는 말이다. 얼굴에서도 관골과 턱 사이가 꺼지면서 빈약해 보인다. 이는 중간이 빈약하고 상하가 발달된 태양인의 체형과 같은 맥락에서 이해할 수 있다. 태음인은 허리가 발달해서 중간이 꺼지기 어렵다. 오히려 통통해지거나 두툼해진다. 태음인은 허리가 굵은 중형이 되고 태양인은 허리가 약해서 얼굴도 모래시계형이 된다.

- 턱이 약하지 않아서 일단 소양인은 아니다. 관골과 턱 사이가 모래시계형으로 함몰. 상하로 발달되었지만 중간이 빈약(관골과 턱 사이가 빈). 턱이 커서 상대적으로 목이 가늘어 보이기도 한다. 같은 양인이지만 절대 소양인처럼 턱이 약해지지 않는다. 얼굴의 크기가 큰 느낌. 얼굴의 허리가 꺼지고 약해짐. 모래시계형. 태음인은 중간이 발달한 중형.

태음인은 확실히 아닌것이 확인?습니다.이렇게되면 태양인을 의심할 수 밖에 없습니다. 육식 사우나 기름끼 수박 밀가루음식 특히 라면등의 반응을 확인하시고 오래?으면 허리에 무리가 많은지 일처리를 미루지 못하고 즉시즉시하는 성품인지 확인하고 태양인약인 미후등식장탕이 속에 편한지를 보시면 좋겠습니다. 체형도 태양인의 특징을 대입해 보시는 것도 중요할것 같습니다. 소음인이나 소양인의 가능성은 거의 없어 보입니다.

- 태양인은 애교가 없습니다. 못 생겨도 애교있고 착착 달라붙고 약간 오버하고...이것은 소양인입니다. 소양인은 누구하거나 금방 친해집니다.

소음인 소양인은 확실히 아닙니다. 사우나를 좋아하고 싫어하는것 보다는
현저히 힘이 빠지는지 확인해 봐야합니다. 이렇게 태양인으로 여겨지면
육식에 대한 반응 밀가루음식 기름기 있는 튀김류 수박등을 먹었을 때의 반응을
확인하시고(설사한다) 하체와 둔근의 발달이 미약하고 어깨가 넓어져 있는지
그리고 오래 앉아 있지 못하는지 등등을 확인하고 결정하시는 것이 좋겠습니다.
태음인 같아 보이긴 하는데 태양인도 좀 의심을 해야 됩니다.

* 음식반응

포도, 파인애플, 키위, 복숭아(도인), 토마토는 太陽人약.

太陽人은 소고기 먹으면 속이 달이고 뜨거워진다. 무, 도라지, 당근, 양파 등 뿌
리야채 먹으면 안좋다.

- 발한 후 반응이나 음식반응(육식 우유 수박)을 봐야한다.

태양인에 해당하는 문진을 해보시면 됩니다. 사우나 육식 수박 기름기 등의 반응
맥진 엉덩이에 살이없는지 등도 살펴보시면 좋겠습니다. 외모로는 태양인의
가능성이 엄청 많습니다

태양인이라고 고기나 수박 사우나를 싫어하는 것은 아닙니다. 다만 그후에 반응이
좋지안다는 뜻입니다. 사우나 할때는 개운하지만 그후에 힘이 빠집니다. 육식도
소화는 그런데로 되지만 그 다음날 대변이 나빠지게 됩니다. 아니면 대변이 잘
나오지 않고 후중감이 생깁니다. 허리가 가늘고 길면서 엉덩이에 살집이 없어서
비약해 보이는지 맥도 무신한 맥상인지 확인해 보면 좋겠습니다.
미후등식장탕을 쓰고서 변비가 안되면 태양인이라고 확인해도 좋습니다.

태양인 약물

노근은 태음인 약이다.

동충하초는 태양인의 대표적인 보약입니다. 폐신을 돕기 때문에 감기 잘 걸리는 사람에게 좋습니다. 누에 (원잠, 건잠)는 비신을 돕기때문에 잘 못먹는 사람에게 좋습니다. 플라스틱곽에 든것도 효과가 있습니다.제주도산이 좋다고 들었습니다

- 교맥은 위열을 사합니다. 소양인 같으면 석고같은 약이라고 할 수 있습니다. 고로 식욕항진 당뇨병등에도 응용할 수 있습니다. 실제로 모밀이 혈당강하 효과가 있습니다

도인과 구인은 어혈약의 대표. 구인은 자음, 청열, 인후에 문제, 천식.

자궁의 어혈에는 택란이 가장좋습니다. 백강잠으로 거풍해야 지절통이 사라지겠습니다. 변비경향이므로 도인을 중용하시고 와송은 그데로 쓰시고 소변문제가 있어서 어성초를 1.5-2돈 가하시는 것이 좋겠습니다.

- 계혈등은 보혈약인데 태양인의 빈혈이나 산후혈증에 특효약이라 생각하면 된다.

2. 태양인 한열, 표리, 병위, 처방의 관계

- 소음인이나 태양인은 위가 약하다는 식으로 유도심문을 해야 한다. 그 유도심문과 전기고문에 살아남은 자만이 열증이다. 열증은 배터지게 먹고 그대로 누워 자도 그 다음날 아침에 아무 증상이 없어야 한다. 그래야 열증이 된다.

한열 구분 : 위가 좋은지 나쁜지로

*** 소양인 열증의 환자에게 숙지황, 산수유를 쓸 수 있냐는 물음에 대하여**

==> 소증이 열이라도 현증이 한이면 한을 제거해야 합니다. 그래서 열증환자에게도 숙지황 산수유를 쓰는 경우가 있습니다. 그래야만 병증이 제거됩니다.

태음인도 마찬가지입니다. 열증도 현증에서 한이 보이면 마황 의이인 등을 가합니다. 그래서 8상의학이 아니고 4상의학입니다. 한열은 자유롭게 넘나드는 것이어서 4개의 바운더리에서 논해야 됩니다.

3. 태양인 약물의 가감 및 질환별 처방운용

■ 외감

감사합니다. 선생님!!! 열증의 외감약은 오가피장척탕, 위장약은 쌍해산/ 속쓰림 조잡은 교맥관장탕 한증의 외감약은 오가피쌍해산, 위장약은 미후등식장탕인거죠?==> 정확하게 이해하신 겁니다.

한증감기약

五加皮雙解散 (표리한열불분) 寒症外感, 熱症胃腸

비연 있으면 蘆根, 漁腥草 증량. 알레르기성 결막염 치료에 있다.

고혈압에 漁腥草 2돈으로 利水清熱(利尿작용). 白茅根 2~5돈으로 청열.

眞珠로 安神, 鎮靜. 不眠과 心悸亢進에.

白僵蠶 1돈반~2돈(중풍)으로 거풍. 두통에.

五加皮 증량하면 피로감 감소. 清熱, 利肝.

白茅根은 변열 없애고, 白僵蠶으로 去風, 利水, 清熱去濕을 위해 漁腥草, 眞珠로 安神.

고혈압, 갑상선 기능 항진에도 활용.

嘈雜(속쓰림) 있으면 蘆根, 蕎麥米(少陽人의 黃蓮같이 열을 사함) 1돈.

便 묽고 消化不良이면 獼猴桃 1돈 추가.

한 위장 : 獼猴桃植腸湯

열 감기 : 五加皮壯脊湯

■ 비염

비염 결막염은 쌍해산에 노근0.5-1돈 더 가하시고 어성초를 1돈을 가해야 합니다. 가려우면 풍열에 쓰는 백강잠을 1-1.5돈 추가 할 수 있습니다. 통증은 따로 잠사 오가피탕을 쓰시고 다쳐서 어혈이면 도인 구인을 가해서 어혈을 풀어야 합니다

* 비염

오가피쌍해산 거 노근. 노근은 태음인약이다.

한증 비염

五加皮雙解散 :

蘆根, 漁腥草 5푼에서 1돈. 漁腥草는 肝濕熱 제거. (少陽人の 人진)

口渴, 煩燥, 눈이나 인후 같은 상부 염증에는 白茅根 2돈에서 5돈.

비강 혈었을 때는 瓦松 1돈에서 1돈반.

피로 많을 때 五加皮.

불면증, 심계, 불안, 정충에는 眞珠.

열증 비염

蘆根清肺湯 : 현저한 열과 黃涕.

기침이 너무 심하고 咽喉에 문제가 있으면 蚯蚓으로 滋陰清熱, 引火歸元.

위장이 약하면 獼猴桃 조금 가한다. 번조와 구갈에는 白茅根 가미.

■ 소화기질환

올봄에 하신 강의 녹취록을 보며 공부하고 있는데요
(2007년 4월9일 10회 강의에서 태양인편부분에서 발췌)

"교재 155페이지 아래에 교맥관장탕을 보시죠. 열증 위장병인데, 조잡성 위장병입니다. 조잡성. 감기걸렸을때 오가피쌍해산이 듣는 사람은, 위장병이 왔을때 미후도식장탕을 쓰는 것이 아니고요, 요결(교맥관장탕)로 가지고 소화를 촉진시켜 주든지, 쌍해산으로 가지고 소화를 시켜주든지..아니면, 속이 쓰리고, 사기불기, 사통불통, 탄산, 조잡 이런 것이 오면, 교맥관장탕을 쓰는 겁니다."

부분에서요,

감기걸렸을때 오가피쌍해산이 듣는 사람이라고 하면 태양인 한증이라고 생각되는데요, 위장병에 미후도식장탕을 쓰는 것이 아니고 교맥관장탕을 쓴다는 말이 잘 이해가 되지 않습니다. 혹시 녹취록에 빠진 부분이나 표현이 있는건지, 아니면 제가 뭘 잘못 이해하고 있는 건지 궁금합니다.

정리하면

1. 교맥관장탕의 치료범위
2. 태양인 위장병의 한증, 열증의 처방이 궁금합니다.

선생님, 매일매일 감사드립니다.

열증의 위장약은 쌍해산이라는 것은 이해가 되시죠. 그런데 이것은 소화불량일 경우를 말하는 겁니다. 열증이면서 소화는 잘 되면서 속쓰림 탄산 조잡증이 오면 교맥관장탕이라는 이야기입니다. 즉 열증의 그냥 소화장애는 쌍해산이고 위산과 다로인한 조잡증이면 위열을 사하는 교맥이 들어간 교맥관장탕을 쓴다는 이야기입니다. 07.09.05 15:38

- 감사합니다. 선생님!!! 열증의 외감약은 오가피장척탕, 위장약은 쌍해산/ 속쓰림 조잡은 교맥관장탕 한증의 외감약은 오가피쌍해산, 위장약은 미후등식장탕인 거죠?==> 정확하게 이해하신 겁니다.

* 소화곤란. 미후도식장탕에 도인3돈 원잠 어성초를 각 한돈 썼는데 소화가 여전히 안 되고 배에 고구마만한 적취가 만져진다. 속이 갑갑해서 미치겠다고 호소 --> 열이 지나치게 많으니 쌍해산을 써야 한다. 노근을 거하고 백강잠 한돈 반, 미후도 한두돈 추가, 오가피 한돈 추가(소화상태에 따라서), 진주 1.5-2돈, 허번이 있으면 백모근 두돈 등으로 안정을 시켜야 한다.

* 속쓰림

미후도식장탕으로 모든 증상 호전. 소화 오심 기상곤란 등의 증상 호전. 다만 새벽에 공복의 속쓰림이 남아있음--> 위열을 내려는 교맥을 증상에 따라 1-2돈 가한다.

* **소화불량 입면장애**, 배고픈 것을 참지 못해 밤에라도 일어나서 뭔가를 먹어야 하고 자다가 소변이 마려워 소변을 봐도 시원치가 못하다.

미후도식장탕가 백하수오 한돈반, 야교등 백편두 각 한돈, 진주모 한돈 반==> 참을 수 없이 배고프던 것이 사라지고 소변이 참을 수 없이 마렵지 않게 되었으며 더부룩한 것이 없어지고 잠을 잘 잘 수 있게 됨. 소변도 양호.

■ 대변

- 대변이 잘 통하지 않으므로 도인으로 윤장시키고 하수오를 쓰면 좋습니다.

■ 소변

* 소변출혈

- 소변에 혈뇨가 나오는 것은 태양인에게 아주 흔한 증상이다. 소변출혈에는 청열지혈작용이 있는 와송 1.5-2돈, 백모근을 꼭 써야 한다. 血尿에는 와송을 쓰면 싹 없어진다.

- 소변을 시원하게 보지 못하는 문제가 있으니 어성초를 한돈반에서 두돈 가하시는데 좋겠습니다.

* 야뇨증

- 태양인 야뇨에는 하수오를 응용한다. 하수오는 간신을 보한다.

■ 간담질환

* 황달

황달은 습열로 인해 생긴다. 소음인에게는 인진을 쓰고 태음인에게는 체질불문하고 무조건 대황으로 사하해야 한다. 소양인에게는 고삼으로 습열을 제거하고 복령 택사 등으로 습을 내보내야 한다. 태양인에게는 초롱담 어성초가 중요하다.

■ 피부질환

태양인의 여드름

좁쌀같은여드름이 얼굴에 퍼졌는데 멀리서 보면 있는지없는지도 모른다.

쌍해산에 백강잠1.5(거품 피부를 열어서 열이 나갈 수 있는길을 열어줌) 와송(청열 열 생기) 비습하면 어성초2.0 그리고 산장을 0.5푼 가해보세요. 번비가 있기때문에 물론 도인을 가할 수있습니다.

여드름(소화곤란, 대변을 매일 못 볼 때가 있음. 가슴 답답하고 상부의 열감, 잠을 깊이 못 잠)

- 대변을 잘 보게 해주고 어혈을 없애는 도인을 꼭 써야 한다. 새살을 돋게 하고 청열하는 와송, 백모근을 써서 가슴답답한 증상을 풀어줘야 한다. 진주도 칠정에 중요하다. 스트레스를 해결해 주어야 여드름이 해결될 가닥을 잡을 수 있을 듯하

다.

- 피부는 백강잠 한돈 반으로 거풍하고 백모근으로 번열을 사해야 하겠습니다. 와송도 좋습니다.

* 생리통이 심한 여성의 여드름

소음인 소양인은 확실히 아닙니다. 태음인아니면 태양인인데.....태양인의 가능성이 더 커보입니다. 오가피쌍해산에 백모근2돈 어성초2돈 백강잠1.5돈 와송1.5돈 등을 가할수있고 활혈제로 우슬 포황(상초이므로 0.5)를 생각할수 있습니다.07.10.01 21:33

[답글](#)

↳ [안준철](#)

포황은 태음인약입니다. 잘못 말했습니다. 어제저녁 소주2잔 마신상태에서....미안..

* 아토피에 대해

소양인은 확실히 아닙니다. 소음인도 확실히 아니고요. 태양인이 거의 확실해 보입니다. 쌍해산에 백모근2돈 어성초2돈 백강잠1.5돈 그리고 새살을 뜯게하는 와송1.5-2돈 진무는 증상이 심하면 초롱담 1돈 어혈증(피부가 검어지느것)이 보이면 우슬0.5돈 가할 수 있습니다.

- 오가피쌍해산에 와송으로 생기하고 백모근 2-5돈 넣어서 청열, 어성초도 청열. 도인 구인으로 활혈. 백강잠(한돈반 이상. 중풍 구안와사에는 두돈)으로 거풍.

- 피부소양에는 초롱담을 가하는 것이 좋다.

* 접촉성 피부염, 소화곤란

- 쌍해산에 노근을 거하고 백강잠(거풍) 한돈반, 백모근 두돈, 와송 한돈반-두돈 가한다. 소화기가 약하면 미후등 한두돈 추가로 가할 수 있고 변비경향이면 도인을 가한다. 간담을 고려해서 어성초를 가할 수도 있다.

■ 통증

태양인의 부종은 옥미수가 가장 기본이 됩니다. 산후이고 변비가 좀 있어서 도인 와송등을 사용하면 좋을것 같습니다. 어성초2돈으로 원잠도 2-3돈(원잠을 많이 쓰면 효과는 좋지만 속이 미식거려합니다.) 지절통과 어혈을 고려해서 잠사도 쓸 수있습니다. 당삼이 태양인 약인데 보혈목적으로 쓸수 있습니다. 그리고 간신을 보하는 하수오.....

- 백강잠으로 거풍해야 지절통이 사라진다.

* 요통

산후요통이면 천장인대를 치료해야 한다. 식적요통이 가장 많다. 미후도식장탕으로 요통이 잘 낫는다. 특히 잘 붓는 경우에는 식적을 의심해야 한다. 식적요통은 양방에서는 어떤 짓을 해도 못 고친다.

■ 여성질환

- 자궁출혈에 와송이 가장 좋다. 계혈등으로 보혈해도 좋다. 월경과다는 반드시 빈혈이 동반된다고 생각해야 한다. 태양인의 빈혈에는 계혈등이 최고다.

- 산후부종과 통증

* 자궁선종

- 자궁선종이 자라 폐경 유도주사를 맞고 있음. 입맛이 없고 소화기능이 떨어졌으며 머리가 무겁고 관절통. 상열감 기력저하. 미후도식장탕가 오가피 원잠 동충하초를 써 볼까요?==> 자궁의 문제가 있으면 와송을 가할 수 있다. **자궁치료를 목적으로 하는 경우에는 쌍해산이 더 좋다(안).**

==> 오가피쌍해산가 오가피 와송 원잠 동충하초 한돈 사용. 폐경 유도주사후 6개월만에 생리 재개. 하복의 굳은 부위가 생리가 재개되면서 풀리기 시작. 소변을 자주 보게 됨. 심하던 상열감은 없어졌으나 입맛 없고 관절증상등은 여전함. 관절은 거의 밤에만 아프다. 손발이 차고 잦은 소화불량. 소변이 다시 시원치 않다. 가감을 새롭게 해보고 싶은데 오가피 쌍해산가 와송 도인 구인 각 한돈 하면 어떨까요?==> **자궁의 어혈에는 택란이 가장 좋습니다. 백강잠으로 거풍해야 지절통이 사라지겠습니다. 변비경향이므로 도인을 중용하고 와송은 그대로**

쓰시고 소변문제가 있으니 어성초를 한돈반에서 두돈 가하시는 것이 좋겠습니다(안)

==> 쌍해산가 백강잠 어성초 한돈반, 택란 도인 와송 각 한돈 처방함. 대소변과 소화는 좋은 상태를 유지하고 있고 생리도 규칙적이며 생리통도 없고 자궁에 아무런 위화감도 없다. 너무나 편안하니 오히려 불안하다 싶은 정도....

손마디가 뻣뻣한 증상이 심하고(밤에 불편한 것은 거의 없어짐) 오후 들면 다리가 붓는 느낌이 있는 것이 유일한 불편함이라 함.

- 계혈등은 보혈약인데 태양인의 빈혈이나 산후혈증에 특효약이라 생각하면 된다.

* 태양인 배란통(학생원장 임상례)

- 2년전부터 심한 배란통. 오가피쌍해산 가 도인(반돈) 백모근, 두 번째 오가피쌍해산 가 도인 현호색 백모근 각 한돈, 세 번째 오가피쌍해산 거 노근 가 도인 현호색 백모근 와송 각 한돈으로 하다. 배란통이 줄다.

■ 부종

* 산후부종과 통증

태양인의 부종은 옥미수가 가장 기본이 됩니다. 산후이고 변비가 좀 있어서 도인 와송등을 사용하면 좋을것 같습니다. 어성초2돈으로 원잠도 2-3돈(원잠을 많이 쓰면 효과는 좋지만 속이 미식거려합니다.) 지절통과 어혈을 고려해서 잠사도 쓸 수있습니다. 당삼이 태양인 약인데 보혈목적으로 쓸수 있습니다. 그리고 간신을 보하는 하수오.....

* 부종에 옥미수도 쓸 수는 있습니다. 그러나 미후도를 한 두돈 증량하는 것도 매우 효과적입니다(안)--> 역시 위장의 문제라고 보시는 듯 합니다(학생).

■ 두통

식적으로 인한 두통은 미후등식장탕,

식적이 아니면 쌍해산에 백강잠 1.5돈(거풍), 백모근 두돈(청열), 심계 등의 증상이 있으면 진주, 경추에 자침도 효과적임.

■ 태양인의 당뇨 고혈압

五加皮雙解酸 + 白茅根 2~5돈.

眞珠로 안신하고, 고혈압에는 漁腥草 2돈 쓴다. 白殭蠶으로 피부 열어 去風.
陰虛하면 蚯蚓 1돈반에서 2돈까지. 七情傷이면 모려.

* 당뇨

교맥미(두돈)로 이열을 사하고 백모근(두돈)으로 심번을 사하고 진주(1.5-2돈)를 써서 스트레스로부터 강하게 해야 한다. 백강잠을 써서 풍열을 사하기도 한다. 잘 된다. 쌍해산에 가한다. 비습하면 어성초...이중에 진주 교맥이 가장 중요하다. 메밀을 주식으로 해도 아주 좋다. 노근은 태음인 약이므로 거해야 한다.

■ 구안와사

* 태양인의 구안와사

오가피쌍해산 거 노근 가 백모근 2돈, 백강잠 1.5돈, 구인1돈 / 처음 한제는 오가피를 한돈 추가한다. 위가 안 좋으면 미후도 한돈 더, 칠정의 증상이 있으면 진주도 가함.

■ 비만

비위의 문제가 상당히 많아서 한증이라고 봐야겠습니다. 쌍해산에 비위가 나쁘기 때문에 미후도를 1돈추가 헛바능이 잘생긴다.==>청열하는 백모근2돈. 냉이 있고 음부가 가렵다.==>습열을 제거하기 위해서 어성초2돈 와송1-2돈 ,현훈 안색창백 ==>보혈하는 계혈등1-2돈.대변3일에 1번==>도인 추말해서 2-3돈, 해질 무렵 피로가 심하다==>음허를 보하는 원잠 동충하초,, 현훈에 거풍하는 백강잠 등을 응용할 수 있습니다.

■ 칠정

* 심계 불안

사람에게서 협박을 당하고 나서부터 불안 심계 손저림, 무섭증이 가시지 않는다.

쌍해산 가 백모근 2돈, 진주 1.5돈, 백강잠 1.5돈(안)==> 결과가 대단히 좋았다.
그런데 과로하니 다시 생기려 하는 것 같다. 그래서 쌍해산 가 백모근 두돈, 진주
옥미수, 원잠, 동충하초를 써보려 한다(학생원장)

- 화병에 백모근

* 불면

자궁내막증으로 여성호르몬 억제치료를 받는데 그 이후로 불면이 생김. 그래서
오가피쌍해산 가 와송한돈, 진주 한돈반, 백모근 백강잠 두돈 처방함. 약 복용 후
속도 편하고 구진도 없어졌으나 불면은 여전하다는데 대해

==> (안) 자궁문제로 호르몬 치료를 했다면 간신이 상했다고 볼 수 있다. 간신을
보하는 적하오 백하오를 한두돈 가하는 것이 좋다. 현훈이나 빈혈이 있으면
보혈하는 계혈등 신양허증이면 음양곽 등을 생각해 볼 수 있다.

==> 쌍해산 가 진주 백모근 백강잠 두 돈, 와송 적하오 백하오 4그램 사용하니
소화나 대변은 좋은 상태고 불면이 다소 호전됨

■ 심장질환

심장증상은 쌍해산에 백모근 두돈 진주 한돈반에서 두돈, 백강잠 1-1.5돈 술을
좀 먹거나 비습하면 어성초를 두돈 정도 쓰는 것이 좋겠습니다. 그리고 위가 나쁘면
미후도를 1-2돈 증량하면 도움이 됩니다.

4. 태양인 처방

오가피장척탕

오가피16 모과 청송절8 포도 노근 앵도육 ?맥미(겉데기 벗긴 메밀) 각4

열증약. 외감에 사용. 표에만 작용한다. 관절염, 신경통 열증, 팔다리 쭉시는 지절통 등에 사용가능. 청송절은 지절통에 사용. 위가 약한 사람의 관절통에는 쌍해산을 사용해야 함.

미후도식장탕

미후도 16 모과 포도근 각8 노근 앵도육 오가피 송화 오두강 각4

한증약. 내상에 사용. 비위에만 국한되어 작용함. 송화는 변이 무르고 설사할 때 들어가면 약간 삼장도 하고 설사도 멎게 하는 작용을 한다. 설사가 심하면 송화를 더 올려서 사용함. 피곤하면 오가피를 한돈 더 넣을 수 있다. 오가피는 시호처럼 청열하면서 피로를 풀어준다.

오가피쌍해산

오가피12 모과 미후도 포도근 각8 노근 앵도육 송화 오두강 각4

표리를 겸치하는 처방. 가장 많이 쓴다. 소음인의 곽향정기산처럼 외감 내상이 동시에 있을 때 즉 속도 나쁘고 감기도 있을 때 쓰고 피부질환 부종 고혈압 이런 식으로 표리를 겸치해야 할 경우에 대단히 많이 쓰임.

- 표리와 한열이 애매하고 병의 위치도 정확하게 따지기 힘들 때 사용할 수 있는 쉽고도 무난한 처방. 위장이 나쁘다고 하면 미후도를 두돈에서 세돈으로 올리고, 열이 많다면 오가피를 한돈 더 넣을 수 있다. 청열해야 할 염증성질환이면 오가피를 더 넣을 수 있다. 피로하면 오가피를 한돈 더 추가한다. 미후도 식장탕에서도 마찬가지. 감기 기침에 쓰면 된다.

교맥관장탕

교맥미16 모과 노근 각8 오가피 미후도 포도근 송화 오두강 각4

진짜 열증의 위장병에 쓴다. 위열로 인해 구갈을 느끼면서 번조 변비 조잡 위산과다로 속이 쓰리다고 하는 상황. 미후도식장탕이나 쌍해산은 소화력이 떨어지고 위액이 부족한 상태일 때 사용한다.

- 위장이 약하면 미후도의 양을 올리고 오가피의 양을 줄이고, 혈뇨에 백모근와송.

노근청폐탕

노근(갈대) 16, 어성초 오가피 각8. 백강잠 앵도육 포도근 모과 각4 산장(파리)2. 누런 코 누런 가래에 무조건 유효함. 한열불문하고 사용. 그 다음에 누런 코, 누런 가래 없어도 오가피쌍해산에다 노근 어성초 넣은 것으로 조리한다. 수막염에도 들음

- 기침 가래가 심한데 누런 것이 나온다고 하면 쌍해산이 아니라 이 처방.
- 자지러지고 밤잠을 자지 못하고 참지 못하는 기침에는 구인(중국산 붉은 지렁이)을 1-2돈 넣어야 한다. 구인은 자음작용이 있고 활혈을 해서 어혈에 쓰이고 기관지를 돕는 작용을 해서 기관지가 너무 민감해서 기침이 낫지 않는 경우에 자음해서 진정시켜 주는 작용을 한다.
- 변조와 구갈이 있으면 **백모근**을 가한다. 백모근은 양열지혈약으로 코피에 쓰는 약으로 백모근을 두돈 써서 후세방에서 소아 코피에 응용한다.
- 인후염, 라력, 편도선염, 구내염에는 酸醬.
- 어성초는 淸熱利水瀉濕작용이 있고 간열을 제거해 주고, 이담작용을 하며 간염에도 특효약. 황달에도 사용. 간의 습열을 제거함. 소음인의 인진과 유사함. 간염 피부염 등의 각종 염증질환에 잘 듣는다.

어성초제습탕

옥미수12 오가피 미후도 각8 포도근 송화 오두강 앵도육 교맥미 노근 어성초 각4

부종 소변불리 황달 간경화 간염 신우신염 당뇨 비만...

옥미수는 일반적인 부종에 들고 신장염과 같은 염증성 부종에는 반드시 어성초가 들어간다

- 신장염이나 간염 당뇨 등으로 혈뇨가 나갈 때 백모근(그리고 와송). 청열양혈해서 혈증에는 백모근을 쓴다. 심번 구갈 코피 날 때도 쓰는데 코피에는 두돈 사용.
- 어성초는 리담작용이 있고 간염에도 들고, 간질환에도 들고, 거습 청열해서 소음인의 인진하고 유사하다. 웬만한 염증에는 어성초가 다 듣는다. 체질을 불문하고 염증이 좀 좋아짐. 피부, 가려움증, 간염...

산장청인탕

오가피 16 모과 산장 각8 앵도육 ?맥미 노근 어성초 백강잠 각4
편도선염 임파선염 후두염, 바이러스성 고열성 인후질환.

평간거풍탕

오가피12 백강잠 청송절 각8 잠사 모과 앵도육 구인 교맥미 미후도 각4

- 태양인의 중풍, 구안와사, 마비, 진진..... 구안와사의 초기에는 열증에는 오가피장척탕, 한증에는 쌍해산을 쓰고 며칠 있다가 평간거풍탕을 사용한다.
- 심계, 경련성질환, 각궁반장에는 진주를 쓴다. 손이 떨리면 항경련작용이 있는 진주를 가한다.
- 운동마비가 심하면 도인. 변비에도 도인

지룡정천탕

오가피12 구인 노근 각8 어성초 백강잠 미후도 포도근 모과 동충하초 각4

- 중국산 지렁이가 더 좋다.
- 태양인의 천식
- 태양인, 태음인에게서 천식이 많다.
- 번갈이 있으면 백모근을 가함. 부종에는 어성초.

잠사오가피탕

蠶沙(누에똥) 오가피 각12 모과 청송절 각8 백강잠 오두강 포도근 각4

- 잠사는 활혈파어작용이 있어서 진통작용이 있고 지절통, 풍습관절요각통, 견비통, 산후동통 마비감 등 일체의 동통에 다 쓴다. 잠사오가피탕은 일체동통에 다 쓴다.
- 위장이 약하면 미후도를 넣고 오가피를 줄인다.
- 타박으로 인한 어혈에는 어혈약인 구인과 도인을 한 돈 가한다. 현호색은 태양인 어혈약.

원잠대보탕

원잠12 오가피 미후도 각8 동충하초 모과 오두강 앵도육 송화 각4

- 태양인 보약
- 누에는 脾 腎을 보하고 동충하초는 肺 腎을 도와서 비위가 약해서 밥맛이 없고 기운이 없으면 원잠을 위주로 하고 기관지가 약하고 감기에 잘 걸리고 잔병을 한다면 동충하초를 더 증량시킨다.
- 위가 약하면 미후도를 두돈에서 세돈으로 올려도 된다. 피곤하면 오가피를 두돈에서 세돈으로...
- 산모에게 쓰니 유즙이 줄더라.