

* 體質鑑別의 方法 *

〈額型和 下顎型이 體質을 區別하는 大體가 되는데, 萬若 이 두가지가 서로 다른 境遇에
는 獨活地黃湯散劑를 服用시켜 試驗하여야 한다〉

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
顔 型	下顎이 厚하지 않은 便이다.	體軀에 比하여 조금 긴 便이다. 卽 驢와 같이 조금 긴 便이나, 或은 등근 境遇도 있다.	馬狀으로 鷄卵型()이며, 下顎이 厚하여 安靜感이 있다. 卽, 少陰人보다는 體軀에 比하여 덜 긴 便이다. *주걱턱; 少陽人에 많다
顔 色	紅潮를 띄며 濁하게 卽 검게 보인다.	大體的으로 蒼白한 便이다. 或은 先天的으로 얼굴全體가 술 醉한 사람 같이 붉은 境遇도 있다.	누렇고 검은 便이다. 或은 하얀 境遇도 있다
額 型	이마가 突出된 곳이 없이 平平하고, 兩眉間은 銅錢한개를 나둔것 같다 1 ————— 前髮際 4/5 ————— (前) 1/5 ————— (後) 0 ————— 兩眉間	大體的으로 中間部位가 若干 陷沒되어 있다. 1 ————— 前髮際 1/3 ————— (前) 1/3 ————— (後) 0 ————— 兩眉間	大體的으로 兩眉間이 突出되어 있거나, 中間部位가 突出되어 있다. 1 ————— 前髮際 1/3 ————— (前) 1/3 ————— (後) 0 ————— 兩眉間

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
眼 型	重而平坦 牛眼型이다.	大而整한 鳥眼型(=鷄眼型)으로 둥글고 濁한 便이다. 卽, 울고난 直後의 形狀과 같이 눈물이 고여 있는 듯하여 濁한 모습을 띤다.	輕한 鳥眼型으로 合理的이고 둥글면서 맑다. 或은 눈이 작으면서 눈꼬리가 있는 境遇도 있다. (≒鷹眼型).

鼻 型	뚱뚱하고, 얼굴全體의 面積에서(=下顎의 模樣에 比해) 차지하는 比重이 큰 便이다. 或은 납작하면서 넓은 境遇도 있다.	大體로 코끝에 앵두를 달아 놓은 것 같다(=방울코). 或은 銳利하나 코끝이 좀더 튀어나와 있으면서 끝에 앵두가 달려있는 느낌을 준다.	코끝이 大體로 銳利하고, 얼굴全體面積에서 차지하는 比重이 比較的 작은 便이나, 或은 크면서 銳利한 境遇도 있다.
-----	--	--	--

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
脣 型	上下脣의 模樣이 거의 비슷한 便이다.	1. 上脣은 薄하고, 下脣은 厚하면서 나와있다. 2. 下脣이 안나오면서全體模樣이 鷄肛門같이 둥글다. 3. 上下로 뒤집혀져 있다 4. 下齒가 上齒를 덮는 境遇도 있다(=反對交合) 5. 犬口型도 있다. 6. 염소입과 같은 境遇도 있다.	1. 下顎이 厚하면서 安靜感이 있고, 上脣이 若干 위로 치켜져 올라가 있는 便이다. 2. 上下脣이 매우 얇은 境遇도 있으나 上脣은 위로 치켜져 올라가 있는 便이다. 3. 上下脣이 서로 벌어지면서 두텁고 特히 上脣이 위로 치켜 올라가 있다(≡豚口型).
手 型	長大而平面狀. *少陽人에 比하여 肉이 있는 便이다.	短大而曲線狀. 即, 安靜感이 있다.	骨格이 굵고, 潤氣가 없으며, 肉이 없어 뼈만 있는 것 같다. *손가락끝이 뾰족하게 나온 女子도 있다. *體軀에 比하여 크거나 긴 境遇도 많다.
足 型	발목이 굵은 便이다.		발목이 가는 便이다.

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
手足의	溫 或 冷한데, 冬季에는 冷한 便이다.	四時에 溫한 便인데, 胃受寒證으로서, 陰盛隔陽	春夏秋冬에 冷한 便인데, 脾受寒證은 夏季에

溫 度	특히 胃脘受寒證이 더욱 冷한 便이다.	證의 境遇에는 冬季에도 手熱하다(∴內氷外炭). 1. 腎受熱證; 手足冷, 有汗 2. 胃受寒證; 手足溫, 無汗	도 冷한 便이다. *冬季에도 手足이 熱하 면 將次 糖尿病이 올 徵兆이다.
手足掌心	氣虛者は 手足掌心에 汗流가 甚하다.	1. 腹冷結로 內竭되면 발 바닥이 허영게 잘 벗겨 진다~用 理中湯. 2. 亡陽證이 오면 手足掌 心に 汗流가 甚하다~ 用 補中益氣湯→尤甚證 用 升陽益氣湯. 3. 발바박이나 발뒷꿈치 가 저리는 것이 잘 나 타나는 便이다.	1. 有汗; 輕證. 2. 無汗; 中證. 3. 乾燥; 中重證. 4. 갈라진다; 重證. *手足掌心에 發汗하면 將次 病이 解하려는 徵兆이다.

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
用便時間 및 大便狀態 및 病理關係	久하며, 頭硬而尾微滑한. (1/1). 第一 가늘고, 發病 하면 後重이 잘 나타남. *傷肺한 境遇나 大腸에 冷濕이 있는 境遇에는 用便時間이 더욱 久함. *胃脘受寒證도 冷極甚하 면 便秘가 올 수도 있다	長久하며, 頭尾燥而體長 하여 굵고 第一 긴 便이 나, 少陽人보다는 덜 굵 다. (一三五七日/回)	速하며, 頭燥尾滑하고, 體大而疎通한다. 第一 굵고 짧은 便이다. (1/1) *冷이 아래로 처지거나 心虛하면 用便時間이 길어진다.
	1. 少陰人便과 같으면 肝受熱裏熱病을 內包함 2. 太陽人便과 같으면 胃 脘受寒表寒病을 內包함 *大便을 참으려면 참을 수도 있고, 참더라도 便 秘는 오지 않는 便이다	1. 少陽人便과 같으면 腎受熱表熱病을 內包함 2. 太陽人便과 같으면 胃受寒裏寒病을 內包함	1. 少陰人便과 같으면 胃受熱裏熱病을 內包. 2. 太陽人便과 같으면 脾受寒表寒病을 內包. *大便을 참으면 견디지 못해서 싸던지 便秘가 오는 便이다.
	*頭燥尾滑은 病解之大便이고, 頭滑尾燥는 病不解之大便이니라.		
大便不通時	肝受熱證은 項強症이 잘 오고, 口苦 口渴而少飲水 한다.	大體的으로 큰 不便을 못 느끼는 便이다.	胃受熱證은 咽乾而多飲 水하고, 冷頭痛이 잘 나 타난다.

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
泄 瀉 時	不飲水(양치질만 한다) 活動時 若干 氣衰하고, 口渴이 若干 나타난다. *胃脘受寒證은 입안이 텅텅하면서 口苦症까지 나타날 수도 있다.	不飲水而脫津, 口燥症. 活動時 氣衰가 甚하고, 甚한 境遇에는 水液을 供給하여야 한다. *腎受熱證患者가 第一 氣運이 빠진다.	少飲水 或 多飲水. 1. 脾受寒證; 若干 氣衰. 2. 胃受熱證; 活動如前. (但, 內渴이 甚하다)
小 便	三四五回/日. *燥熱病患者나 心虛者는 小便이 數해진다. *一二回/日이나 六回/日 以上은 非正常이다.	二三四回/日(∵腎大). 小便量: 大體로 많다. *鬱縮膀胱되면 小便이 頻數해진다. *五回/日 以上은 非正常 이다.	四五六回/日(∵腎小). 1. 脾受寒證; 産後調理가 不良, 流産經歴多者는 小便數而不禁이 오는데 오줌소태까지는 안 옴. 2. 胃受熱證; 膀胱이 마 르면 小便이 數해지고 오줌소태가 잘 온다. *一二回/日과 七回/日 以上은 非正常이다.
經 度	量多(肝受熱證이 尤多), 七日間. *閉經이 되고 나면 症이 易發하는 便이다.	量은 普通. 三五日間.	量少. 二三日間.

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
生 理 痛	腹痛(量多) 或은 腰腹痛 (量少, 有塊)이 나타난다	無痛 或은 腹痛. *冷甚이 極하면 腰腹痛 도 나타난다.	腰痛. *發病하면 腰腹痛이 甚 하여 鎮痛劑를 服用해 야만 할 程度이다.
初産時	大體的으로 腹痛인데, 或은 腰腹痛도 나타난다	無痛 或은 腹痛. *胃冷이 甚하면 腰腹痛 도 온다.	尾骨이 뒤틀리며 빠지 는 듯이 아프다. *出産時 脫陰이 되는 境遇도 많다.
	筋肉은 堅實하고, 表皮는 厚하다. 潤氣가 없으므로	筋肉은 浮軟하고, 表皮는 薄하다. 肉眼上 潤氣가	筋肉은 厚軟하고, 表皮 는 淺(얇다)하다. 潤氣

皮膚	거칠게 보이고, 만져봐도 삼베를 만지는 것 같이 거칠다.	나며, 觸感上 비단결같이 부드럽다. 理가 緻密함	가 없어 거칠게 보이지 만 觸感上 비단결같다. *손끝의 皮膚가 벗겨지 거나 갈라지는 것이 第一 많이 나타나고, 主婦濕疹은 流産經歷 이 많은 境遇에 多發.
----	---------------------------------------	-------------------------------	---

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
飲 水 關 係	平素에 잘 안 즐기는데, (但, 飲酒者는 즐긴다) 萬若 喜飲水하면 肝熱이 動하여 內熱이 發生하니 肝病과 燥熱病이 發生하 고, 甚하면 夢泄病, 肺病 이 發生한다.(∴熱) *虐疾惡寒中에 多飲冷水 하고, 發熱中에는 汗出하 여 水液이 빠지는 데도 不飲水한다. 寒證: 飲冷水→多飲冷水. 熱證: 少飲水→喜溫水.	上熱感이 많으므로 平素 多飲水하는데, 不飲水하 면 胃가 冷해져서 大腸 이 마르므로 大便이 滑 或 秘하니, 浮腫 卽 腎機 能障礙가 온다.(∴冷) *虐疾惡寒中이나 泄瀉時 嘔吐後에 不飲水한다. *能飲水는 一吉證也니라 ①腎受熱證: 平素 多飲水 ②胃受寒證: 平素 不飲水 熱證: 飲冷水→少飲水. 寒證: 少飲水→多飲冷水.	胃熱이 생기면 자다가 깨서도 찾을 程度인데, 萬若 不飲冷水而喜溫水 하면 胃腑가 枯竭되어 胃潰瘍이나 消渴病이 發生한다.(∴熱) *發熱中에는 能飲冷水 하나, 惡寒中에는 不飲 水한다. *胃熱이 甚하면 喜溫水 或 不飲冷水하는데, 糖尿病患者는 飲冷水함 寒證: 少飲水→多飲冷水 熱證: 多飲冷水→喜溫水
三 伏 에 不飲冷水	肝受熱證에 燥熱病이 온 境遇에 나타날 수도 있 으나, 거의 없는 便이다.	胃極冷한 境遇에 發生함 (冷水를 보면 흐느끼 程 度임. 大便滑)	涼膈散火湯證(=胃極熱, 消證)의 境遇에 나타난 다.

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
口渴의 樣 狀	“입천장과 코가 마른다” 고 한다(原因: 肝熱) *입천장에서 咽喉部로 말라들어간다.(∴肺小)	“舌前부와 脣이 마른다” 고 한다. ∴脣瘡症易發. (∴內氷外炭) *입술에서 咽喉部로 말 라들어간다. 甚하면 입술이 뒤집어진다.	“咽喉部가 마른다”고 한다.(∴胃熱) *咽喉部에서 입술로 말라 나온다.

汗 液	平素에 大體的으로 多汗인데, 多汗即完實而無病이니라.	平素에 腎受熱證은 有汗하고, 胃受寒證은 無汗인데, 胃冷이 甚하여 傷肺하면 多汗하여 亡陽病이 온다. (全身과 手足掌心에 모두 汗出한다)	多汗而陰虛病, 盜汗等. *陰虛하면 脾局의 陰氣와 腎局의 陰氣가 一升一降作用이 不能하여 多汗하는데, 이때에는 全身에 汗出하나 手足掌心에는 汗不出한다.
病癒之汗	汗出이 自始耳後高骨 面部髮際하여 大通於胸臆間한다.	人中에 先汗하고 部→頸部→胸部에 汗出한다.	手足掌心에 發汗한다.
手足冷汗	肝受熱證에 多發한다. (∵肝熱肺燥)	腎受熱證에 多發한다. (∵腎陽困熱 및 胃極冷)	

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
手足無汗		肺弱者나 藏厥者는 手足無汗하여 손과 발바닥이 허영게 잘 벗겨진다.	脾受寒證에 手足無汗者의 重證에는 손끝이나 발땀꿈치가 잘 갈라짐. <手足冷甚, 무증, 多飲水~用 獨活地黃湯>
手足汗多	肝熱이 甚하여 傷肺하면 發生한다. (用熱多寒少湯, 葛根解肌湯).	胃冷이 甚하여 傷肺하면 發生한다. (用補中益氣湯, 升陽益氣湯)	胃熱이 甚하여 傷肺하면 發生한다. (用 涼膈散火湯).
脈 診	長而緊. <肝熱이 甚하면 脈이 微弱해진다>	緩而弱.	微細不現. *微脈: 無力脈(≡緩脈). *細脈: 실같이 가는 脈. <中風患者에 滑脈은 危證이거나 死證이다>
容貌詞氣	居處에 禮義가 있고, 修整正大하다.	簡易小巧하여 態度에 自然性이 豊富하고, 아담한 便이다.	有剽銳氣. 形象이 勇敢하고, 性質이 輕急하다. *주걱턱; 매우 게으르다
形局의 象	牛之性.	驢之性.	馬之性.

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
體 形 氣 像	腰圍之立勢는 盛壯하나, 腦 之起勢는 孤弱하다. (원기둥 模樣)	膀胱之坐勢는 盛壯하나, 胸襟之包勢는 孤弱하다. 即 上虛下實한 體形으로 서 엉덩이가 좀 큰 便임 (사다리 模樣)	胸襟之包勢는 盛壯하나, 膀胱之坐勢는 孤弱하다 即 上盛下虛하고 胸實 足輕하여 剽銳好勇한 形象을 띄며, 人數가 亦 多하여 四象人 中에 가 장 區分하기가 쉽다. (=어깨部位가 發達하고 엉덩이가 좀 작은 便으 로서, 역사다리꼴이다) 或 肺虛한 여자는 어깨 가 좁은 境遇도 있다)
性 質	成就慾이 强하다.	端重하는데 長點이 있고 表裏不同한 境遇가 많다	剛武에 長點이 있다.
材 幹	居處에 能하다.	黨與에 能하다.	事務에 能하다.

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
性 情	恒有怯心하니, 怯心이 寧 靜則居之安資之深而造於 道也오, 怯心이 益多則放 心桎梏而物化之也라. 萬若 怯心이 至於 心하 면 症이 發生하는데 症은 太陰人病中에 重證이다. 또한 恒常 急迫한 마음 을 갖고 있는데 이를 잘 調節하면 肝血이 和平할 수 있다. *心虛하면 衝擊時에 欲 大便하여 滑便을 본다.	恒有不靜定之心하니, 이를 잘 調節하면 脾氣 가 活할 수 있다. *不安靜之心; 胃受寒證의 重證으로서, 脾氣가 絶 한 것이다. *處方; 白何烏寬中湯. 或加香附子・白何烏二錢 1)大便燥--加三稜・蓬朮 2)腹痛--加 五靈脂.	恒有懼心하니, 懼心이 寧靜則居之安資之深而 造於道也오, 懼心이 益 多則放心桎梏而物化之 也라. 萬若 懼心이 至於 恐心하면 健忘症이나 胸腹痛이 發生하는데, 健忘症이나 胸腹痛은 少陽人病中에 險證이다 *怒心→哀心→悲觀→ 懼心→健忘症, 胸腹痛. *心虛하면 衝擊을 받을 때 欲小便而不出하여 애를 쓴다.
	恒常 慾火(욕하는 性質) 를 갖고 있는데, 이를 잘	進一步하여 恒常 不安靜 한 마음을 갖지 않도록	안을 살펴서 恒常 懼心 을 갖지 않도록 하며,

七情	調節하면 肝血이 和平할 수 있다. 또 喜心樂心を 恒常 警戒하여야 한다.	하며, 喜心樂心を 恒常 警戒하여야 한다.	哀心怒心を 恒常 警戒하여야 한다.
健康한 狀態	汗液이 通暢하면 完實而 無病하다.	飲食이 善化하면 完實而 無病하다.	大便이 善通하면 完實而 無病하다.

區分點	太陰人	少陰人	少陽人
發病主流	肺系の 胃脘, 舌, 耳, 頭腦 皮毛 等の 弱화로 因해 發病한다. 또한 外感腦 하고, 內觸胃脘病한다.	脾系の 胃, 乳, 目, 背, 筋 等の 弱화로 因하여 發病한다. 또한 外感背部하고, 內觸胃腸한다.	腎系の 大腸, 前陰, 口, 膀胱, 骨 等の 弱화로 因하여 發病한다. 또한 外感膀胱하고, 內觸大腸病한다.
病 理 關 係	胃脘寒邪에 대한 抵抗力이 弱한 者로서, 萬若에 寒邪가 侵犯時에 完除하지 않으면 長久한 期間 潛伏하다가 抵抗力이 弱한 때가 되면 發病하려 하는데, 이는 臟腑의 先天的 性作用때문이다.	胃系에 加해진 寒毒과 腎系에 加해진 熱毒과 脾系에 加해진 寒毒 等 惡性作用의 進度에 따라 腎動脈血과 脾動脈血의 輪廻作用이 不完全하게 되어 腎系の 陽性作用과 脾系の 陽性作用과의 一升一降이 衰退하게 되므로 發病한다. 이는 胃受 寒毒으로 因하여 腎系와 脾系와의 陽性交流作用이 中斷되기 때문이다. 故로 腎에서 熱을 내어 溫胃冷하면 無病하니라.	1. 內傷: 脾臟系の 陰氣와 腎臟系の 陰氣는 胃腑系の 強大한 熱邪로 因해 一升一降이 不能함으로써 그 機能이 敗하니 萬病이 發한다. 또한, 2. 外感: 風, 寒, 涼, 燥 等の 影響으로 因하여 萬病이 發한다. 故로 脾局의 陰氣와 腎局의 陰氣의 一升一降作用이 胃局의 陽氣를 調節할 수 있으면 無病하니라.

區分點	太陰人	少陰人	少陽人
治療의 難易度	1. 肺病類: 速治. 2. 腎病類: 難治, 九死一生 3. 胃病類: 難治.	1. 肺病類: 難治. 2. 腎病類: 久治. 3. 胃病類: 速治.	1. 肺病類: 久治. 2. 腎病類: 速治. 3. 胃病類: 久治.

治病爲主	汗液을 疏通시키는 것을 爲主로 하는데, 肝受熱者는 大便을 疏通시키면 汗液이 疏通된다.	小便을 通利시키는 것을 爲主로 하는데, 消化를 于先으로 생각하여야 한다.	大小便을 通利시키는 것을 爲主로 하는데, 通大便이 더욱 重要하다.
感氣時 解熱劑 服用後	發汗시켜야 하는데 解熱劑를 服用하니 괜찮은 便이다.	順氣시켜야 하는데 解熱劑를 服用하니 冷結해져 좋지 않다.	清熱시켜야 하는데 解熱劑를 服用하니 熱結해져 좋지 않다.
咳嗽의 發生季節		冬季에 出産하고 夏季에 發病하는 境遇가 많다.	夏季에 出産하고 冬季에 發病하는 境遇가 多
頭痛의 樣 狀	1. 胃脘受寒證: 前頭部가 잘 아프다. 2. 肝受熱證: 後頭部가 잘 아프다.	1. 腎受熱證: 後頭部가 잘 아프다. 2. 胃受寒證: 前頭部가 잘 아프다. (∵ 內氷外炭) *冷勝則頭痛也.	冷頭痛으로 兩前頭部에서 頂門穴部位로 온다. 1. 男子: 毛髮을 건드려 도 싫다고 한다 2. 女子: 머릿속이 흔들 린다고 한다.

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
嘔 吐 時	元來 濕이 많으므로 胃脘部の 冷濕을 吐하니, 속이 便해진다(양치질) <原因: 胃脘部の 冷結> *一吐는 吉證也니라.	胃冷結로 氣血이 不足한 데, 胃府의 冷濕을 吐하 고 나서 不飲水하니, 氣盡되어 重證으로 된다	熱盛하므로 嘔吐하는데 胃腑의 熱濕을 吐하니 便한 듯하나 더욱 熱盛 하게 되니 咽乾燥하여 多飲水함(목안이 탄다)
口 苦 症	肝受熱證에 頻發한다.	胃受寒證에 多發한다. <平素에 滑便을 보다가 便秘가 되면 나타난다>	胃受熱證에 多發한다.
喘 息	肺性 喘息으로서 多發함	心性 喘息으로서 少發함 (不用人蔘, 用白何首烏) *難治證: 寬中湯, 蘇子湯.	氣管支性 喘息으로서 多發함(原因: 腎虛하여 胃熱이 盛하므로)
太 息	平素에 잘 안하는데, 心虛해지면 나타난다.	元來 氣虛하므로 平素에 자주한다.	平素에 잘 안하는데, 氣管支에 障礙가 오면 나타난다.
糖尿病에	一飲二 하니 初期부터	體重減少가 甚하지 않은	體重減少가 甚하지 않

大體로 體重減少가 甚한 便이다.	便이나, 中證이 되고나면 體重減少가 나타난다.	은 便이나, 中證이 되기 直前에는 나타난다.
----------------------	------------------------------	-----------------------------

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
肛門部位		잘 짓무르고(=濕疹), 肛門開口도 나타난다; 用 赤白何烏寬中湯.	
종 아 리 靜 脈 瘤	多發하고, 脫陰症이 온 境遇에 나타난다. (∵女子; 産後調理不良, 男子; 多飲酒하여 冷이 아래로 처져 發生)		
足 熱 로 이불을 못 덮는 境遇	肝受熱證에 多發한다. (∵傷肺); 熱多寒少湯. 或用 補肺湯.	肺結核患者의 境遇.	胃受熱證에 多發한다. (∵傷肺나 氣管支弱)
足 底	子宮虛(∵産後調理不良) 한 肝受熱證의 境遇에는 발뒹꿈치가 갈라지는데, 睡眠時 足熱로 이불속에 발을 넣지 못한다.	腹冷結로 內竭되어 子宮 이 弱해지면 발바닥이- 特히 湧泉穴에서 然谷穴- 部位가 허영게 벗겨지고 甚하면 갈라지기도 한다	腎虛, 産後調理不良, 胃 熱甚한 境遇에는 발바 닥이 마르고, 더욱 甚해 지면 갈라지는데, 脾受寒證에 易發하고, 足冷하여 睡眠時 이불 속에 발을 넣는다.

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
其 他 事 項	고집이 세고, 骨格이 壯大하며, 발목이 굵고, 허리를 펴고 곧바로 걷는다.	엉덩이가 큰 便이고, 얼굴이 좀 긴 便이며, 목소리가 굵고, 허리를 굽히고 걷고, 瘀血이 잘 생기는 便이다. *平素에 찬 것을 좋아하 는데, 오히려 甘味를 좋 아하게되면 좋지 않은	목소리가 가늘고, 발목 이 가늘며, 엉덩이가 작은 便이고, 허리를 펴 고 左右로 흔들면서 걷 고, 參見하기를 좋아함.

		徵兆이다.	
종 은 食 品	溫性 食品. 멥쌀, 수수, 울무, 콩, 감자 마, 무우(生:肝受熱證), 설탕, 밤(生:胃脘受寒證) 보리, 쇠고기, 사슴, 牛乳, 호박, 찹쌀, 수박, 배, 살구 鹿茸, 찹, 옥수수, 도라지, 蓮根, 은행, 오징어, 호도, 잣. (상추먹으면 졸린다)	熱性 食品. 찹쌀, 차조, 찰수수, 대추, 찰옥수수, 찹쌀, 닭고기 개고기, 흑연소, 노루, 꿩, 뱀, 자라, 소금, 마늘, 호추 고추, 土卵, 生薑, 고구마, 꿀, 굴, 복숭아, 땅콩, 人蔘 파, 鷄卵, 오렌지(주스), 홍합. <밀가루 飮食을 먹 으면 膽石症에 잘 걸림>	寒性 食品. 조, 팥, 녹두, 돼지고기, 참기름, 상추, 새우젓, 굴 치자, 가지, 오이, 시금치 숙주나물, 더덕, 조개류 (但, 대합조개는 除外), 아몬드, 딸기, 산딸기, 참외, 토마토, 파인애플, 바나나, 키위, 골뱅이, 紅茶, 유자차, 배추, 한치
	太陽人: 冷性 食品. 사과, 머루, 葡萄, 앵두, 감, 대합조개, 松花, 메밀,		

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
Coffee 服用後	잠을 잘잔다. *肝受熱證은 좋지 않다.	口燥症과 胸燥症이 나타 나서 잠을 못자고, 속이 흔느다고도 한다.	心悸, 症이 나타나 서 잠을 못자고, 속이 쓰릴 수도 있다.
清心蓮子湯 服用後	1. 胃脘受寒證: 消化不良. 頭痛, 胸煩도 올 수 있다 2. 肝受熱證: 가슴이 시원 하다고 한다	“어지럽고 消化不良이 나타나며 無氣力하다”고 한다.	“頭痛과 胸煩症이 나타 난다”고 한다. 甚하면 症도 나타난다.
補 肺 湯 服用後	1. 胃脘受寒證: 便하다. 2. 肝受熱證: 心煩, 不眠症	“嘔逆症이 나타난다”고 한다. 大便을 자주 본다. 或은 가슴이 답답하다. 無氣力해진다.	“어지럽다”고 한다. 陽氣無力, 泄瀉, 脫肉이 오는데, 甚하면 小便數 而不禁, 胸煩, 頭痛, 不眠 등도 나타난다.
麻黃發表湯 服用後	1. 胃脘受寒證: 便하다. 2. 肝受熱證: 胸煩, 不眠.	脫津, 無氣力甚.	胸煩燥, 小便數, 頭痛.

區 分 點	太 陰 人	少 陰 人	少 陽 人
寬 中 湯 服 用 後	醉하면서 頭痛이 나타나 드러눕는다.	便하다.	腹痛과 속쓰림이 나타 난다.甚하면 胃受熱證 의 境遇에 卒倒도 한다
獨活地黃湯 服 用 後	嘔逆症이 오면서 醉하는 듯이 머리가 횡하고, 四 肢가 나른하고, 症이 이 오면서 甚하면 드러 눕는다. 속쓰림도 온다. 腹不安.	頭痛이 오면서 腹痛과 속쓰림이 오면서 飽滿感 이 나타난다.或은 顔面 下顎部에 熱이 난다. 咽乾症도 올 수 있다. 冷涎도 發生할 수 있다. 하품을 여러차례한다.	1.脾受寒證; 便하다. 2.胃熱甚證; 滿症과 咽乾症이 올 수 있다 *涼膈散火湯證의 境遇 에는 속쓰림도 온다.
荊防瀉白散 服 用 後	“어지럽다”고 한다.	腹痛(原因; 冷)이 온다.	脾受寒證은 속이 거북 하면서 가슴이 허전하 고, 頭痛, 泄瀉도 온다.

* 體質鑑別의 方法 *

<이마의 생김새와 아래턱의 생김새가 體質을 區別하는 大體가 되는데,
萬若 이 두가지가 서로 다른 境遇에는 獨活地黃湯散劑를 服用시켜 試驗하여야 한다>

01. 顔型.

- 一. 太陰人: 下顎이 厚하지 않은 便이다.
- 二. 少陰人: 體軀에 比하여 조금 긴 便이다. 即 驢와 같은 模樣이다.
或은 둥근 境遇도 있다.
- 三. 少陽人: 馬狀으로 鷄卵型()이며, 下顎이 厚하여 安定感이 있다.
即 少陰人보다는 體軀에 比하여 덜 긴 便이다.
*주걱턱은 少陽人에 많은 便이다.

02. 顔色.

- 一. 太陰人: 紅潮를 띄우며 濁-검게-하게 보인다.
- 二. 少陰人: 大體의으로 蒼白한 便이다.
或은 얼굴全體가 술에 醉한 사람같이 붉은 境遇도 있다.
- 三. 少陽人: 누렇게 검은 便이다. 或은 하얀 境遇도 있다.

03. 額型.

- 一. 太陰人: 이마가 突出된 곳이 없이 平平하고, 兩眉間은 銅錢한개를 놔둔 것 같고,
前髮際下 1/5地點부터 前髮際까지는 이마가 뒤로 넘어간다.
或은 兩眉間은 陷沒되면서 前髮際下 1/5地點에서 突出된 곳이 있는 데
少陽人과는 달리 가운데로 물리는 느낌을 주지 않는 便이고,
前髮際下 1/5地點부터 前髮際까지는 이마가 뒤로 넘어간다.
- 二. 少陰人: 大體의으로 中間部位가 若干 陷沒되어 있다.
- 三. 少陽人: 大體의으로 兩眉間이 突出되어 있거나, 中間部位가 突出되어 있는데
가운데로 물리는 느낌을 주는 便이다.

圖表. 體質別 型の 側面圖.

太陰人	少陰人	少陽人
1 地點←	1 ←	1 →
(前) 4/5 地點←	1/3 ←	1/3 →
1/5 地點←	1/3 ←	1/3 →
0 地點←	0 ←	0 →
		兩眉間

04. 眼型.

- 一. 太陰人: 重而平한 牛眼型이다.
- 二. 少陰人: 大而整한 鳥眼型(=鷄眼型)으로 둥글고 濁한 便이다.
即 울고난 直後에 눈물이 고여있는 듯한 느낌을 준다.

- 三. 少陽人: 輕한 鳥眼型(=鷹眼型)으로 合理的이고 돌글면서 맑다.
或은 눈이 작으면서 눈꼬리가 있는 境遇도 있다.

05. 鼻型.

- 一. 太陰人: 퉁퉁하고 얼굴全體의 面積에서(=下顎의 模樣에 比해) 차지하는 比重이 큰 便이다. 或은 납작하면서 넓은 境遇도 있다.
二. 少陰人: 大體의으로 코끝에 앵두를 달아놓은 것 같다(=방울코).
或은 銳利하면서 코끝이 좀 더 튀어나와 있으면서 끝에 앵두가 달려있는 느낌을 주는 境遇도 있다.
三. 少陽人: 코끝이 大體의으로 銳利하고 얼굴全體面積에서(=下顎의 模樣에 比해) 차지하는 比重이 比較的 작은 便인데 或은 크면서 銳利한 境遇도 있다.

06. 脣型.

- 一. 太陰人: 上下脣의 模樣이 거의 비슷한 便이다.
二. 少陰人: ①上脣은 薄하고 下脣은 厚하면서 나와 있다.
②下脣이 안나오면서 全體模樣이 鷄肛門같이 등글다.
③上下로 뒤집혀져 있는 境遇도 있다.
④下齒가 上齒를 덮고 있는 境遇도 있다(=反對交合).
⑤犬口型도 있다.
⑥염소입과 같은 境遇도 있다.
三. 少陽人: ①下顎이 厚하면서 安定感이 있고, 上脣이 위로 若干 치켜져 올라가 있는 便이다(=豚口型).
②上下脣이 매우 얇은 境遇도 있으나 上脣은 若干 위로 치켜져 올라가 있는 便이다.
③上下脣이 서로 벌어지면서 두텁고 特히 上脣이 若干 위로 치켜져 올라가 있는 便이다.

07. 手型.

- 一. 太陰人: 長大而平面狀으로 少陽人에 比하여 肉이 있는 便이다.
二. 少陰人: 短大而曲線狀으로 安定感이 있다.
三. 少陽人: 骨格이 굵고 潤氣가 없으며, 肉이 없어 뼈만 있는 것 같다.
或은 손가락의 끝이 뾰족하게 나온 女子도 있다.
或은 體軀에 比하여 크거나 긴 境遇도 많다.

08. 足型.

- 一. 太陰人: 발목이 굵은 便이다.
二. 少陰人:
三. 少陽人: 발목이 가는 便이다.

09. 手足의 溫度.

- 一. 太陰人: 溫 或 冷한데, 冬季에는 冷한 便으로, 特히 胃脘受寒證은 더욱 冷한 便이다.
二. 少陰人: 四時에 溫한 便인데, 胃受寒證으로서 陰盛隔陽證의 境遇에는 冬季에도 手熱한 便이다(∵內水外炭).

- 三. 少陽人: 春秋冬季에 冷한 便인데, 脾受寒證은 夏季에도 冷한 便이다.
但 冬季에도 手足이 熱하면 將次 消渴證이 오려는 徵兆이다.

10. 手足掌心.

- 一. 太陰人: 氣虛하고 肝熱이 甚하여 傷肺하면 手足掌心に 汗流가 甚하다.
手足冷汗은 腎陽困熱한 肝受熱證에 多發한다.
- 二. 少陰人: ①腹冷結로 內竭되면 발바닥(特히 湧泉穴에서 然谷穴까지 部位)이 허영게
말라 잘 벗겨진다(=肺弱者나 藏厥者이다).
②亡陽證이 오면 手足掌心に 汗流가 甚하다(用 補中益氣湯, 升陽益氣湯).
③발바닥이나 발뒷꿈치가 저리는 것은 少陰人에 잘 나타난다.
*手足冷汗은 腎陽困熱한 腎受熱證에 多發한다.
*胃冷이 甚하여 傷肺하면 手足에 汗流가 甚하다.
- 三. 少陽人: 손끝이 갈라지거나 발뒷꿈치가 두꺼워지거나 갈라지는 것이 잘 나타나는
便이다.
*手足掌心に 有汗이면 輕證이고, 無汗이면 中證이며,
手足掌心이 乾燥해지면 中重證이고, 갈라지는 것은 重證이다.
*胃熱이 甚하여 傷肺하면 手足에 汗流가 甚하다.
*手足掌心に 發汗하면 病이 將次 解하려는 徵兆이다.

11. 大便.

- 一. 太陰人: 用便時間은 久한 便이며, 大便狀態는 頭硬而尾微滑하다. (1/1)
模樣은 第一 가는 便이고, 發病하면 後重이 잘 나타나는 便이다.
*傷肺한 境遇나 大腸에 冷濕이 있는 境遇에는 用便時間이 더욱 오래 걸린다
*胃脘受寒證일지라도 冷이 極甚하면 便秘가 올 수 있다.
①少陰人便과 같으면 肝受熱裏熱病을 內包한다.
②太陽人便과 같으면 胃脘受寒表寒病을 內包한다.
*大便을 참으려면 참을 수도 있고, 참더라도 便秘는 오지 않는 便이다.
*參考事項.
1)大便滑; 胃脘受寒證.
2)頭燥尾滑; 胃脘受寒證에 肝受熱이 온 境遇.
3)大便燥而二三日/回者; 肝受熱證.
- 二. 少陰人: 用便時間은 第一 오래 걸리는 便이고, 大便狀態는 頭尾燥而體長하여 굵고
第一 긴 便이나, 少陽人보다는 덜 굵은 便이다. (一三五七日/回)
①少陽人便과 같으면 腎受熱表熱病을 內包한다.
②太陽人便과 같으면 胃受寒裏寒病을 內包한다.
- 三. 少陽人: 用便時間은 速한 便이며, 大便狀態는 頭燥尾滑하고 體大而疏通하여
第一 굵고 짧은 便이다. (1/1)
*冷이 아래로 쳐지거나 心虛하면 用便時間이 길어진다.
①少陰人便과 같으면 胃受熱裏熱病을 內包한다.
②太陽人便과 같으면 脾受寒表寒病을 內包한다.
*大便을 참으려면 못 견뎌서 싸던지 便秘가 오는 便이다.

*體質別 大便의 길이와 굵기의 比較.	大便狀態	病의 狀態
1)少陰人:(頭燥)——(尾燥), 中間程度이다.		
2)太陰人:(頭燥)——(尾微滑), 第一 가는 便이다.	頭燥尾滑	病解之大便也
3)少陽人:(頭燥)——(尾滑), 第一 굵은 便이다.	頭滑尾燥	病不解之大便也

12. 大便不通時.

- 一. 太陰人: 肝受熱證은 項強症이 잘 오고, 口苦口渴하나 少飲水하는 便이다.
*胃脘受寒證은 口苦, 口渴, 項強이 없는 便이다.
萬若 項強이 나타나면 加 葛根・大黃한다.
- 二. 少陰人: 大體的으로 큰 不便을 느끼지 못하는 便이다.
- 三. 少陽人: 胃受熱證은 咽乾하여 多飲水하고, 頭痛이 잘 나타나는 便이다.

13. 泄瀉時.

- 一. 太陰人: 양치질만 할 程度로 不飲水하며, 活動時에는 若干 氣衰하고 口渴이 若干 나타난다.
*胃脘受寒證은 口苦, 口渴, 項強이 나타나는 便인데,
便滑이 오래되어도 口苦症이 나타날 수 있다.
肝受熱證은 口苦, 口渴, 項強이 없는 便이다.
- 二. 少陰人: 不飲水하므로 脫津되며 口燥症이 나타나고, 活動時에는 氣衰가 甚하고, 甚한 境遇에는 水液을 供給하여야 할 程度이다. <大棗煎湯 調服>
*腎受熱證이 第一 氣運이 떨어진다.
- 三. 少陽人: 少飲水하거나 多飲水하여 脫津되는 境遇는 드문 便이다.
①脾受寒證은 活動時에 若干 氣運이 떨어지는 便이다.
②胃受熱證은 活動時에 如前한데 內渴이 甚하게 나타난다.

14. 小便.

- 一. 太陰人: 三四回/日. 但 燥熱病患者나 心虛者는 小便이 數해진다.
*一二回/日이나 六回/日 以上은 非正常이다.
- 二. 少陰人: 二三四回/日(∵腎大). 小便量은 大體的으로 많은 便이다.
但 鬱縮膀胱되면 小便이 頻數해진다.
*五回/日 以上은 非正常이다.
- 三. 少陽人: 四五六回/日(∵腎小).
*一二回/日이나 七回/日 以上은 非正常이다.
①脾受寒證으로서 産後調理不良하거나 流産經歴이 많은 者는 小便數而不禁,
咳嗽時小便失禁 등이 오는데, 오줌소태까지는 잘 안오는 便이다.
②胃受熱證은 膀胱이 말라 無力해지면 小便이 數해지면서 오줌소태까지도 잘 오는 便이다.

15. 經度.

- 一. 太陰人: 出血期間은 四七日間 程度이고, 經量은 第一 많은 便인데, 肝受熱證이 특히 더욱 많은 便이다.
*閉經이 되고나면 症이 易發하는 便이다.
- 二. 少陰人: 出血期間은 三五日間 程度이고, 經量은 普通인 便이다.

三. 少陽人: 出血期間은 二三日間 程度이고, 經量은 第一 적은 便이다.

16. 生理時.

一. 太陰人: 大體의으로 腹痛(量多), 或은 腰腹痛(量少, 有塊)이 나타난다.

二. 少陰人: 大體의으로 無痛이거나 腹痛이 나타나는 便이다.

*冷이 極甚하면 腰腹痛도 나타날 수 있다.

三. 少陽人: 大體의으로 腰痛이 나타나는 便이다.

*發病하면 腰腹痛이 甚하여 鎮痛劑를 服用해야만 할 程度이다.

17. 初産時.

一. 太陰人: 大體의으로 腹痛인데, 或은 腰腹痛이 나타나기도 한다.

二. 少陰人: 大體의으로 無痛이거나 腹痛이 나타나는 便이다.

*胃冷이 甚하면 腰腹痛도 나타날 수 있다.

三. 少陽人: 大體의으로 尾骨이 뒤틀리며 빠지는 듯한 痛症이 오는 便이다.

*出産時에 脫陰이 되는 境遇도 많은 便이다.

18. 皮膚.

一. 太陰人: 筋肉은 堅實하고 表皮는 厚한 便이다. 또한 潤氣가 없으므로 거칠게 보이고 만져봐도 삼베를 만지는 것 같이 거칠게 느껴진다.

二. 少陰人: 筋肉은 浮軟하고 表皮는 薄한 便이다. 또한 潤氣가 있으므로 부드럽게 보이고 만져봐도 비단결같이 부드럽다.

三. 少陽人: 筋肉은 厚軟하고 表皮는 淺-얇다-한 便이다. 또한 潤氣가 없어 거칠게 보이지만 만져보면 부드럽게 느껴진다.

*손끝의 皮膚가 벗겨지거나 갈라지는 것이 第一 많이 나타나고, 主婦濕疹은 流産經歷이 많은 女子에 多發하는 便이다.

19. 飲水關係.

一. 太陰人: 平素에 잘 안즐기는 便인데(但 飲酒者는 多飲水한다),

萬若 喜飲水하면 肝熱이 動하여 內熱이 發生하니

肝病과 燥熱病이 發生하고, 甚하면 夢泄病과 肺病이 發生한다(∴熱).

*虐疾惡寒中에 多飲冷水하고,

發熱中에는 汗出하여 水液이 빠지는데도 不飲水한다.

①胃脘受寒證: 平素에 飲冷水하나, 發病하면 多飲冷水한다.

②肝受熱證: 平素에 少飲水하나, 發病하면 喜溫水한다.

二. 少陰人: 上熱感이 많으므로 平素에 多飲水하는 便인데,

萬若 不飲水하면 胃가 冷해져서 大腸이 마르므로 大便이 滑 或 秘하니, 浮腫 卽 腎機能障礙가 온다(∴冷).

*虐疾惡寒中이나 泄瀉時나 嘔吐後에 不飲水한다. 能飲水는 一吉證也니라.

①腎受熱證: 平素에 多飲冷水하나, 發病하면 少飲水한다.

②胃受寒證: 平素에 少飲水하나, 發病하면 多飲冷水한다.

三. 少陽人: 平素에 즐기는 便으로, 胃熱이 發生하면 자다가 깨서도 찾을 程度인데,

萬若 不飲冷水而喜溫水하면 胃府가 枯竭되어 胃潰瘍이나 消渴病이 發生한다(∴熱).

*發熱中에는 能飲冷水하나, 惡寒中에는 不飲水한다.

*胃熱이 甚하면 喜溫水 或 不飲冷水하는데, 消渴病患者는 飲冷水한다.

①脾受寒證; 平素에 少飲水하나, 發病하면 多飲冷水한다.

②胃受熱證; 平素에 多飲冷水하나, 發病하면 喜溫水한다.

20. 三伏에 不飲冷水.

一. 太陰人: 肝受熱證에 燥熱病이 온 境遇에 나타날 수도 있으나, 거의 없는 便이다.

二. 少陰人: 胃極冷한 境遇에 나타난다. (冷水를 보면 흐느낄 程度이다, 大便滑)

三. 少陽人: 胃極熱(=涼膈散火湯證)의 境遇에 나타난다.

21. 口渴의 樣狀.

一. 太陰人: 입천장과 코에서 咽喉部로 말라들어간다(∵肺小).

二. 少陰人: 입술과 舌前部에서 咽喉部로 말라들어간다(∵內氷外炭).

故로 唇瘡症이 잘 發生하고, 甚하면 입술이 뒤집어진다.

三. 少陽人: 咽喉部에서 입술쪽으로 말라나온다(∵胃熱).

<口臭>

一. 太陰人: 輕證으로 口臭는 弱하고, 口苦가 甚하다.(∵肺虛나 肝熱)

二. 少陰人: 太重證으로 口臭가 甚하고, 口渴은 弱하다.(∵胃冷)

三. 少陽人: 太重證으로 口臭와 口渴이 甚하고, 口苦는 弱하다, 舌黃苔.(∵胃熱)

22. 汗液.

一. 太陰人: 平素에 多汗하는 便이나, 少汗 或 無汗하는 境遇도 있다.

*多汗則完實而無病이니라.

二. 少陰人: 平素에 腎受熱證은 有汗하고, 胃受寒證은 無汗하는 便이다.

*胃冷이 甚하여 傷肺하면 多汗하는데, 全身과 手足掌心に 모두 汗出한다.

*亡陽證.

①腎受熱證: 用 補中益氣湯, 升陽益氣湯.

②胃受寒證: 官桂附子理中湯 官桂 代 桂枝.

三. 少陽人: 平素에 少汗하는 便이다.

*陰虛하면 脾局의 陰氣와 腎局의 陰氣가 一升一降作用을 못하여 多汗하는데 이 때에는 全身에는 汗出하나, 手足掌心에는 無汗한다.

23. 病癒之汗.

一. 太陰人: 汗出이 自始 耳後高骨 面部髮際하여 大通於胸臆間한다.

二. 少陰人: 人中에 先汗하고, 部→頸部→胸部에 汗出한다.

三. 少陽人: 手足掌心に 發汗한다.

24. 手足冷汗.

一. 太陰人: 肝受熱證에 多發하는 便이다(∵肝熱肺燥).

二. 少陰人: 腎受熱證에 多發하는 便이다(∵腎陽困熱 및 胃極冷).

三. 少陽人:

25. 手足無汗.

- 一. 太陰人;
- 二. 少陰人: 肺弱者나 藏厥者는 手足無汗하여 손바닥과 발바닥이 허영게 잘 벗겨진다.
- 三. 少陽人: 脾受寒證으로서 手足無汗者의 重證에는 손끝이나 발뼛꿈치가 잘 갈라진다.
*症狀: 手足冷甚, 무좀, 多飲水~用 獨活地黃湯.

26. 手足汗多.

- 一. 太陰人: 肝熱이 甚하여 傷肺하면 發生한다. (用 熱多寒少湯, 葛根解肌湯)
- 二. 少陰人: 胃冷이 甚하여 傷肺하면 發生한다. (用 補中益氣湯, 升陽益氣湯)
- 三. 少陽人: 胃熱이 甚하여 傷肺하면 發生한다. (用 荊防瀉白散 加 地骨皮, 涼膈散火湯)

27. 脈診.

- 一. 太陰人: 長而緊. <肝熱이 甚하면 脈이 微弱해진다>
- 二. 少陰人: 緩而弱.
- 三. 少陽人: 微細不現. (*微脈: 無力한 脈. *細脈: 실같이 가는 脈)
<中風患者에 滑脈이 나타나면 危證이거나 死證이다>

28. 容貌詞氣.

- 一. 太陰人: 居處에 禮義가 있고, 修整正大하다.
- 二. 少陰人: 簡易小巧하여 態度에 自然性이 豊富하고 아담한 便이다.
- 三. 少陽人: 有剽銳氣하다. 卽 形象이 勇敢하고 性質이 輕急하다.
*주걱턱인 境遇에는 매우 게으른 便이다.

29. 形局의 象.

- 一. 太陰人: 牛之性.
- 二. 少陰人: 驢之性.
- 三. 少陽人: 馬之性.

30. 體形氣像.

- 一. 太陰人: 腰圍之立勢는 盛壯하나 腦 之起勢는 孤弱하다. 卽 원기둥 模樣이다.
- 二. 少陰人: 膀胱之坐勢는 盛壯하나 胸襟之包勢는 孤弱하다. 卽 上虛下實한 體形으로서 엉덩이가 좀 큰 便이다. 사다리 模樣이다.
- 三. 少陽人: 胸襟之包勢는 盛壯하나 膀胱之坐勢는 孤弱하다.
卽 上盛下虛하고 胸實足輕하여 剽銳好勇한 形象을 띄며, 人數가 亦多하여 四象人 中에 가장 區分하기가 쉽다. 역사다리 模樣이다.
卽 어깨部位가 發達하고 엉덩이가 조금 작은 便이다.
*傷肺한 女子의 境遇에는 어깨部位가 좁은 境遇도 있다.

31. 性質.

- 一. 太陰人: 成就慾이 强하다.
- 二. 少陰人: 端重하는데 長點이 있고 表裏不同한 境遇가 많은 便이다.
- 三. 少陽人: 剛武에 長點이 있다.

32. 材幹.

- 一. 太陰人: 居處에 能하다.
- 二. 少陰人: 黨與에 能하다.
- 三. 少陽人: 事務에 能하다.

33. 性情.

- 一. 太陰人: 恒有怯心하니, 怯心이 寧靜則居之安資之深而造於道也오,
怯心이 益多則放心桎梏而物化之也라.
萬若 怯心이 至於 心하면 症이 發生하는데,
症은 太陰人病中에 重證이다.
恒常 急迫한 마음을 갖고 있는데, 이를 잘 調節하면 肝血이 和平할 수 있다.
*心虛하면 衝擊을 받을 때 欲大便하여 滑便을 보는 便이다.
- 二. 少陰人: 恒有不安定之心하니, 이를 잘 調節하면 脾氣가 活할 수 있다.
*不安定之心~胃受寒證의 重證으로서 脾氣가 絶한 것이다. 白何烏寬中湯加減
- 三. 少陽人: 恒有懼心하니, 懼心이 寧靜則居之安資之深而造於道也오,
懼心이 益多則放心桎梏而物化之也라.
萬若 懼心이 至於恐心하면 健忘症이나 胸腹痛이 發生하는데,
健忘症이나 胸腹痛은 少陽人病中에 險證이다.
*怒心→哀心→悲觀→懼心→健忘症, 胸腹痛.
*心虛하면 衝擊을 받을 때 欲小便而不出하여 애를 쓴다.

34. 七情.

- 一. 太陰人: 恒常 慾火를 갖고 있는데, 이를 잘 調節하면 肝血이 和平할 수 있다.
또한 喜心樂心을 恒常 警戒하여야 한다.
- 二. 少陰人: 進一步하여 恒常 不安定한 마음을 갖지 않도록하며, 喜心樂心을 恒常 警戒하여야 한다.
- 三. 少陽人: 안을 살펴서 恒常 懼心을 갖지 않도록하며, 哀心怒心을 恒常 警戒하여야 한다.

35. 健康한 狀態.

- 一. 太陰人: 汗液이 通暢하면 完實而無病하다.
- 二. 少陰人: 飲食이 善化하면 完實而無病하다.
- 三. 少陽人: 大便이 善通하면 完實而無病하다.

36. 發病主流.

- 一. 太陰人: 肺系의 胃脘, 舌, 耳, 頭腦, 皮毛 等の 弱화로 因하여 發病한다.
또한 外感腦 하고 內觸胃脘病한다.
- 二. 少陰人: 脾系의 胃, 乳, 目, 背, 筋 等の 弱화로 因하여 發病한다.
또한 外感背部하고 內觸胃腸한다.
- 三. 少陽人: 腎系의 大腸, 前陰, 口, 膀胱, 骨 等の 弱화로 因하여 發病한다.
또한 外感膀胱하고 內觸大腸病한다.

37. 病理關係.

- 一. 太陰人: 胃脘寒邪에 대한 抵抗力이 弱한 者로서, 萬若에 寒邪가 侵犯時에 完除하지 않으면 長久한 期間을 潛伏하다가 抵抗力이 弱한 時에 되면 發病하려 하는데, 이는 臟腑의 先天的인 性作用때문이다.
- 二. 少陰人: 胃系에 加해진 寒毒과 腎系에 加해진 熱毒과 脾系에 加해진 寒毒 等 惡性作用의 進度에 따라 腎動脈血과 脾動脈血의 輪廻作用이 不完全하게 되어 腎系의 陽性作用과 脾系의 陽性作用과의 一升一降이 衰退하게 되므로 發病한다. 이는 胃受寒毒으로 因하여 腎系와 脾系와의 陽性交流作用이 中斷되기 때문이다. 故로 腎에서 熱을 내어 溫胃冷하면 無病할 수 있다.
- 三. 少陽人: ①內傷~脾臟系의 陰氣와 腎臟系의 陰氣는 胃府系의 強大한 熱邪로 因하여 一升一降이 不能함으로써 그 機能이 敗하니 萬病이 發生한다. 또한 ②外感~風, 寒, 涼, 燥 等の 影響으로 因하여 萬病이 發生한다. 故로 脾局의 陰氣와 腎局의 陰氣의 一升一降作用이 胃局의 陽氣를 調節할 수 있으면 無病할 수 있다.

38. 治療의 難易度.

- 一. 太陰人: ①肺病類~速治. ②腎病類~難治, 九死一生. ③胃病類~難治.
- 二. 少陰人: ①肺病類~難治. ②腎病類~久治. ③胃病類~速治.
- 三. 少陽人: ①肺病類~久治. ②腎病類~速治. ③胃病類~久治.

39. 治病爲主.

- 一. 太陰人: 汗液을 疏通시키는 것을 爲主로 한다.
 ①胃脘受寒證~汗液을 疏通시키는 것을 爲主로 한다.
 ②肝受熱證~먼저 大便을 疏通시키면 汗液이 疏通된다.
- 二. 少陰人: 小便을 通利시키는 것을 爲主로 하는데, 消化를 于先으로 생각하여야 한다.
- 三. 少陽人: 大小便을 通利시키는 것을 爲主로 하는데, 通大便이 더욱 重要하다.

40. 感氣時에 解熱劑를 服用한 境遇.

- 一. 太陰人: 發汗시켜야 하는데 解熱劑를 服用하니 艱難은 便이다.
- 二. 少陰人: 順氣시켜야 하는데 解熱劑를 服用하니 좋지 않은 便이다.
- 三. 少陽人: 清熱시켜야 하는데 解熱劑를 服用하니 좋지 않은 便이다.

41. 體質에 따른 咳嗽의 季節別 發生比率.

- 一. 少陰人: 冬季에 出産하고 夏季에 發病하는 境遇가 많다.
- 二. 少陽人: 夏季에 出産하고 冬季에 發病하는 境遇가 많다.

42. 頭痛의 樣狀.

- ①左偏頭痛~神經性이나 스트레스에 의한 肝鬱에 의한 것이다.
 - ②右偏頭痛~氣虛에 의한 頭痛이다.
 - 一. 太陰人: ①胃脘受寒證~前頭部가 잘 아픈 便이다.
 ②肝受熱證~後頭部가 잘 아픈 便이다.
 - 二. 少陰人: ①腎受熱證~後頭部가 잘 아픈 便이다.
 ②胃受寒證~前頭部가 잘 아픈 便이다.
- *冷勝則頭痛也(∵內氷外炭).

三. 少陽人: 冷頭痛으로서 兩前頭部에서 頂門穴部位로 잘 나타나는 便이다.

①男子~毛髮을 건드리기만하여도 싫다고 한다.

②女子~머릿속이 흔들린다고 한다.

43. 嘔吐時.

一. 太陰人: 原來 濕이 많으므로 胃脘部の 冷濕을 吐하니, 속이 便해지고,
嘔吐後에는 양치질만 하는 便이다(∵胃脘部の 冷結).

*一吐는 吉證也니라.

二. 少陰人: 原來 氣血이 不足한데 胃府의 冷濕을 吐하고나서 不飲水하니 氣盡되어
重證으로 된다(∵胃冷結).

三. 少陽人: 胃府의 熱濕을 吐하니 便한 듯하나 더욱 熱盛하게 되니 咽喉가 乾燥하고
가슴이 타는 듯한 느낌이 오면서 더욱 괴로워지고 多飲水한다(∵熱盛).

44. 口苦症.

一. 太陰人: 肝受熱證에 頻發하는 便이다.

二. 少陰人: 胃受寒證에 多發하는 便이다.(平素에 滑便을 보다가 便秘가 되면 나타남)

三. 少陽人: 胃受熱證에 多發하는 便이다.

45. 喘息.

一. 太陰人: 肺性 喘息으로서 多發하는 便이다.

二. 少陰人: 心性 喘息으로서 少發하는 便이다. 難治症이다. 不用 人蔘 代 白何首烏.

三. 少陽人: 氣管支性 喘息으로서 多發하는 便이다(∵腎虛하여 胃熱이 盛하므로).

46. 太息.

一. 太陰人: 平素에 잘 안하는 便이나, 心虛해지면 나타난다.

二. 少陰人: 原來 氣虛하므로 平素에 잘하는 便이다.

三. 少陽人: 平素에 잘 안하는 便이나, 氣管支에 障礙가 오면 나타난다.

47. 糖尿病에 걸린 境遇.

一. 太陰人: 一飲二 하니, 初期부터 體重減少가 甚하게 나타나는 便이다.

二. 少陰人: 體重減少가 初期에는 甚하지 않은 便이나, 中證이 되고나면 體重減少가
나타난다.

三. 少陽人: 體重減少가 初期에는 甚하지 않은 便이나, 中證이 되기 直前에는 나타난다.

48. 肛門部位.

一. 太陰人:

二. 少陰人: 特徵적으로 肛門이 짓무르는 것(≡濕疹)이 잘 發生하는 便이고,
肛門開口症도 잘 나타나는 便이다. 用 赤白何烏寬中湯.

(∵冷이 아래로 쳐져 後陰部에 影響을 주므로)

三. 少陽人:

49. 중아리의 靜脈瘤.

一. 太陰人: 多發하는 便이고, 産後調理가 不良한 女子나 多飲酒하여 冷이 아래로 쳐진

男子에게 발생한다. 女子의 境遇에는 脫陰症까지도 隋伴하는 境遇가 많다.

二. 少陰人;

三. 少陽人;

50. 足熱로 이불을 못 덮는 境遇.

一. 太陰人: 肝受熱證에 多發하는 便이다. (原因: 傷肺.)

用 補肺湯, 熱多寒少湯.

二. 少陰人: 肺結核患者의 境遇에 發生한다.

三. 少陽人: 胃受熱證에 多發하는 便이다. (原因: 傷肺, 氣管支.)

51. 足底.

一. 太陰人: 子宮虛(∴産後調理不良)한 肝受熱證의 境遇에는 발뭇꿈치가 갈라지는데, 睡眠時에 足熱로 이불속에 발을 넣지 못한다.

二. 少陰人: 腹冷結로 內竭되어 子宮이 弱해지면 발바닥—특히 湧泉穴에서 然谷穴까지의 部位—이 허영게 말라서 벗겨지는 便이고, 甚하면 갈라지기도 한다.

三. 少陽人: 腎虛나 産後調理不良 또는 胃熱이 甚한 境遇에는 발바닥이 마르고, 더욱 甚해지면 갈라지는데, 脾受寒證에 易發하는 便으로서 발이 차서 꼭 이불을 덮고 자는 便이다.

52. 其他 事項.

一. 太陰人: 고집이 센 便이고, 骨格이 壯大하며, 발목이 굵고, 허리를 펴고 곧바로 걷는 便이다.

二. 少陰人: 목소리가 굵은 便이고, 허리를 굽히고 걷는 便이며, 瘀血이 잘 생기는 便임. 또한 平素에 찬 것을 좋아하는 便인데 萬若 甘味를 좋아하게되면 안좋은 徵兆이다.

三. 少陽人: 목소리가 가는 便이고, 발목이 가는 便이며, 허리를 펴고 左右로 흔들면서 걷는 편이고, 남의 일에 參見하기를 좋아하는 便이다.

53. 좋은 食品.

一. 太陰人: 溫性 食品.

몹살, 수수, 울무, 콩, 감자, 마, 무우(生: 肝受熱證), 옥수수, 밤(生: 胃脘受寒證), 설탕, 도라지, 蓮根, 은행, 보리, 쇠고기, 사슴, 牛乳, 호박, 찹, 찹순, 수박, 배, 살구, 鹿茸, 오징어, (상추를 먹으면 졸린다고 한다)

二. 少陰人: 熱性 食品.

참살, 차조, 찰수수, 찰옥수수, 대추, 찹쌀, 닭고기, 개고기, 흑염소, 노루, 꿩, 뱀, 자라, 소금, 마늘, 호추, 고추, 土卵, 生薑, 고구마, 꿀, 굴, 오렌지, 복숭아, 인삼, 땅콩, 파, 鷄卵, 홍합, (밀가루를 많이 먹으면 膽石症에 걸리기 쉽다)

三. 少陽人: 寒性 食品.

조, 팔, 녹두, 돼지고기, 참기름, 상추, 새우젓, 굴, 치자, 가지, 오이, 시금치, 더덕, 숙주나물, 조개類(但 大蛤조개는 除外), 아몬드, 딸기, 산딸기, 참외, 토마토, 파인애플, 바나나, 키위, 골뱅이, 紅茶, 유자차, 배추, 한치,

四. 太陽人: 冷性 食品.

사과, 머루, 葡萄, 앵두, 감, 대합조개, 松花, 메밀,

54. 커피 服用後.

- 一. 太陰人: 胃脘受寒證은 잠을 잘자는 便이고, 肝受熱證에는 좋지 않다.
- 二. 少陰人: 口燥症과 胸燥症이 나타나서 잠을 못자고, 속이 혼는다고 한다.
- 三. 少陽人: 心悸, 症이 나타나서 잠을 못자고, 속이 쓰릴 수도 있다.

55. 清心蓮子湯服用後.

- 一. 太陰人: ①胃脘受寒證~消化不良, 大便滑 或 頭痛, 胸煩 등이 나타날 수 있다.
②肝受熱證~가슴이 시원하다.
- 二. 少陰人: 眩暈과 消化不良이 나타나고 無氣力해진다.
- 三. 少陽人: 頭痛과 胸燥症이 나타나고,甚하면 症이 온다.

56. 補肺湯服用後.

- 一. 太陰人: ①胃脘受寒證~便하다.
②肝受熱證~心煩症과 不眠症이 나타난다.
- 二. 少陰人: 嘔逆症이 나타나고, 大便을 자주 보게되고, 或은 가슴이 답답할 수도 있다.
無氣力해질 수도 있다.
- 三. 少陽人: 眩暈, 陽氣無力, 泄瀉, 脫肉 등이 나타나고,甚하면 小便數而不禁, 胸煩, 頭痛, 不眠 等도 나타날 수 있다.

57. 麻黃發表湯服用後.

- 一. 太陰人: ①胃脘受寒證: 便하다.
②肝受熱證: 胸煩, 不眠이 나타난다.
- 二. 少陰人: 脫津이 되어 無氣力이甚하게 나타난다.
- 三. 少陽人: 胸煩燥, 小便數, 頭痛이 나타난다.

58. 寬中湯服用後.

- 一. 太陰人: 醉하면서 頭痛이 나타나고,甚하면 드러누울 수도 있다.
- 二. 少陰人: 便하다.
- 三. 少陽人: 腹痛과 속쓰림이 나타나고,甚하면 胃受熱證의 境遇에는 卒倒할 수도 있다.

59. 獨活地黃湯服用後.

- 一. 太陰人: 醉하는 듯이 머리가 횡하고(=眩暈), 四肢가 나른하고, 嘔逆症도 올 수 있고 症과 속쓰림도 나타날 수 있고,甚하면 드러눕는다. 腹不安.
- 二. 少陰人: 頭痛, 腹痛, 속쓰림이 오면서 飽滿感이 나타나고, 或은 顔面下顎部에 熱이 나면서 咽乾症도 올 수 있고, 冷涎도 發生할 수 있다.
하품을 여러차례할 수도 있다.
- 三. 少陽人: ①脾受寒證~便하다.
②胃受熱證~ 滿症과 咽乾症이 올 수 있다.
涼膈散火湯證의 境遇에는 속쓰림도 올 수 있다.

60. 荊防瀉白散服用後.

- 一. 太陰人: 眩暈症이 나타난다.
- 二. 少陰人: 腹痛이 나타난다.
- 三. 少陽人: ①脾受寒證~속이 거북하면서 가슴이 허전하고, 頭痛, 泄瀉도 나타날 수 있다.
②胃受熱證~便하다.