

급성복통 : 응진 소순호 부비

O	언제부터? 어떤 상황에서? 갑자기? 서서히?
L	어디? 짚어보세요. 아픈 부위 이동? (충수염 : 명치→ RLQ) 다른 부위 통증? 퍼지나요?
D	하루 몇 번? 얼마나 지속? 규칙적?
Co	점점 더 심해짐?
Ex	예전에도 이런 적?
C	[양상] 답답/콕콕/베이듯/타듯/쥐어짜듯 (답콕베타쥐) [NRS]
A	[응급] 두근거림/숨참/어지럼/소변량 감소 [전신] 발열/오한/피로/체중변화/식은땀 [소화기] 식욕감소/구역/구토/변비/설사/토혈/흑색변/혈변/복부팽만감/복부종괴/황달(담관염)/지방변 [순환기] 흉통/호흡곤란/기침 [부인과] 질출혈/질분비물 [비뇨기] 배뇨통/핍뇨/혈뇨/빈뇨/혈변(크론병)/항문통증(크론병)
F	술 음변자식 여우스 -식사 후(위염, 위궤양, 소화천공궤양, 급성췌장염)/공복(십이지장궤양)/음주 후(급성췌장염) 심해지나요? -자세에 따라 통증이 변하나요? (췌장염-앞으로 숙이면 완화) -배뇨/배변에 의한 통증?
E	건강검진 - 담석, 요로결석?
약사가외 과여	약 - 진통소염제, 제산제 복용 여부. (복부대동맥류 파열 -고혈압 시 약 복용 잘 했는지) 식습관 - 최근 해산물 복용 여부
P/E	1.눈→ 2.입 (탈수) →3. 목 림프절→4. 피부긴장도, 오목부종→ 5. 복부 (상복부: murphy, 하복부: rovsing or mc.burney) →5.CVAT→6. DRE *순환기/호흡기 의심 시: 폐 청진, 심장 청진 “윗배가 아프신 분들 중 가슴이 아픈 데 배가 아픈 것처럼 느끼는 경우도 있다” *황달, 간질환 의심 시 : 간, 비장 타진/촉진  [Psoas 징후] 오른쪽 허벅지를 펴신(말) 때 통증이 있음 (충수돌기가 후복막에 위치한 경우) → 급성 충수돌기염  [Obturator 징후] 오른쪽 허벅지를 안쪽 돌출내회전(사일) 때 통증이 있음(충수돌기가 골반쪽에 있을 때) → 급성 충수돌기염  [Rovsing 징후] 왼쪽 아랫배를 촉진했을 때 오른쪽 아랫배에 통증이 발생 → 급성 충수돌기염  [McBurney 징후] 오른쪽 아랫배(ASIS와 배꼽의 중간)의 통증 → 급성 충수돌기염  [Murphy 징후] 오른쪽 양배의 갈비뼈 아래 경계 부위를 가볍게 누른 상태에서 숨을 깊게 들이 마시면 갑자기 통증이 유발 → 급성 담낭염
진단 검사 치료	-교:금연, 금주, 수술 필요할 수 있으니 금식해주세요. 규칙적 식사, 기름진 음식 줄이기

#진단/치료 계획

-소화 천공 궤양(위궤양 증상+두근.어지럼.Td/rTd) : X-ray, 복부 CT → 응급 개복 수술

-급성 담낭염/담석증/담관염(RUQ 통증, 황달, 발열, Murphy) : 복부 CT, 복부 초음파, 간기능검사 → 담낭 절제술, 항생제

-급성 충수염(명치→RLQ, 구역, 구토, 식욕저하, Rovsing, obturator, psoas) : 복부 초음파, CT → 충수 절제술, 항생제

-급성 췌장염(과음, 찌르는듯 통증, 앞으로 굽히면 나아짐, 음식 섭취 후 악화.구역.구토) : amylase, lipase, 복부 CT → 전해질 교정, 수분 공급, 진통제(morphine), 코위관 삽입

-요관 결석(옆구리 통증, 배뇨통, 혈뇨) : 소변검사, KUB, 골반 CT → 수액 치료, 초음파 쇄석술, 수술

-PID(발열, 질분비물, 산부인과 수술) : 소변 검사, 복부 CT, 질분비물 배양, CBC → 항생제 (ceftriaxone)

-자궁 외 임신(젊은 여성, 임신가능성, 생리주기변화) : 골반 초음파 검사, urine hCG → 메토크렉세이트, 복강경술

소화불량/만성복통: 응전소 간 GERD, IBS, 부비

O	언제부터? 어떤 상황에서? 갑자기? 서서히? 주로 언제?
L	어디? 짚어보세요.
D	하루 몇 번? 얼마나 지속?
Co	점점 더 심해짐?
Ex	예전에도 이런 적?
C	[양상] 타는듯/더부룩/가스 차는 느낌/소화 안됨/통증 (타부룩가소통) [NRS]
A	[응급] 두근거림/숨참/어지럼/소변량 감소 [전신] 발열/오한/피로/체중변화/식은땀 (악성 종양 감별) [소화기] 식욕저하/구역/구토/설사/변비/혈변/흑색변/복통/속쓰림/복부팽만/연하곤란 [간담체] 황달 (가려움, 복수, 소변/대변색 변화) [GERD] 신물 올라옴/기침/가슴 타는듯한 통증 [IBS] 배변 습관의 변화 [부인과] 질출혈/질분비물 [비뇨기] 배뇨통/핍뇨/혈뇨/빈뇨/혈변(크론병)/항문통증(크론병)
F	[개방형 질문] 음변자식 여우스 -식사 전 후 악화/우유나 기름진 음식 먹을 때/대변 보고나면 완화? (IBS)/스트레스/여행/자세
E	건강검진? 위, 대장 내시경? 결과? 간염 예방접종?
약사가 외과여	약-진통제, 항생제, 제산제, 스테로이드
P/E	1.눈→2. 입인두 (위산역류) →3. 목 림프절 →4. 복부(Murphy's sign포함) →5. CVAT→ 6. DRE
진단 검사 치료	-치: 위산분비 억제하는 약, 제균치료, 위암으로 진단 시 수술이나 항암치료 -교: [응급] 음식을 삼키기 힘들거나, 어지럽고, 피를 토하거나, 혈변이나 흑색변 나올 경우 병원 방문. 맵거나 자극적인 음식 피하기. 금연, 금주. 카페인(위산 촉진) 금지

#진단/치료 계획

- 위식도내시경 : 45세 이상, 악성 경고 증상 +, 만성 증상 변화+, 환자가 암에 대해 걱정
- 위염, 위궤양(식후), 십이지장궤양(공복): 위내시경, 요소날숨검사, 신속요소분해효소검사 →PPI, H.pylori 제균, 제산제
- 위암(체중감소, 흑색변, 소화불량): 위내시경, 복부 CT → 위절제술, 내시경점막밀박리, 항암치료
- 당뇨병위마비(오래된 당뇨병력, 복부팽만,음식구토, 상복부불편, 식후 속쓰림) : 혈중 포도당, 당화혈색소, 위배출검사→당뇨 조절, Metoclopramide, Cisapride
- 담석증, 만성 담낭염(RUQ 통증, 오심, 구토): 상복부 초음파, LFT→쓸개절제술
- 만성궤장염(심와부 통증,등으로 뻗침, 제산제 복용 후에도 완화 안됨, 음주 후 악화, 지방변): 복부초음파, CT, MRI, 내시경역해 담체관조영 → 궤장효소 보충, 금주/금연, 식이조절(과식, 고지방식 자제), 통증조절
- 만성간염(피로, 식욕 저하, 구역, 구토, 근육통, 소변색 진해짐, 황달): HBsAg, anti-HAV, anti-HCV, LFT→항바이러스제
- 젓당불내성(우유): 수소날숨검사, 젓당부하검사 →유당회피
- IBS(젊은 여성, 만성복통, 배변 후 완화, 복부 팽만, 잦은 트림/방귀, 소화불량, 스트레스 시 악화): 대변검사, 대장내시경 → 심리적 안정, 운동, 휴식, 식습관교정(고섬유, low FODMAP, 술/커피 줄이기, 진경제, 완화제)
- 기능소화불량(상복부 통증/쓰림, 식후 충만감, 조기포만감, 불규칙 식습관, 스트레스, 내시경 정상): 필요 x, 위내시경, 신속요소 분해효소검사 등으로 다른 질환 감별 → PPI(궤양형), 운동촉진약물(운동장애형)

토혈 (Hematemesis): 전소 탈출 정말 GERD

O	언제부터? 어떤 상황에서? 갑자기?
L	-
D	몇 번?
Co	양이 점점 늘어나나요? 심해지고 있나요?
Ex	예전에도 이런 적? 그 때는 치료 받으셨나요?
C	[객혈 감별] 거품/가래? 기침/토? 음식물? 코나 입에서 피? 출혈량은 종이컵 기준으로 얼마나? 색깔?(선홍색/검붉은색) 피떡?
A	[전신] 발열/오한/피로/체중변화 (식도암, 위암) [과다 출혈] 어지럼증/호흡곤란/소변량 감소 → “수액 달아드릴게요” [출혈경향] 코피, 출혈 후 피 잘 안 멎음/멍 잘 듦/ 생리량 많아짐 [소화기] 식욕감소/구역/구토/변비/설사/토혈/흑색변/혈변/소화불량 [역류성 식도염/식도암] 신물 올라옴/속 쓰림/연하곤란 [식도정맥류파열] 황달/복부팽만/소변, 대변 색 변화 [말로리-바이스] 토하기 전 과음?
F	[악화] 통증 있다면 식사와 관련?
E	건강검진? 위 내시경? 간염 예방접종?
약사가외 과여	약 - 아스피린, 항혈소판제, NSAIDs 사 - 술, 담배, 커피/직업/식사/운동 가 - 간 질환/소화기 질환 과 - 간경변/간질환/간염
P/E	1.혈압, 맥박 보고 응급인지 확인→2.눈 (빈혈, 황달) →3.코(비경으로 출혈 확인) →4.입(설압자로 출혈 확인, 탈수, 인두 피떡) →5. 목 (경부 림프절 촉진) →6.손 (피부 긴장도, <u>Flapping tremor</u>) →7.복부 (spider angioma, 간/비장 타진) →8. DRE
진단 검사 치료	-교: [위내시경] - 8시간 금식 [응급] 출혈 심하면 어지럼/호흡곤란 → 병원으로 바로 내원 [금주] 상태 악화, 재발할 수 있음

#진단/치료 계획

- 위염/위궤양/십이지장 궤양(속쓰림, 식후 악화(위궤양), 공복 악화(십이지장궤양), 명치부 통증, 상복부 압통) : 위내시경, 신속 요소 분해효소 검사 → 내시경 지혈술, PPI, H.pylori 제균치료, 제산제
- 위암(체중감소, 소화불량, 흑색변, 이전 위내시경에서 궤양소견) : 위내시경, 복부 CT → 응급 개복 수술
- 식도정맥류(많은 양 토혈, 황달, 복부팽만, 간염.간경변, flapping tremor, spider angioma): 위내시경, 간기능검사 → 수액 정주, 내시경정맥류결찰술, 텔리프레신, 소마토스타틴, 베타차단제(예방)
- 말로리-바이스(음주 후 구토하던 중 토혈): 위내시경 → 수액, 안정

혈변 (Hematochezia): 전소 탈출 항암간 IBD

O	언제부터?
L	-
D	얼마나 자주?
Co	양이 점점 늘어나나요?
Ex	예전에도 이런 적? 그 때는 치료 받으셨나요?
C	출혈량은 어느정도? (변기가 붉어짐/피 뚝뚝/휴지 묻어남) 색깔? (선홍색/검붉은색) [IBD] 변 양상 (점액성)
A	[과다 출혈] 어지럼증/호흡곤란/소변량 감소 -> “수액 달아드릴게요” [출혈경향] 코피, 출혈 후 피 잘 안 멎음/멍 잘 듦/ 생리량 많아짐 [전신] 발열/오한/피로/체중변화 [소화기] 식욕감소/구역/구토/변비/설사/토혈/복통 (발열, 복통, 변비, RLQ pain : 게실 출혈?) [결장암/직장암] 변 굵기 변화/복부 종괴/뒤무직 [치핵/항문 열창] 배변 시 통증? 튀어나온 덩이? [간질환] 황달/(황달 있으면 가려움증/복수/소변, 대변색 변화)
F	[음식] 식사량 관련? 스트레스랑 관련?
E	건강검진? 대장 내시경?
약사가외 과여	약 - 아스피린, 항혈소판제, NSAIDs 사 - 술, 담배, 커피/직업/식사/운동 가 - 소화기 질환/대장암
P/E	1.혈압, 맥박 보고 응급인지 확인→2.눈 (빈혈, 황달)→3.입(탈수)→4.목 (경부 림프절 촉진) (대장암 전이) →5.피부 긴장도 (탈수)→6. 복부+복수 (황달 있거나 간질환 의심 시 간, 비장 타진)→7. DRE
진단 검사 치료	-A : 대장암 가능성 반드시 설명!! [대장내시경]금식과 관장약 복용 필요한 검사. 준비과정 힘들고 검사가 불편할 수 있지만 진단을 위해 꼭 필요함 -교: [응급] 출혈 심하면 어지럼/호흡곤란 → 응병원으로 바로 내원 → 수액이나 수혈 필요함 [위험인자] 나이 많거나, 담배 많이 피는 등 위험인자 있을 경우 대장내시경 통해 기질성 질환 감별 필요 [치료 중요] 치료받지 않을 경우 재출혈 가능성, 기저 질환 악화 [검진] 국가 암검진 프로그램 : 만 50세 이상 남녀 대상 매년 분변 잠혈검사, 이상 시 대장내시경 정기 검진 권유 [양성 질환] 변기에 오래 앉아있지 말고 섬유소가 많이 들어있는 음식 섭취

진단/치료 계획

- 대장암/직장암(많은 양의 혈변, 흑색변, 변 굵기 변화, 변비, 체중감소): 대장내시경, 복부 CT, MRI → 대장 절제술, 방사선 치료
- 게실 출혈(발열, 복통, 변비, RLQ): 대장내시경, 복부 CT → 경과관찰, 수액요법, 항생제, 금식→출혈 지속 시 소작술 or 혈관조영술
- 허혈결장염(기저 심장질환, 고혈압, 복통): 대장내시경, 복부 X-ray→수액 공급, 항생제, 금식
- IBD(점액변, 젊은 환자, 심한 복통, 탈수, 체중감소): 대장내시경, 복부 CT → 설파살라진, 스테로이드, infliximab, 영양공급
- 감염성 대장염(발열, 설사, 심한 복통, 상한 음식): 대장내시경, 대변 배양검사, 복부X-ray →수액공급, 항생제, 금식
- 치핵/항문 열창: 대장내시경 → 보존적 치료, 치핵 절제술, 좌욕치료(배변 직후 물 40c/5~10min/하루 3~4번)
- 약물 유발 위염

구토 (환자 누워있음!!): 전소 탈수 뇌비피폭

O	언제부터? 갑서? 어떤 상황에서?(식사와 관련 있는지 묻는 것)
L	-
D	몇 번?
Co	심해지나요?
Ex	예전에도 이런 적? 그 때는 치료 받으셨나요? 항구토제나 제산제 드셨나요?
C	[양상] 양/색(빨, 노, 초, 흰)/음식물 섞여나옴? [정도] 일상 생활에 많이 불편?
A	[전신] 발열/오한/피로/체중변화 [탈수] 목마름/호흡곤란/두근거림/소변량 감소 [신경계] 어지럼/이명/두통/팔다리 힘 빠짐/감각 저하/목 뻣뻣 [소화기] 식욕감소/구역/구토/변비/설사/복통 (구토 후/식전/식후 복통 변화)/속쓰림/연하곤란 [비뇨기] 소변색 변화/거품뇨 [피부] 피부 발진 [신경성 폭식증/식욕부진] 고의적 구토? 스스로의 체형 어떻게 생각?
F	[식중독] 어제 드신 음식? 최근에 드신 음식? 같이 먹은 분들도 구토? 최근 과식/과음? 여행? 스트레스?
E	복부 수술? 두부 외상?
약사가외 과여	사 - 술, 담배, 커피/직업/식사/운동 가 - 가족들 중에 음식 같이 먹고 증상 호소하시는 분? 소화기 질환? 여 - LMP/규칙적/주기/생리량/생리통/임신 가능성
P/E	1.눈 (빈혈, 황달) → 2. 입(탈수), 일부러 구토한 흔적(치아, 손등) → 3.목 (림프절 촉진) → 4. 피부 (발진, 피부긴장도) 소화기계 의심 시: 복부: 시-청-타-촉 신경계 의심 시(앉아서): 뇌신경검사(동공반사, 안구 운동_H, 겹쳐보임?, 얼굴 감각/운동_표정, 이, 눈썹, 턱딱) 팔다리 신경학적 검진: 운동, 감각, DTR (누워서): 수막 자극 징후(Kernig, Brudzinski, Neck stiffness)
진단 검사 치료	-치: 정확한 진단이 나오기 전까지는 입원을 하고, 금식하시면 증상이 나아질 것입니다. 영상 검사와 혈액검사 결과에 따라 수술이 필요할 수도 있는 상황입니다. -교: [응급] 혹시라도 어지럽거나 목이 마른대거나 소변량이 줄어드는 경우 탈수 증상으로 치료가 필요합니다. 이런 증상이 생기면 바로 말씀해주시기 바랍니다. [식중독] 앞으로 예방을 위해 식사 전에는 항상 손을 씻고, 위험한 음식은 가려먹는 것이 좋습니다. [항구토제]항구토제는 일시적으로 증상을 완화할 뿐이므로 가급적 사용하지 않는 것이 좋습니다.

#진단/치료 계획

-식중독/급성 위장염(발열, 복통, 설사, 탈수, 상한 음식, 갈먹, 장음향진): CBC, 전해질, 대변배양검사 → 항생제

-위염, 위궤양, 십이지장궤양: 위내시경, 요소날숨검사, 신속요소분해효소검사 → PPI, 제산제, 위점막 보호제

-위암: 위내시경 → 위절제술, 내시경적 점막하 절제술

-장폐색증(식후 복통, 복부 수술): 복부 X-ray → 코위관, 전해질 교정, 수술

-뇌수막염(두통, 발열, 경부강직): 뇌 CT, 뇌척수액 천자 → Cefotaxim + Vancomycin

-신경성 폭식증/식욕부진: 인지행동치료, 항우울제(SSRI)

-요독증(만성신부전, 피로, 거품뇨): serum BUN/Cr, 신장초음파, 소변검사 → 신대체요법, 신장이식

설사 : 전소 항갑정 + 탈수

O	언제부터? 갑자기?
L	-
D	하루에 몇 번?
Co	점점 심해지나요? 좋아졌다 나빠졌다?
Ex	예전에도 이런 적? 그 땐 어떤 치료? 지사제? 얼마나? 효과?
C	[양상] 양? 냄새? 물처럼(장염, 식중독)? 점액성(IBD)? 기름? 지방변(지방흡수장애) [일상생활] 일상생활에 지장?
A	[전신] 발열/오한/피로/체중변화 [탈수] 두근거림/호흡곤란/어지러움/소변량 감소/숨 참/목마름 [소화기] 식욕 저하/복통(양상, 배변 후 나아지는지)/구역/구토/혈변/흑색변/변실금/뒤무직 [항문] 항문 통증 [갑기향] 더위불내성? [정신] 스트레스/우울/불안
F	[음식] 최근 드신 음식? (언제? 어떤?) 평소 안 먹던 음식? [우유] 우유 먹으면 더 심해지나요? 최근 여행? 스트레스?
E	[건강검진] 이전 건강검진? 내시경?
약사가외 과여	약-항생제, 제산제 삼투성 하제(변비약) [식습관] 평소 식습관? 맵거나 기름진 음식? 식이섬유, 채소? 물? [비슷한 증상] 가족 중 비슷한 증상? [대장암] 가족 중 대장암?
P/E	1.눈(빈혈) → 2. 구강(탈수) → 3. 목(갑상샘, 림프절) → 4. 피부 긴장도 + <u>벌레 물린 곳</u> → 5. 하지부종 → 6. 복부 진찰 → 7. DRE (오른쪽 다리 굽히기, 변에 피가 나오는지, 직장이나 항문에 덩이)
진단 치료 교육	-공감 : 설사 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다. -교: 병원에 일찍 잘 오셨습니다~ 잘 하셨습니다! [지사제 위험성] 자주 사용하면 오히려 약 영향이 있을 수 있기 때문에 필요시만 [응급] 38.9도 이상의 고열, 가슴 두근거리고 숨쉬기 힘들거나, 입이 마른다 → 내원 [과민대장증후군] 맵, 짠, 기름, 카페인, 장 자극, 술은 음식물이 장을 빠르게 지나가게 해서 설사 유발 [젖당불내증] 우유 섭취 자제하면 증상 완화 [식중독] 손 잘 씻고, 음식 익혀먹기

진단/치료계획

-식중독(음식 섭취 후 72시간 내, 탈수, 발열, N/V, 복통, 특이음식): 대변검사, 대변배양검사 → 수액, 항생제 사용

-급성위장염: 수액 공급, 항생제(지사제 금지)

-IBS(스트레스, 배변 후 호전): 안심시키기, 자극성 음식 회피, 유제품 제한, loperamide

-젖당불내성(우유), 약물 유발(항생제, 변비약)

-IBD(젊음, 체중감소, 혈변, 심한 복통): 입원, bed rest, sulfasalazine, mesalazine, steroid

-결장암/직장암: 수술, 방사선 치료, 항암제

변비

O	언제부터? 갑자기?
L	-
D	일주일에 몇 번? 변 볼 때마다 변비?
Co	점점 심해지나요? 좋아졌다 나빠졌다?
Ex	예전에도 이런 적? 그 땐 어떤 치료? 변비약? 얼마나 오래? 효과?
C	[CAT] 색/모양/굵기 [딱딱 SHIP] 딱딱/힘 줌/손가락으로 긁어냄/잔변감/항문 막힌 느낌 [S배변습관] 오래 앉아있음(몇 분?)/집에서만 배변/오래 참음/화장실에서 폰이나 신문지/변비-설사 교대? [일상생활] 일상생활에 지장?
A	[전신] 발열/오한/피로/체중변화 [소화기] 식욕 저하/복통(양상, 배변 후 나아지는지)/구역/구토/혈변/흑색변/복부 팽만감/복부 종괴 [결장/직장암] 뒤무직/가늘어짐 [항문] 항문 통증/덩이/구역, 구토, 가스배출 안 됨(폐쇄) [갑기저] 추위불내성/피부 푸석푸석 [정신] 스트레스/우울/불안/수면장애
F	최근 스트레스?
E	[건강검진] 이전 건강검진? 내시경?
약사가외 과여	약-opoid, 철분제, 항콜린제, 항고혈압제 [식습관] 평소 식습관? 맵거나 기름진 음식? 식이섬유, 채소? 물? [운동] 하루에 운동 얼마나? [가족] 가족 중 대장암? 변비?
P/E	1.눈(빈혈) → 2. 구강(탈수) → 3. 목(갑상샘, 림프절) → 4. 피부 긴장도 → 5. 하지부종 → 6. 복부 진찰 → 7. DRE (오른쪽 다리 굽히기, 변에 피가 나오는지, 직장이나 항문에 덩이)
진단 치료 교육	-공감 : 변비 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다. -A : -검: 직장항문기능검사, 혈액검사(CBC, 전해질, TFT), 대장내시경, 대장조영술, 복부 X-ray, CT 골반 MRI -치: -교: 병원에 일찍 잘 오셨습니다~ 잘 하셨습니다! [변비약 위험성] 자주 사용하면 오히려 이차성 변비가 있을 수 있기 때문에 필요시만 [생활 습관] 규칙적 식사, 운동, 금연/금주, 채소류, 물 충분히, 30분 정도의 유산소 [배변 습관] 너무 힘 주지 말고, 아침 15~20분 정도에 집중, 발 뒤꿈치 드는 자세 취하면 도움이 되리라 생각

#진단, 치료 계획 : 식습관 개선, 배변 훈련, 심할 경우 하제, 약물치료(bulking agent, MgO, osmotic(lactulose))

-장폐색(A/N/V, 수술, 타진 tympanic)

-대장암(고령, 체중감소, 혈변, DRE_혈): 대장내시경, 항문경유초음파, 복부CT/MRI →수술, 항암치료, 방사선치료

-기능성(젊음, 건강, 저섬유식, 수분저하): 단순 복부 X-ray, 대장통과시간, 항문압 → 섬유소, 수분섭취, 규칙적 식사, 적절한 운동, 배변습관 교정

-IBS(설사 변비 번갈아, 배변 후 복통 호전): 대변검사, 대장내시경, CBC → 심리적 안정, 적당한 운동과 휴식, 진경제, 완화제

-직장류(잔변감, 골반내진): 배변조영술, 대장내시경 → 케겔운동, 페서리, 수술

-IBD(젊음, 체중 감소, D, 혈변, 복통)

-갑기저: TFT → 갑상샘 호르몬

황달 96 : 전소 수출 간염 황달

O	언제부터? 어떤 상황에서? 갑자기?
L	어디? 어디서부터?
D	-
Co	점점 더 심해짐?
Ex	예전에도 이런 적? 당시 치료 받았나요?
C	어떤 노란색? 녹색에 가까운? 굴? 카로틴 음식(호박, 당근, 녹황색 채소)?
A	[전신] 발열/오한/체중감소/식욕 변화 [황달 증상] 몸이 가려운지/소변색이나 대변색 변화/배가 부풀어오름? [간염] 관절통/근육통 (viral, toxic hepatitis) [탈수] 어지럼증/호흡 곤란/ 소변량 감소 [소화기] 소화불량/ 복통/ 구역 구토/ 변비 설사/혈변/ 흑색변/ 회색변/ 지방변 [출혈 경향성] 양치할 때 잇몸 피/ 멍 잘 드는 편 [수혈] 최근 수혈
F	[악화] -길버트 : 술, 약, 스트레스, 금식 시 악화/ 최근 감기 -A형 간염 : 최근 여행 -B형 간염 : 실례지만 성관계 상대 여러명 -A형 간염, 기생충 : 평소 안 드시던 음식? 날것? 생선회 민물고기 해산물?
E	[건강검진] 이전 건강검진? [A, B형 간염 예방접종] 예방접종? [수혈] 수혈? 어떤 이유?
약사가외 과여	
P/E	1. 눈(결막, 빈혈, 황달)→ 2. 입(혀, 탈수)→ 3. 목(림프절) → 4. 손 : 피부 긴장도, flapping tremor → 5. 흉부 시진 (spider angioma) → 6. 복부 진찰 + 복수 (간, 비장, murphy, Courvoisier_담낭축진) → 7. 하지 부종
진단 치료 교육	[치료] 황달로 인한 가려움 때문이라면 담즙 배출해주는 콜레스티라민 처방. 종류에 따라 항바이러스제 -A형 간염: 입원치료, 항바이러스제는 불필요 [교육] 간독성 음식 피하기, 술 먹지 않는 것. 간염 예방접종 추가 접종. 한약/약/건강보조식품 함부로 X 간염의 경우 법정 감염병이므로 국가에 신고할 의무가 있음 -A형 간염: (음식) 보존적 치료로 완치 가능, 한 번 치료 시 재발 -B,C형 간염(혈액) 만성화 가능, 간경화증이나 간암으로 진행 가능

#진단/치료 계획

-급성바이러스간염(오염된 음식, A:여행, B:성,혈액): LFT, 바이러스검사 → 수액, 영양공급, 간이식(전격 간부전)

-독성간염(약물, 독): LFT → 간이식, 원인약물 복용 중단

-알코올성 간염, 간경화증, 간암(토혈, 피로, spider angioma, flapping tremor): LFT, albumin, PT, 복부CT

→ (알코올성) 금주, 영양, glucocorticoid, (간경화)원인질환치료, 합병증치료, 간이식 (복수)저염식, 이뇨제 (간암) 간절제술, 항암

-길버트증후군(가족성 황달, 스트레스, 감염, 피로, 금식 후 악화): LFT → 안심시키기, 유발요인 관리

-월슨병(어린나이, 가족력, 신경학적 이상, K-F ring): 혈중 세룰로플라스민, 24hr 소변 구리 배출 → 트리엔틴, 페니실라민, 간이식

-담관염(발열, 오한, RLQ, 민물고기): LFT, 복부초음파, MRI, 내시경역행담관조영(ERCP) → 항생제, 내시경적 담관배액, 담관절제

-담관암/췌두부암(체중감소, 무통성담낭축진): ERCP, 복부 CT, MRI → 수술적 절제, 항암치료

-가성황달(얼굴과 손만 노랗게, 공막황달 X): LFT → 치료 X