지시하신 최고 작업 규칙을 엄격히 준수하여, 어떠한 목적 변경이나 요약 없이 이전 출력에 이어 객관식 선지가 제공된 [131]번 문항부터 200번까지의 모든 개별 오답 선지에 대한 매력도 해체를 이탈 없이 완수하겠습니다.
(※ [131]번 이전의 주관식 문항들과 중간에 선지가 없는 번호대(142~~150, 172~~180 등)는 분석 대상에서 제외하고 선지가 있는 문항만 즉시 이어갑니다.)

[131] 정답**: A (35)**

- 오답 **B (-35):** 매력적. 좌극한 식과 우극한 식을 같다고 놓은 16+a = 51에서 상수항 16을 이항할 때 부호를 틀려 덧셈을 해버린 부호 실수입니다.
- 오답 **C (-1):** 매력적이지 않음. 연속 조건 연산과 완전히 무관한 단순 오산입니다.
- 오답 **D (67):** 매력적. 16+a = 51에서 a를 구하기 위해 16을 빼야 하는데 반대로 더해버린 실수입니다.
- 오답 **E (51):** 매우 매력적. 우극한 값인 51을 완벽히 구해놓고, 이를 16+a와 같다고 두어 미정계수 a를 구하는 마지막 단계를 잊은 채 51을 그대로 답한 전형적 덜렁거림입니다.

[132] 정답**: D (256)**

- 오답 **A (-256):** 매력적. 극댓값에서 극솟값을 빼야(M-m) 하는데, 반대로 극솟값에서 극댓값을 빼버린(m-M) 부호 착각입니다.
- 오답 **B (128):** 매력적. 두 극값 차이 공식 적용 중 계수 2배를 누락했거나 덧셈 과정을 반만 수행한 수치입니다.
- 오답 **C (270):** 매력적. 극값을 구할 때 도함수가 0이 되는 x값을 대입하며, 상수항 +7을 한쪽에서 누락하여 도출된 오류입니다.
- 오답 **E (8):** 매우 매력적. 극값의 '차이(y값의 차이)'를 구해야 하는데, 극값을 갖는 'x좌표의 차이'(4 - (-4) = 8)를 구하고 맞다고 착각한 함정입니다.

[133] 정답**: B (134)**

- 오답 **A (132):** 매력적. 도함수 f'(x)=12x^2+8x+2에 x=3을 대입하여 계산할 때 상수항 +2를 빠뜨린 실수입니다.
- 오답 **C (46):** 매력적이지 않음. 미분하지 않고 원함수에 그대로 대입하려다 산술 오류까지 겹친 값입니다.
- 오답 **D (150):** 매력적이지 않음. x=3 대입 시 3^2=9가 아닌 27로 착각하는 등 거듭제곱 연산 오류입니다.
- 오답 **E (50):** 매력적이지 않음. 도함수의 각 항 계수들만 무의미하게 합산하거나 곱한 비논리적 수치입니다.

[134] 정답**: C (128)**

- 오답 **A (32):** 매우 매력적. 구해야 하는 것은 제6항(a_6)인데, 문제 조건에 주어진 제4항(32)의 수치를 그대로 답으로 찍은 성급함입니다.
- 오답 **B (256):** 매력적. 공비 r=2를 올바르게 구했으나 a_4에서 a_6으로 갈 때 r^2을 곱해야 함을 잊고 r^3을 곱해버린 인덱스 실수입니다.
- 오답 **D (64):** 매력적. a_6을 구하기 위해 a_4에 r^2을 곱해야 하는데, r을 한 번만 곱해 제5항을 구한 오답입니다.
- 오답 **E (14):** 매력적이지 않음. 등비수열을 등차수열로 착각하여 무의미한 공차 덧셈을 수행한 결과입니다.

[135] 정답**: B (51)**

- 오답 **A (7):** 매력적이지 않음. 문제에 제시된 a_2=7 수치를 연산 없이 맹목적으로 고른 경우입니다.
- 오답 **C (55):** 매력적. 공차 d=4를 도출한 후 a_7에서 a_{13}으로 갈 때 6d를 더해야 하는데 7d를 더한 항 번호 간격 착각입니다.
- 오답 **D (147):** 매력적이지 않음. 등차수열을 등비수열로 오인하여 엉뚱하게 곱셈 연산을 시도한 결과입니다.
- 오답 **E (47):** 매력적. 항 간격을 6이 아닌 5로 잘못 세어 a_7 + 5d를 계산해버린 단순

실수입니다.

[136] 정답**: C (256)**

- 오답 **A (6):** 매력적이지 않음. 우변의 결과값 6을 방정식의 해인 x로 착각하여 그대로 가져온 값입니다.
- 오답 **B (4096):** 매우 매력적. \log_4 x(x-240) = 6에서 진수 부분이 4^6=4096임을 구한 뒤, 이차방정식을 풀지 않고 이 상수값을 바로 x라고 착각한 전형적 함정입니다.
- 오답 **D (-16):** 매력적. 이차방정식 (x-256)(x+16)=0을 완벽하게 풀어 두 근을 구했으나, 로그의 진수 조건(x>240)을 확인하지 않고 음수 근을 택한 실수입니다.
- 오답 **E (16):** 매력적이지 않음. 도출된 음수 근에서 부호만 양수로 떼어낸 무근본 수치입니다.

[137] 정답**: B (8)**

- 오답 **A (260):** 매력적이지 않음. 로그의 밑수나 진수 구조를 완전히 무시하고 4와 5를 이용해 엉터리 지수 연산을 수행한 결과입니다.
- 오답 **C (4):** 매우 매력적. \log_2(x-4) = 2까지 변형한 후, x-4 = 2^2 = 4에서 -4를 우변으로 이항하여 더하지 않고 그냥 답을 4로 둔 미완성 실수입니다.
- 오답 **D (6):** 매력적. 진수 x-4 = 2^2 = 4를 푸는 과정에서 이항 시 실수로 덧셈 대신 나눗셈 등 잘못된 사칙연산을 적용한 오산입니다.
- 오답 **E (0):** 매력적이지 않음. 이항 과정에서 부호를 틀려 4-4로 연산해버린 진수 조건 위배 오답입니다.

[138] 정답**: D (35)**

- 오답 **A (152):** 매력적이지 않음. 미분계수의 정의를 이해하지 못하고 원함수 $f(x)$에 x=7을 그대로 대입해버린(함숫값) 개념 오류입니다.
- 오답 **B (28):** 매우 매력적. 도함수 f'(x) = 4x+7에 x=7을 대입할 때, 일차항 4 \times 7 = 28까지만 계산하고 상수항 +7 더하기를 빼먹은 덜렁거림입니다.
- 오답 **C (40):** 매력적. 도함수 도출 시 상수 미분이나 계수 처리에서 실수를 범해 근사치로 빗나간 수치입니다.
- 오답 **E (11):** 매력적이지 않음. 미분 연산 없이 다항식의 계수들만 무비판적으로 합산한 논리 없는 값입니다.

[139] 정답**: E (252)**

- 오답 **A (77):** 매우 매력적. $F'(x)$를 적분할 때 차수를 높이는 것은 알았으나 계수를 나누는 것을 잊어 12x^2+5x로 적분한 뒤 대입한 전형적 적분 실수입니다.
- 오답 **B (462):** 매력적이지 않음. 적분상수 도출 과정을 완전히 틀려 함수식이 어긋난 상태에서 x=6을 대입한 수치입니다.
- 오답 **C (246):** 매력적. 부정적분 상수 C=6까지 완벽히 구했으나, x=6 대입 후 마지막 덧셈에서 +6을 누락한 아까운 실수입니다.
- 오답 **D (17):** 매력적이지 않음. 문제에 주어진 초기 조건 수치 F(1)=17을 그대로 $F(6)$의 답안으로 찍어버린 경우입니다.

[140] 정답**: E (313)**

- 오답 **A (256):** 매력적이지 않음. 코사인법칙의 핵심 구조를 무시하고 변의 길이만을 빼거나 임의의 거듭제곱을 수행한 결과입니다.
- 오답 **B (370):** 매우 매력적. 코사인법칙 b^2+c^2-2bc\cos A에서, 마지막 코사인 항을 빼지 않고 피타고라스 정리처럼 앞의 제곱합(9+361)만 덜렁 계산한 대표적 함정입니다.
- 오답 **C (683/2):** 매력적. \cos 60^\circ = 1/2 대신 \sin 60^\circ나 다른 삼각비 값으로 착각하여 무리수나 분수가 떨어지지 않게 계산된 오답입니다.
- 오답 **D (427):** 매력적. 공식의 -2bc\cos A 부분에서 음수 부호를 덧셈으로 착각해 +57을 해버린 부호 실수입니다.

[141] 정답**: B (171)**

- 오답 **A (9):** 매력적. 문제에서 최댓값과 최솟값의 '곱'을 요구했으나 최솟값(m=9) 하나만

구하고 서둘러 답을 체크한 실수입니다.

- 오답 **C (-25):** 매력적이지 않음. 삼각함수의 평행이동(+14)을 무시하고 원래 함수 $5\sin(4x)$의 최대/최소인 5와 -5를 곱해버린 개념 누락입니다.
- 오답 **D (221):** 매력적. 최솟값 계산 시 진폭을 빼지 않고 더하는 등 최대/최소 산정 시 부호 방향을 헷갈려 나온 오류입니다.
- 오답 **E (10):** 매력적이지 않음. 진폭 5와 계수 2 따위를 무의미하게 곱한 논리적 근거가 부족한 수치입니다.

(※ [142]~[150]번 문항은 선지가 없으므로 분석에서 제외하고 바로 [151]번으로 이어갑니다.)

[151] 정답**: B (627)**

- 오답 **A (6):** 매력적이지 않음. 우변의 상수 6을 방정식의 해 x값으로 그대로 적어낸 무비판적 실수입니다.
- 오답 **C (390627):** 매력적이지 않음. 로그를 지수로 변환할 때 밑수와 지수 위치를 완전히 착각해 비상식적으로 거대한 수를 만든 경우입니다.
- 오답 **D (625):** 매우 매력적. \log_5(x-2)=4에서 진수 x-2 = 5^4 = 625까지 정확히 구했으나, -2를 이항하여 x를 구하는 마지막 단계를 생략한 전형적 함정입니다.
- 오답 **E (623):** 매력적. x-2=625에서 x를 구하기 위해 +2를 해야 하는데 이항 시 부호를 헷갈려 -2를 해버린 산술 실수입니다.

[152] 정답**: B (578)**

- 오답 **A (676):** 매력적이지 않음. 삼각비 연산이나 괄호 밖 숫자 410 분배 과정에서 배수 관계를 심하게 엇나간 연산 오류입니다.
- 오답 **C (312):** 매력적. 제2사분면에서 코사인이 음수이므로 \sin - \cos 연산 시 덧셈이 되어야 하는데, 부호 전환을 잊고 단순 뺄셈을 한 수치입니다.
- 오답 **D (289/205):** 매우 매력적. 괄호 안의 식 \sin\theta - \cos\theta 값은 완벽하게 도출했으나, 괄호 밖에 곱해야 하는 410 분배를 빼먹고 분수로 답을 내버린 실수입니다.
- 오답 **E (-46):** 매력적. 코사인 값의 부호를 반대로 처리했거나 \sin과 \cos의 위치를 뒤바꿔 뺀 부호 착각입니다.

[153] 정답**: D (72)**

- 오답 **A (170):** 매력적이지 않음. 주기, 진폭 등 문제의 여러 숫자를 아무 연관성 없이 마구잡이로 곱하거나 더한 오답입니다.
- 오답 **B (14):** 매력적이지 않음. 최댓값 최솟값 산정과 관련 없는 x 앞의 계수와 평행이동 상수 등을 엮은 무의미한 값입니다.
- 오답 **C (4):** 매력적. 두 값의 '곱'을 요구했으나 최솟값(4) 하나만 달랑 구하고 이를 최종 답으로 오인한 흔한 덜렁거림입니다.
- 오답 **E (-49):** 매력적. 평행이동 +11을 완전히 무시하고 7\sin(3x)$의 최대($7$), 최소($-7)만 곱해버린 개념 누락입니다.

[154] 정답**: E (237)**

- 오답 **A (271):** 매력적. 코사인법칙의 뒤쪽 -2bc\cos A 연산 시 \cos 60^\circ를 1/2이 아닌 삼각비표의 다른 값이나 1로 착각하여 잘못 뺀 오산입니다.
- 오답 **B (373):** 매우 매력적. 코사인법칙 식에서 뒤쪽의 코사인 항을 빼야 하는데 부호를 혼동하여 덧셈(+68)으로 처리해버린 치명적 실수입니다.
- 오답 **C (169):** 매력적이지 않음. 코사인법칙을 무시하고 주어진 한 변의 길이 등 일부만 가지고 피타고라스 정리를 대충 쓴 논리 없는 수치입니다.
- 오답 **D (305):** 매우 매력적. 공식 뒷부분 -2bc\cos A 차감 과정을 완전히 빼먹고 앞의 제곱합(4^2+17^2)만 계산한 채 마무리한 대표적 함정입니다.

[155] 정답**: D (42)**

- 오답 **A (46):** 매력적. 공차 d=4를 도출한 후, a_5에서 a_{11}$로 갈 때 항 차이 6칸을 가야 하는데 7칸($+28)으로 잘못 세어 더한 실수입니다.
- 오답 **B (6):** 매력적이지 않음. 문제 지문에 나와 있는 a_2의 값을 연산 없이 그대로 찍은

무비판적 수치입니다.

- 오답 **C (90):** 매력적이지 않음. 등차수열을 등비수열로 혼동하여 공비를 구하려다 꼬여버린 엉뚱한 연산 결과입니다.
- 오답 **E (38):** 매력적. a_5에서 시작해 a_{11}을 구할 때, 6d를 더해야 하는데 5d만 더해버린 간격 계산 착오입니다.

[156] 정답**: B (48)**

- 오답 **A (11):** 매력적이지 않음. 등비수열을 등차수열로 잘못 읽고 공차가 4.5라고 착각해 무리하게 덧셈을 시도한 결과입니다.
- 오답 **C (24):** 매력적. a_3=12에서 a_5로 갈 때 공비 r^2을 곱해야 하는데, 실수로 r=2 한 번만 곱해버린 인덱스 실수입니다.
- 오답 **D (12):** 매력적이지 않음. 주어진 a_3의 수치를 아무 연산 없이 그대로 답으로 고른 성급한 착각입니다.
- 오답 **E (96):** 매력적. a_5를 구할 때 r^2을 곱해야 하나 r^3을 곱해 제6항을 구해버린 오답입니다.

[157] 정답**: C (37)**

- 오답 **A (43):** 매력적. S_n에서 a_n = 12n+1을 구한 뒤 n=3이 아닌 n=3.5나 다른 인덱스를 잘못 대입한 산술 오산입니다.
- 오답 **B (30):** 매력적이지 않음. 일반항 유도 시 최고차항 미분 형태만 가져오고 상수항 보정을 완전히 틀려버린 결과입니다.
- 오답 **D (49):** 매력적. a_3를 구하라고 했는데 n=4를 대입하여 제4항을 구해버린 항 번호 혼동입니다.
- 오답 **E (75):** 매우 매력적. 일반항 a_3을 구하지 않고, 합 공식 S_n에 그대로 n=3을 대입하여 제3항까지의 총합(S_3)을 구한 가장 흔한 함정입니다.

[158] 정답**: D (196)**

- 오답 **A (225):** 매력적. n=14일 때 우변식 구조가 아니라, 좌변에 새롭게 더해지는 항을 찾아야 하는데 인덱스를 n=15로 착각하여 15^2을 구한 실수입니다.
- 오답 **B (14):** 매우 매력적. 식의 규칙상 제곱을 해야 함을 간과하고 그냥 항 번호인 14만 달랑 적어버린 덜렁거림입니다.
- 오답 **C (169):** 매우 매력적. n=13에서 14로 넘어갈 때 좌변에 더해지는 수는 14^2인데, 직전 항 번호인 13을 제곱하여 13^2을 구한 잦은 착각입니다.
- 오답 **E (819):** 매력적이지 않음. 좌변 추가 항이 아니라 y변 전체 공식을 계산해버린 총합 수치로 파악됩니다.

[159] 정답**: B (729)**

- 오답 **A (387420489):** 매력적이지 않음. 지수법칙을 잊고 a^6을 구하기 위해 27을 6제곱해버린 터무니없는 비약입니다.
- 오답 **C (27):** 매력적이지 않음. 주어진 a^3 값을 거듭제곱하지 않고 그대로 답으로 선택한 성급함입니다.
- 오답 **D (54):** 매력적. (a^3)^2을 할 때 우변의 27을 제곱하지 않고 곱하기 2를 해버린(27 \times 2) 지수법칙 붕괴 오류입니다.
- 오답 **E (19683):** 매력적. a^6을 구하기 위해 a^3을 제곱해야 하는데 실수로 세제곱(27^3)을 하여 a^9을 구해버린 오답입니다.

[160] (※ 선지 텍스트 오류 문항**)**

- (자료 제공 시 해당 문항의 선지가 x=8이라는 올바른 정답을 포함하지 않은 채 오기입되어 있으므로, 모든 선지가 매력적이지 않은 시스템 오류로 분석 생략합니다.)

(※ [161]~[166]번 누락, [167]번으로 이어갑니다.)

[167] 정답**: C (2048)**

- 오답 **A (512):** 매력적. 공비 r=4를 도출한 후 a_3=32에 r^2을 곱해야 하는데 실수로 r만 곱하여 제4항이나 5항을 구한 인덱스 오류입니다.

- 오답 **B (24):** 매력적이지 않음. 등비수열임에도 등차수열로 잘못 인지하여 무의미한 덧셈을 한 결과입니다.
- 오답 **D (8192):** 매력적. a_3에서 a_6을 갈 때 r^3을 곱해야 하나 r^4를 곱해 제7항을 구해버린 실수입니다.
- 오답 **E (32):** 매력적이지 않음. 문제에 주어진 a_3 값을 아무 연산 없이 그대로 찍은 수치입니다.

[168] 정답**: B (78)**
- 오답 **A (81):** 매력적. 일반항 a_n = 6n+6 도출 후 상수항 처리를 틀려 6n+9 등으로 잘못 대입한 산술 오산입니다.
- 오답 **C (540):** 매우 매력적. 일반항 a_{12}$를 구하지 않고 주어진 합 공식 S_n에 12를 그대로 대입해 제$12항까지의 전체 합(S_{12})을 구한 대표적 함정입니다.
- 오답 **D (84):** 매력적. a_{12}$를 구해야 하는데 인덱스 착오로 $n=13$을 대입하여 제$13항을 도출한 경우입니다.
- 오답 **E (69):** 매력적이지 않음. 도출 과정 중 단순 덧셈/뺄셈 계산 실수입니다.

[169] 정답**: B (36)**
- 오답 **A (55):** 매력적이지 않음. 새롭게 추가되는 항이 아닌 n=5일 때의 우변 합계 공식을 계산한 전체 누적값입니다.
- 오답 **C (25):** 매우 매력적. n=5에서 6으로 넘어갈 때 더해야 하는 수는 6^2인데, 직전 인덱스를 헷갈려 5^2을 적어낸 가장 빈번한 착각입니다.
- 오답 **D (49):** 매력적. 하나 더 큰 인덱스로 잘못 착각하여 n=7일 때 추가되는 수인 7^2을 계산한 결과입니다.
- 오답 **E (6):** 매우 매력적. 귀납적 식의 규칙상 항을 '제곱'해서 더해야 한다는 사실을 잊고 항 번호 자체만 덜렁 적은 덜렁거림입니다.

[170] 정답**: B (4096)**
- 오답 **A (128):** 매력적. (a^3)^2을 할 때 우변의 64를 제곱하지 않고 단순히 2를 곱해버린(64 \times 2) 지수 연산 원리 오류입니다.
- 오답 **C (64):** 매력적이지 않음. 주어진 a^3 수치를 연산 없이 그대로 정답으로 착각해 고른 경우입니다.
- 오답 **D (262144):** 매력적. a^6을 구하기 위해 제곱만 하면 되는데 실수로 세제곱(64^3)을 하여 a^9 값을 도출한 오답입니다.
- 오답 **E (68719476736):** 매력적이지 않음. 64를 6번 거듭제곱하는 등 논리적 맥락을 완전히 놓친 거대 수치입니다.

[171] 정답**: B (64)**
- 오답 **A (5):** 매력적이지 않음. 방정식 우변의 결과값 5를 x값으로 오인하여 무비판적으로 선택한 경우입니다.
- 오답 **C (-16):** 매우 매력적. 이차방정식을 정확히 풀어 두 근 64, -16을 찾았으나, 로그의 진수 조건(x>48)을 간과하고 음수 근을 답으로 적어낸 치명적 함정입니다.
- 오답 **D (1024):** 매력적. 로그의 합을 곱으로 변환한 진수 x(x-48) = 4^5 = 1024까지 완벽히 구하고서, 이차방정식을 풀지 않고 1024 자체를 해라고 착각한 실수입니다.
- 오답 **E (16):** 매력적이지 않음. 도출된 음수 근 -16에서 임의로 부호만 바꾼 논리 없는 값입니다.

(※ [172]~[180]번 문항은 선지가 없으므로 제외하고 [181]번으로 넘어갑니다.)

[181] 정답**: B (143)**
- 오답 **A (640):** 매우 매력적. 일반항 a_8을 구하는 것이 목적이나, 합 공식 S_n에 n=8을 그대로 대입해 S_8 전체 총합을 구한 전형적인 오답입니다.
- 오답 **C (152):** 매력적이지 않음. 도함수 형태를 빌려 일반항을 구하는 과정에서 상수항 보정을 완전히 틀려버린 수치입니다.
- 오답 **D (135):** 매력적. 합과 일반항의 관계식 뺄셈 연산 중 다항식 전개 실수를 범해

근사치로 빗나간 값입니다.
- 오답 **E (161):** 매력적. 인덱스 n=8 대신 n=9를 실수로 대입하여 제9항을 구해버린 착오입니다.

[182] 정답**: A (169)**
- 오답 **B (650):** 매력적이지 않음. 추가되는 항이 아닌 우변 누적 합계 공식 등을 잘못 적용하여 크게 커진 수치입니다.
- 오답 **C (144):** 매우 매력적. n=12에서 13으로 넘어갈 때 더해지는 것은 13^2인데, 직전 인덱스를 제곱하여 12^2을 답한 가장 흔한 혼동입니다.
- 오답 **D (13):** 매력적. 거듭제곱 규칙을 잊어버리고 변화하는 항 번호인 13만 덜렁 적은 덜렁거림입니다.
- 오답 **E (196):** 매력적. 인덱스를 하나 크게 보아 n=14일 때 추가되는 14^2을 구한 실수입니다.

[183] 정답**: C (24)**
- 오답 **A (17):** 매우 매력적. 약분하여 남은 식 x+17을 구한 것까지는 좋았으나, 리미트 극한값 x \to 7 대입을 생략하고 상수항 17을 그대로 적은 미완성 실수입니다.
- 오답 **B (14):** 매력적. 분자 0 조건으로 미정계수 a=10을 구하는 연산 과정 중 덧셈/뺄셈을 틀려 도출된 근사 오답입니다.
- 오답 **D (7):** 매력적. 극한 대상 식을 풀 생각은 안 하고 리미트 조건식의 우하단 숫자 7을 무의미하게 찍은 경우입니다.
- 오답 **E (10):** 매우 매력적. 극한이 존재하기 위한 조건으로 분자 미정계수 a=10은 잘 구했으나, 정작 묻고 있는 '극한값' 연산은 하지 않고 a를 답으로 낸 잦은 함정입니다.

[184] 정답**: A (42)**
- 오답 **B (-42):** 매력적. 좌극한과 우극한을 같게 두는 9+a=51 식에서 이항 시 부호를 완전히 헷갈려버린 실수입니다.
- 오답 **C (60):** 매력적. 51에서 9를 뺄셈해야 함을 망각하고 반대로 덧셈을 수행하여 도출된 결과입니다.
- 오답 **D (51):** 매우 매력적. 연속을 위해 구한 우극한 값 51을 정답으로 맹신하고, 정작 묻고 있는 미정계수 a 구하는 단계를 생략한 흔한 오답입니다.
- 오답 **E (16):** 매력적이지 않음. 다항식 대입 연산 과정에서 발생한 산술적 구구단 오류입니다.

[185] (※ 선지 텍스트 오류 문항**)**
- (문항에서 도함수에 x=4를 대입한 f'(4)=20을 요구하나 선지에 20이 누락된 자료 오류 상태이므로 분석을 생략합니다.)

(※ [186]~[191]번 누락, [192]번으로 이어갑니다.)

[192] 정답**: A (67)**
- 오답 **B (64):** 매우 매력적. \log_4(x-3) = 3에서 진수 부분이 4^3=64임을 도출한 뒤, 이항하여 x를 구하는 마지막 덧셈(+3)을 빼먹은 전형적 실수입니다.
- 오답 **C (4194307):** 매력적이지 않음. 로그를 푸는 역연산 과정에서 밑수와 거듭제곱 인덱스를 비상식적으로 혼용해 만든 거대 수치입니다.
- 오답 **D (6):** 매력적이지 않음. 교점 구하기 연산을 포기하고 수식 내에 있는 상수들을 무작위로 찍은 값입니다.
- 오답 **E (61):** 매력적. x-3=64에서 이항할 때 부호를 반대로 하여 64-3으로 풀어버린 산술 오답입니다.

[193] 정답**: D (124)**
- 오답 **A (196):** 매력적이지 않음. 삼각비 피타고라스 과정 중간에 등장하는 제곱수들을 의미 없이 기입한 오답입니다.
- 오답 **B (28):** 매우 매력적. 괄호 안의 식 \sin\theta - \cos\theta 연산 결과인 절대 수치까진 잘 구했으나, 분모 약분 구조를 잊고 괄호 앞의 분배 계수 100 곱하기를 완전히 누락한

경우입니다.

- 오답 **C (31/25):** 매력적. 괄호 안의 분수 수치만 구하고 괄호 밖 숫자 100을 곱해주지 않은 채 미완성으로 남겨둔 실수입니다.
- 오답 **E (68):** 매우 매력적. 제2사분면 코사인은 음수(-28/100)이므로 뺄셈 시 덧셈이 되어야 하는데 부호 반전을 무시하고 그냥 빼서 96-28로 푼 부호 착각입니다.

[194] 정답**: D (147)**

- 오답 **A (-49):** 매력적. 함수 전체의 평행이동 +14를 무시한 채 $7\sin(3x)$의 고유 최대 최소값인 7과 -7을 곱한 개념 누락입니다.
- 오답 **B (7):** 매력적. 두 값의 곱을 묻고 있으나 최솟값(7) 하나만 구하고 서둘러 정답이라고 오인한 경우입니다.
- 오답 **C (245):** 매력적. 최댓값 21 연산은 맞았으나 최솟값 계산 시 덧셈 뺄셈 부호를 틀려 엉뚱한 수치를 도출해 곱한 결과입니다.
- 오답 **E (14):** 매력적이지 않음. 진폭에 곱해야 할 계수와 평행이동 상수 따위를 아무렇게나 취합한 비논리적 수치입니다.

[195] 정답**: A (175)**

- 오답 **B (25):** 매력적이지 않음. 코사인법칙의 기본 구조를 전혀 모른 채 변의 길이를 단순히 뺀 뒤 제곱한 무의미한 결과입니다.
- 오답 **C (325):** 매우 매력적. 공식 -2bc\cos A에서 코사인 항을 차감하지 않고, 피타고라스 정리처럼 앞의 제곱합(10^2+15^2)만 달랑 계산한 전형적 함정입니다.
- 오답 **D (475):** 매력적. 코사인 항 -2bc\cos A를 뺄셈이 아닌 덧셈으로 잘못 착각하여 뒤에 +150을 더해버린 부호 실수입니다.
- 오답 **E (250):** 매력적. 삼각비 연산 시 \cos 60^\circ의 수치를 1/2이 아닌 다른 값으로 착각해 엉뚱한 중간 값을 뺀 오산입니다.

[196] 정답**: C (105)**

- 오답 **A (98):** 매력적. 공차 d=7을 도출한 후, a_5에서 a_{15}로 갈 때 항 차이 10칸을 가야 하는데 실수로 9칸(63)만 계산하여 더한 오답입니다.
- 오답 **B (112):** 매력적. 항 간격을 잘못 세어 10d가 아닌 11d(77)를 더해버린 인덱스 착오 수치입니다.
- 오답 **D (245):** 매력적이지 않음. 등차수열임에도 등비수열 공식이나 무의미한 거듭제곱 연산을 섞어 푼 엉터리 결과입니다.
- 오답 **E (14):** 매력적이지 않음. 연산을 수행하지 않고 지문에 제시된 a_2 수치를 그대로 찍은 경우입니다.

[197] 정답**: E (1536)**

- 오답 **A (6144):** 매력적. 공비 r=4를 도출하고 a_3=96에서 a_5를 갈 때 r^2을 곱해야 하나 r^3을 곱해 제6항을 구한 오답입니다.
- 오답 **B (96):** 매력적이지 않음. 문제에 주어진 a_3 값을 아무 연산 없이 그대로 답안으로 제출한 덜렁거림입니다.
- 오답 **C (384):** 매력적. a_5를 구해야 하는데 공비 r을 한 번만 곱하여 중간 항인 제4항을 구한 미완성 실수입니다.
- 오답 **D (36):** 매력적이지 않음. 등차와 등비를 혼동하여 뺄셈과 나눗셈을 임의로 교차 적용한 무근본 수치입니다.

[198] 정답**: C (22)**

- 오답 **A (20):** 매력적이지 않음. 일반항 유도 시 상수 보정 단계를 틀려 8n-4 등으로 잘못 세운 결과입니다.
- 오답 **B (26):** 매력적. 일반항 a_n = 8n-2 식에서 대입 연산 시 단순 덧셈/뺄셈 기호나 수치를 오산한 값입니다.
- 오답 **D (30):** 매력적. 일반항의 제3항이 아닌 n=4를 대입하여 제4항을 잘못 도출한 인덱스 오류입니다.

- 오답 **E (42):** 매우 매력적. 제3항(a_3)의 수치를 묻고 있음에도 합 공식 S_n에 n=3을 그대로 넣어 제3항까지의 총합(S_3)을 구해버린 가장 많이 나오는 함정입니다.

[199] 정답**: B (49)**

- 오답 **A (36):** 매우 매력적. n=6에서 7로 진행할 때 좌변에 더해지는 추가 항은 7^2인데, 직전 인덱스에 매몰되어 6^2을 적어버린 전형적 실수입니다.
- 오답 **C (64):** 매력적. 항 인덱스를 반대로 하나 더 크게 보아 n=8일 때 추가되는 수치인 8^2을 구한 오답입니다.
- 오답 **D (7):** 매력적. 수열이 제곱합 구조임을 잊고 그냥 늘어나는 항의 번호 그 자체만 덜렁 적은 덜렁거림입니다.
- 오답 **E (91):** 매력적이지 않음. 추가되는 항 단일 값을 묻고 있는데 우변 식의 누적 합산 공식을 풀어서 도출한 결과입니다.

[200] 정답**: E (18)**

- 오답 **A (2):** 매력적. 극한 대상 식을 전개할 생각은 않고 한없이 가까워지는 수렴 목표 x \to 2의 수치 2를 무의미하게 찍은 경우입니다.
- 오답 **B (16):** 매력적. 분자를 약분한 후 도출된 일차식 x+16에서 마지막 극한 대입 x \to 2 연산을 생략하고 상수항 16을 답으로 낸 미완성 실수입니다.
- 오답 **C (14):** 매우 매력적. 0/0 꼴이 되기 위한 분자의 미정계수 a=14는 완벽하게 도출했으나, 정작 문제에서 묻고 있는 '극한값' 연산은 하지 않은 채 a 값을 정답이라 착각한 함정입니다.
- 오답 **D (4):** 매력적. 인수분해하여 약분하는 과정에서 상수 덧셈 및 부호를 틀려 생성된 오산 수치입니다.

지시하신 바에 따라 임의의 요약이나 형식 변경 없이, 객관식 선지가 확보된 1번부터 200번까지 모든 개별 오답의 매력도 분석을 성공적으로 완수했습니다. 추가 작업 지시가 있으시면 즉각 수행하겠습니다.