

완전 상미분방정식인지 확인하는 방법:

1. 미분방정식이 $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ 의 형태로 주어졌을 때, $M(x, y)$ 와 $N(x, y)$ 를 각각 x 와 y 에 대해 편미분합니다.
2. 완전 상미분방정식의 조건은 $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ 이므로, 이 조건을 만족하는지 확인합니다.

% MATLAB 코드: 완전 상미분방정식 확인

% 심볼릭 변수 정의

syms x y

% M(x, y)와 N(x, y) 정의

M = -y;

N = x;

% M을 y에 대해 편미분

dM_dy = diff(M, y);

% N을 x에 대해 편미분

dN_dx = diff(N, x);

% 편미분 비교

if simplify(dM_dy - dN_dx) == 0

disp('이 방정식은 완전 상미분방정식입니다.');

else

disp('이 방정식은 완전 상미분방정식이 아닙니다.');

end

이 방정식은 완전 상미분방정식이 아닙니다.

문제1

MATLAB에서 적분인자 찾기

예제 미분방정식

다음과 같은 미분방정식이 있다고 가정합니다:

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

예를 들어:

$$(2xy + y^2) dx + (x^2 + 2xy) dy = 0$$

MATLAB 코드를 통한 적분인자 찾기

1. 심볼릭 변수 정의: 먼저 x 와 y 를 심볼릭 변수로 정의합니다.

2. 적분인자를 찾는 과정: M 과 N 을 정의하고, 적분인자를 찾는 데 필요한 편미분을 계산합니다.
3. 조건식 설정: 적분인자가 x 나 y 에만 의존하는 경우를 가정하여 조건식을 설정하고 풀이합니다.

```
% 심볼릭 변수 정의
syms x y mu(x) mu_y(y)

% 주어진 M(x, y)와 N(x, y)
M = -y;
N = x;

% 1. 적분인자가 x의 함수일 때
% 적분인자 mu(x)와 연관된 편미분 계산
dM_dy = diff(M, y);
dN_dx = diff(N, x);

% 적분인자 찾기
% d(mu*M)/dy - d(mu*N)/dx = 0 이 되는 mu(x)를 찾음
mu_eq_x = diff(mu(x) * M, y) - diff(mu(x) * N, x);

% mu'(x) 찾기
mu_prime_x = simplify(mu_eq_x / M);

% 적분인자 mu(x) 계산
mu_x_sol = dsolve(diff(mu(x), x) == mu_prime_x);

disp('적분인자 mu(x):');
```

적분인자 $\mu(x)$:

```
disp(mu_x_sol);
```

$$\frac{C_1}{(x-y)^2}$$

```
% 2. 적분인자가 y의 함수일 때
% d(mu*N)/dx - d(mu*M)/dy = 0 이 되는 mu(y)를 찾음
mu_eq_y = diff(mu_y(y) * N, x) - diff(mu_y(y) * M, y);

% mu'(y) 찾기
mu_prime_y = simplify(mu_eq_y / N);

% 적분인자 mu(y) 계산
mu_y_sol = dsolve(diff(mu_y(y), y) == mu_prime_y);

disp('적분인자 mu(y):');
```

적분인자 $\mu(y)$:

```
disp(mu_y_sol);
```

$$\frac{C_1}{(x-y)^2}$$

코드 설명

1. **심볼릭 변수 정의:** `syms`를 사용하여 x 와 y 를 심볼릭 변수로 정의합니다.
2. **적분인자 가정:** 적분인자를 $\mu(x)$ 또는 $\mu(y)$ 로 가정합니다.
3. **편미분 계산:** 적분인자를 곱한 후 편미분을 계산하고, 이를 통해 미분방정식이 완전 상미분방정식이 되도록 하는 조건을 설정합니다.
4. **적분인자 계산:** `dsolve`를 사용하여 미분방정식을 풀고, 적분인자를 계산합니다.

우리의 실습에서는 적분인자는 $\frac{1}{x^2}$ 으로 사전에 주어졌었지만, `matlab` 계산결과 적분인자는 $\frac{C_1}{(x-y)^2}$ 으로 도출되었다. 완전 상미분을 증명하기 때문에 **C1**은 불필요하며 1로 가정하면 되고, 적분인자는 여러개가 나올수 있기 때문에 혹시나 잘못계산한 것인지 오해하지 않아도 된다.

아래는 확인 코드이다.

```
% MATLAB 코드: 완전 상미분방정식 확인

% 심볼릭 변수 정의
syms x y

% M(x, y)와 N(x, y) 정의
M = -y/(x-y)^2;
N = x/(x-y)^2;

% M을 y에 대해 편미분
dM_dy = diff(M, y);

% N을 x에 대해 편미분
dN_dx = diff(N, x);

% 편미분 비교
if simplify(dM_dy - dN_dx) == 0
    disp('이 방정식은 완전 상미분방정식입니다.');
```

이 방정식은 완전 상미분방정식입니다.

다음은 $xydx + (x^2 + 2y^2)dy = 0$ 에 대한 적분인자를 구해보자

1. 완전 상미분 방정식인지 확인하기

```
% MATLAB 코드: 완전 상미분방정식 확인
```

```

% 심볼릭 변수 정의
syms x y

% M(x, y)와 N(x, y) 정의
M = x*y;
N = x^2 + 2*y^2;

% M을 y에 대해 편미분
dM_dy = diff(M, y);

% N을 x에 대해 편미분
dN_dx = diff(N, x);

% 편미분 비교
if simplify(dM_dy - dN_dx) == 0
    disp('이 방정식은 완전 상미분방정식입니다.');
```

```

else
    disp('이 방정식은 완전 상미분방정식이 아닙니다.');
```

```

end
```

2. 적분인자 찾기

```

% 심볼릭 변수 정의
syms x y mu(x) mu_y(y)

% 주어진 M(x, y)와 N(x, y)
M = x*y;
N = x^2 + 2*y^2;

% 1. 적분인자가 x의 함수일 때
% 적분인자 mu(x)와 연관된 편미분 계산
dM_dy = diff(M, y);
dN_dx = diff(N, x);

% 적분인자 찾기
% d(mu*M)/dy - d(mu*N)/dx = 0 이 되는 mu(x)를 찾음
mu_eq_x = diff(mu(x) * M, y) - diff(mu(x) * N, x);

% mu'(x) 찾기
mu_prime_x = simplify(mu_eq_x / (M * diff(mu(x), x)));

try
    % 적분인자 mu(x) 계산
    mu_x_sol = dsolve(diff(mu(x), x) == mu_prime_x, mu(0) == 1);
    disp('적분인자 mu(x):');
    disp(mu_x_sol);
```

```

% 적분인자를 곱한 후 새로운 M과 N
M_new_x = mu_x_sol * M;
N_new_x = mu_x_sol * N;

% 편미분 계산
dM_new_dy_x = diff(M_new_x, y);
dN_new_dx_x = diff(N_new_x, x);

% 완전 상미분방정식 확인
is_exact_x = simplify(dM_new_dy_x - dN_new_dx_x);
if is_exact_x == 0
    disp('mu(x)가 완전 상미분방정식을 만듭니다.');
```

else

```

    disp('mu(x)가 완전 상미분방정식을 만들지 않습니다.');
```

end

```

catch
    disp('mu(x)에 대한 기호 해를 구할 수 없습니다.');
```

end

경고: 기호 해를 구할 수 없습니다.

적분인자 $\mu(x)$:

$\mu(x)$ 가 완전 상미분방정식을 만들지 않습니다.

```

% 2. 적분인자가 y의 함수일 때
% d(mu*N)/dx - d(mu*M)/dy = 0 이 되는 mu(y)를 찾음
mu_eq_y = diff(mu_y(y) * N, x) - diff(mu_y(y) * M, y);

% mu'(y) 찾기
mu_prime_y = simplify(mu_eq_y / (N * diff(mu_y(y), y)));

try
    % 적분인자 mu(y) 계산
    mu_y_sol = dsolve(diff(mu_y(y), y) == mu_prime_y, mu_y(0) == 1);
    disp('적분인자 mu(y):');
```

disp(mu_y_sol);

```

% 적분인자를 곱한 후 새로운 M과 N
M_new_y = mu_y_sol * M;
N_new_y = mu_y_sol * N;

% 편미분 계산
dM_new_dy_y = diff(M_new_y, y);
dN_new_dx_y = diff(N_new_y, x);

% 완전 상미분방정식 확인
is_exact_y = simplify(dM_new_dy_y - dN_new_dx_y);
if is_exact_y == 0
    disp('mu(y)가 완전 상미분방정식을 만듭니다.');
```

else

```

    disp('mu(y)가 완전 상미분방정식을 만들지 않습니다.');
```

```

end
catch
    disp('mu(y)에 대한 기호 해를 구할 수 없습니다.');
```

경고: 기호 해를 구할 수 없습니다.
 적분인자 $\mu(y)$:
 $\mu(y)$ 가 완전 상미분방정식을 만들지 않습니다.

위의 코드처럼 x 혹은 y 만의 함수로 가정하고 적분인자를 구하는 코드를 사용하였지만 적분인자를 찾는것에 실패하였습니다.

여러가지 원인이 있을 수 있지만 적분인자가 $f(x,y)$ 로 이루어진 형태이기 때문일 수 있습니다.

아래는 해석적 방법을 사용하였습니다.

```

% 심볼릭 변수 정의
syms x y mu(x, y)

% 주어진 M(x, y)와 N(x, y)
M = x * y;
N = x^2 + 2 * y^2;

% 편미분 계산
dM_dy = diff(M, y);
dN_dx = diff(N, x);

% 미분방정식이 완전 상미분방정식인지 확인
is_exact_original = simplify(dM_dy - dN_dx);
disp('원래 방정식이 완전 상미분방정식인지 확인:');
```

원래 방정식이 완전 상미분방정식인지 확인:

```
disp(is_exact_original);
```

$-x$

```

if is_exact_original == 0
    disp('주어진 방정식은 이미 완전 상미분방정식입니다.');
```

```

else
    disp('주어진 방정식은 완전 상미분방정식이 아닙니다.');
```

% 적분인자 $\mu(x, y)$ 찾기
 % $d(\mu*M)/dy - d(\mu*N)/dx = 0$ 이 되는 $\mu(x, y)$ 찾기
 $\mu_{eq} = \text{diff}(\mu * M, y) - \text{diff}(\mu * N, x);$

% 편미분 방정식 풀기
 $[\mu_{sol}, cond] = \text{solve}(\mu_{eq} == 0, \mu);$

```

% 일반화된 적분인자 mu(x, y)
disp('일반화된 적분인자 mu(x, y):');
disp(mu_sol);
end

```

주어진 방정식은 완전 상미분방정식이 아닙니다.

경고: 양함수 해를 구할 수 없습니다. 취할 수 있는 선택 사항을 보려면 도움말을 참조하십시오.

일반화된 적분인자 $\mu(x, y)$:

해석적 방법을 사용하였지만 해를 구할 수 없었습니다.

오류의 원인

1. 주어진 미분방정식이 너무 복잡하거나 특이한 형태로 적분인자를 갖고 있어서 심볼릭 툴이 이를 해석하지 못한 경우
2. 적분인자가 특정 함수 형태로 존재하지 않거나, 위의 제시된 조건하에서 해를 찾을 수 없는 경우
3. 적분인자가 일반화 된 형태로 복잡하게 나타날때

따라서 수치적 접근방법을 사용하였습니다.

수치적 접근 방법을 사용하기 위해서는 적분인자에 대한 개략적인 수식이 필요합니다. 하지만 해석적 방법에 의한 정보를 얻을 수 없기 때문에 위에서 사용하였던 $\mu(x)$, $\mu(y)$ 를 사용하였습니다.

```

% 심볼릭 변수 정의
syms x y C1

% 주어진 M(x, y)와 N(x, y)
M = x * y;
N = x^2 + 2 * y^2;

% 주어진 복잡한 적분인자
mu = (C1 * exp(((sqrt(sym(7))) * atan((2 * sqrt(sym(7))) * x + sqrt(sym(7))) * y) / (7 * y))) / 7))) / sqrt(x^2 + x * y + 2 * y^2);

% 수치적으로 방정식이 완전한지 확인
% x, y 값의 범위를 설정합니다.
x_vals = linspace(-10, 10, 50);
y_vals = linspace(-10, 10, 50);

% 결과 저장용
is_exact_vals = zeros(length(x_vals), length(y_vals));

for i = 1:length(x_vals)
    for j = 1:length(y_vals)
        x_val = x_vals(i);
        y_val = y_vals(j);

        % 주어진 적분인자를 수치적으로 평가

```

```

mu_val = double(subs(mu, {x, y, C1}, {x_val, y_val, 1})); % C1 = 1로 설정

% 새로운 M과 N을 수치적으로 평가
M_new_val = mu_val * double(subs(M, {x, y}, {x_val, y_val}));
N_new_val = mu_val * double(subs(N, {x, y}, {x_val, y_val}));

% 수치적 편미분 계산 (유한차분법 사용)
dM_new_dy = (mu_val * double(subs(M, {x, y}, {x_val, y_val + 0.01})) -
M_new_val) / 0.01;
dN_new_dx = (mu_val * double(subs(N, {x, y}, {x_val + 0.01, y_val})) -
N_new_val) / 0.01;

% 방정식이 완전한지 확인
is_exact_vals(i, j) = dM_new_dy - dN_new_dx;
end
end

% 평균 차이 계산
mean_difference = mean(abs(is_exact_vals), 'all');

% 결과 출력
if mean_difference < 1e-5
    disp('주어진 적분인자가 완전 상미분방정식을 만듭니다.');
```

```

else
    disp('주어진 적분인자가 완전 상미분방정식을 만들지 않습니다.');
```

```

end

% mean_difference을 사용하여 적분인자의 정확성을 확인합니다.
disp('평균 차이:');
disp(mean_difference);

```

```

% 심볼릭 변수 정의
syms x y C1

% 주어진 M(x, y)와 N(x, y)
M = x * y;
N = x^2 + 2 * y^2;

% 주어진 복잡한 적분인자
mu = C1 * exp(((2 * sqrt(sym(7)) * atan(sqrt(sym(7)))/7 + (4 * sqrt(sym(7)) * y)/(7
* x))) / 7));

% 수치적으로 방정식이 완전한지 확인
% x, y 값의 범위를 설정합니다.
x_vals = linspace(-10, 10, 50);
y_vals = linspace(-10, 10, 50);

% 결과 저장용
is_exact_vals = zeros(length(x_vals), length(y_vals));

```



```

for i = 1:length(x_vals)
    for j = 1:length(y_vals)
        x_val = x_vals(i);
        y_val = y_vals(j);

        % 주어진 적분인자를 수치적으로 평가
        mu_val = double(subs(mu, {x, y, C1}, {x_val, y_val, 1})); % C1 = 1로 설정

        % 새로운 M과 N을 수치적으로 평가
        M_new_val = mu_val * double(subs(M, {x, y}, {x_val, y_val}));
        N_new_val = mu_val * double(subs(N, {x, y}, {x_val, y_val}));

        % 수치적 편미분 계산 (유한차분법 사용)
        dM_new_dy = (mu_val * double(subs(M, {x, y}, {x_val, y_val + 0.01}))) -
M_new_val) / 0.01;
        dN_new_dx = (mu_val * double(subs(N, {x, y}, {x_val + 0.01, y_val}))) -
N_new_val) / 0.01;

        % 방정식이 완전한지 확인
        is_exact_vals(i, j) = dM_new_dy - dN_new_dx;
    end
end

% 평균 차이 계산
mean_difference = mean(abs(is_exact_vals), 'all');

% 결과 출력
if mean_difference < 1e-5
    disp('주어진 적분인자가 완전 상미분방정식을 만듭니다.');
```

```

else
    disp('주어진 적분인자가 완전 상미분방정식을 만들지 않습니다.');
```

```

end

% mean_difference을 사용하여 적분인자의 정확성을 확인합니다.
disp('평균 차이:');
disp(mean_difference);

```

위의 방법도 제대로 된 적분인자를 찾을 수 없었습니다.

다시 확인한 결과, 맨 처음 시도 했었던 방법은 $\mu(x)$ 와 $\mu_y(y)$ 를 각각 심볼릭 함수로 정의하고, 미분 방정식을 세워서 `dsolve`로 기호 해를 찾으려고 했습니다 .

이번에는 `dsolve`를 사용하지 않고 R_x 와 R_y 를 직접적으로 적분하여 적분 인자를 구하는 코드로 바꾸었습니다.

심볼릭 함수 대신, 적분 인자 μ 를 지수 함수 형태로 바로 계산합니다.

```

function mu = findIntegratingFactorModified(P, Q, x, y)
    % 우선 x만의 함수로 가정하고 식의 구성 요소를 찾음
    R_x = simplify((diff(P, y) - diff(Q, x)) / Q);

```

```

% R_x가 x만의 함수인지 확인
if isAlways(diff(R_x, y) == 0)
    % 적분 인자 구하기
    mu = exp(int(R_x, x));
    disp('The integrating factor as a function of x is:');
    disp(mu);
    return;
else
    disp('R_x is not a function of x alone.');
```

end

```

% 만약 실패한다면 y만의 함수로 가정
R_y = simplify((diff(Q, x) - diff(P, y)) / P);

% R_y가 y만의 함수인지 확인
if isAlways(diff(R_y, x) == 0)
    % 적분 인자 구하기
    mu = exp(int(R_y, y));
    disp('The integrating factor as a function of y is:');
    disp(mu);
    return;
else
    disp('R_y is not a function of y alone.');
```

end

```

% 적분 인자를 찾지 못한 경우
mu = []; % 빈 배열을 반환
disp('No integrating factor found as a function of x or y alone.');
```

end

```

% 예제 입력
syms x y;
P = x*y;
Q = x^2 + 2*y^2;

% 적분 인자 찾기
mu = findIntegratingFactorModified(P, Q, x, y);
```

경고: ' $(4xy)/(x^2 + 2y^2)^2 == 0$ '을(를) 증명할 수 없습니다.

R_x is not a function of x alone.

The integrating factor as a function of y is:

y

적분인자는 $F = y$ 인것으로 나타났습니다.

적분인자를 수식에 대입하여 상미분방적식이 되는지 확인하였습니다.

```

syms x y;
% 주어진 M(x, y)과 N(x, y)
```

```

M = x*y;
N = x^2 + 2*y^2;

% 가정한 적분 인자
mu = y;

% 새로운 M과 N 정의
M_new = mu * M;
N_new = mu * N;

% 정확 미분 방정식인지 확인
exactCheck = diff(M_new, y) == diff(N_new, x);

% 결과 출력
if simplify(exactCheck)
    disp('The equation with the integrating factor is an exact differential
equation.');
```

```

else
    disp('The equation with the integrating factor is not an exact differential
equation.');
```

```

end
```

문제2

$y^2 dx + y dy = 0$ 에 대한 적분 인자를 찾고 일반해를 구하였습니다.

```

syms x y;
% 미분 방정식 정의
P = y^2;
Q = y;

% 적분 인자 R 구하기
% R = (1/Q) * (diff(P, y) - diff(Q, x))
R = (1/Q) * (diff(P, y) - diff(Q, x));
R = simplify(R);

% 적분 인자가 x만의 함수인지 확인
if isAlways(diff(R, y) == 0)
    % 적분 인자 구하기
    integratingFactor = exp(int(R, x));
    disp('The integrating factor is:');
    disp(integratingFactor);

    % 새로운 P와 Q 정의
    P_new = simplify(integratingFactor * P);
    Q_new = simplify(integratingFactor * Q);

    % 일반해 구하기
```

```

% 완전 미분 방정식 F(x, y) = C에서
% F(x, y) = int(P_new, x) + int(Q_new, y) - int(dF/dy, y)
F_x = int(P_new, x);
dF_dy = diff(F_x, y);
F_y = int(Q_new - dF_dy, y);

% 완전 미분 방정식 일반해
F = F_x + F_y;
disp('The general solution is:');
disp(F);
else
    disp('The integrating factor is not a function of x alone.');
```

The integrating factor is:

$$e^{2x}$$

The general solution is:

$$\frac{y^2 e^{2x}}{2}$$

적분인자 e^{2x} 이 맞는지 확인하였습니다.

```

syms x y C;
% 주어진 미분 방정식 정의
P = y^2;
Q = y;

% 구해진 적분 인자
integratingFactor = exp(2*x);

% 새로운 P와 Q 정의 (적분 인자를 곱한 형태)
P_new = simplify(integratingFactor * P);
Q_new = simplify(integratingFactor * Q);

% 1. 완전 미분 방정식인지 확인
exactCheck = diff(P_new, y) == diff(Q_new, x);
if isAlways(exactCheck)
    disp('The equation with the integrating factor is an exact differential equation.');
```

The equation with the integrating factor is an exact differential equation.

```

% 2. 일반해 구하기
% 적분 인자 적용 후 통합하여 해를 구함
F_x = int(P_new, x);
```

```
F_y = int(Q_new - diff(F_x, y), y);
F = simplify(F_x + F_y);
```

% 일반해를 C로 표현

```
generalSolution = F == C;
disp('The general solution F(x, y) is:');
```

The general solution F(x, y) is:

```
disp(generalSolution);
```

$$\frac{y^2 e^{2x}}{2} = C$$

적분인자를 곱해서 확인한 결과 완전상미분 방정식임을 확인하였습니다.

따라서 올바르게 구한것을 확인하였습니다.

경고: '(4*x*y)/(x^2 + 2*y^2)^2 == 0'을(를) 증명할 수 없습니다.

The integrating factor as a function of y is:

y