

3. 저혈당과 고혈당 응급처치 계획

(당뇨병 의료관리 계획을 참고하여 기입합니다. 간식의 종류, 개수 등도 이에 따라 수정합니다.)

사전에 학부모(보호자)의 동의와 전문의약품을 처방한 의사의 자문을 받아 제15조 제2항에 따른 보건교사 또는 순회 보건교사(이하 이 조에서 “보건교사등”이라 한다)로 하여금 제1형 당뇨병으로 인한 저혈당쇼크 또는 아나필락시스 쇼크로 인하여 생명이 위급한 학생에게 투약행위 등 응급처치를 제공하게 할 수 있다.

저혈당 증상	경증에서의 중등도 저혈당 증상 :
심한 저혈당	- 의식소실, 경련 등으로 스스로 저혈당 대처를 할 수 없는 상황임 - 심한 저혈당 발생 시 우선 이송이 가능한 병원
저혈당 기준	혈당이 _____ mg/dL
경증에서 중등도 저혈당 처치	- 무지방 탄수화물 _____ g 을 먹인다. - 포도당캔디 _____ 개 혹은 - 주스 _____ mL - 섭취 후 15분간 기다린다. - 혈당을 다시 측정한다. - 혈당이 _____ mg/dL 미만인 경우 탄수화물을 반복해서 먹게 한다. - 보호자에게 연락한다. - 학생의 혈당이 정상으로 돌아오면 1시간 후에 혈당수치를 다시 확인한다.
심한 저혈당 처치	- 학생을 옆으로 눕힌다. - 입 안에 아무것도 넣지 않는다. - 보건교사가 글루카곤을 투여 한다. : 좌 / 우측 _____ (부위)에 _____ mL (1 mL=1 mg) - 타인에게 119(응급의료서비스)에 신고하도록 요청한다. - 학생의 보호자에게 연락한다. 119가 도착할 때까지 학생 옆에서 자리를 지킨다.