

5. 당뇨병 학생 관련 서식³⁾

1) 기본정보 (학생 및 보호자가 작성)

정보공유 여부 확인	학생 및 보호자는 학생의 당뇨병에 대한 상태를 이 문서를 통하여 학교에 제공하기를 원하십니까? (위의 질문에 '예'라고 대답한 경우에만 아래 서식을 작성하여 학교에 제출합니다.)				
	☐ 예		☐ 아니오		
학생정보	성명				
	당뇨병유형	☐ 제1형 당뇨병 ☐ 제2형 당뇨병 ☐ 기타			
	당뇨병 진단일	년 월 일			
	학년/반				
	연락처				
보호자정보 (2인 작성 권장)	1	성명		학생과의 관계	
		연락처	(집) (휴대전화) (기타) (이메일)		
		주소			
	2	성명		학생과의 관계	
		연락처	(집) (휴대전화) (기타) (이메일)		
		주소			
	병원정보	병원명			
담당 의료인					
주소					
전화번호					
의료인 부재시 연락처					

3) 「당뇨병 학생 지원 가이드라인」(교육부, 2019)에서 발췌함

2) 혈당 측정(학생 및 보호자가 작성)

혈당목표수준	식전 ☐ 90~130 mg/dL ☐ 다른 범위 (~ mg/dL)				
혈당측정방식	☐ 자가 혈당측정기 사용 ☐ 연속 혈당측정기 사용 ☐ 둘 다 사용 ☐ 기타 ()				
학생의 혈당측정기술	☐ 혈당을 스스로 측정한다				
	☐ 혈당을 스스로 측정하나 감독이 필요하다				
	☐ 연속혈당측정기(CGM)를 사용한다				
자가 혈당측정기 사용 시	브랜드/ 모델명				
	혈당 측정 시기	☐ 아침 식사 전	☐ 아침 식사 ____ 시간 후	☐ 오전 중	
		☐ 점심 식사 전	☐ 점심 식사 ____ 시간 후	☐ 교정 인슐린 주입 2시간 후	
		☐ 운동 전	☐ 운동 후	☐ 방과 후 수업 시작 전	
		☐ 저혈당, 고혈당 징후 및 증상이 있거나 의심되면		☐ 기타 :	
		☐ 저녁 식사 전	☐ 저녁식사 2시간 후	☐ 자기 전	
연속 혈당측정기 사용 시	브랜드/ 모델명				
	알람설정	저혈당 알람설정 ☐ 예 ☐ 아니오 (설정값 _____mg/dL 이하)			
		고혈당 알람설정 ☐ 예 ☐ 아니오 (설정값 _____mg/dL 이상)			
	연속혈당측정기를 사용하는 학생을 위한 추가 정보	1) 연속혈당측정기의 혈당 수치에 따른 조치를 취하기 전에 반드시 혈당측정기로 결과를 확인하고, 학생이 저혈당 징후 또는 증상을 보인다면 연속혈당측정기와 상관없이 손가락 끝에서 혈당을 확인한다. 2) 인슐린 주사는 연속혈당측정기 삽입 위치에서 최소 5 cm 이상 떨어진 부위에 주입한다. 3) 운동 중에도 연속혈당측정기를 분리하지 않는다. 4) 연속혈당측정기가 몸에서 분리되면 보호자에게 모두 반환하고, 어떤 부품도 버리지 않는다.			

3) 인슐린 치료 및 약물(학생 및 보호자가 작성)

인슐린 투여방법	☐ 인슐린 주사기 ☐ 펜형 인슐린 ☐ 인슐린 펌프																											
학교에서 인슐린 용량 결정 방법	☐ 용량 고정식 ☐ 용량 조절식(기저-보루스) ☐ 학교에서 인슐린 사용 안함																											
학생의 인슐린 투여 자기관리 능력	☐ 인슐린 용량을 스스로 계산하고 투여할 수 있다.																											
	☐ 보호자의 인슐린 용량 확인 후 스스로 투여할 수 있다.																											
학생의 인슐린 조정 자기관리 능력	☐ 학생 스스로 용량을 교정할 수 있다. ☐ 교정용량 투여 전에 보호자에게 확인을 받아야 한다.																											
인슐린 펌프 사용시 학생의 인슐린 펌프 자기관리 기술	<table border="1"> <thead> <tr> <th>학생의 인슐린 펌프 자기관리 기술</th><th colspan="2">독립적 수행가능</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>배터리를 교체할 수 있다.</td><td>☐ 예</td><td>☐ 아니요</td></tr> <tr> <td>펌프 주입세트를 분리할 수 있다.</td><td>☐ 예</td><td>☐ 아니요</td></tr> <tr> <td>펌프를 주입 부위에 연결할 수 있다.</td><td>☐ 예</td><td>☐ 아니요</td></tr> <tr> <td>알람이나 기능장애를 스스로 해결할 수 있다.</td><td>☐ 예</td><td>☐ 아니요</td></tr> </tbody> </table>			학생의 인슐린 펌프 자기관리 기술	독립적 수행가능		배터리를 교체할 수 있다.	☐ 예	☐ 아니요	펌프 주입세트를 분리할 수 있다.	☐ 예	☐ 아니요	펌프를 주입 부위에 연결할 수 있다.	☐ 예	☐ 아니요	알람이나 기능장애를 스스로 해결할 수 있다.	☐ 예	☐ 아니요										
학생의 인슐린 펌프 자기관리 기술	독립적 수행가능																											
배터리를 교체할 수 있다.	☐ 예	☐ 아니요																										
펌프 주입세트를 분리할 수 있다.	☐ 예	☐ 아니요																										
펌프를 주입 부위에 연결할 수 있다.	☐ 예	☐ 아니요																										
알람이나 기능장애를 스스로 해결할 수 있다.	☐ 예	☐ 아니요																										
사용하는 인슐린	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th><th colspan="4">섭취 전 투여하는 인슐린 종류 및 용량</th></tr> <tr> <th>종류(명칭)</th><th>용량</th><th>종류(명칭)</th><th>용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>아침 식사 전</td><td></td><td>(단위)</td><td></td><td>(단위)</td></tr> <tr> <td>점심 식사 전</td><td></td><td>(단위)</td><td></td><td>(단위)</td></tr> <tr> <td>간식 전</td><td></td><td>(단위)</td><td></td><td>(단위)</td></tr> </tbody> </table>				구분	섭취 전 투여하는 인슐린 종류 및 용량				종류(명칭)	용량	종류(명칭)	용량	아침 식사 전		(단위)		(단위)	점심 식사 전		(단위)		(단위)	간식 전		(단위)		(단위)
구분	섭취 전 투여하는 인슐린 종류 및 용량																											
	종류(명칭)	용량	종류(명칭)	용량																								
아침 식사 전		(단위)		(단위)																								
점심 식사 전		(단위)		(단위)																								
간식 전		(단위)		(단위)																								
기타 당뇨병약물 [경구투여(먹는약) 등]	이름 : _____ 용량 : _____ 경로 : _____ 투여 시간 : _____ 이름 : _____ 용량 : _____ 경로 : _____ 투여 시간 : _____ 이름 : _____ 용량 : _____ 경로 : _____ 투여 시간 : _____																											

4) 저혈당과 고혈당의 응급상황 시 조치 (학생 및 보호자가 의료진과 상의하여 작성)

저혈당 발생 시													
학생이 저혈당일 때 나타나는 증상													
저혈당 시 조치계획	1) 저혈당 증상을 보이거나 혈당이 _____ mg/dL 미만인 경우, 빨리 흡수되는 탄수화물 _____ 그램의 포도당 제품을 먹는다.												
	2) 15분 이내에 혈당을 다시 측정하고, 혈당이 _____ mg/dL 미만인 경우 처치를 반복한다.												
	3) 학생이 먹지 못하거나, 의식이 없거나, 발작 또는 경련(갑작스런 움직임)을 보이는 경우:												
	① 학생을 옆으로 돌려 눕혀 기도를 확보한다. ② 글루카곤을 투여한다.												
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>용량</td> <td>☐ 1 mg</td> <td>☐ 0.5 mg</td> <td colspan="2">☐ 기타 _____ mg</td> </tr> <tr> <td>부위</td> <td>☐ 팔(상완부)</td> <td>☐ 허벅지(대퇴부)</td> <td>☐ 둔부</td> <td>☐ 기타</td> </tr> </tbody> </table>				용량	☐ 1 mg	☐ 0.5 mg	☐ 기타 _____ mg		부위	☐ 팔(상완부)	☐ 허벅지(대퇴부)	☐ 둔부
용량	☐ 1 mg	☐ 0.5 mg	☐ 기타 _____ mg										
부위	☐ 팔(상완부)	☐ 허벅지(대퇴부)	☐ 둔부	☐ 기타									
4) 119(응급의료서비스)에 연락하고 학생의 보호자에게 연락한다.													
저혈당 발생 시 유의사항	당뇨병 학생 지원 가이드라인과는 달리 이 학생에게 주의가 필요한 부분은 다음과 같습니다.												
의료진 권고사항													

고혈당 발생 시	
학생이 고혈당일 때 나타나는 증상	
고혈당 시 조치계획	1) 혈당이 _____ mg/dL 이상이면 _____ 시간마다 ☐ 소변 ☐ 혈액 케톤을 측정한다. 2) 혈당이 _____ mg/dL을 초과할 경우 보호자에게 알린다.
체육활동 중단 유무	☐ 혈당이 _____ mg/dL을 초과할 경우 체육활동을 하지 않는다. ☐ 혈당에 관계없이 체육활동에 참여한다. ☐ 학생에게 맡긴다.
고혈당 발생 시 기타 유의사항	1) 인슐린 펌프 사용자의 경우: 인슐린 펌프를 사용하는 학생을 위한 추가 정보를 참고한다. 2) 화장실을 언제든지 사용할 수 있도록 허용한다. 3) 물이나 당분이 함유되지 않은 음료(보리차 등)를 추가로 제공한다. 4) 소변/혈액 케톤이 중등도에서 중증 범위인 경우 신체 활동을 피하도록 한다. 5) 학생이 다음과 같은 증상(케톤산증의 증상)을 보이면 119와 보호자에게 연락한다. (구강건조, 심한 갈증, 메스꺼움과 구토, 심한 복통, 거친 호흡 또는 가쁜 호흡, 가슴통증, 자주 자려고 함, 의식 수준 감소)
기타 의료진 권고사항	

5) 운동/식사 조치 계획 (학생 및 보호자가 의료진과 상의하여 작성)

운동 및 체육시간																	
운동, 체육시간 준비물	☐ 포도당 캔디 ☐ 당분을 함유한 주스(음료수)																
운동, 체육활동 중 탄수화물 섭취	학생은 ☐ 활동 전 ☐ 활동 중 30분마다 ☐ 활동 중 60분마다 ☐ 격렬한 신체 활동 이후 ☐ 기타: _____																
	☐ 15그램 ☐ 30그램 ☐ 기타: _____ 그램의 탄수화물 식품을 섭취해야 한다.																
운동 시 혈당수치	가장 최근 혈당 수치가 _____ mg/dL 미만인 경우, 탄수화물 섭취로 혈당을 교정하여 혈당이 _____ mg/dL를 초과해야만 신체 활동에 참여할 수 있다. 혈당이 _____ mg/dL를 초과하거나 혈액 케톤 결과가 0.6 mmol/L 이상인 경우 신체 활동을 피해야 한다.																
식사(급식) 시간																	
식사계획	<table border="1"> <thead> <tr> <th>식사/간식</th> <th>시간</th> <th>평소에 섭취하는 탄수화물 양(g) 혹은 분량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>아침</td> <td></td> <td>(예시) 탄수화물 200g, 밥 2/3공기 등</td> </tr> <tr> <td>오전 간식</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>점심</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>오후 간식</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	식사/간식	시간	평소에 섭취하는 탄수화물 양(g) 혹은 분량	아침		(예시) 탄수화물 200g, 밥 2/3공기 등	오전 간식			점심			오후 간식			
	식사/간식	시간	평소에 섭취하는 탄수화물 양(g) 혹은 분량														
	아침		(예시) 탄수화물 200g, 밥 2/3공기 등														
	오전 간식																
	점심																
오후 간식																	
예상되지 않은 간식 섭취	교실 파티나 시식 이벤트처럼, 동료 학생과 함께 음식을 섭취하는 경우 ☐ 보호자의 확인 필요 ☐ 학생에게 맡김																
학생의 자기관리 능력	☐ 섭취량에 따라 인슐린 용량을 스스로 결정할 수 있다.																
	☐ 정해진 인슐린 용량에 따라 섭취량을 일정하게 유지한다.																
	☐ 보호자의 확인 후 섭취량과 인슐린 용량을 결정한다.																

6) 학교 보관용 당뇨병 물품 보관 관리 및 일지

※ 당뇨병 관리물품에 대해서는 학기별로 최소 1회 점검하여야 합니다. 사용 시 1주일 내에 다시 보충하는 것을 권고하며 교체 시기를 확인하도록 합니다.

물품명	보관 여부	종류 및 수량	확인날짜	보관장소 및 보관방법	확인자 서명
			유통기한		
인슐린()	예 / 아니오			보건실 냉장보관 / 실온보관	
인슐린()	예 / 아니오			보건실 냉장보관 / 실온보관	
글루카곤 비상 용품키트	예 / 아니오			보건실 냉장보관 / 실온보관	
간식, 포도당 제품	예 / 아니오			교실 캐비닛	
혈당 측정기	예 / 아니오			교실 캐비닛	
혈당 측정용 시험지	예 / 아니오			교실 캐비닛	
케톤 측정용 시험지	예 / 아니오			교실 캐비닛	
기 타					

※ 상기 예시된 물품 외 추가 비상관리물품이 있을 경우 기재

* 상기 물품은 예시임

7) 동의서 및 서명

의료진과 작성여부	이 「당뇨병 의료관리 계획」은 학생과 보호자, 의료진이 함께 작성하였습니다. ☐ 예 ☐ 아니오
공개여부	학생 및 보호자는 당뇨병 의료관리 계획에 포함된 정보를 관련된 교직원과 자녀의 건강 및 안전을 유지하기 위해 필요한 개인에게 공개하는 것에 ☐ 예 ☐ 아니오 공개범위 (☐ 교직원 ☐ 친구)
투약	[보건교사 배치교에 한함] 보건교사가 학생이 저혈당 쇼크로 스스로 주사를 하지 못하는 경우 생명이 위급한 학생에게 투약 행위 등 응급처치를 제공하는 데에 동의합니다. ☐ 예 ☐ 아니오 ※ 단, 본 서식에 전문의약품을 처방한 의사의 자문 (의료진 주의사항 및 권고, 의사의 서명) 을 받은 경우에만 학교보건법 15조의2에 의거하여 응급시 투약행위가 가능합니다.
학생 당뇨병관리물품	

학부모(보호자) 동의, 응급상황 시 조치계획 작성, 전문의약품 처방한 의사의 서명이 되어있는 경우 응급상황시 보건교사의 투약행위가 가능합니다.

[근거 : 학교보건법 의거 「사전에 학부모(보호자)의 동의와 전문의약품을 처방한 의사의 자문을 받아 제15조제2항에
따른 보건교사 또는 순회 보건교사(이하 이 조에서 “보건교사 등”이라 한다)로 하여금 제1형 당뇨병으로
인한 저혈당쇼크 또는 아나필락시스 쇼크로 인하여 생명이 위급한 학생에게 투약행위 등 응급처치를 제공
하게 할 수 있다.]

본 인 (소속) (성명) (서명)

보호자 (관계) (성명) (서명)

의 사 (소속) (성명) (서명)

○○ 학교 귀하

8) 「당뇨병 학생 개별지원계획」

계획 작성일			
대상자	성명 :	학년/반 :	당뇨병 진단날짜 :
	보호자 성명 및 연락처 :		
건강증진부 구성	※ 소속 교직원의 성명 및 직위 기입		
1. 혈당 측정 계획			
혈당 측정 장소	☐ 교실 ☐ 보건실 ☐ 기타 : _____		
혈당 측정 시간	☐ 아침식사 전 ☐ 오전 중 ☐ 점심식사 전 ☐ 점심식사 후 ☐ 간식 전 ☐ 운동 전 ☐ 운동 후 ☐ 교정 인슐린 주사 2시간 후 ☐ 하교시간 전 ☐ 필요에 따라 ☐ 기타 : _____		
학생의 혈당측정 자기관리 기술	☐ 독립적 ☐ 감독 필요 ☐ 지원 필요		
혈당측정기 브랜드/모델명			
연속혈당측정기 브랜드/모델명			
2. 인슐린 주사 지원계획			
인슐린 주사장소	☐ 교실 ☐ 보건실 ☐ 기타 : _____		
인슐린 주사시간	☐ 아침식사 전 ☐ 오전 중 ☐ 점심식사 전 ☐ 간식 전 ☐ 필요에 따라 ☐ 기타 : _____		
인슐린 용량결정	☐ 학생 스스로 결정 ☐ 감독 하에 스스로 결정 ☐ 보호자 승인 필요		
인슐린 주사	☐ 독립적 ☐ 감독 필요 ☐ 지원 필요		
인슐린 주입방식	☐ 인슐린 주사기 ☐ 펜형 인슐린 ☐ 인슐린 펌프		