

5. 선별검사를 위한 척도 모음(예시)

활용에 대한 기본 지침

심리지원 서비스가 필요한 위기학생 선별은 심리평가 도구를 통한 결과 점수에만 의존하지 않고, 면밀한 면담이 함께 수반되는 것이 중요합니다. 선별검사에서 주로 사용하는 우울, 사건 충격, 자살관련 평가를 위한 척도를 아래에 수록 하였으니, 필요에 따라 대상에 맞게 선택해서 활용하시기 바랍니다.

아동용 우울척도(Children's Depression Inventory: CDI)

다음에는 각 문항마다 여러 가지 느낌과 생각들이 적혀있는 문장들이 있습니다. 그 중에서 **지난 2주일 동안** 나를 가장 잘 나타 내어 주는 문장을 하나 골라 주십시오. 여기에는 정답이 없습니다. 단지 자신을 가장 정확하게 표현하는 문장을 하나 골라서 ○ 표시 하십시오.

연번	문항	점수
1	나는 가끔 슬프다.	0
	나는 자주 슬프다.	1
	나는 항상 슬프다.	2
2	내 모든 일이 제대로 되어갈 것이다.	0
	나는 일이 제대로 되어갈지 확신할 수 없다.	1
	나에게 제대로 되어가는 일이란 없다.	2
3	나는 대체로 무슨 일이든지 웬만큼 한다.	0
	나는 잘못하는 일이 많다.	1
	나는 모든 일을 잘못한다.	2
4	나는 재미있는 일들이 많다.	0
	나는 재미있는 일들이 더러 있다.	1
	나는 어떤 일도 전혀 재미가 없다.	2
5	나는 가끔 못된 행동을 한다.	0
	나는 못된 행동을 할 때가 많다.	1
	나는 언제나 못된 행동을 한다.	2
6	나는 가끔씩 나에게 나쁜 일이 일어나지 않을까 생각한다.	0
	나는 나에게 나쁜 일이 일어날까 걱정한다.	1
	나는 나에게 무서운 일이 일어나리라는 것을 확신한다.	2
7	나는 나 자신을 좋아한다.	0
	나는 나 자신을 좋아하지 않는다.	1
	나는 나 자신을 미워한다.	2

8	잘못되는 일은 보통 내 탓이 아니다.	0
	잘못되는 일은 내 탓인 것이 많다.	1
	잘못되는 일은 모두 내 탓이다.	2
9	나는 자살을 생각하지 않는다.	0
	나는 자살에 대하여 생각은 하지만 그렇게 하지는 않을 것이다.	1
	나는 자살하고 싶다.	2
10	나는 때때로 울고 싶은 기분이 든다.	0
	나는 울고 싶은 기분인 날도 많다.	1
	나는 매일 울고 싶은 기분이다.	2
11	간혹 이 일 저 일로 해서 성가실 때가 있다.	0
	이 일 저 일로 해서 성가실 때가 많다.	1
	이 일 저 일로 해서 늘 성가시다.	2
12	나는 사람들과 함께 있는 것이 좋다.	0
	나는 사람들과 함께 있는 것이 싫을 때가 있다.	1
	나는 사람들과 함께 있는 것을 전혀 원하지 않는다.	2
13	나는 쉽게 결정을 내린다.	0
	나는 어떤 일에 대한 결정을 내리기가 어렵다.	1
	나는 어떤 일에 대한 결정을 내릴 수가 없다.	2
14	나는 관찮게 생겼다.	0
	나는 못생긴 구석이 약간 있다.	1
	나는 못생겼다.	2
15	나는 별로 어렵지 않게 학교 공부를 해낼 수 있다.	0
	나는 학교 공부를 해내려면 많이 노력해야만 한다.	1
	나는 학교 공부를 해내려면 언제나 노력해야만 한다.	2
16	나는 잠을 잘 잔다.	0
	나는 잠들기 어려운 밤이 많다.	1
	나는 매일 밤 잠들기가 어렵다.	2
17	나는 가끔 피곤하다.	0
	나는 자주 피곤하다.	1
	나는 언제나 피곤하다.	2
18	나는 밥맛이 좋다.	0
	나는 밥맛이 없을 때가 많다.	1
	나는 밥맛이 없을 때가 대부분이다.	2
19	나는 몸이 쭈시고 아프다든지 하는 것에 대해 걱정하지 않는다.	0
	나는 몸이 쭈시고 아픈 것에 대해 걱정할 때가 많다.	1
	나는 몸이 쭈시고 아픈 것에 대해 항상 걱정한다.	2

20	나는 외롭다고 느낀다.	0
	나는 자주 외롭다고 느낀다.	1
	나는 항상 외롭다고 느낀다.	2
21	나는 학교생활이 재미있을 때가 많다.	0
	나는 가끔씩 학교생활이 재미있다.	1
	나는 학교생활이 재미있었던 적이 없다.	2
22	나는 친구가 많다.	0
	나는 친구가 좀 있지만 더 있었으면 한다.	1
	나는 친구가 하나도 없다.	2
23	나의 학교 성적은 괜찮다.	0
	나의 학교 성적은 예전처럼 좋지 않다.	1
	내가 예전에는 무척 잘하던 과목의 성적이 요즘 뚝 떨어졌다.	2
24	나는 다른 아이들처럼 착하다.	0
	나는 마음만 먹으면 다른 아이들처럼 착할 수가 있다.	1
	나는 절대로 다른 아이들처럼 착할 수가 없다.	2
25	분명히 나를 진심으로 좋아하는 사람이 있다.	0
	나를 진심으로 좋아하는 사람이 있을지 확실하지 않다.	1
	나를 진심으로 좋아하는 사람은 아무도 없다.	2
26	나는 누가 나에게 시킨 일을 대체로 한다.	0
	나는 누가 나에게 시킨 일을 제대로 하지 않는다.	1
	나는 누가 나에게 시킨 일을 절대로 하지 않는다.	2
27	나는 사람들과 사이좋게 지낸다.	0
	나는 사람들과 잘 싸운다.	1
	나는 사람들과 언제나 싸운다.	2
총 점		

검사설명 및 해석지침	
척도내용	Kovacs(1983)가 제작한 Children's Depression Inventory(CDI)를 조수철과 이영식(1990)이 우리나라 아동에게 맞게 수정 보완한 한국형 소아 우울척도. 우울정서 5문항, 행동장애 7문항, 흥미상실 7문항, 자기비하 4문항, 생리적 증상 4문항으로 구성되어 있으며 총 27문항.
한국어판	조수철, 이영식(1990). 한국형 소아우울척도의 개발. 신경정신의학, 29, 943-956.
대상	8~13세
해석지침	총점의 범위 0-54점 • 0-14점 우울하지 않음 • 15-19점 경미한 우울 • 20-24점 중등도 우울 • 25-54점 심한 우울 해석출처: 방영룡, 박재홍, 김성환.(2015). Cut-Off Scores of the Children's Depression Inventory for Screening and Rating Severity in Korean Adolescents. PSYCHIATRY INVESTIGATION, 12(1), 23-28.

역학연구를 위한 우울적도-단축형
 (The Center for Epidemiologic Studies Depression scale: CES-D-10)

아래에 문항을 잘 읽으신 후, **지난 1주 동안** 당신이 느끼고 행동한 것을 가장 잘 나타낸다고 생각되는 답변에 O 표시를 하여 주십시오. 한 문항도 빠짐없이 답해 주시기 바랍니다.

연번	문항	아니다	그렇다
1	비교적 잘 지냈다.	1	0
2	상당히 우울했다.	0	1
3	모든 일들이 힘들게 느껴졌다.	0	1
4	잠을 설쳤다.(잠을 잘 이루지 못했다.)	0	1
5	세상에 홀로 있는 듯한 외로움을 느꼈다.	0	1
6	큰 불만 없이 생활했다.	1	0
7	사람들이 나에게 차갑게 대하는 것 같았다.	0	1
8	마음이 슬펐다.	0	1
9	사람들이 나를 싫어하는 것 같았다.	0	1
10	도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다.	0	1
각 칸 점수를 더해 주세요.			
총 점			

검사설명 및 해석지침	
척도내용	우울증의 지역사회 역학 조사용으로 미국 정신보건연구원(NIMH)이 1971년 개발한 The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale(CES-D)는 총 20문항으로 구성된 자기보고형 우울증 간이선별 검사도구로서 본 자료의 척도는 Kohout 등(1993)이 10문항으로 구성한 단축형 버전. 문항이 간결하여 세계적으로 널리 사용됨.
한국어판	신서연(2011). 한국어판 단축형 CES-D들의 타당성 연구, 서울대학교 대학원 석사학위 청구논문. 조맹제, 김계희(1993). 주요우울증환자 예비평가에서 CES-D의 진단적 타당성 연구. 신경정신의학 32, 381-399.
대상	청소년 이상
해석지침	총점의 범위 0-10점 • 0-2점 정상 우울 관련 정서적 문제를 호소하는 정도가 일반 사람들과 비슷한 수준입니다. • 3-10점 우울 우울과 관련된 증상들을 유의한 수준으로 보고하였습니다. 스트레스가 가중되면, 우울 증상이 확산되고 평소에 비해 일상생활 기능이 저하될 수 있으므로 주의가 필요합니다. 해석출처: 국립정신건강센터, 2020년 정신건강 검진도구 및 사용에 대한 표준지침

우울증평가 도구(Patient Health Questionnaire-9: PHQ-9)

지난 2주간, 얼마나 자주 다음과 같은 문제들로 곤란을 겪으셨습니까? **지난 2주 동안**에 아래와 같은 생각을 한 날을 헤아려서 해당하는 곳에 ○ 표시해주세요.

연번	문항	없음	2~6일	7~12일	거의 매일
1	기분이 가라앉거나, 우울하거나, 희망이 없다고 느꼈다.	0	1	2	3
2	평소 하던 일에 대한 흥미가 없어지거나 즐거움을 느끼지 못했다.	0	1	2	3
3	잠들기가 어렵거나 자주 깬다. / 혹은 너무 많이 잤다.	0	1	2	3
4	평소보다 식욕이 줄었다. / 혹은 평소보다 많이 먹었다.	0	1	2	3
5	다른 사람들이 눈치 챌 정도로 평소보다 말과 행동이 느려졌다. / 혹은 너무 안절부절 못해서 가만히 앉아 있을 수 없었다.	0	1	2	3
6	피곤하고 기운이 없었다.	0	1	2	3
7	내가 잘못 했거나, 실패했다는 생각이 들었다. / 혹은 자신과 가족을 실망시켰다고 생각했다.	0	1	2	3
8	신문을 읽거나 TV를 보는 것과 같은 일상적인 일에도 집중할 수가 없었다.	0	1	2	3
9	차라리 죽는 것이 낫겠다고 생각했다. / 혹은 자해할 생각을 했다.	0	1	2	3
합 계					
총 점					

검사설명 및 해석지침		
척도내용	Spitzer 등(2001)에 의해 개발된 PHQ의 우울장애 진단 모듈, 총 9문항. 점수가 높을수록 우울 증상의 심각도가 높아짐을 의미.	
한국어판	박승진, 최혜라, 최지혜, 김건우, 홍진표(2010). 한글판 우울증선별도구(Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9)의 신뢰도와 타당도, 대한불안학회지 6, 119-124	
해석지침	총점의 범위 0-27점	
	• 0-4점 가벼운 우울	유익한 수준의 우울감이 시사되지 않습니다.
	• 5-9점 가벼운 우울	다소 경미한 수준의 우울감이 있으나 일상생활에 지장을 줄 정도는 아닙니다. 다만, 이러한 기분 상태가 지속될 경우 개인의 신체적, 심리적 대처자원을 저하시킬 수 있습니다. 그러한 경우, 가까운 지역 센터나 전문기관을 방문하시기 바랍니다.
	• 10-19점 중간정도의 우울	중간정도 수준의 우울감이 시사됩니다. 이러한 수준의 우울감은 흔히 신체적, 심리적 대처자원을 저하시키며 개인의 일상생활을 어렵게 만들기도 합니다. 가까운 지역 센터나 전문기관을 방문하여 보다 상세한 평가와 도움을 받아보시기 바랍니다.
	• 20-27점 심한 우울	심한 수준의 우울감이 시사됩니다. 전문기관의 치료적 개입과 평가가 요구됩니다.
해석출처: 국립정신건강센터, 2020년 정신건강 검진도구 및 사용에 대한 표준지침		

사건충격척도(Impact of Event Scale-Revised-Korea: IES-R-K)

다음은 지난 사고(사건)에 대한 여러분의 생각과 느낌을 묻는 질문들입니다. 사건 후 최근 1주 내에 여러분에게 얼마나 자주 경험되었는지 각 문항에 ○ 표시해 주세요.

연번	문항	전혀 없다	드물게 있다	가끔 있다	자주 있다	많이 있다
1	그 사건을 상기시켜 주는 것들이 그 사건에 대한 감정(느낌)들을 다시 되살아나게 한다.	0	1	2	3	4
2	나는 수면을 지속하는 데 어려움이 있었다.	0	1	2	3	4
3	나는 다른 일들로 인해 그 사건을 생각하게 된다.	0	1	2	3	4
4	나는 그 사건 이후로 예민하고 화가 난다고 느꼈다.	0	1	2	3	4
5	그 사건에 대해 생각하거나 떠오를 때마다 혼란스러워지기 때문에 회피하려고 했다.	0	1	2	3	4
6	내가 생각하지 않으려고 해도 그 사건이 생각난다.	0	1	2	3	4
7	그 사건이 일어나지 않았거나, 현실이 아닌 것처럼 느꼈다.	0	1	2	3	4
8	그 사건을 상기시키는 것들을 멀리하며 지냈다.	0	1	2	3	4
9	그 사건의 영상이 나의 마음속에 갑자기 떠오르곤 했다.	0	1	2	3	4
10	나는 신경이 예민해졌고 쉽게 깜짝 놀랐다.	0	1	2	3	4
11	그 사건에 관해 생각하지 않기 위해 노력했다.	0	1	2	3	4
12	나는 그 사건에 관해 여전히 많은 감정을 가지고 있다는 것을 알지만 신경 쓰고 싶지 않았다.	0	1	2	3	4
13	그 사건에 대한 나의 감정은 무감각한 느낌이었다.	0	1	2	3	4
14	나는 마치 사건 당시로 돌아간 것처럼 느끼거나 행동할 때가 있었다.	0	1	2	3	4
15	나는 그 사건 이후로 잠들기가 어려웠다.	0	1	2	3	4
16	나는 그 사건에 대한 강한 감정이 물밀 듯 밀려오는 것을 느꼈다.	0	1	2	3	4
17	내 기억에서 그 사건을 지워버리려고 노력했다.	0	1	2	3	4
18	나는 집중하는 데 어려움이 있었다.	0	1	2	3	4
19	그 사건을 떠올리게 하는 어떤 것에도 식은땀, 호흡곤란, 구역질, 심장 두근거림 같은 신체적인 반응을 일으켰다.	0	1	2	3	4
20	나는 그 사건에 관한 꿈들을 꾸 적이 있었다.	0	1	2	3	4
21	내가 주위를 경계하고 감시하고 있다고 느꼈다.	0	1	2	3	4
22	나는 그 사건에 대해 이야기하지 않으려고 노력했다.	0	1	2	3	4
합 계						
총 점						

검사설명 및 해석지침	
척도내용	Horowitz M., Wilner N., Alvarez W.가 개발한 사건충격척도에 Weiss D. S.와 Marmar G.가 PTSD의 핵심 특징 중 하나인 과각성 증상 6문항을 추가하여, 회피 6문항, 침습 5문항, 수면장애, 정서적 마비 및 해리증상 5문항으로 사건충격척도 수정판을 구성하였으며, 총 22문항으로 이루어짐.
한국어판	은현정, 권태완, 이선미, 김태형, 최말레, 조수진(2005). 한국판 사건충격척도 수정판의 신뢰도 및 타당도 연구. 대한신경정신의학회지, 44(3), 303-310.
해석지침	총점의 범위 0-88점 • 0-17점 외상후 스트레스 장애 거의 없음. • 18-24점 급성스트레스장애, 외상후스트레스장애 가능성 있음, 전문가상담 권유. • 25점 이상 급성스트레스장애, 외상후스트레스장애 가능성 매우 높음, 전문가상담 반드시 필요 해석출처: 서울특별시교육청(2021). 위(Wee) 센터 위기지원 운영 가이드라인