

날짜 :	학생이름 :	상담자 :	
면담내용	1 죽고 싶다거나, 죽는 게 더 낫겠다고 생각한 적이 있니? ☐ 예 ☐ 아니오		
	2 자살을 할까 생각하고 있니? ☐ 예 ☐ 아니오		
	3 최근에 어떻게 죽어야겠다고 계획을 세운 적이 있니? ☐ 예 ☐ 아니오		
	☐ 시간: ☐ 장소: ☐ 방법:		
	4 최근(6개월 간) 이 계획을 실행해야겠다는 생각을 한 적이 있니? ☐ 예 ☐ 아니오		
	5 혹시 죽어야겠다는 생각에, 어떤 행동을 해본 적이 있니? ☐ 예 ☐ 아니오		
	☐ 시간: ☐ 장소: ☐ 방법:		
	6 무엇이 너를 그렇게 힘들게 만들고 죽고 싶게 하는지 그 이유를 물어봐도 될까?		
	자살 위험성 단계	☐ 위험성 없음 혹은 낮은 위험 : 모두 ‘아니오’인 경우, 혹은 1번만 ‘예’이고, 나머지는 모두 ‘아니오’인 경우 수동적 자살사고는 있지만, 적극적인 자살 사고, 계획, 의도, 시도 경험은 없음에 해당	
☐ 중간 위험 : 1, 2번이 모두 ‘예’ 이나 나머지는 모두 ‘아니오’인 경우 수동적/적극적 자살 사고는 있으나 계획, 의도, 시도 경험은 없음에 해당			
☐ 높은 위험 : 5번이 ‘예’이면서, 3번과 4은 모두 ‘아니오’인 경우(1, 2번의 응답은 상관없음) 과거 자살시도라는 위험요인이 있으므로, 관리 요망			
☐ 응급 상황 : 3번이나 4번 중 하나라도 ‘예’인 경우(1, 2, 5번의 응답은 상관없음) 최근 6개월간 구체적 자살계획과 실행 의도가 있으므로, 응급대처 요망			
조치	☐ 위험성 없음 혹은 낮은 위험 → 교내 상담 인력의 지속적 관찰과 상담		
	☐ 중간위험 → 학부모 연락, 자살예방센터 및 Wee 센터, 정신건강증진센터 등 교육청에서 지정한 전문기관 의뢰		
	☐ 높은위험 → 학부모에게 연락하고, 자살예방센터 또는 전문병원 진료 권유		
	☐ 응급상황 → 학생을 혼자 두지 않고, 안전조치. 부모에게 즉각 알리고 자살예방센터 또는 전문병원 진료 적극 권유		

더 알고보고 싶다면

외상 후 스트레스·우울·불안·
신체증상, 자살위험성 자가진단
(국가트라우마센터)



정신건강 검진 도구 및
사용에 대한 지침
(국립정신건강센터)

