

격리지연시간(Isolation) 시뮬레이션 분석

평균의 관점

- ▶ A, B 두 시기 모두에서 10일 만에 격리실로 이동시키는 경우 환자가 가장 많이 발생
- ▶ 오히려 14일로 지연되는 경우보다 많은 환자가 발생함

중간값의 관점 - 기간 A

- ▶ 격리지연이 3일일 때보다 7일일 때 최종 확진자가 약 48명으로 가장 작은 값
- ▶ 격리지연 10일은 가장 빠르게 환자가 증가
- ▶ 3일과 14일은 큰 차이 없이 비슷한 결과

중간값의 관점 - 기간 B

- ▶ 한 달 만에 모든 경우에서 28명의 환자가 발생하고 이후 추가 환자가 없어 변화 없음
- ▶ (격리실과 일반실 모두 이미 감염되었기 때문에 격리 이동 불가로 추측)

Q1, Q3 범위 - 기간 A

- ▶ 4개월 후 상위 25% 결과(Q3)가 약 30명 발생
- ▶ 격리지연 10일은 상위 25%에서 최종 약 80명까지 발생하며 가장 큰 값
- ▶ 나머지 격리지연은 모두 비슷한 수준

Q1, Q3 범위 - 기간 B

- ▶ Q3 값이 28명 이후 더 이상 증가하지 않는 경우가 절반 이상, Median도 Q3와 같음
- ▶ 상위 25%에서는 최종 약 65명까지 늘어났으며, 격리지연 시간과 무관하게 같은 결과