۱


غذاهای آلرژی‌زا

INTRODUCING ALLERGENS

واکنش غذایی پس از مواجهه با غذا آشکار می‌شود.

ممکن است نخستین بار هنگام معرفی دیده شود.

معرفی ایمن؛ نه حذفِ بی‌دلیل.



۲

نشانه‌های واکنش


REACTION SIGNS

پوست: کهیر، خارش یا ورم لب و صورت

تنفس: سرفهٔ مکرر، خس‌خس یا گرفتگی گلو

گوارش: استفراغ یا دل‌درد؛ بعضی واکنش‌ها دیرتر بروز می‌کنند.

بسیاری از واکنش‌های فوری در چند دقیقه تا چند ساعت آغاز می‌شوند.



۳

چرا بی‌دلیل عقب نیندازیم؟

EARLY INTRODUCTION

تأخیرِ غذاهای آلرژی‌زا، روشِ اثبات‌شدهٔ پیشگیری برای همه نیست.

برای بادام‌زمینی، معرفی به‌موقع و مصرفِ منظم می‌تواند خطر را کم کند.

شواهد برای همهٔ غذاها یکسان نیست؛ پیشگیری کامل هم تضمین نمی‌شود.



۴

زمان شروع و آمادگی


WHEN TO START

غذای کمکی را حدود ۶ ماهگی،
با آمادگی رشدی شروع کنید.

کنترل سر و گردن، نشستن با کمک
و توانایی بلعیدن مهم است.

غذای کمکی پیش از ۴ ماهگی
توصیه نمی‌شود.

اگزمای شدید یا آلرژی به تخم‌مرغ؟
پیش از بادام‌زمینی با پزشک مشورت کنید.



۵

معرفی ایمن


SAFE FEEDING

هر بار یک آلرژن جدید؛ کودک سالم و نشسته باشد.

تخم‌مرغ کاملاً پخته؛ کرهٔ بادام‌زمینی رقیق‌شده در پوره.

مغز کامل یا قاشق غلیظِ کرهٔ مغزها خطرِ خفگی دارد؛ ندهید.

اگر تحمل کرد، در رژیم بماند؛ مصرفِ منظم بادام‌زمینی مهم است.



۶

اگر واکنش دیدیم؟

WHAT TO DO

- کهیر یا ورم؟ غذا را متوقف کنید و با پزشک کودک تماس بگیرید.
- تنگی نفس، تورم زبان یا گلو، بی‌حالی شدید یا چند نشانه با هم؟
- اگر اپی‌نفرین تجویز شده، طبق برنامه استفاده و با اورژانس تماس بگیرید.
- بدون راهنمایی پزشک، در خانه دوباره امتحان نکنید.

