

# 概率论与数理统计

## 第一章 随机事件

1. 概率的性质:
  - (1)  $P(\emptyset) = 0$
  - (2)  $A_i$  两两互斥,  $P(\bigcup A_i) = \sum P(A_i)$
  - (3)  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
  - (4)  $P(B - A) = P(B) - P(A)$
  - (5) (加法公式)  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
2. 加法公式:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ 
  - (1) 互不相容:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
  - (2) 相互独立:  $P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A})P(\bar{B})$
3. 乘法公式:  $P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$ 
  - (1) 相互独立:  $P(AB) = P(A)P(B)$
4. 条件概率公式:  $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$
5. 全概率公式:  $P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$
6. 贝叶斯公式:  $P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A|B_j)}$

## 第二章 随机变量

1. 概率密度函数  $f(x)$ :  $P\{a < X \leq b\} = \int_a^b f(x)dx$
2. 概率分布函数:  $F(x) = P\{X \leq x\}$ 
  - (1) (单调不减性)  $P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$
  - (2) (有界性)  $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$
  - (3)  $F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$
  - (4)  $\sum F(x) = 1$
3.  $F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t)dt$   
 $f(x) = F'(x)$
4. 已知连续性随机变量  $X$  的概率密度  $f_X(x)$ , 求随机变量  $Y = g(X)$  的概率密度  $f_Y(y)$ 
  - (1) 积分转化法  $F_Y(y) = P\{g(X) \leq y\}, f_Y(y) = F'_Y(y)$
  - (2) 单调函数公式法 反函数  $x = h(y)$ 
$$f_Y(y) = \begin{cases} f(h(y)) \cdot |h'(y)|, & a < y < b, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

### 离散型随机变量

1. 两点分布  $X \sim B(1, p)$ 

$P\{X = 1\} = p, P\{X = 0\} = 1 - p$

性质 1  $E(X) = p, D(X) = p(1 - p)$   
 $\hat{p} = \bar{X} = \sum X/n$  是  $p$  的矩估计和极大似然估计
2. 二项分布  $X \sim B(n, p)$  伯努利实验

$b(k; n, p) = P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{(n-k)}$

性质 1  $E(X) = np, D(X) = np(1 - p)$   
性质 2  $X$  可表示成  $n$  个  $X_i \sim B(1, p)$  的独立随机变量  
性质 3 若  $X_i$  相互独立, 且  $X_i \sim B(n_i, p)$ ,  
则  $X = \sum X_i \sim B(n, p)$   
 $\hat{p} = \bar{X}/n = \sum X/(nN)$  是  $p$  的矩估计和极大似然估计
3. 泊松分布  $X \sim P(\lambda)$

$b(k; \lambda) = P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

- 性质 1  $E(X) = \lambda, D(X) = \lambda$
- 性质 2 若  $X_i$  相互独立, 且  $X_i \sim P(\lambda_i)$ , 则  $X = \sum X_i \sim P(\lambda)$
- 性质 3 若  $X_1, X_2$  相互独立, 且  $X_i \sim P(\lambda_i)$ , 则  $X_i | (X_1 + X_2 = n) \sim B(n, \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \lambda_2})$

某医院每天前来就诊的病人数, 某地区一段时间间隔内发生火灾的次数, 一段时间间隔内容器内部细菌数, 某地一年内发生暴雨的次数, 每条床单上的疵点数.

4.  $P\{X \geq x\} = \sum_{r=x}^{\infty} \frac{e^{-r} \lambda^r}{r!}$
5. 当  $n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0$  时,  $b(k; n, p) \approx b(k; \lambda), \lambda = np$

### 连续型随机变量

1. 均匀分布  $X \sim U[a, b]$

$$f(x) = \begin{cases} 1/(b-a), & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

性质1  $E(X) = (a+b)/2, D(X) = (b-a)^2/12$

性质2  $(\forall c, d) a \leq c < d \leq b$ , 有  $P\{c \leq X \leq d\} = \frac{d-c}{b-a}$

性质3  $F(X) \sim U(0, 1)$

2. 指数分布  $X \sim EP(\lambda) \sim e(\lambda^{-1})$  寿命分布

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

性质1  $E(X) = \lambda^{-1}, D(X) = \lambda^{-2}$

性质2 (无记忆性)  $P\{X > x+y | X > y\} = P\{X > x\}$

3. 正态分布  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  高斯分布

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

(1) 标准正态分布:  $X \sim N(0, 1)$

(2) 概率密度:  $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

(3) 分布函数:  $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$

(4)  $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$

(5) 标准正态分布上的  $\alpha$  分位点,  $\Phi(Z_\alpha) = 1 - \alpha$ ,  
 $P\{X > Z_\alpha\} = \int_{Z_\alpha}^{+\infty} \varphi(x) dx = \alpha$

性质1  $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$

性质2  $\sum_{i=1}^n c_i X_i + d \sim N(\sum_{i=1}^n c_i \mu_i + d, \sum_{i=1}^n c_i^2 \sigma_i^2)$

性质3 若  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 则  $Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ ;

若  $X \sim N(0, 1)$ , 则  $Y = \sigma X + \mu \sim N(\mu, \sigma^2)$

性质4  $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

性质5  $P\{a < X < b\} = \Phi(\frac{b-\mu}{\sigma}) - \Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})$

$P\{X < b\} = \Phi(\frac{b-\mu}{\sigma})$

$P\{X > a\} = 1 - \Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})$

某地区成年男性的身高, 某零件长度的测量误差, 半导体器件中的热噪声电流.

### 第三章 随机向量

1.  $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ ,

$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$

(1) 离散型:  $F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$

(2) 连续型:  $F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$

i.  $f(x, y) \geq 0$

ii.  $F(+\infty, +\infty) = 1$

iii.  $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$

iv.  $P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy$

2. 二维均匀分布  $f(x, y) = \begin{cases} 1/d, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

3. 二维正态分布  $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[ \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]}$$

4. 边缘概率分布:

$F_X(x) = F(x, +\infty), F_Y(y) = F(+\infty, y)$

(1) 二维离散型随机向量:  $p_{i\cdot} = \sum_j p_{ij}, p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij}$

(2) 二维连续型随机变量:  $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$   
 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

5. 条件概率密度:  $f_{X|Y}(u|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$

6. 独立性的判断:  $\forall x, y, F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$ ,

对于连续型变量  $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

7.  $Z = X + Y$  的密度:  $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$ ,  
 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$ .

$$(1) \text{ 相互独立: } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx, \\ f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy.$$

8.  $Z = \max\{X, Y\}$  和  $Z = \min\{X, Y\}$  的分布:

$$F_{\max}(z) = F_X(z) \cdot F_Y(z)$$

$$F_{\min}(z) = 1 - (1 - F_X(z)) \cdot (1 - F_Y(z))$$

## 第四章 数字特征

1. 期望  $E(X)$

$$(1) \text{ 离散型: } E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

$$(2) \text{ 连续型: } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

$$(3) E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$

$$\text{性质 1 } E(c) = c$$

$$\text{性质 2 } E(kX) = kE(X)$$

$$\text{性质 3 } E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

$$\text{性质 4 若 } X, Y \text{ 相互独立, 则 } E(XY) = E(X)E(Y)$$

2. 方差  $D(X) = \text{Var}(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$

$$(1) \text{ 离散型: } D(X) = \sum_{i=1}^n [x_i - E(X)]^2 p_i$$

$$(2) \text{ 连续型: } D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx$$

$$(3) \text{ (计算公式) } D(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

$$\text{性质 1 } D(c) = 0, D(X + c) = D(X)$$

$$\text{性质 2 } D(kX) = k^2 D(X), D(-X) = D(X)$$

$$\text{性质 3 } D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y).$$

$$\text{若 } X, Y \text{ 相互独立, 则 } D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$

$$\text{性质 4 若 } X, Y \text{ 相互独立, 则 } D(aX \pm bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y)$$

3. 协方差  $\text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$

$$\text{性质 1 } \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

$$\text{性质 2 } \text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{性质 3 } \text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$$

$$\text{性质 4 (计算公式) } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$\text{性质 5 } \text{Cov}^2(X, Y) \leq D(X)D(Y), \text{ 等号成立 iff } (\exists a, b) Y = aX + b$$

4. 相关系数  $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$

$$(1) |\rho_{XY}| \leq 1$$

$$(2) \text{ 互不相关: } \rho_{XY} = 0$$

5.  $E\{[X - E(X)]^k\}$  称为  $X$  的  $k$  阶中心矩

6. 记  $c_{ij} = \text{Cov}(X_i, Y_j)$ , 称  $C = (c_{ij})_{n \times n}$

为  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  的协方差矩阵

## 第五章 极限定理

1. 切比雪夫不等式:  $\forall \varepsilon > 0,$

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \sigma^2 / \varepsilon^2,$$

$$P\{|X - \mu| < \varepsilon\} \geq 1 - \sigma^2 / \varepsilon^2$$

2. 大数定律:  $X_i$  相互独立,  $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \forall \varepsilon > 0,$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - \mu| < \varepsilon\} = 1.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|n_A/n - p| < \varepsilon\} = 1.$$

3. 独立同分布的中心极限定理:

$$X_i \text{ 相互独立且服从同一分布, 则 } Y_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

$$\text{的分布函数 } F_n(x) = P\{Y_n \leq x\} \text{ 收敛于 } \Phi(x),$$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow \infty} F_n(x) = \Phi(x).$$

4. (棣莫夫-拉普拉斯定理)  $X_i$  相互独立且服从  $B(1, p)$ , 则  $\forall x,$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \Phi(x).$$

## 第六章 样本与统计量

1. 样本均值  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  是  $\mu$  的估计

2. 样本方差  $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$  是  $\sigma^2$  的估计

$$3. \text{ 样本标准差 } S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$4. \text{ 样本原点矩 } A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

$$5. \text{ 样本中心矩 } M_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

$$6. \text{ 样本均值的大样本分布: } \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

$$F(x) \approx \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right),$$

$$P\{|\bar{X} - \mu| \leq c\} \approx 2\Phi\left(\frac{c}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - 1$$

### 正态总体的抽样分布

$$1. \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) = \begin{cases} (\frac{n}{2}-1)(\frac{n}{2}-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1, & n \text{ 为偶数,} \\ (\frac{n}{2}-1)(\frac{n}{2}-2)\cdots \frac{3}{2}\cdot \frac{1}{2}\sqrt{\pi}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

$$2. \chi^2 \text{ 分布 } X \sim \chi_n^2$$

$$X_i \text{ 独立同分布于 } N(0, 1), X = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$\text{性质 1 } E(X^k) = 2^k \frac{\Gamma(\frac{n}{2}+k)}{\Gamma(\frac{n}{2})},$$

$$E(X) = n, D(X) = 2n$$

$$\text{性质 2 若 } X_i \sim \chi_{n_i}^2 \text{ 独立同分布, 则 } \sum_{i=1}^m X_i \sim \chi_n^2,$$

$$\text{其中 } n = \sum_{i=1}^m n_i$$

$$3. \chi_n^2(\alpha) \text{ 为 } \chi_n^2 \text{ 分布上的 } \alpha \text{ 分位点:}$$

$$P\{\chi_n^2 > \chi_n^2(\alpha)\} = \int_{\chi_n^2(\alpha)}^{+\infty} f(x)dx = \alpha$$

$$4. t \text{ 分布 } T \sim t_n \text{ 学生分布}$$

$$X \sim N(0, 1), Y \sim \chi_n^2, T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

$$\text{性质 1 } E(F) = 0, D(F) = n/(n-2), n = 3, 4, \dots$$

$$\text{性质 2 } Y = \frac{F_2 - F_1}{2\sqrt{F_1 F_2/n}} \sim t_n$$

$$\text{性质 3 } \frac{\bar{F} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

$$5. t_n(\alpha) \text{ 为 } t_n \text{ 分布上的 } \alpha \text{ 分位点:}$$

$$P\{T > t_n(\alpha)\} = \int_{t_n(\alpha)}^{+\infty} f(x)dx = \alpha$$

$$6. (\text{基本定理}) \text{ 样本 } X_i \text{ 来自正态总体 } N(\mu, \sigma^2)$$

$$(1) \bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$$

$$(2) (n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi_{n-1}^2$$

$$(3) \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立}$$

$$(4) \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

## 第七章 参数估计

$$1. \text{ 矩估计: } \alpha_m = E(X^m), A_m = \sum X_i^m, \alpha_m(\theta_i) = A_m$$

$$(1) \text{ 正态分布: } \hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$(2) \text{ 均匀分布: } \hat{a} = \bar{X} - \sqrt{3}\hat{\sigma}, \hat{b} = \bar{X} + \sqrt{3}\hat{\sigma}$$

$$2. \text{ 极大似然估计: } L(x_i; \theta_j) = \prod f(x_i, \theta_j),$$

$$\ln L(\theta) = \sum \ln f(x_i; \theta_j), \frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_i} = 0$$

$$(1) \text{ 正态分布: } \mu^* = \bar{X}, \sigma^{2*} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$(2) \text{ 泊松分布: } \lambda^* = \bar{X}$$

$$(3) \text{ 均匀分布: } a^* = \min\{X_i\}, b^* = \max\{X_i\}$$

$$3. \text{ 无偏估计: } E[\hat{\theta}(X_i)] = \theta$$

$$(1) E(\bar{X}) = \mu$$

$$(2) E(S^2) = \sigma^2$$

$$(3) S \text{ 不是 } \sigma \text{ 的无偏估计}$$

$$4. \text{ 均方误差: } \text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = D(\hat{\theta}) + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2$$

$$(1) \text{ 无偏估计: } \text{MSE}(\hat{\theta}) = D(\hat{\theta})$$

$$(2) \text{ 两个估计中哪个方差小, 哪个优}$$

$$5. P\{\theta \in [\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]\} \geq 1 - \alpha$$

$$\text{置信区间 } [\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2], \text{ 置信系数 } 1 - \alpha$$

$$6. X_i \sim N(\mu, \sigma^2), \text{ 置信系数为 } 1 - \alpha$$

$$(1) \mu \text{ 的置信区间: } [\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\frac{\alpha}{2}}]$$

$$\sigma^2 \text{ 未知时: } [\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1}(\frac{\alpha}{2}), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1}(\frac{\alpha}{2})]$$

$$(2) \sigma^2 \text{ 的置信区间: } [\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1}^2(\frac{\alpha}{2})}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1}^2(1-\frac{\alpha}{2})}]$$

7.  $X_i \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y_i \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$  互相独立
- (1)  $\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n)$ ,  
或  $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n}} \sim N(0, 1)$
- (2)  $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S\sqrt{1/m + 1/n}} \sim t_{m+n-2}$ ,  
其中  $S^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$
- (3)  $\mu_1 - \mu_2$  的置信区间:  $[\bar{X} - \bar{Y} \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}]$   
 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ :  $[\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{m+n-2}(\frac{\alpha}{2}) S \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}]$
8. 大样本参数  $\mu$  的置信区间:  $[\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\frac{\alpha}{2}}]$
9. 二项分布参数  $p$  的置信区间:  $[\hat{p} \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}]$ ,  
其中  $\hat{p} = Y_n/n = \sum_{i=1}^n X_i/n$
10. 泊松分布参数  $\lambda$  的置信区间:  $[\bar{X} \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\bar{X}/n}]$

## 第八章 假设检验

1. 检验  $H_0$  有可能犯的两类错误
- (1) 第一类错误“弃真”错误:  $H_0$  正确但是被拒绝了
- (2) 第二类错误“采伪”错误:  $H_0$  错误但是被接受了
2. 检验的显著性水平:  $P\{\text{犯第一类错误}\} \leq \alpha \in (0, 1)$

### 1. 正态总体均值的检验

1. 单个正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  均值  $\mu$  的检验
- (1)  $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$   
i. 拒绝域:  $\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq Z_{\frac{\alpha}{2}}$   
ii. 拒绝域:  $\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{S/\sqrt{n}} \geq t_{n-1}(\frac{\alpha}{2})$
- (2)  $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$   
i. 拒绝域:  $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \geq t_{n-1}(\alpha)$
2. 两个正态总体  $N(\mu_1, \sigma_1^2)$  和  $N(\mu_2, \sigma_2^2)$  均值的比较
- (1)  $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$   
i. 拒绝域:  $|\bar{X} - \bar{Y}| \geq Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n}$   
ii. 拒绝域:  $|\bar{X} - \bar{Y}| \geq t_{m+n-2}(\frac{\alpha}{2}) \sqrt{\frac{m+n}{mn}} S$
- (2)  $H'_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0 \leftrightarrow H'_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$   
i. 拒绝域:  $\bar{X} - \bar{Y} \leq -t_{m+n-2}(\alpha) \sqrt{\frac{m+n}{mn}} S$
- (3)  $H''_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 0 \leftrightarrow H''_1: \mu_1 - \mu_2 > 0$   
i. 拒绝域:  $\bar{X} - \bar{Y} \geq t_{m+n-2}(\alpha) \sqrt{\frac{m+n}{mn}} S$
3. 成对数据的  $t$  检验
- (1)  $H_0: \mu = 0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 0, d_i = X_i - Y_i$   
i. 拒绝域:  $|\bar{d}| \geq t_{n-1}(\frac{\alpha}{2}) \frac{S_d}{\sqrt{n}}$

### 2. 正态总体方差的检验

1. 单个正态总体方差的  $\chi^2$  检验
- (1)  $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$   
i. 拒绝域:  $(n-1)S^2/\sigma_0^2 \leq \chi_{n-1}^2(1-\frac{\alpha}{2})$   
ii. 拒绝域:  $(n-1)S^2/\sigma_0^2 \geq \chi_{n-1}^2(\frac{\alpha}{2})$
- (2)  $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$   
i. 拒绝域:  $(n-1)S^2/\sigma_0^2 \geq \chi_{n-1}^2(\alpha)$

### 3. 拟合优度检验

1.  $H_0$ : 样本  $X_i$  的总体分布为  $F(x)$
- (1) 把  $(-\infty, +\infty)$  分割为  $k$  个区间:  
 $I_1 = (a_0, a_1], \dots, I_k = (a_{k-1}, a_k)$
- (2) 计算每个区间的实际频数  $f_i$
- (3) 计算理论频数  $p_i(\theta) = F(a_i, \theta) - F(a_{i-1}, \theta)$
- (4) 计算偏差平方和  $\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{[f_i - np_i(\theta^*)]^2}{np_i(\theta^*)}$
- (5) 假设  $H_0$  的水平  $\alpha$  的检验拒绝域为  $\chi^2 \geq \chi_{k-r-1}^2(\alpha)$

### 4. 独立性检验

1.  $H_0: p_{ij} = p_{i \cdot} p_{\cdot j}$
- (1) 拒绝域:  $\chi^2 \geq \chi_{(a-1)(b-1)}^2(\alpha)$ ,  
其中  $\chi^2 = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \frac{(nn_{ij} - n_{i \cdot} n_{\cdot j})^2}{n_{ij} n_{i \cdot} n_{\cdot j}}$

## 第九章 回归分析

1. 一元线性回归模型  $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + e_i$
- 性质 1  $E(\hat{\beta}_0) = \beta_0, E(\hat{\beta}_1) = \beta_1$  为无偏估计

性质2 假设  $e_i \sim N(0, \sigma^2)$ ,  $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2$ , 则

$$\hat{\beta}_0 \sim N(\beta_0, (1/n + \bar{x}^2/S_{xx})\sigma^2),$$

$$\hat{\beta}_1 \sim N(\beta_1, \sigma^2/S_{xx}).$$

2. 高斯-马尔可夫假设:  $E(e_i) = 0, D(e_i) = \sigma^2, \text{Cov}(e_i, e_j) = 0$

$$3. L_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2,$$

$$L_{xy} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y},$$

$$L_{yy} = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2.$$

$$4. \text{最小二乘估计} \begin{cases} \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}, \\ \hat{b} = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2} = \frac{L_{xy}}{L_{xx}}. \end{cases}$$

5. 经验回归直线方程  $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$

6. 残差  $\hat{e}_i = y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i)$

$$7. \hat{\sigma}^2 = \sum \hat{e}_i^2 / (n - 2)$$

(1)  $\hat{\sigma}^2$  是  $\sigma^2$  的无偏估计

(2)  $(n - 2)\hat{\sigma}^2 / \sigma^2 \sim \chi_{n-2}^2$ , 且  $\hat{\sigma}^2$  与  $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$  相互独立

8. 回归方程的显著性检验

(1)  $H_0: \beta_1 = 0 \leftrightarrow H_1: \beta_1 \neq 0$

i. 拒绝域:  $r = \frac{L_{xy}}{\sqrt{L_{xx}L_{yy}}} \geq r_{\alpha=0.01}(n - 2)$

ii. 拒绝域:  $|T| = \left| \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\sigma}/\sqrt{S_{xx}}} \right| \geq t_{n-2}(\frac{\alpha}{2})$

iii. 拒绝域:  $F = \frac{\hat{\beta}_1^2}{\hat{\sigma}^2/S_{xx}} \geq F_{1, n-2}$

$$9. \text{判定系数/确定系数 } R^2 = \frac{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

$$(1) \text{回归平方和 } SS_{\text{回}} = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

$$(2) \text{总平方和 } SS_{\text{总}} = \sum (y_i - \bar{y})^2$$

$$(3) \text{误差平方和 } SS_{\text{误}} = \sum \hat{e}_i^2 = SS_{\text{回}} - SS_{\text{总}}$$

$$10. \text{回归参数的区间估计 } \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_0} = \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}} \hat{\sigma}, \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{xx}}}.$$

$$\beta_i \text{ 的置信区间: } [\hat{\beta}_i \pm t_{n-2}(\frac{\alpha}{2}) \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_i}]$$

## 常用结论

1. 人群中有相同生日:  $P(A) = \frac{A_N^n}{N^n}$

2. 把  $n$  个物品分成  $k$  组, 每组恰有  $n_i$  个, 不同分组方法  $\frac{n!}{\prod_{i=1}^k n_i!}$  种

3. 将  $n$  个球放入  $M$  个盒子, 有球的盒子数  $E(X) = M \left[ 1 - (1 - \frac{1}{M})^n \right]$

## 4. 基本积分表

$$(1) \int k dx = kx + C$$

$$(2) \int x^\mu dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C$$

$$(3) \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

$$(4) \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$$

$$(5) \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

$$(6) \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$(7) \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$(8) \int e^x dx = e^x + C$$

$$(9) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

## 5. 微分法则

$$d(u \pm v) = du \pm dv$$

$$d(Cu) = Cdu$$

$$d(uv) = vdu + u dv$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2}$$

## 6. 积分换元法

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = [\int f(u)du]_{u=\varphi(x)}$$

$$\int f(x)dx = [f[\psi(t)]\psi'(t)dt]_{t=\psi^{-1}(x)}$$

## 7. 二重积分的计算

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$$

# 离散数学

## 第一章 数理逻辑

### 1. 逻辑表达式

- 0 0000<sub>2</sub> **F** 永假公式(矛盾式)
- 1 0001<sub>2</sub>  $A \wedge B$  合取;  $A \cdot B, AB$  与  $A \cap B$  交集
- 2 0010<sub>2</sub>  $A \overset{c}{\rightarrow} B$  逆条件;  $A \wedge \neg B$   $A - B, A \setminus B$  差集
- 3 0011<sub>2</sub>  $A$
- 4 0100<sub>2</sub>  $B \overset{c}{\rightarrow} A$  逆条件;  $\neg A \wedge B$
- 5 0101<sub>2</sub>  $B$
- 6 0110<sub>2</sub>  $A \vee B$  不可兼或取;  $A \oplus B$  异或  $A \oplus B$  对称差
- 7 0111<sub>2</sub>  $A \vee B$  析取;  $A + B$  或  $A \cup B$  并集
- 8 1000<sub>2</sub>  $A \downarrow B$  或非;  $\neg(A \vee B)$
- 9 1001<sub>2</sub>  $A \leftrightarrow B, A \rightleftharpoons B$  双条件;  $A \odot B$  同或; iff
- 10 1010<sub>2</sub>  $\neg B$  非
- 11 1011<sub>2</sub>  $B \rightarrow A$  条件;  $A \vee \neg B$
- 12 1100<sub>2</sub>  $\neg A$  非  $\sim A, \overline{A}, A^c, A'$  补集
- 13 1101<sub>2</sub>  $A \rightarrow B$  条件;  $\neg A \vee B$
- 14 1110<sub>2</sub>  $A \uparrow B$  与非;  $\neg(A \wedge B)$
- 15 1111<sub>2</sub> **T** 永真公式(重言式)

2. 布尔合取(小项):  $m_i \wedge m_j = \mathbf{F}, \sum_{i=0}^{2^n-1} m_i = \bigvee m_i \Leftrightarrow \mathbf{T}$   
 布尔析取(大项):  $M_i \vee M_j = \mathbf{T}, \prod_{i=0}^{2^n-1} M_i = \bigwedge M_i \Leftrightarrow \mathbf{F}$

### 3. 证明方法

- P规则 前提引入 P, P(附加前提)
- T规则 结论引用 T(i)E, T(i)I
- CP规则 由  $(S \wedge R) \Rightarrow C$ , 证得  $S \Rightarrow (R \rightarrow C)$  CP
- US规则 全称指定规则  $(\forall x)P(x), \therefore P(c)$  US(i)
- UG规则 全称推广规则  $P(c), \therefore (\forall x)P(x)$  UG(i)
- ES规则 存在指定规则  $(\exists x)P(x), \therefore P(c)$  ES(i)
- EG规则 存在推广规则  $P(x), \therefore (\exists x)P(x)$  EG(i)

### 4. 常用蕴含式

- $I_1 P \wedge Q \Rightarrow P$
- $I_2 P \wedge Q \Rightarrow Q$
- $I_3 P \Rightarrow P \vee Q$
- $I_4 Q \Rightarrow P \vee Q$
- $I_5 \neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$
- $I_6 Q \Rightarrow P \rightarrow Q$
- $I_7 \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$
- $I_8 \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$
- $I_9 P, Q \Rightarrow P \wedge Q$
- $I_{10} \neg P, P \vee Q \Rightarrow Q$
- $I_{11} P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$
- $I_{12} \neg Q, P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$
- $I_{13} P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \Rightarrow P \rightarrow R$
- $I_{14} P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R \Rightarrow R$
- $I_{15} A \rightarrow B \Rightarrow (A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$
- $I_{16} A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$
- $I_{17} (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x))$
- $I_{18} (\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$
- $I_{19} (\exists x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$

### 5. 常用等价式(改换符号可得集合的运算律)

- $E_1$  (对合律)  $\neg\neg P \Leftrightarrow P$
- $E_2$  (交换律)  $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$
- $E_3$  (交换律)  $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$
- $E_4$  (结合律)  $(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$
- $E_5$  (结合律)  $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$
- $E_6$  (分配律)  $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
- $E_7$  (分配律)  $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
- $E_8$  (德摩根律)  $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$
- $E_9$  (德摩根律)  $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
- $E_{10}$  (幂等律)  $P \vee P \Leftrightarrow P$
- $E_{11}$  (幂等律)  $P \wedge P \Leftrightarrow P$
- $E_{12}$  (同一律)  $R \vee (P \wedge \neg P) \Leftrightarrow R$

- $E_{13}$  (同一律)  $R \wedge (P \vee \neg P) \Leftrightarrow R$   
 $E_{14}$  (零律)  $R \vee (P \vee \neg P) \Leftrightarrow \mathbf{T}$   
 $E_{15}$  (零律)  $R \wedge (P \wedge \neg P) \Leftrightarrow \mathbf{F}$   
 $E_{16}$   $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \wedge Q$   
 $E_{17}$   $\neg(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$   
 $E_{18}$   $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$   
 $E_{19}$   $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$   
 $E_{20}$   $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$   
 $E_{21}$   $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge (\neg P \wedge \neg Q)$   
 $E_{22}$   $\neg(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow P \leftrightarrow \neg Q$   
 $E_{23}$   $(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$   
 $E_{24}$   $(\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x)$   
 $E_{25}$   $\neg(\exists x)A(x) \Leftrightarrow (\forall x)\neg A(x)$   
 $E_{26}$   $\neg(\forall x)A(x) \Leftrightarrow (\exists x)\neg A(x)$   
 $E_{27}$   $(\forall x)(A \vee B(x)) \Leftrightarrow A \vee (\forall x)B(x)$   
 $E_{28}$   $(\exists x)(A \wedge B(x)) \Leftrightarrow A \wedge (\exists x)B(x)$   
 $E_{29}$   $(\exists x)(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \rightarrow (\exists x)B(x)$   
 $E_{30}$   $(\forall x)A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow (\exists x)(A(x) \rightarrow B)$   
 $E_{31}$   $(\exists x)A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow (\forall x)(A(x) \rightarrow B)$   
 $E_{32}$   $A \rightarrow (\forall x)B(x) \Leftrightarrow (\forall x)(A \rightarrow B(x))$   
 $E_{33}$   $A \rightarrow (\exists x)B(x) \Leftrightarrow (\exists x)(A \rightarrow B(x))$

## 第二章 集合论

- 幂集  $\mathcal{P}(A) = \{X | X \subseteq A\}$ ,  $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ .
- 序偶  $\langle x, y \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \{\{x\}, \{x, y\}\}$ ,  $\langle x, y, z \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ .
- 笛卡尔积(直积):  $A \times B = \{\langle u, v \rangle | u \in A \wedge v \in B\}$ .
  - $A^n = A \times A \times \cdots \times A$
  - $A \times \emptyset = \emptyset$ ,  $\emptyset \times A = \emptyset$
  - $A \times B \neq B \times A$ ,  $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$
  - $*$   $\stackrel{\text{def}}{=} \cup, \cap, -$ ,  
 左分配  $A \times (B * C) = (A \times B) * (A \times C)$   
 右分配  $(B * C) \times A = (B \times A) * (C \times A)$
  - $A \subseteq B \Leftrightarrow A \times C \subseteq B \times C \Leftrightarrow C \times A \subseteq C \times B$
  - $A \times B \subseteq C \times D \Leftrightarrow A \subseteq C, B \subseteq D$
- 覆盖  $\bigcup S_i = A$ ; 划分  $\bigcup S_i = A$ , 且  $S_i \cap S_j = \emptyset$ .
- 鸽笼原理: 把  $n$  个物体放入  $m$  个盒子, 则至少有一个盒子里有  $\lceil n/m \rceil$  个物体.
- 容斥原理(加法原理):  $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ ,  
 $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|$ .
- 关系  $xRy \stackrel{\text{def}}{=} \langle x, y \rangle \in R$ . 恒等关系  $I_A = \{\langle x, x \rangle | x \in A\}$ .
- 定义域  $\text{dom } R$ , 值域  $\text{ran } R$ , 域  $\text{FLD } R = \text{dom } R \cup \text{ran } R$ .
- 逆关系  $R^c = \{\langle b, a \rangle | \langle a, b \rangle \in R\}$ ,  $\langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in R^c$ .
- 复合关系  $R_1 \circ R_2$ ,  $R^{(m)} = R \circ \cdots \circ R$ .  
 $c_{ij} = \bigvee_{k=1}^n (a_{ik} \wedge b_{kj})$ .  $(R_1 \circ R_2)^c = R_1^c \circ R_2^c$ .
- 关系的基本类型
 

<p>自反 iff <math>I_A \subseteq R \Leftrightarrow r(R) = R</math></p> <p><math>\Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow xRx)</math></p> <p><math>\Leftrightarrow M_R</math> 的主对角元全为 1</p> <p><math>\Leftrightarrow G_R</math> 每一结点有自回路</p>	如 $\cong$
<p>对称 iff <math>R^c = R \Leftrightarrow s(R) = R</math></p> <p><math>\Leftrightarrow (\forall x, y)(x, y \in A \wedge xRy \rightarrow yRx)</math></p> <p><math>\Leftrightarrow M_R</math> 是对称矩阵</p> <p><math>\Leftrightarrow G_R</math> 有向边成对出现</p>	如 $=$ , 等势, 同余
<p>传递 iff <math>R \circ R \subseteq R \Leftrightarrow t(R) = R</math> 如 <math>=, &lt;, \leq, \subset, \subseteq</math>, 整除, 等势, 同余</p> <p><math>\Leftrightarrow (\forall x, y, z)(x, y, z \in A \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)</math></p> <p><math>\Leftrightarrow G_R</math> 若从 <math>a</math> 到 <math>b</math> 有一条路径, 则从 <math>a</math> 到 <math>b</math> 有一条弧</p>	
<p>反自反 iff <math>R \cap I_A = \emptyset</math></p> <p><math>\Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow \neg xRx)</math></p> <p><math>\Leftrightarrow M_R</math> 的主对角元全为 0</p> <p><math>\Leftrightarrow G_R</math> 每一结点无自回路</p>	如 $<, >$
<p>反对称 iff <math>R \cap R^c \subseteq I_A</math></p> <p><math>\Leftrightarrow (\forall x, y)(x, y \in A \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x = y)</math></p> <p><math>\Leftrightarrow M_R</math> 中 <math>i \neq j \wedge (a_{ij} = 1) \rightarrow (a_{ji} = 0)</math></p> <p><math>\Leftrightarrow G_R</math> 若从 <math>a</math> 到 <math>b</math> 有一条弧, 则必无 <math>b</math> 到 <math>a</math> 的弧</p>	如 $\leq, \subseteq$



12. 关系的闭包运算和构造闭包的方法
  - (1) 自反闭包  $r(R) = R \cup I_A$ ,  
 $M_r = M + I$ ;
  - (2) 对称闭包  $s(R) = R \cup R^c$ ,  
 $M_s = M + M^T$ ;
  - (3) 传递闭包  $t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i \stackrel{\text{def}}{=} R^+$ ,  
 $M_t = M + M^2 + M^3 + \cdots$ ,  
Warshall-Floyd 算法:  $A[i, j] \leftarrow A[i, k] + A[k, j]$ .
13.
  - (1)  $rs(R) = sr(R)$ ;
  - (2)  $rt(R) = tr(R)$ ;
  - (3)  $st(R) \subseteq ts(R)$ .
14. 等价关系  $R$ : 自反、对称、传递.
  - (1) 等价类:  $[a]_R = \{x | x \in A \wedge aRx\}$ .  $aRb \Leftrightarrow [a]_R = [b]_R$ .
  - (2) 商集  $A/R = \{[a]_R | a \in A\}$ .  $R_1 = R_2$  iff  $A/R_1 = A/R_2$ .
  - (3) 一个等价关系确定一个划分, 一个划分确定一个等价关系.
15. 相容关系  $r$ : 自反、对称.
  - (1) 相容类:  $a_1ra_2$ .
  - (2) 最大相容类:  $(\forall C)C \subseteq C_r$ .
  - (3) 完全覆盖:  $C_r(A)$ .
  - (4) 覆盖  $\{A_i\}$  确定的关系  $r = \bigcup A_i \times A_i$  是相容关系.
16. 偏序关系  $\preceq$ : 自反、反对称且传递; 偏序集  $\langle A, \preceq \rangle$ .
17. 哈斯图: 表达盖住关系.  $\text{COV } A = \{\langle x, y \rangle | x, y \in A;$   
 $x \preceq y, x \neq y; (z \in A)(x \preceq z \preceq y)\}$
18.
  - (1) 极大元  $b$ :  $(\forall x \in B)(b \preceq x \rightarrow x = b)$ . 最末端的元素;
  - (2) 极小元  $b$ :  $(\forall x \in B)(x \preceq b \rightarrow x = b)$ . 最底层的元素.
19.
  - (1) 最大元  $b$ :  $(\forall x)(x \in B \rightarrow x \preceq b)$ ;
  - (2) 最小元  $b$ :  $(\forall x)(x \in B \rightarrow b \preceq x)$ .
20. 设  $\langle A, \preceq \rangle, B \subseteq A, a \in A$ :
  - (1) 上界  $a$ :  $(\forall x)(x \in B \rightarrow x \preceq a)$ , 上确界  $\text{LUB } B = \{a\}$ ;
  - (2) 下界  $b$ :  $(\forall x)(x \in B \rightarrow b \preceq x)$ , 下确界  $\text{GLB } B = \{b\}$ .
21. 良序: 每一非空子集总含有最小元. 良序集合:  $\langle A, \preceq \rangle$ .  
良序集合一定是全序集合, 有限全序集合一定是良序集合.

### 第三章 图论

1.