

KORONÁRNÍ TROMBÓZA U DOSPĚLÝCH

1. Předcházejte a buďte připraveni



Podporujte kardiovaskulární prevenci, abyste snížili riziko akutních koronárních příhod



Zlepšete zdravotní výchovu k rozpoznání příznaků a školení KPR pro potenciální zachránce



Posilujte regionální síť katetizačních sálů k zajištění včasné PCI

2. Rozpoznejte a jednejte



Vyhodnoťte 12svodové EKG po ROSC; pokud není průkazné, opakujte jej



Vyhodnoťte klinické příznaky naznačující akutní koronární syndrom



Aktivujte katetizační sál a transportujte pacienta do PCI centra, pokud je na EKG elevace úseku ST nebo trvá ischemie

3. Resuscitujte a stanovte reperfuční strategii

Pacienti se setrvalým ROSC

S elevací úseku ST

Je PCI možná do 120 min.?

Ano

Okamžitá koronarografie ± PCI

Ne

Zvažte podání fibrinolýzy, pokud není kontraindikována, a převoz do centra pro PCI

Bez elevací úseku ST

Je pacient nestabilní nebo vykazuje známky pokračující ischemie?

Ano

Okamžitá koronarografie ± PCI

Ne

Zvažte vyloučení nekoronárních příčin

Zvažte odložení koronarografie ± PCI

Bez setrvalého ROSC

Naznačují okolnosti OHCA pravděpodobnou marnost/neúčinnost péče?

Ano

Zvažte ukončení KPR

Ne

Zvažte převoz do PCI centra za pokračující KPR

↓
Zvažte mechanickou KPR

↓
Zvažte ECPR