

I. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES OBJET DE RESTRICTION

1. INSECTICIDES

(IMPORTATION UNIQUEMENT POUR LES CAMPAGNES NATIONALES)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	USAGE
01	Clorpyrifosethyl&metyl	-	-	Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les campagnes nationales(date d'effet:22/12/2023)
02	Diméthoate	400 g/L	EC	Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les campagnes nationales(Oliviers,..)(date d'effet:13/07/2023)
03	Imidaclopride	200 g/L	SL/OD	Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les campagnes nationales(charançon rouge,..)(date d'effet:13/07/2023)
04	Malathion	95%	ULV	Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les campagnes nationales(Agrumes,..)(date d'effet:13/07/2023)
		500 g/L	EC	

2. INSECTICIDES HOMOLOGUES STRICTEMENT REGLEMENTES

(UTILISATION UNIQUEMENT POUR LES TRAITEMENTS DES SEMENCES)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	Imidacloprid+Tebuconazole	210 g/l+12 g/l	FS	GIZMO SUPER FS	F.018-18	AGRIPROTEC	NUFARM	Blé : Carie & charbon, Fusariose: 250 cc/qt Traitement des semences (Traitement des semences; Nbre de traitement : 1 calendrier des applications : avant semis;(COMM 18/10/2018) Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les Traitement des semences (date d'effet:13/07/2023)
02	Thiamethoxam	350 g/L	FS	ADAGE 350FS	I.013-18	SOLAGRI	SYNGENTA	P.de terre : Insectes du sol : 20 ml/100 Kg de semences(Trempage) Blés : Insectes du sol : 100 ml + 600 à 800 ml d'eau/Quintal de semences (Enrobage) (COMM18/10/2018) Restriction d'usage:Utilisation uniquement pour les traitements des semences(date d'effet 13/07/2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 1 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
03	Thiametoxam	350 g/L	FS	Cruiser 350 FS	I.124-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	P.de terre : Insectes du sol : 20 ml/100 Kg de semences (Trempage) Blés : Insectes du sol : 100 ml + 600 à 800 ml d'eau/Quintal de semences (Enrobage) Restriction d'usage:Utilisation uniquement pour les traitements des semences(date d'effet 13/07/2023)
04	Difenoconazole + Fludioxonil +Thiamethoxam	25g/l + 25 g/l + 262.5 g/l	FS	CelestTop 312.5	126-11/21 F.	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Semences de blé : Maladies transmissibles par semences de Blés (Carie, Charbon, Septoriose, Fusarium) : 150 ml+ 600à800ml d'eau/quintal. Semences de céréales : Traitement de semences : protection foliaire contre les pucerons la dose de 150 ml + 600à800ml d'eau/quintal. Restriction d'usage:Utilisation uniquement pour les traitements des semences(date d'effet 13/07/2023)
05	Difenoconazole + Metalaxyl –M + Thiamethoxam	20 g/kg+200 g/kg+200g/kg	WS	APRON STAR WS	FI.028-22	COTUGRAIN	SYNGENTA	Semences des féveroles: Anthracnose, Pythium, Fusarium spp, Mildiou, Ver blanc, Bruches:250 g/100 kg de semences par enrobage. (COMM 08/06/22) Restriction d'usage:Utilisation uniquement pour les traitements des semences(date d'effet 13/07/2023)

3. FONGICIDES

(IMPORTATION UNIQUEMENT POUR LES CAMPAGNES NATIONALES)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	USAGE
01	Mancozèbe	80%	WP	Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les campagnes nationales(CBS Agrumes,...)(date d'effet:13/07/2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 2 sur 122

4. FONGICIDES HOMOLOGUES STRICTEMENT REGLEMENTES (UTILISATION UNIQUEMENT POUR LES LEGUMINEUSES)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	Chlorothalonil	720 g/l	SC	Morfus 720 SC	F.014-14/24	SANABEL AGRO	ROTAM AGROCHEMIC AL(rivale)	Fève : Anthracnose : 200 cc/hl; Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses (date d'effet:13/07/2023) (comm 22 mai 2024)
02	Chlorothalonil	500g/l	SC	AVOCA	F.004-20	RAYEN AGRICOLE	Barclay chemicals(R&D) Ltd.	Féverole :Anthracnose(Aschochytafabae): 3L/ha (300 l/ha) (COMM13//02/2020) Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses (date d'effet:13/07/2023)
03	Chlorothalonil	720 g/L	SC	Banko 720 SC	F.013-11/21	BIOPROTECTION	UPL/ARYSTA LIFESCIENCE	Fèves : Anthracnose : 200 cc/hl Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses (date d'effet:13/07/2023)
04	Chlorothalonil	720 g/L	SC	TERRAVO	F.010-20	SOLAGRI	SYNGENTA	Fèves : Anthracnose : 200 cc/hl Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses (date d'effet:13/07/2023)
05	Chlorothalonil +Tebuconazole	250 g/l+90 g/l	SC	Timpani	F.017-15	EL MOUSSEM AGRICOLE	NUFARM	Féverole :Rouille, Anthracnose :1.5 l/ha Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses (date d'effet:13/07/2023)
06	Chlorothalonil +Tebuconazole	250 g/l+90 g/l	SC	SUPER PLAZMA SC	F.55-21	AGRIPROTEC	NUFARM	Féverole : Rouille, Anthracnose : 1.5 l/ha (COMM09/02/21) Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses (date d'effet:13/07/2023)
07	Tébuconazole +Chlorothalonil	125 g/l+375 g/l	SC	CIGAL PLUS SC	F.008-18	SANABEL AGRO	RotamAgrochemi calCo.Ltd	Féverole: Rouille : 1 l/ha (Pulvérisation foliaire; Préventif et curatif;300 l de bouillie/ha (COMM 18/10/2018) Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses (date d'effet:13/07/2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 3 sur 122

LISTE DES PRODUITS PESTICIDES A USAGE AGRICOLE HOMOLOGUES

Version actualisée 22 mai 2024

* = *

I. INSECTICIDES

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N° .H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	Abamectine	18 g/L	EC	Numectin	I.A.009-16	AGRIPROTEC	NUFARM	Agrumes :Acariens : 60cc/hl
02	Abamectine	18 g/L	EC	LAOTTA	03-24.I	ATLAS AGRICOLE	LAINCO	Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :60 cc/hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
03	Abamectine	84 g/L	SC	Agrimec Gold 084 SC	I.A.129-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Agrumes :mineuse: 15 cc/hl (pas moins de 125 cc/ha) + 400 cc huile/hl; Agrumes : Acariens:15 cc/hl (pas moins de 125 cc/ha); Poirrier : Psylle : 20 cc/ hl ; Pommiers : Acariens:15 cc/hl (pas moins de 125 cc/ha) Palmier dattier:Acariens des dattes(Oligonychusafrasiaticus):15 ml/hl en Traitement curatif (APV ; COMM 08/06/22)
04	Abamectine	20g/l	SC	TERVIGO 020 SC	IN.001-19	BIOPROTECTION	Syngenta Crop Protection AG	Tomate : Nématode "Meloidogynespp": 2 App au sol par saison (2*4 l/ha); Melon :Nématode "Meloidogynespp": 2 App au sol par saison (2*3 l/ha)I;(COMM 23/04/2019)
05	Abamectine	18g/l	EC	VALMEC EC	I.004-19	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAU GH EUROPE SARL	Tomate : Acariens "Tetranychus urticae":75 cc/hl -Pulvérisation foliaire (action : translaminaire) : dès la détection du parasite sur feuilles -2ème application après 02 semaines - Effet d'écotoxicité inacceptable pour le prédateur Phytoseiuluspersimilis Agrumes :Mineuses des feuilles:40 cc +400cc huile d'été/hl -Pulvérisation foliaire : deux app espacées de 15 à 21j pour obtenir une meilleure efficacité L'efficacité de produit s'étale sur 7 à 10 jours (COMM 23/04/2019) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :75 cc/Hl

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 4 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
06	Abamectine	18 g/l	EC	ROMECTIN EC	I.02-21	AGRONOMIC LAND	ROTAM CHEMISTRY CO.,Ltd	Agrumes :Acariens(TetranychusUrticae) : 25 ml/100 l -Pulverisation foliaire -le produit présente un effet toxique significatif sur les prédateurs respectivement aux 14ème et 21ème jours après traitement.(COMM09/02/21)
07	Abamectine	18 g/l	EC	VARGAS ULTRA EC	I.51-23	SOLAGRI	ROTAM CHEMISTRY CO.,Ltd/ALBAUG H	Agrumes :Acariens(TetranychusUrticae) : 25 ml/100 l -Pulverisation foliaire -le produit présente un effet toxique significatif sur les prédateurs respectivement aux 14ème et 21ème jours après traitement.(COMM09/02/21)'COMM28 dec2023)
08	Abamectine	18 g/l	EC	Vertimec	IA.003-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Tomate et Pommier : Acariens 75 cc/hl + Mouillant Fraisier : Acariens: 75 cc/hl Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Palmier dattier :Acariens des dattes(Oligonychusafrasiaticus):60 ml/hl en Traitement curatif (COMM 08/06/22)
09	Abamectine	18 g/L	EW	Diva 1.8 EW	I.A.002-15	EL MOUSSEM AGRICOLE	CHEMINOVA	Pommier : Acariens : 75 cc/hl Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasiticus " :60 cc/Hl Nbre max de traitement: 03 Période de traitement: curatif Calendrier des applications: début d'attaque des formes mobiles d'acariens avec intervalle de 7 à 10 jours Pas plus de 2 traitements consécutifs Alternier avec des acaricides appartenant à des familles chimiques différentes Persistance d'action:3-6 semaines DAR:14 jours LMR:0.01 AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 5 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								(COMM 22/02/2024)
10	Abamectine	18 g/l	EC	ACTROSE 18 EC	I.015-18	Ets MEZGHANI	ASTRACHEM	Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl (COMM 18/10/2018)
11	Abamectine	18 g/l	EC	TINA EC	IA.005-11/21	ETS MEZGHANI	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl(COMM 18/10/2018)
12	Abamectine	18 g/l	EC	MECTINE PRO	I.006-17	JADWA AGROTEC	AAKO BV	Poirier : Psylle : 75 cc/hl; Agrumes : Acariens : 60 cc/hl; Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl (COMM 20/06/2017)
13	Abamectine	18 g/l	EC	Potenza 1.8	IA.007-11/21	SANABEL AGRO	SINON CORPORATION	Poirier : Psylle : 75 cc/hl; Agrumes : Acariens : 60 cc/hl; Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl; Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :60ml/Hl AUTORISATION PROVISoire DE VENTE (COMM 22/02/2024)
14	Abamectine	18 g/l	EC	Aakomectine	IA.009-11/21	STEC	AAKO BV	Poirier : Psylle : 75 cc/hl; Agrumes : Acariens : 60 cc/hl; Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl; Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl
15	Abamectine	18 g/l	EC	Transact 18 EC	IA.161-11/21	TASMID	ASTRACHEM	Poirier : Psylle : 75 cc/hl; Agrumes : Acariens : 60 cc/hl; Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl; Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl
16	Abamectin +Chlorantraniliprole	18 g/l+45 g/l	SC	Cleverole plus SC	I.14-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : (<i>Tutaabsoluta</i>):50 ml/hl 1 application Volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 28/12/2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 6 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
	Abamectin +Chlorantraniliprole	18 g/l+45 g/l	SC	ABAROLE SC	I.13-24	PLANETE VERTE	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : (<i>Tutaabsoluta</i>):50 ml/hl 1 application Volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 22/05/24)
17	Abamectine +spinosad	3%+ 2%	EW	REVINTY 5 EW	I.35-23	PROMOCHIMIE	JIANGXI ZHENGHANG CHINE	TOMATE SOUS SERRE : Acariens rouges :75 cc/hl Appliquer le produit pendant tout le cycle Nbre max d'application :2 DAR:07 jours (COMM 28/12/2023)
18	Acetameprid	70%	SP	ACETADE FORT	I.009-17	SANABEL Agro	SHARDA CROPHEM	Agrume: Mineuse: 40g/100 l (COMM du 20/06/2017)
19	Acetameprid	70%	SP	Polysect	I.004-16	SOCOOPEC	SHARDA	Agrume: Mineuse :40g/100 l
20	Acetamiprid +pyriproxyfen	186 g/l+124 g/l	DC	CANVION310 DC	I.032-22	COTUGRAIN	Syngenta Crop Protection	Agrumes: cochenilles farineuses:40 ml/hl Appliquer le produit après la floraison lorsque la surveillance des cultures indique le début de sortie des larves mobiles. Ne pas appliquer sur des populations bien établies ou des insectes adultes matures dominant la population . Si nécessaire , une deuxième application supplémentaire peut être faite 23 jours après la première. Appliquer par pulvérisation foliaire, jusqu'au point de ruissellement, en assurant une couverture complète. Volume d'eau:1000-2000L/ha Ne pas dépasser 1.6L de produit par hectare en une seule application. (com 27/12/22)
21	Acetamiprid	200 g/kg	SP	POtegon 20 SP	I.22-23	PLANETE VERTE	ASTRANOVA	TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche (<i>Bemisiatabaci</i>) :30 g/100 l DAR:03 jours (COMM 28/12/2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 7 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
22	Acetamipride	200 g/L	SL	Escort 20 SL	I.010-11/21	BIOPROTECTION	UPL/(NIPPON SODA)ARYSTA LIFESCIENCE	Agrumes : Mineuses : 30cc/hl (pulvérisation foliaires), Arbres âgés de moins de 4ans : 1 à 2 ml/ arbre (badigeonnage du tronc). Cultures sous serres : Mouches blanches: 50 cc/hl. Pommier, Agrumes : Pucerons: 12,5 cc / hl Fraisiers : Thrips : 40 cc/hl
23	Acetamipride	200 g/L	SL	Mospilan 20 SL	I.011-11/21	SEPCM	(NIPPON SODA) ARYSTA LIFESCIENCE /UPL	Agrumes : Mineuses : 30cc/hl (pulvérisation foliaires), Arbres âgés de moins de 4ans : 1 à 2 ml/ arbre (badigeonnage du tronc). Cultures sous serres : Mouches blanches: 50 cc/hl. Pommier, Agrumes : Pucerons: 12,5 cc / hl Fraisiers : Thrips : 40 cc/hl
24	Acetamipride	200 g/l	SL	DEPOT SL	I.037-22	PROTAGRI	MODERN INSECTICIDES LIMITED	Piment : Mouches blanches(Bemiiatabaci): 50 cc/hl Appliquer par pulvérisation à l'aide d'un appareillage conventionnel pour l'agriculture. -pulvérisation foliaire -traiter dès l'apparition des foyers. -DAR:7 jours(plein champ) DAR:3 jours (sous serre) (com 27/12/22)
25	Acrinathrine	75 g/L	EW	Orytis	I.135-11/21	ATLAS AGRICOLE	CHEMINOVA	Tomate de plein champs : Acariens : 60 cc/hl Olivier : Acariens Eriophydes : 60 cc/hl Pommier : Acariens : 60 cc/hl Pêcher : Thrips: 60 cc/hl (COMM23/04/2019)
26	Acrinathrine	75 g/L	EW	Rufast 7,5 EW	A.013-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	CHEMINOVA	Tomate de plein champs : Acariens : 60 cc/hl Olivier : Acariens Eriophydes : 60 cc/hl Pommier : Acariens : 60 cc/hl Pêcher : Thrips: 60 cc/hl (COMM 18/10/2017)
27	Acrinathrine +Abamectine	22.5 g/l+12.6 g/l	EW	TRIPSOL EW	I.010-19	AGROSYSTEME	Cheminova/fmc	Fraisiers : Thrips: 75cc/hl (l'efficacité de produit est de 07 jours au maximum); (COMM 23/04/2019)
28	Afidopyropen	100 g/l	DC	VERSYS DC	HOMOLOGATI ON I.30-23	AGRIPROTEC	BASF	TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche (Bemisiatabaci):35 cc/hl POIVRON SOUS SERRE :Mouche blanche (Bemisiatabaci):35 cc/hl Volume de bouillie :1000 l/ha Application foliaire Application dès les premières infestations

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 8 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Nbre d'app:4 Intervalle d'app:7-14 jours DAR:0 jours COMM 28/12/2023) (comm 22 mai 2024)
29	Alphaméthrine	100 g/L	EC	Bonbard	I.176-11/21	COTUGRAIN IMPEX	BASF	Betterave : Casside : 60 cc/hl Tomate : Noctuelles : 15 cc/hl Poirier : Psylle : 50 cc/hl Arbres fruitiers à pépins : Carpocapse : 30 cc/hl
30	Alphacypermethrine	100 g/l	EC	ALPHATOP EC	I.39-23	SLDA	SHARDA CROPCHEM INDE	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles :15 cc/hl Application foliaire 1 à 2 traitements alternés par cycle de culture. Traiter dès l'observation des premiers symptômes Durée de protection :5 à 7j suivant le degré d'attaque et les conditions climatiques (COMM 28/12/2023)
31	Alphacypermethrine	100 g/l	EC	REMAX EC	I.10.24	FERTITECH	SHARDA CROPCHEM INDE	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles :15 cc/hl Application foliaire 1 à 2 traitements alternés par cycle de culture. Traiter dès l'observation des premiers symptômes Durée de protection :5 à 7j suivant le degré d'attaque et les conditions climatiques (COMM 22/05/2024)
32	Alphacypermethrine	100g/l	EC	ALLIGATOR	I.42-23	SSCC	GHARDA CHEMICALS LTD	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles :15 cc/hl (COMM 28/12/2023)
33	Azadirachtine (0,03 %) + huile de neem	0 ,3 g/L+90,5%	EC	Nimbicidine	I.160-11/21	TASMID	T. STANES &Co.Ltd.	Tomate : TutaAbsoluta à la dose de 250 CC/HL Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :50 g/hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
34	Azadirachtine 32 g/L	32 g/L	EC	OIKOS MAX	I.004-20	EL KHADRA	SIPCAM INAGRA	Piment, Tomate : Mouches blanches : 100 cc/hl Agrumes : Mineuses : 60 cc/hl Fraisiers : Thrips : 150 cc/hl Tomate :TutaAbsoluta :150 cc/hl; (COMM13/02/2020)&(COMM09/02/21)
35	Bacillus thuringiensis	16x106I.U/g	SC	BELTHIRUL 16SC	I.09-21	AGRIPROTEC	PROBLETE	Tomate : Mineuse (Tutaabsoluta) :200 cc/hl(1000 l/ha) pulvérisation foliaire- -appliquer de préférence à l'observation des premières larves et essayer de bien mouiller toute la

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 9 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								végétation. -nbre max :2 -stade d'applications: appliquer durant tout le cycle espacé de 7 à 14 jours.(COMM09/02/21)
36	Bacillus thuringiensis kurstaki	3200 UI/mg	WP	HALT WP	I.47-23	NEGANOR	BIOSTADT INDE	TOMATE : Noctuelles :50 g/hl Volume de bouillie:1000 l/ha Traitement des parties aériennes sur les jeunes stades larvaires Max 03 applications Min intervalle entre appm7 jours DAR: non requis (COMM 28/12/2023)
37	Bacillus thuringiensis	32000UI/mg	WG	Delfin WG	I.131-11/21	AGROSYSTEMES	CERTIS	Tomate :Tutaabsoluta : 250 g/hl
38	Bacillus thuringiensis (spKurstaki),souche ABTS-351	32000UI/mg	WG	BACTOSPINE DF	I.017-19	SEPCM	VALENT BIOSCIENCE CORPORATION/s umitomo chemical	Citronnier : Teigne : 75 g/hl (750g/ha); -Traitement parties aériennes sur jeunes stades larvaires; -Deux applications espacées de 07 à 10jours; (COMM23/04/2019) TOMATE : Noctuelles :75 g/hl (750g/ha) Traitement parties aériennes sur jeunes stades larvaires 02 applications ,Renouveler tous les 07-10j (COMM 28/12/2023)
39	Bacillus thuringiensis (spKurstaki),souche ABTS-351	16000UI/mg	WP	touta stop WP	I.025-11/21	etsmezghani	industrialquimica key	Tomate :Tutaabsoluta : 450 g/hl(COMM09/02/21)
40	Bacillus thuringiensis subsp- kurstakisouche EG-2348	375 g/kg	WP	LEPINOX PLUS WP	I.019-22	COTUGRAIN	CBC (EUROPE)/BIOG ARD	Tomate sous serre :Tuta absoluta:1 kg/ha Volume de bouillie:500-1000 l Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur conventionnelk et s'assurer de la couverture de l'ensemble des parties aeriennes par le produit Appliquer le produit dès la presence des premiers oueuvs et larves (stade L1-LII) Repete l'application tous les 7 à 10 jours pendant la periode de ponte Nbre d'applications:3 par saison. (COMM08/06/22) TOMATE : Noctuelles :1 kg/ha Volume de bouillie :500-1000 l Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur conventionnel et s'assurer de la couverture de l'ensemble des parties aériennes par le produit Appliquer le produit dès la présence des premiers

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 10 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								œufs et larves (stade L1-LII) Répéter l'application tous les 7 à 10 jours pendant la période de ponte Nbre d'applications :3 par saison (COMM 28/12/2023)
41	Beauveria bassiana strain ATCC 74040	0.0185 %W/W)	OD	Naturalis	I.038-22	COTUGRAIN	CBC europe/italie	Piment, Tomate: Mouche blanche:1.5 l/ha Tomate: Acariens(Aculopslycopersici):2 l/ha Volume de bouillie :1000 l/ha Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur conventionnel et d'assurer de la couverture de l'ensemble des parties aériennes par le produit Répéter l'application tous les 5 à 7 jours pendant la période de ponte Nombre d'application :5/saison Mode d'action: par contact DAR:0 jour(com 27/12/22) PIMENT SOUS SERRE : Acariens :Aculopslycopersici : (acarirose bronzé) :2 l/ha Volume de bouillie :1000 l/ha Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur conventionnel et d'assurer de la couverture de l'ensemble des parties aériennes par le produit Répéter l'application tous les 5 à 7 jours pendant la période de ponte Nbre d'app:5/saison Mode d'action: par contact DAR:0 jour (COMM 28/12/2023)
42	Beauveriabassianastrain R444	2x109 spores	WP	Bb-Protec WP	I.08-21	ALOHA Agriculture	Plant Health Products (phy)/Sud d'afrique/Andermat t PHP(Pty) Ltd/ANDERMAT T BIOCONTROL GROUP AG	Tomate: Mouche blanche (Bemisiatabaci) :300 g/ha -pulvérisation foliaire-nbre max :3/cycle-intervalle de 10 jours(COMM09/02/21)
43	Bifenazate	240 g/l	SC	COMITE 240 SC	I.024-22	BIOPROTECTION	CHEMTURA/AR YSTA	Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Palmier dattier: Acariens (Oligonychusafrasiaticus): 60 cc/hl. (COMM09/02/21);COMM08/06/2022)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 11 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
44	Bifenazate	240 g/l	SC	FLORAMITE 240 SC	I.008-16	AGRIMATCO	CHEMTURA/AR YSTA	Agrumes : Acariens: 60 cc/hl Palmier dattier :Acariens(Oligonychusafrasiaticus):60 cc/hl (COMM09/02/21)
45	Bifenazate	50%	WG	BANTER WG	I.003-19	AGRIPROTEC	UPL limited	Agrumes :Acariens"Tetranychusurticae: 100 g/hl;- Traitement foliaire : en une seule application avec une couverture d'un mois;-Présence d'effetsd'une écotoxicité inacceptable pour le prédateur Phytoseiuluspersimilis durant quelques jours après le traitement (COMM 23/04/2019)
46	Bifenazate	494,8 g/L	SC	Acramite 480 SC	IA.030-11/21	SEPCM	CHEMTURA /UPL	Pommier : Acariens 100 cc/hl; Tomate en plein champs : Acariens 30 cc/hl; Agrumes : Acariens 100 cc/hl Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasiticus " :50cc/Hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
47	Borax	10 g/L	SL	Prev-am	I.A.F.031-11/21	EL MOUSSEM	ORO AGRI	Vigne, Fraisières : Cochenille farineuse, Mildiou, Pourriture :300 cc/hl Tomate : Acariens : 300 cc/hl Tomate : Mouches blanches : 320 cc/hl Vigne : Oïdium : 200 cc/hl Palmier dattier : Dessèchement Foliaire(AlternariamalietAlternariaarborescens) :350 ml/hl traitement en curatif dès l'apparition des symptômes de dessèchement sur les palmiers,(COMM09/02/21)(APV) Palmier dattier :Acariens des dattes(Oligonychusafrasiaticus):350 ml/hl (APV COMM 08/06/22)
48	Borax	10 g/L	SL	Orotun	I.A.F.017-16	RAYEN PHYTAGRI	ORO AGRI	Vigne, Fraisières : Cochenille farineuse, Mildiou, Pourriture :300 cc/hl Tomate : Acariens : 300 cc/hl Tomate : Mouches blanches : 320 cc/hl Vigne : Oïdium : 200 cc/hl

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 12 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
49	Buprofezin	25%	SC	Applaud 25 SC	I.23-23	AGRIPROTEC	SIPCAM INAGRA	TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche (<i>Bemisiatabaci</i>):100 cc/hl Volume de bouillie :1000 l/ha (COMM 28/12/2023)
50	Chlorantraniliprole	20%	SC	Virago	I.041-22	SHARDA CROPCHAM Tunisia	SHARDA CROPCHAM limited	Tomate: Tutaabsoluta: 15 cc/hl Application foliaire (com 27/12/22)
51	Chlorantraniliprole	20%	SC	PROPICE SC	I.041-22	SANABEL AGRO	SHARDA CROPCHAM limited	Tomate: Tutaabsoluta: 15 cc/hl Application foliaire(com 27/12/22)'COMM 28 dec 2023)
52	Chlorantraniliprole	200 g/L	SC	Coragen 20 SC	I.033-11/21	SEPCM	DU PONT/FMC	Tomate : Tutaabsoluta : 50 cc/hl
53	Chlorantraniliprole	350 g/kg	WG	ALTACOR 35 WG	I.015-22	AGRIPROTEC	FMC	Tomate sous serre: Tuta absoluta:10 g/hl (100g/ha) Volume de bouillie: 300-800 L/ha Pulvérisation foliaire -période de traitement : préventif -nombre maximum de traitements: 2 par saison -calendrier des applications:BBCH71-BBCH89 DAR: 1j. (COMM 08/06/22) TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles :10 g/hl (100g/ha) Volume de bouillie: 300-800 L/ha Pulvérisation foliaire -période de traitement : préventif nombre maximum de traitements: 2 par saison -calendrier des applications: BBCH71-BBCH89 DAR: 1j (COMM 28/12/2023)
54	Chlorantraniliprole	200g/l	SC	COREGIS SC	I.025-22	PROMOCHIMIE	DU PONT/FMC	Tomate : Tuta absoluta:50 cc/hl(COMM 08/06/22)
55	Chlorantraniliprole	200 g/l	SC	CLEVEROLE SC	I.10-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : <i>Tuta absoluta</i> :50 ml/ha -1 application -volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 28/12/2023)
56	Chlorantraniliprole	200 g/l	SC	KORTEX	I.06-24	NEGANOR FFT	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : <i>Tuta absoluta</i> :50 ml/ha -1 application -volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 22/05/2024)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 13 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
57	Chlorantraniliprole + Abamectine	45 g/L +18g/L	SC	VoliamTargo 063 SC	I.034-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Tomate : Tutaabsoluta : 60 cc/hl Tomate : noctuelles : 60 cc/ hl Poirier : Psylle : 60 cc/ hl Pommier : Acariens: 60cc/hl
58	Chlorantraniliprole +LambdaCyhalothrine	100 g/L+50 g/L	SC	BESIEGE 150 ZC	I.009-18	COTUGRAIN IMPEX	SYNGENTA	Tomate : Tutaabsoluta : 30 cc/hL Piment : Pucerons : 30 cc/hl Tomate : Noctuelle : 20 cc/hl(COMM18/10/2018)
59	Chlorantraniliprole +Lambda-cyhalothrine	100 g/l+ 50 g/l	SC	POLYVALENT SC	I.18-23	Sté El Khadra	EASTCHEM CO,Ltd CHINE	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :30 cc/hl Pulvérisation foliaire Volume de bouillie :800-1000 l/ha DAR:03 jour Nbre d'app:1à2 (COMM 28/12/2023)
60	Chlorantraniliprole + lambdacyhalothrin	100 g/l+50 g/l	EC	LASTROLE EC	I.11-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE :Tuta absoluta:30 ml/hl -1 application -volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 28/12/2023)
61	Chlorantraniliprole + lambdacyhalothrin	100 g/l+50 g/l	EC	PLIGO ZC	I.07-24	NEGANOR FFT	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE :Tuta absoluta:30 ml/hl -1 application -volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 22/05/2024)
62	Chlorantraniliprole +methoxyfenozide	4%+18%	SC	ABSOLUT SC	I.09-23	STEC	NANJING AGROCHEMICA L CHINE	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :50 cc/hl Volume de bouillie:800-1000 l/ha 02 traitements/cycle (COMM 28/12/2023)
63	Chromafénozide	50 g/L	SC	Matric	I.044-11/21	BIOPROTECTION	UPL/ARYSTA LIFESCIENCE	Pommier : Carpocapse : 0,2 L/hl (maximum 2 applications par an) Vigne : Tordeuse, Ver de la grappe : 0,2 L/hl (maximum 2 applications par an)
64	CINNAMALDHEYDE	w/w :22.03	EC	SEICAN EC	I.33-23	ATLAS AGRICOLE	SEIPASA S.A	TOMATE SOUS SERRE : Acariens rouges : 250cc/hl(2.5 l/ha) Volume de bouillie 1000 l/ha Application foliaire Appliquer en préventive oudés l'apparition des œufs ou larves Répéter le traitement tout les 5 à 7 j DAR:0 j (COMM 28/12/2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 14 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
65	Clofentezine	500 g/L	SC	Apollo 50	A.045-11/21	STEC	AAKO BV	C. maraichères : Acariens : 100 cc/hl Pommier : Acariens : 40 cc/hl.
66	Cyantraniliprole	200g/kg	SC	VERIMARK SC	I.25-23	SEPCM	FMC	TOMATE SOUS SERRE :Mouche blanche (<i>Bemisiatabaci</i>):0.375 l/ha en goutte à goutte POIVRON SOUS SERRE :Thrips :0.5 l/ha en goutte à goutte Volume de bouillie :100 L/ha -Ne pas l'associer avec les engrais, biostimulants et oligoélément. - la conservation de la préparation ne dépasse pas 8heures. -Appliquer durant le premiers tiers(1/3) du temps de l'irrigation. -nbre d'application :2 -intervalle d'app :12 j -DAR :1j (COMM 28/12/2023)
67	Cyantraniliprole	200g/kg	SC	OKINA SC	I.05-23	SSCC	FMC	TOMATE SOUS SERRE :Mouche blanche (<i>Bemisiatabaci</i>):0.375 l/ha en goutte à goutte POIVRON SOUS SERRE : Thrips :0.5 l/ha en goutte à goutte Volume de bouillie :100 L/ha -Ne pas l'associer avec les engrais, biostimulants et oligoélément. - la conservation de la préparation ne dépasse pas 8heures. -Appliquer durant le premiers tiers(1/3) du temps de l'irrigation. -nbre d'application :2 -intervalle d'app :12 j -DAR :1j (COMM 28/12/2023)
68	Cyantraniliprole	100 g/L	OD	Benevia	I.014-16	AGRIMATCO	DU PONT	Tomates sous serre : mouche blanche : 0.6 l/ha (En Préventif : avant début de l'attaque)
69	Cyantraniliprole	100 g/L	OD	Preza OD	I.11-21	Agriprotec	DU PONT/FMC	Tomates sous serre : mouche blanche : 0.6 l/ha (En Préventif : avant début de l'attaque)(COMM09/02/21)
70	Cyantraniliprole +Acibenzolar-S-methyl	100 g/l+12,5 g/L	SC	PLESIVA ALPHA SC	I.011-22	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Tomate sous serre :Mouche blanche(<i>Bemisiatabaci</i>); Tuta absoluta:1 l/ha -Pulvérisation foliaire ou en goutte à goutte(COMM 08/06/22)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 15 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Piment: Mouche blanche(Bemisiatabaci):1 l/ha -application en goutte à goutte(com 27/12/22)
71	Cyantraniliprole+Abamectine	60 g/l+18g/l	SC	MINECTO PRO SC	I.006-22	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Piment sous serre: Mouche blanche(Bemisiatabaci):0.75 l/ha -volume de bouillie:400-800 l/ha -Désles premiers individus de mouches blanches sont observés -Type: foliaire en préventif et en curatif -Nbre d'app:3 applications -Durée entre les applications:14 à 21 jours d'intervalle(en fonction de l'intensité de l'attaque) DAR:3 jours(COMM 08/06/22) TOMATE SOUS SERRE : <i>Tuta absoluta</i> :0.6 l/ha Volume de bouillie 400-800 l/ha Dés les premières larves ou mines sont présentes sur les plants de tomate Type: foliaire en préventif et en curatif Nbbred'app:3 applications Durée entre les applications :14 à 21 jours d'intervalle (en fonction de l'intensité de l'attaque) DAR:3 jours (COMM 28/12/2023)
72	Cyflumetofen	100g/l	DC	DANIRANGER 10DC	I.001-22	AGRIMATCO	OAT AgrioCO.Ltd	Agrumes: Acariens(Tetranychusurticae):100 cc/hl -pulvérisation foliaire -application dès l'apparition de premières formes mobiles (COMM 08/06/22) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasiticus " :100 cc/hl Volume de bouillie:500 l/ha Application dès l'apparition de première formes mobiles Autorisation Provisoire de Vente (COMM 22/02/2024)
73	Cyflumetofen	193.5 g/l	SC	VELAR 20 SC	I.03-21	cotugrain	OAT agrio(fab)/Japo(LI DA PLANT RESEARCH/Four nisseur)	Agrumes: Acariens(TetranychusUrticae):1 l/ha BBCH:11-85 Durée de protection:7jours -App foliaire -02 applications

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 16 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								le produit présente une efficacité qui COMMence au 3ème jour (effet choc) et s'étale sur 21 jours avec une efficacité importante sur les œufs et les formes mobiles. (COMM09/02/21) TOMATE SOUS SERRE : Acariens rouges :1 l/ha Stade d'application BBCH:13-89 Durée de protection :3 jours -App foliaire -02 applications (COMM 28/12/2023)
74	Cypermethrine	100 g/l	EC	CYTHRINE 10 EC	I.41-23	AGRIPROTEC	ARYSTA LIFESCIENCE/IP L	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles :40 cc/hl Volume de bouillie :1000 l/ha -pulvérisation foliaire -en curatif -nbre max :1 -calendrier des applications :dés l'apparition de l'organisme nuisible -DAR:3 jours COMM 28/12/2023)
75	Cypermethrine	250 g/L	EC	SYNCHRO	I.004-15	EL KHADRA	SHARDA WORLDWIDE	Tomate : Noctuelle défoliatrice : 50 cc/hl.
76	Cypermethrine	25%	EC	SINOCYPER	I.44-23	EL KHADRA	CROPSAVE PESTICIDES INDIAN PVT.LTD	TOMATE : Noctuelles : 50 cc/hl Mode d'action : contact et ingestion Pulvérisation foliaire Volume de bouillie :800-1000 l/ha DAR:3 jours Nbre d'applications :3/saison (COMM 28/12/2023)
77	Cypermethrine	250 g/L	EC	CYPERNOVA	I.004-17	AGRINOVA	SHARDA WORLDWIDE	Tomate : Noctuelle défoliatrice : 50 cc/hl(.COMM 20/06/2017)(COMM08/06/22)
78	Cypermethrine	500 g/l	EC	CYPGOLD 500 EC	I.029-22	EL MOUSSEM	ARYSTA LIFESCIENCE /UPL	Olivier : Dacus (Bactroceraeoleae):75 ml/ha (7.5 ml/ha) -application foliaire -DAR :28 jours -max 5 traitements /cycle -LMR :0.4mg/kg(com 27/12/22)
79	Cypermethrine	100 g/l	EC	CYRUX	I.003-17	PROTAGRI	UPL	Tomate : Noctuelle: 100ml/hl;(COMM du 20/06/2017)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 17 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
80	Cypermethrine	0.86 %	MG	Belem 0.8 MG	002-16 I.	SEPCM	SBM FORMULATION/ CMPA	Pomme de terre: Taupins:12 kg/ha (T traitement localisé sur ligne)
81	Cyperméthrine	100 g/L	EC	Selene	I.048-11/21	ETS. MEZGHANI	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	Betterave : Casside : 100 cc/hl C. maraîchères : Pucerons, tordeuse, altises, noctuelles défoliatrice : 100 cc/hl Céréales : Pucerons : 100 cc/hl P .de terre : Pucerons : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie : 100 cc/hl Arbres fruitiers : Scolytes : 100 cc/hl Poirier : Psylle :100 cc/hl Olivier : Dacus : 75 cc/hl
82	Cyperméthrine	100 g/L	EC	Sherpa	I.146-11/21	JADWA AGROTEC	CMPA	Betterave : Casside : 100 cc/hl C. maraîchères : Pucerons, tordeuse, altises, noctuelles défoliatrice : 100 cc/hl Céréales : Pucerons : 100 cc/hl P .de terre : Pucerons : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie : 100 cc/hl Arbres fruitiers : Scolytes : 100 cc/hl Poirier : Psylle :100 cc/hl Olivier : Dacus : 75 cc/hl
83	Cyperméthrine	250 g/L	EC	Cypercal 250 EC	I.046-11/21	BIOPROTECTION	UPL/ARYSTA LIFESCIENCE	C. maraîchères : Noctuelle défoliatrice : 50 cc/hl Olivier : Dacus : 30 cc/hl Betterave : Casside : 50 cc/hl Grandes cultures : Pucerons, Tordeuse, Altise : 50 cc/hl Céréales : Pucerons : 50 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie : 50 cc/hl Arbres fruitiers : Scolytes: 50 cc/hl Poirier : Psylle: 50 cc/hl
84	Difenoconazole + Cyprodinil	87.2g/l+251.1 g/l	EW	INSPIRE PLUS EW	F.03-23	BIOPROTECTION	SYNGENTA	POMMIER : Tavelure (<i>Venturia inaequalis</i>) :0.7 l/ha Volume de bouillie :500-1000 l/ha -stade d'application : préventif -Type: foliaire Nbre d'application :2/saison -Durée entre les applications :10-14 jours DAR:14 jours (COMM 28/12/23)
85	Deltamethrin	25 g/l	EC	CISTHRIN EC	I.45-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW	TOMATE:Noctuelles : 75 ml/hl Mode d'action : contact et ingestion (COMM 28/12/23)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 18 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
							CHEMICAL CO.LTD	
86	Deltamethrin	25 g/l	EC	DELTOP EC	I.04-24	COTUGRAIN Impex	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE:Noctuelles: 75 ml/hl Mode d'action : contact et ingestion (COMM 22/05/24)
87	Deltamethrine	25 g/l	EC	D66	I.003-15	ETS MEZGHANNI	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	Agrumes: Cochenilles : 50 cc/hl(COMM13/02/2020)
88	Deltamethrine	25 g/l	EC	Dextra 25 EC	16-016I.	RAYEN PHYTAGRI	TAGROS CHEMICALS	Tomate : Noctuelle : 75 cc/hl
89	Deltamethrine	25 g/l	EC	Delmitox	16-011I.	SANABEL AGRO	SHARDA CROPChem	Tomate : Pucerons : 100 cc/hl
90	Deltamethrine	15 g/l	EC	Atrium	16-012I.	SANABEL AGRO	ROTAM AGROCHEMICALS	Féverole : Sitonesphytonomes : 0.75 l/ha
91	Deltamethrine	25 g/l	EC	Sergent	I.006-15	SOCOOPEC	SHARDA WORLDWIDE	Pommier : pucerons : 100 cc/hl
92	Deltamethrine	25 g/l	EC	SCATTO EC	I.013-19	STIMA	ISAGRO SPA/GOWAN	Pêcher: Cératite:100 ml/hl ; COMM 23/04/2019
93	Deltaméthrine	100 g/L	EC	Decis Expert	I.056-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Tomate de pleins champs : Noctuelles (chenilles défoliatrices) : 15 cc/hl ; Olivier : Neiroun : 15 cc/hl; Tomates/Piments : Pucerons : 15 cc/hl; Pêcher : Pucerons : 20 cc/hl; Arbres fruitiers : Scolytes : 15 cc/hl
94	Deltaméthrine	25 g/l	EC	COBRA EC	I.43-23	SSCCokina	GHARDA CHEMICALS LTD	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles :75 cc/hl (COMM 28/12/2023)
95	Deltaméthrine	25 g/l	EC	SERISS 25 EC	I.40-23	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRASA S.A / ALBAUGH EUROPE SARL	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles :50 cc/hl -Traitement foliaire - Volume de bouillie :700 à 1000 l d'eau/ha -2 Traitements espacés de 14 jours par cycle de la culture. -1er traitement au stade BBCH 72-73 (COMM 28/12/2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 19 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
96	Deltamethrine	100 g/l	EC	DEXTRA 100 EC	I.46-23	RAYEN PHYTAGRI	TRAGOS CHEMICOLS /INDE	TOMATE : Noctuelles : 15 cc/hl Mode d'action : contact et ingestion Application foliaire 1 à 2 traitements/cycle chaque 7 à 10 jours Traiter dès l'observation des premiers dégâts (COMM 28/12/2023)
97	Deltaméthrine	25 g/L	EC	Deltacal	I.053-11/21	BIOPROTECTION	UPL/ARYSTA LIFESCIENCE	Céréales : Pucerons : 100 cc/hl C. maraîchères : Noctuelle, Pucerons : 75 cc/hl Vigne : Tordeuse, Pyrale, Cicadelle, Thrips : 50 cc/hl Olivier : Psylle, Dacus, Teigne, Hylésine Cochenille, Neiroun, Pyrale de jasmin : 50 cc/hl (T.aérien /terrestre) P.de terre : Teigne : 100 cc/hl Poirier : Psylle : 75 cc/hl Arbo : Pucerons, Mineuse, Carpocapse, Tordeuse, Zeuzère, Scolytes, Cératites : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie, Cicadelle, Thrips: 50 cc/hl Légumineuses : Sitonesphytonomes : 125 cc/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 cc/hl Forêt : Limantriadispar : 50 cc/hl Criquets pèlerins (adultes et larves) : 0,3 à 0,4 L/ha Toutes cultures : Cigales : 100 cc/hl Agrumes : Cochenilles noires : 50 cc/hl
98	Deltaméthrine	25 g/L	EC	Decis EC 25	I.054-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Céréales : Pucerons : 100 cc/hl C. maraîchères : Noctuelle, Pucerons : 75 cc/hl Vigne : Tordeuse, Pyrale, Cicadelle, Thrips : 50 cc/hl Olivier : Psylle, Dacus, Teigne, Hylésine Cochenille, Neiroun, Pyrale de jasmin : 50 cc/hl (T.aérien /terrestre) P.de terre : Teigne : 100 cc/hl Poirier : Psylle : 75 cc/hl Arbo : Pucerons, Mineuse, Carpocapse, Tordeuse, Zeuzère, Scolytes, Cératites : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie, Cicadelle, Thrips: 50 cc/hl Légumineuses : Sitonesphytonomes : 125 cc/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 cc/hl Forêt : Limantriadispar : 50 cc/hl Criquets pèlerins (adultes et larves) : 0,3 à 0,4 L/ha

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 20 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Toutes cultures : Cigales : 100 cc/hl Agrumes : Cochenilles noires : 50 cc/hl
99	Deltaméthrine	25 g/L	EC	Fruithrine	I.166-11/21	PROTAGRI	United Phosphorus Ltd	Betterave : Cassides, Pucerons : 50 cc/hl Céréales : Pucerons : 100 cc/hl C. maraîchères : Noctuelle, Pucerons : 75 cc/hl Vigne : Tordeuse, Pyrale, Cicadelle, Thrips : 50 cc/hl Olivier : Psylle, Dacus, Teigne, Hylésine Cochenille, Neiroun, Pyrale de jasmin : 50 cc/hl (T.aérien/terrestre) P.de terre : Teigne : 100 cc/hl Poirier : Psylle : 75 cc/hl Arbo : Pucerons, Mineuse, Carpocapse, Tordeuse, Zeuzère, Scolytes, Cératites : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie, Cicadelle, Thrips: 50 cc/hl Légumineuses : Sitonesphytonomes : 125 cc/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 cc/hl Forêt : Limantriadispar : 50 cc/hl Criquets pèlerins (adultes et larves) : 0,3 à 0,4 L/ha Toutes cultures : Cigales : 100 cc/hl Agrumes : Cochenilles noires : 50 cc/hl
100	Deltaméthrine	25 g/L	EC	Delta	I.055-11/21	STEC	BAYER CROPS SCIENCE	Céréales : Pucerons : 100 cc/hl C. maraîchères : Noctuelle, Pucerons : 75 cc/hl Vigne : Tordeuse, Pyrale, Cicadelle, Thrips : 50 cc/hl Olivier : Psylle, Dacus, Teigne, Hylésine Cochenille, Neiroun, Pyrale de jasmin : 50 cc/hl (T.aérien /terrestre) P.de terre : Teigne : 100 cc/hl Poirier : Psylle : 75 cc/hl Arbo : Pucerons, Mineuse, Carpocapse, Tordeuse, Zeuzère, Scolytes, Cératites : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie, Cicadelle, Thrips: 50 cc/hl Légumineuses : Sitonesphytonomes : 125 cc/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 cc/hl Forêt : Limantriadispar : 50 cc/hl Criquets pèlerins (adultes et larves) : 0,3 à 0,4 L/ha Toutes cultures : Cigales : 100 cc/hl Agrumes : Cochenilles noires : 50 cc/hl

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 21 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
101	Diafenthiuron	500 g/L	SC	Pegasus 500 SC	I.057-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Pommier, Agrumes : Acariens, Pucerons : 60 ml/hl Tomate : Mouches blanches, Acariens : 60 ml/hl Cucurbitacées : Pucerons, Mouches blanches, Acariens : 60 ml/hl Tomate :TutaAbsoluta :100 cc/hl
102	Difenoconazole	250 g/l	EC	NANJI 250 EC	F.19-23	STEC	JIANGSU FENGDENG(fab) NANJING AGROCHEMICA L (DIS)	MELON SOUS SERRE :Oidium (Sphaerothecafuliginea) : 40 cc/hl Volume de bouillie :600 l/ha -pulvérisation foliaire -nbre max :2/cycle -DAR:3 jours (COMM28/12/23)
103	Dinotefuran	20%	SG	STARKLE 20SG	I.30-22	AGRIMATCO	Mitsui Chemicals Agro,Inc	Agrumes : Cochenille farineuse :75 g/hl Volume de bouillie :1000 L/ha -pulvérisation foliaire -application dès l'apparition des 1 ^{ère} formes mobiles (COMM 27/12/22) Cactus : cochenille :75g /hl Pulvérisation foliaire App dès l'apparition de première formes mobiles APV(COMM28/12/23)
104	Emamectin benzoate	50 g/L	EC	Proact 50 EC	I.128-11/21	TASMID	ASTRACHEM	Tomate : Tutaabsoluta : 30 cc/hl
105	Emamectin benzoate	50 g/L	EC	PROFAST EC	I.046-22	PLANETE VERTE	ASTRACHEM/AS TRANOVA	Tomate : Tutaabsoluta : 30 cc/hl (COMM27/12/22)
106	Emamectin benzoate	5%	SG	Proclaim 05 SG	I.063-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Tomate : Noctuelles : 250 g/ha; Tomate : TutaAbsoluta :30 g/hl
107	Emamectin benzoate	5%	SG	JEMSTAR	I.049-22	FERTIPLANT	Krishlifescience	Tomate :Tuta absoluta:30 g/hl Traitement foliaire(com 27/12/22)
108	Emamectine benzoate	5.7 %	WG	EMATOP	I.19-23	Sté El Khadra	HANGZHOU TOPAGRO BIOSCIENCE CHNINE	TOMATE SOUS SERRE :Tuta absoluta:30 g/hl Pulvérisation foliaire Volume de bouillie :800-1000 l/ha Nbre d'app:1à2 (COMM 28/12/2023)
109	Emamectin Benzoate + Pyriproxyfen	20 g/l+60 g/l	EC	Prifenup EC	I.03-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	Agrume : Cochenille : Pou rouge de floride (<i>chrysomphalusaonidum</i>):50 ml/hl Volume de bouillie:800-1000 l/ha 01 application (COMM 28/12/2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 22 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
110	Emamectin Benzoate + Pyriproxyfen	20 g/l+60 g/l	EC	PROXYSAFE EC	I.11-24	PLANETE VERTE	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	Agrume : Cochenille : Pou rouge de floride (<i>chrysomphalusaonidum</i>):50 ml/hl Volume de bouillie:800-1000 l/ha 01 application (COMM 22/05/2024)
111	Emamectin benzoate + Spinosad	40 g/l+160 g/l	EC	SPANVIC PLUS SC	I.11-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :20 ml/hl 1 application Volume de bouillie :450-500 l/ha (COMM 28/12/2023)
112	Emamectin benzoate + Spinosad	40 g/l+160 g/l	EC	SMECTO SC	I.05-24	NEGANOR FFT	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :20 ml/hl 1 application Volume de bouillie :450-500 l/ha (COMM 22/05/2024)
113	Etofenprox	30%	EC	TREBON EC	I.012-19	ATLAS AGRICOLE	SIPCAM INAGRA S.S	Agrumes :Cératite:100 ml/hl;-Pulvérisation foliaire;- Durée de protection :7 à 10j suivant le degré d'attaque et les conditions climatiques;(COMM23/04/2019). Tomate :Tuta absoluta:50 cc/hl Volume de bouillie :400 à 1000 l/ha Max application par an DAR:3 jours(com 27/12/22)
114	Etoxazole	110g/l	SC	Borneo 10 SC	I.A.017-17	BIOPROTECTION	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S	Pommier : Acarien rouge Panonychusulmi : 25 cc/hl (Mode d'action : translaminaire);(COMM du 18/10/2017)
115	(E,Z,Z)-3,8 ,11-Tetradecadien -1- yl acetate(53.8 mg/diffuseur) (E,Z)-3,8 –Tetradecad ien -1-yl acetate(6.2 mg/diffuseur)	60 mg /dispensers	VP	SHIN –ETSU MD T	I.014-22	COTUGRAIN	Shin ETSU chemical/ CBC (EUROPE)	Tomate sous serre :Tutaabsoluta :1000 diffuseurs/ha(100 diffuseurs/1000 m2) Une persistance d'action de: -110-120 jours au printemps-été. -150-160 jours en automne-hiver (COMM 08/06/22)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 23 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N° .H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
116	Fenazaquin	200 g/L	SC	MAGISTER	A.I.003-20	SEPCM	GOWAN Espagne	Olivier : Acariens Eriophydes : 50cc/hl Pommier : Acariens : 50 cc/hl Tomate de plein champs : Acariens : 50 cc/hl.(COMM13/02/2020) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :50cc/Hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
117	Fenazaquin 20%	20%	SC	QUEEN SC	I.49-23	SHARDA CROPCHEM TUNISIA	SHARDA CROPCHEM INDE	TOMATE SOUS SERRE : Acariens rouges:50 cc/hl 1 application DAR:03 jours (COMM 28/12/2023)
118	Fenazaquin 20%	20%	SC	QUEEN PRO SC	I.09-24	SHARDA CROPCHEM TUNISIA	SHARDA CROPCHEM INDE	TOMATE SOUS SERRE : Acariens rouges:50 cc/hl 1 application DAR:03 jours (COMM 22/05/2024)
119	Fenpyroximate	51,2 g/L	SC	FLASH EVO	I.012-18	EL KHADRA	SIPCAM INAGRA (ancienfabricant: NIHON NOHYAKU Co. Ltd)	Pommier : Acariens : 75 cc/hl Tomate en plein champs : Acariens : 75 cc/hl (COMM18/10/2018)
120	Fenpyroximate	50 g/L	SC	Mitacid	I.010-15	INNOVA	SIPCAM INAGRA (ancienfabricant: NIHON NOHYAKU Co. Ltd)	Pommier : Acariens : 75 cc/hl Tomate en plein champs : Acariens : 75 cc/hl
121	Flonicamid	500 g/kg	WG	TEPPEKI WG	I.10-21	AGRIPROTEC	ISK Biosciences Europe N.V(fabricant)/upl(fournisseur)	Tomate :Mouche blanche (Bemisiatabaci) :160 g/ha -Mode de traitement : goutte à goutte -stade d' app: dès les premiers signes d'infestation -DAR :3 jours(COMM09/02/21) PIMENT SOUS SERRE : Mouche blanche (Bemisiatabaci) : 160 g/ha -Mode de trait: goutte à goutte -Calendrier des applications :dès les premiers signes d'infestation -DAR :3 jours TOMATE SOUS SERRE :Pucerons :100 g/ha

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 24 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								PASTEQUE SOUS SERRE :Pucerons :100 g/ha -Mode de traitement: foliaire Calendrier des applications:dés les premiers signes d'infestation -DAR :3 jours TOMATE SOUS SERRE :Thrips :60 g/ha -Mode de trait: foliaire -Calendrier des app:dés les premiers signes d'infestation DAR :3 jours (COMM 28/12/2023)
122	Flubendiamide	480 g/l	SC	FAME 480 SC	I.020-22	ATLAS AGRICOLE	BAYER	Tomate sous serre : Tutaabsoluta :125 ml/ha, Volume de bouillie :300-800 l/ha Application foliaire--stade d'application : BBCH13 à BBCH 89 (COMM 08/06/22).
123	Flubendiamide	24%	WG	TAKITOP WG	I.17-23	Sté EL KHADRA	EASTCHEM CO,Ltd CHINE	TOMATE SOUS SERRE : Tutaabsoluta :25 g/hl Pulvérisation foliaire Volume de bouillie:800-1000 l/ha DAR:1 jour Nbre d'app:1à 2 (COMM 28/12/2023)
124	Flubendiamide	20%	WG	Takumi 20 WG	I.070-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	NIHON NOHYAKU / NICHINO EUROPE	Tomate : TutaAbsoluta : 30 g/hl; Piment :Noctuelles : 12,5 g/hl
125	Flufenoxuron	100 g/L	EC	Qatar	I.071-11/21	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Agrume : Mineuses : 60 cc/hl ou 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pommier : Carpocapse, acariens : 75 cc/hl Tomate : Acariens, noctuelles : 60 cc/hl
126	Flupyradifurone	200g/l	SL	SIVANTO PRIME 200 SL	I. 016-17	ATLAS AGRICOLE	Bayer A.G	Pêcher : Pucerons : 0.6 l/ha Vigne : Cicadelle : 0.3 l/ha (COMM du 18/10/2017) Piment sous serre :Mouche blanche (Bemisiatabaci): 0.75 l/ha Rectification de la dose .60cc à 0.75 l/ha (COMM08/06/22)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 25 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
127	Fluxametamide	10%	EC	GRACIA 100 EC	I.38-23	AGRIMATCO	NISSAN CHEMICAL CORPORATION	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles :0.5 l/ha (50 cc/hl) Pulvérisation foliaire, dès l'apparition des premières larves 02 applications par saison Durée de protection 02 semaines au minimum (COMM 28/12/23)
128	Gamma-cyhalothrine	60 g/l	CS	Vantex	16-018I.	AGROSYSTEMES	FMC	Pommier : Carpocapse : 20 cc/hl
129	Helicoverpaarmigeranucleopolyhedrovirus	7.5 10 ¹² cfu/l	SC	BOLLDEX SC	I.010-17	ALOHA Agriculture	ANDERMATT BIOCONTROL	Tomate :Noctuelles : 200 cc/ha (COMM du 20/06/2017)
130	Hexythiazox	10%	WP	Jalisco	IA.010-16	AGRIPROTEC	PROPLAN/QUMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Agrumes : Acariens : 50g/hl; Tomate :Acariens" Tetranychusurticae": 50g/hl;-Le produit montre une écotoxicité inacceptable pour le prédateur Phytoseiulus persimilis durant quelques jours après le traitement;-Mode d'action : contact (COMM 23/04/2019)
131	Hexythiazox	10%	WP	Diablo	I.A.175-11/21	EL KHADHRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Tomate : Acariens : 50 g/hl Piment : Acariens : 50 g/hl Agrumes, pommier : Acariens : 50 g/hl Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :50 g/hl -Application foliaire -volume de bouillie 800-1000 l/ha -nbre d'application:1 à 2 applications AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
132	Hexythiazox	10%	WP	Cesar	I.A.075-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	NIPPON SODA CO., LTD/ARYSTA/UP L	Tomate : Acariens : 50 g/hl Piment : Acariens : 50 g/hl Agrumes, pommier : Acariens : 50 g/hl Palmier dattier : Acariens des dattes:Oligonychusafrasicus:50 g/hl (COMM08/06/22 : APV)
133	Hexythiazox	10%	WP	Exitox	I.A.177-11/21	Ets MEZGHANI	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	Pommier : Acariens : 50 g/hl(COMM13/02/2020) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :50 g/hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
134	Hexythiazox	258,7 g/l	SC	ACRUX SC	I.005-22	AGROSYSTEMES	Ascenza Agro	Agrumes : Acariens (Tetranychusurticae):20 ml/hl volume de bouillie :1000 l/ha Appliquer au début du printemps à l'eclosion des

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 26 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								oeufs d'hivernage des acariens ou dès l'apparition des premières formes mobiles (COMM 08/06/2022)
135	Hexythiazox	258.7 g/l	SC	DIABLO MAX SC	I.004-22	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Agrumes: Acariens (Tetranychus urticae): 20 cc/hl volume de bouillie : 800-1000 l -avec l'apparition de l'infestation, au début de l'éclosion des œufs d'hiver (couleur rose des bourgeons) -pulvérisation foliaire -DAR: 28 jours -nbre d'app: 1 à 2 applications. (COMM 08/06/22) Palmier dattier : acarien " Oligonychus africanus " : 20 cc/Hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
136	Hexythiazox + Abamectine	50 g/L + 18 g/l	SC	ROCINANTE	I.04-21	AGRIPROTEC	PROPLAN/QUMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Agrumes: Acariens (Tetranychus urticae) : 0.75 l/ha (2000 l) Le présente un effet sur les formes mobiles qui dure 14 jours, et ne présente pas un effet significatif sur les œufs. (COMM 09/02/21) Palmier dattier : acarien " Oligonychus africanus " : 75 cc/Hl Volume de Bouillie : 1000 L/ha Période de traitement: curatif Nb de traitement: 01 Calendrier des applications: début d'attaque DAR: 14 JOURS AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
137	Huile d'essence d'orange	600 g/L	EC	OLEORA EC	I.04-23	BIOPROTECTION	UPL	Agrumes: Cochenille : Pou rouge de floride (<i>chrysomphalus aonidum</i>): 100 ml/hl (max. 2 L/ha) Volume de bouillie: 1000 l/ha stade d'application: BBCH 71-81 Nb de app: 2 au max Intervalle d'app: 07 jours (Comm 28 dec 2023)
138	Huile de paraffine	800 g/l	EC	OVI PRON TOP	I.003-22	BIOPROTECTION	UPL	Agrumes: Acariens (Tetranychus urticae): 1.5 l/hl (1500 l/ha)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 27 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								-Stade de culture BBCH 72 -nbre d'application:1-2 -durée entre les applications:>60 jours -DAR:20 jours (COMM 08/06/22)
139	Huile de paraffinique	79 %	EC	LAINCOIL EC	I.033-22	FERTITECH	LAINCO	Agrumes: Cochenilles farineuses:15 l/ha Volume de bouillie:1000 l/ha -Appliquer avant la coloration du fruit (avant BBCH81) -fréquence d'application: une seule application -méthode d'application: par pulvérisation foliaire(com 27/12/22)
140	Huile de paraffinique	79 %	EC	OLEO CAP EC	I.047-22	NEGANOR	LAINCO	Agrumes: Cochenille farineuse : 1.5 l/hl(15l/ha)(com 27/12/22)
141	Huile de paraffinique	830g/l	EC	AGROIL BLEU EC	I.034-22	PROMOCHIMIE	SIPCAM INAGRA	Agrumes: Traitement d'hiver et d'été (cochenilles farineuses ovicide à partir du3 ^{ème} jour et cet effet se poursuit jusqu' à 3 ^{ème} semaines après l'application du traitement.):20l/ha Volume de bouillie:2000-3000 l/ha Pulvérisation foliaire 2 traitement/10 jours(com 27/12/22)
142	Huile minérale	850 g/L	EC	SunOIL	I.008-13/23	AGRIMATCO	PETRONAS LUBRICANTS BELGIUM NV	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. D'hiver : 1,5 L/hl(COMM 19 avril 2023)
143	Huile minérale	817 g/L	EC	Oviphyt	I.127-11/21	ATLAS INDUSTRIE	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS/S ANGOSSE	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. D'hiver : 1,5 L/hl (COMM23/04/2019)
144	Huile minérale	850 g/L	EC	Citrole	I.076-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	TotalEnergies Fluides	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 28 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Pommier : Acariens trait. D'hiver : 1,5 L/hl
145	Huile minérale	850 g/L	EC	LUMIERE EC	I.50-23	COTUGRAIN	TotalEnergies Fluides <u>A travers</u> KOPPERT	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. D'hiver : 1,5 L/hl (COMM 28/12/2023)
146	Huile minérale	830 g/l	EC	Insecticida KEY	I.001-14/24	ETS MEZGHANI	IndustrialQuimica Key	Agrumes : Mineuses :1L/ha (Produit seul) OU 0.4 L/ha (En association avec un insecticide). (comm22mai2024)
147	Huile minérale	850 g/L	EC	PetrOil	I005-17	SOCOOPEC	PETRONAS LUBRICANTS	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. D'hiver : 1,5 L/hl COMM 20/06/2017
148	Huile minérale	850 g/L	EC	Plant oil	I.149-11/21	STE EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAU GH EUROPE SARL	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. D'hiver : 1,5 L/hl
149	Indoxacarb	150 g/l	SC	PIXEL SC	I.043-22	FERTITECH	TOPAGRO BIOSCIENCE	Tomate :Tuta absoluta:50 ml/hl 03 applications au minimum 7 jours d'intervalle Première applications: développement des premières pousses Volume de bouillie:1000 l/ha DAR:42 jours(com 27/12/22)
150	Indoxacarb	150 g/l	SC	POTER	I.07-23	PROTAGRI	NANJING AGROCHEMICA L	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :50 cc/hl Intervalle entre les applications 8 jours DAR:3 jours (COMM 28/12/2023)
151	Indoxacarb	30 %	WDG	INDOXAL XTRA WDG	I.15-23	AGRINOVA	AGROBEATS TECH CHINE	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :150 g/ha 1 à 2 applications Volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 28/12/2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 29 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
152	Indoxacarb	30 %	WDG	VEROX WDG	I.08-24	SANABEL AGRO	AGROBEATS TECH CHINE	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :150 g/ha 1 à 2 applications Volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 22/05/2024)
153	Indoxacarbe	150 g/l	SC	OXAL SC	I.035-22	NEGANOR	Jingboagrochemica ls technologie	Choux: Piérade de choux:30 cc/hl(300 cc/ha) Volume de bouillie:1000 l/ha -application par pulvérisation foliaire -appliquer dès le stade cotylédons étalés de la culture, avec un seuil de 25 % de plants qui présentent des dégâts. -4 applications max/cycle -intervalle entre les applications:3 jours -DAR:3 jours30 cc/hl(300 cc/ha) (com 27/12/22)
154	Indoxacarbe	150 g/l	SC	INDO SUPER SC	I.039-22	Sté ELKHADRA	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO .LTD/cropidea	Tomates: Tuta absoluta:50 cc/hl Volume de bouillie:500-1000 l/ha -DAR:03 jours -Nombre de traitements:2 -intervalle:14 jours(com 27/12/22)
155	Indoxacarbe	30%	WG	VIRTUOZ WG	I.52-23	NEGANOR	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL	Tomate: Tuta absoluta:170 g/ha Application foliaire (COMM 28/12/2023)
156	Indoxacarbe	30%	WG	HoproleXtra	I.040-22	UNIAGRO	Shandong weifang rainbow chemical0	Tomate: Tuta absoluta:170 g/ha Application foliaire(com 27/12/22)
157	Indoxacarbe	30%	WG	JOKARI 30WG	I.37-23	SEPCM	AAKO	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelle(<i>Asparagus caterpillar</i>) :15 g/hl(150g/ha) Volume de bouillie: 600-800 L/ha -02 applications/cycle -appliquer dès les premières éclosions. Renouveler le traitement 7-14 jours plus tard si nécessaire -DAR:3 jours (COMM 28/12/2023)
158	Indoxacarbe	150 g/L	SC	TALENT 150 SC	I.016-18	Ets MEZGHANI	ASTRACHEM/AS TRANOVA	Tomate : TutaAbsoluta :50 cc/hl(COMM 18/10/2018)
159	Indoxacarbe	150 g/L	SC	Amiral	I.087-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	PARIJAT INDUSTR./ariestas	Tomate : TutaAbsoluta :50 cc/hl
160	Indoxacarbe	150 g/L	SC	GENERAL SC	I.045-22	RAYEN PHYTAGRI	PARIJAT INDUSTR.	Tomate : TutaAbsoluta :50 cc/hl(COMM27/12/22)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 30 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
161	Indoxacarbe	150 g/L	EC	AVATAR EC	I.023-22	ATLAS AGRICOLE	DU PONT/FMC	Tomate : Noctuelle : 30 cc/hl (300 cc/ha); Tomate :TutaAbsoluta :50 cc/hl (COMM 08/06/22)
162	Indoxacarbe	150 g/L	EC	Avaunt	I.089-11/21	SEPCM	DU PONT/FMC	Tomate : Noctuelle : 30 cc/hl (300 cc/ha); Tomate :TutaAbsoluta :50 cc/hl
163	Indoxacarbe	150 g/l	SC	STARCARB	I.021-22	SSCC	GARDA CHEMICAL	Tomate sous serre:Tuta absoluta:25 cc/hl. (COMM 08/06/22)
164	Indoxacarbe	15%	SC	GENERAL SR/Changement Nom COMMercial	I.21-23	ATLAS AGRICOLE	GHARDA HOUSE INDE	TOMATE SOUS SERRE:Tuta absoluta:50 ml/hl(0.5 l/ha) Volume de bouillie :400-1000 l/ha Nbre d'application:3 DAR:5 jours (COMM 28/12/2023)
165	Lambda-cyhalothrin	50 g/l	EC	LASTING EC	I.08-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE :Tuta absoluta:300 ml/ha -1 à 2 applications -volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 28/12/2023)
166	Lambda-cyhalothrin	50 g/l	EC	LATHRIN EC	I.14-24	PLANETE VERTE	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE :Tuta absoluta:300 ml/ha -1 à 2 applications -volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 22/05/2024)
167	Lambda-cyhalothrine	100 g/l	SC	BREAK ME SC SR/ Changement Nom COMMBreak thru	I.28-23	EL KHADRA	AUGUST inc/CORPORATE	TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche (Bemisiatabaci):20 cc/hl Volume de bouillie :500-1000l/ ha Pulverisation foliaire DAR:7 jours Mode de contact:contact, ingestion et inhalation -nbre d'app:2 à 3 app/saison (COMM 28/12/2023)
168	Indoxacarbe	150 g/L	SC	Valent	I.086-11/21	TASMID	ASTRACHEM	Tomate :TutaAbsoluta :50 cc/hl
169	Lambada cyhalothrine	5%	EG	Kempo EG	I. 14-21	BIOPROTECTION	NUFARM	Agrumes : Pucerons : 200 g/ha(COMM 09/02/21)
170	Lambada cyhalothrine	5%	EG	KAISO 5%	I. 014.-17	EL MOUSSEM AGRICOLE	NUFARM	Agrumes : Pucerons : 200 g/ha(COMM18/10/2017)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 31 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
171	Lambda cyhalothrin	2,50%	WDG	JUDO	I. 013-17	STIMA	Sharda	Agrumes : Cératite:75 g/hl Pêcher : Cératite: 75 g/hl Mode d'action :Par contact et ingestion (COMM du 18/10/2017)
172	Lambda cyhalothrin	2,50%	WDG	INDIGO WDG	I. 15-21	AGRIMED DISTRIBUTION	Sharda	Agrumes : Cératite:75 g/hl Pêcher : Cératite: 75 g/hl COMM09/02/21) COMM028 dec2023
173	Lambda-cyhalothrin	25 g/l	EC	KEYLAM EC	I.003-18	EtsMezghanni	Industrialquimica Key	Betterave à sucre : Pucerons, Casside : 75 cc/hl (12/01/2018)
174	Lambda-cyhalothrine	0.4 %	GR	POINTER GEO GR	I.07-21	AGRIPROTEC	SIPCAM INAGRA	Pomme de terre :insecte du sol (taupins)15 kg/ha Localisé à la ligne de semis à coté de la graine et/ou reparti et enterré dans le sillon pendant le buttage.(COMM09/02/21)
175	Lambda-cyhalothrine	0.4 %	GR	TRIKA EXPERT GR	I.06-21	PROMOCHIMIE	SIPCAM INAGRA	Pomme de terre :insecte du sol (taupins)15 kg/haLocalisé à la ligne de semis à coté de la graine et/ou reparti et enterré dans le sillon pendant le buttage.(COMM09/02/21)
176	Lambda-cyhalothrine	10g/l	CS	LAMBDATROL	I.007-18	AGRIPROTEC	SIPCAM INAGRA	Tomate : Noctuelle : 10 cc/hl;(COMM 18/10/2018)
177	Lambda-cyhalothrine	100g/l	CS	POINTER100 CS	I.002-17	promochimie	SIPCAM INAGRA	Tomate : Noctuelle : 10 cc/hl;(COMM du 20/06/2017)(COMM09/02/2021)
178	Lambda-cyhalothrine	25 g/l	EC	Pulsar	I.168-11/21	PROTAGRI	United Phosphous Ltd	Olivier : Teigne : 250 cc/ha Betterave : pucerons, casside : 75 cc/hl Arbres fruitiers : Carpocapse : 75cc/hl Pommiers : Pucerons :75 cc/hl
179	Lambda-cyhalothrine	50 g/L	EC	Ravane	I.091-11/21	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Pommier : Carpocapse : 25 cc/hl
180	Lambda-cyhalothrine	50 g/L	EC	Markate	I.016-15	AMINCO	GLOBACHEM	Pommier : Carpocapse : 25 cc/hl
181	Lambda-cyhalothrine	50 g/L	EC	Expert	I.007-15	SANABEL AGRO	SHARDA WORLDWIDE	Pommier : Carpocapse : 25 cc/hl
182	Lambda-cyhalothrine	50 g/L	EC	lalion EC	I.16-21	deltaagricole plus	SHARDA WORLDWIDE	Pommier : Carpocapse : 25 cc/hl(COMM09/02/21)
183	Lambda-cyhalothrine	50 g/L	EC	Jackpot	16-013I.	SANABEL AGRO	ROTAM AGROCHEMICA LS(rivale)	Féverole : sitones et phytanomes : 300 cc/ha
184	Lambda-cyhalothrine	100 g/L	CS	Kung Fu	I.005-18	SOLAGRI	SYNGENTA	Toutes cultures : Noctuelles : 80 cc/ha; Pommier, poirier : Carpocapse, ceratite : 150 cc/ha; Pommier, poirier : Pucerons : 80 cc/ha; Vigne : Cicadelles, Thrips : 200 cc/ha; C. maraîchères : Pucerons, Mouches blanches : 150 cc/ha

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 32 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
185	Manipropamide +Oxychlorure de cuivre	2.5%+13.95%	WG	REVUS C	F.05-23	BIOPROTECTION	SYNGENTA	TOMATE SOUS SERRE :Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) :5 k/ha Volume de bouillie :200-600 l App foliaire BBCH11-BBCH89 04 app/saison Durée entre les app:07 jours DAR:3 jours(COMM 28/12/23) (comm22/05/2024)
186	Metaflumizone	240 g/l	SC	VERSIMO 240 SC	I.13-21	AGRIPROTEC	BASF	Tomate :Tutaabsoluta: 1 L/ha (stade larvaire L1, traitement foliaire, 2 fois par cycle max)(COMM 09/02/21)
187	metarhiziumrileyi strain	PHP1705:1x108 CFU/g (1.0 W/W %)		Nomu-Protec	I.48-23	ALOHA	ANDERMATT PHP (Pty) AFRIQUE DE SUD	TOMATE : Noctuelles :300 g/ha Pulvérisation foliaire 09 applications au max/cycle Intervalle entre application:07 jours DAR:0 j (COMM 28/12/23)
188	Métam sodium	510 g/L	SL	Fumical	IN.098-11/21	BIOPROTECTION	UPL/ARYSTA LIFESCIENCE	Tomate : Insectes du sol, Nématodes : 1L PC/10Ld'eau/10m²;Soit 1000 L/ha (traitement des planches de semis); Tabac : Insectes du sol, Nématodes : 1L PC/10Ld'eau/10m²,Soit 1000 L/ha (30 jours avant transplantation)
189	Methoxyfenozide	240 g/l	SC	Runner	I.019-16	PROMOCHIMIE	DOW AGROSCIENCES	Pommier : Carpocapse: 40 cc/hl(COMM09/02/2021)
190	Milbemectin	10 g/L	EC	Milbeknock	IA.103-11/21	AGRIPROTEC	Mitsui Chemicals Agro,Inc/summit agro	C.maraîchères, Arboriculture fruitière : Acariens, mouches mineuse, mouche blanche : 70 cc/hl Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasiticus " :70 cc/Hl Volume de Bouillie :1000L/Ha Période de traitement: curatif Nbre de traitement: 01 Calendrier des applications début d'attaque DAR:14 jours AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 33 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
191	Natural Pyrethrin	20 g/l	EC	PULSEI EC	I.24-23	COTUGRAIN	SPEISA SA ESPAGNE	TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche (<i>Bemisiatabaci</i>):120 ml/100 litres PIMENT SOUS SERRE : Pucerons :120 ml/100 litres Réaliser 1 à 3 applications à l'intervalle de 07 jours COMMencer les traitements dès le début de l'infestation Les traitements doivent être effectués en ajustant le volume de bouillie pour avoir une bonne couverture de la plante. (COMM 28/12/23)
192	Oxamyl	100 g/l	SL	Vydate 10 L	128-11/21 I.	AGRIPROTEC	DU PONT/cortevaagris cience	Tomate: mouche blanche: 10 l/ha
193	Pyriproxyfen	100 g/l	EC	LYNO EC	I.27-23	PROTAGRI	NANJING CHINE(dis)/jiangs u (fab)	TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche:50 cc/hl 02 applications max durant 7 j d'intervalle DAR:7jours (COMM 28/12/23)
194	Pyriproxifene	50 cc/hl	EC	DRASSEN	I.06-23	AGRONOMIC LAND	jiangsukuaida/shan ghai shengnong pesticide	Agrume : Cochenille : Pou rouge de floride (<i>chrysomphalusaonidum</i>):50 cc/hl Pulvérisation foliaire Appliquer au début de l(incubation des nymphes et renouveler l'application à un intervalle de 7-15 jours DAR :28 jours (COMM 28/12/23)
195	Phosmet	50%	WP	Imidan 50 A	I.152-11/21	AGRIPROTEC	GOWA&N/Espagn e	Arbo: Carpocapse, teigne, ver de jeunes fruits, psylle :100 g/hl Poirier : Carpocapse:100 g/hl; Agrumes : Cératites : 100 g/hl (COMM 17/05/2016) Pêcher : Cératite : 150 g/hl, Mode d'action : contact, ingestion et inhalation;(COMM18/10/2017) Olivier: Dacus oleae:150 g/hl Volume de bouillie:1000 L/ha -pulvérisation foliaire en préventif -nombre d'application:2/an Calendrier d'application:dés le début du vol DAR:28 jours (com 27/12/22)
196	Phosmet	50%	WP	Foslete 50	I.011-13/23	EL KHADHRA	SIPCAM INAGRA	Arbo: Carpocapse, teigne, ver de jeunes fruits, psylle :100 g/hl;

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 34 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Poirier : Carpocapse:100 g/hl; Pêcher : Cératite: 150 g/hl (Ext : COMM 18/10/2017); Agrume : Cératite:100 g/hl ; -Pulvérisation foliaire avec 1 app/an (COMM 23/04/2019)(COMM 19 avril 2023)
197	Phosphure d'Al.	77,50%	ET	Quickphlo-R	I.153-11/21	PROTAGRI	UNITED PHOSPHORUS LTD	Amande, pistache, noisette, pignon, cacao, ect... : Insectes des denrées agro-alimentaires stockés Céréales, légumineuses : Insectes des denrées stockés Dattes stockées : Pyrale : Sachet de 125 gr pour 15 m3 soit 4 Tonnes (Fumigation par générateur de gaz en milieu hermétiquement fermé).
198	Phosphure d'Al. +Phosphure d'Hy.	57 % +33%	FU	Quickphos	I.154-11/21	PROTAGRI	UNITED PHOSPHORUS LTD	Désinfection des denrées stockées;Désinfection des dattes : 1 à 2 g/m3
199	Phosphure d'Al. +Phosphure d'Hy.	57 % +33%	ET	Detia Gas	I.142-11/21	STIMA	DETIA DEGUECH	Désinfection des denrées stockées;Désinfection des dattes : 1 à 2 g/m3
200	Phosphure de Magnésium +Phosphure d'Hy.	57%+33%	PL	Magnaphos	I.171-11/21	PROTAGRI	UNITED PHOSPHORUS LTD	Dattes : Pyrale, ectomeyloïsciratonia :1 plaq./10m3 Tabac au stockage : Lasioderma serricorne : 1 plaq./30 m3 pendant 72 heure
201	Phosphure de Magnésium +Phosphure d'Hy.	57%+33%	PL	Deguech plate	I.143-11/21	STIMA	DETIA DEGUECH	Dattes : Pyrale, ectomeyloïsciratonia :1 plaq./10m3 Tabac au stockage : Lasioderma serricorne : 1 plaq./30 m3 pendant 72 heure
202	Pyradaben	200 g/kg	WP	RHAMSES 20 WP	I.34-23	PLANETE VERTE	ASTRANOVA	TOMATE SOUS SERRE : Acariens rouges:100 g/100 l DAR:03 jours (COMM 28/12/23)
203	Pyréthrine	40g/l	EC	ABANTO 40 EC	I.008-19	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAU GH EUROPE SARL	Piment : Mouche blanche(Aleurodes) :75cc/hl (30 g s.a/ha);-pulvérisation foliaire avec deux traitements au maximum.-stade d'app :au début de l'attaque, lorsque les premiers symptômes sont visibles, avant le rejet du NTA,-L'efficacité de produit s'étale sur 7 jours,, Pêcher : Pucerons: 75 cc/hl (30 g s.a/ha) -pulvérisation foliaire,-Nbre d'app :1 à 2 traitements par saison.-stade d'app :au début de l'attaque, lorsque les premiers symptômes sont visibles.L'efficacité de produit s'étale sur 15 jours(COMM23/04/2019)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 35 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche : 75cc/hl 1à 2 applications par saison Volume de bouillie:800 à1000 l/ha (COMM 28/12/2023)
204	Pyrethrines	40 g/l	EC	KRISANT EC	I.31-23	PROMOCHIMIE	SIPCAM INGRA ESPAGNE	PIMENT SOUS SERRE: Mouche blanche (<i>Bemisiatabaci</i>):0.75 l/ha Appliquer le produit pendant tout le cycle de culture au début de l'infestation Nbre d'appli:2 avec intervalle entre les applide 07 j au min Volume de bouillie:1000 l/ha DAR:3 j (COMM 28/12/2023)
205	Pyrethrins	20 g/l	EC	PIRECRIS	I.008-22	ATLAS AGRICOLE	SeipasaS.A	Piment sous serre: Mouche blanche Bemisia tabaci:120cc/hl (1.2 l/ha) avec volume de bouillie:1000 l/ha Application foliaire en 3 application/cycle Intervalle 7 jours entre applications DAR:1j(COMM 08/06/22)
206	Pyrethrins	18, 61 g/l	EC	Piretro Verde	I. 012-17	STIMA	COPYR S.p.A	Agrumes: Mineuses : 160 cc/hl En trois (03) applications espacées de 7 jours. Mode d'action : contact et ingestion (COMM 18/10/2017) Tomate : Mouche blanche : 160 cc/hl (comm12/01/2018)
207	Pyridalyl	500 g/l	EC	Sumipleo50EC	I.015-16	AGRIMATCO	SUMITOMO	Tomate : Noctuelle : 0.2 l/ha TOMATE SOUS SERRE : <i>Tutaabsoluta</i> :40cc/hl -pulvérisation foliaire au début de l'infestation (COMM 28/12/23)
208	Pyrifluquinazon	20%	SC	RYCAR SC	I.007-22	EL KHADRA	SIPCAM INAGRAS	Piment sous serre: Mouche blanche(<i>Bemisiatabaci</i>):25 cc/hl volume de bouillie:700-1000 l/ha -pulvérisation foliaire -Traitement: *1 ier quand un seuil de 10 insectes (larves et adultes) par plante est atteint *2éme 7 à 10 jours après le premier traitement (COMM 08/06/22) Agrumes: Cochenilles farineuses:25 cc/hl

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 36 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Volume de bouillie:600-1000 l/ha -pulvérisation foliaire -Traitement: appliquer au stade phénologique BBCH 65(plein floraison:50% des fleurs sont ouvertes les premiers pétales tombant. (com 27/12/22) PIMENT SOUS SERRE : Thrips :25 cc/hl Volume de bouillie :700-1000 l/ha -pulvérisation foliaire -Traitement: *1 ier quand un seuil de 10 insectes (larves et adultes) par plante est atteint *2ème 7 à 10 jours après le premier traitement (COMM 28/12/2023)
209	Pyrimicarbe	50%	WG	y	I.110-11/21	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Betterave, Céréale, P.de terre, Arbo,C. ornementale: Pucerons : 70 g/hl
210	Pyrimicarbe	50%	WG	Tornado	I.017-15	AMINCO	GLOBACHEM	Betterave, Céréale, P.de terre, Arbo,C. ornementale: Pucerons : 70 g/hl
211	PYRIMIPHOS METHYL	500 g/l	EC	ACTELIC EC	I.02-24 Restriction d'usage: utilisation uniquement pour les sociétés productrices des semences	AGRIPROTEC	SYNGENTA	Grains de Céréales: Ravageurs des denrées stockées (Insectes Et Acariens) *100 ml/5 Litres d'eau/ 100 m2 (traitements des surfaces : Locaux Et Sacs Vides) *20 ml/Tonne dans 1 à 2 Litres d'eau (Traitement des denrées stockées) (COMM 22/02/2024)
212	Pyriproxyfen	100 g/l	EC	MAGIC EC	I.009-22	Fertitech	HANGZHOU TOPAGRO BIOSCIENCE	Piment sous serre: Mouche blanche (Bemisiatabaci):0.5 l/havolume de bouillie:1000 l/ha-intervalle d'application:7 jours-fréquence:2 fois par saison-méthode d'application: par pulvérisation-DAR:3 jours. (COMM 08/06/22)
213	Pyriproxyfene	100 g/l	EC	MULIGAN	I.001-18	AGRIPROTEC	PROPLAN/QUMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Tomate :Mouche blanche :50 cc/hl (12/01/2018)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 37 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
214	Pyriproxyfene	100 g/l	EC	PROXIMO EC	I.002-18	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAU GH EUROPE SARL	Tomate : Mouche blanche /75 cc/hl (12/01/2018) Agrumes : Cochenille australienne:50 cc/hl -Pulvérisation foliaire avec une seule application par compagne (COMM 23/04/2019)
215	Pyriproxyfene	100g/l	EC	BRAI EC	I.006-19	RAYEN PHYTAGRI	LAINCO SA	Agrumes : Cochenilles australienne: 50 cc/hl ;- Avec restriction d'usage deux application au maximum par cycle de culture (COMM 23/04/2019)
216	Pyriproxyfene	100g/l	EC	PROXYGOLD EC	I.044-22	NEGANOR	LAINCO SA	Agrumes : Cochenilles australienne : 50 cc/hl (com 27/12/22)
217	Spinetoram	120 g/l	SC	Radiant 120 SC	I.001-15	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCE	Cultures Maraichères s/serres : Noctuelles : 50 cc/hl Tomate :Tutaabsoluta :50 cc/hl Poirier : PSYLLE : 80 CC/HL Piment : Thrips : 50 cc/hl Pomme de terre : Teigne:10 cc/hl (Par pulvérisation ou trempage) Vigne : Thrips: 40 cc/hl(Pulvérisation foliaire) Vigne : Drosophile: 20 cc/hl Fraisier : Thrips: 40 cc/hl(l'efficacité de produit s'étale sur 7 à 10 jours), Pulvérisation foliaire (COMM 23/04/2019)
218	Spinetoram + Methoxyfenozone	60g/l+300g/l	SC	UPHOLD SC	I.36-23	ATLAS AGRICOLE	CORTIVA	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles : 35 cc/hl Application foliaire 1 à 3 traitements par cycle de culture Traitement dès l'observation des larves Durée de protection 10 à 15j suivant le degré d'attaque et les conditions climatiques (COMM 28/12/2023)
219	Spinosade	480 g/l	SC	SPINO 480 SC	I.017-22	EL KHADRA	BAICO BIOTECH CO,LTD/	Tomate sous serre :Tuta absoluta:0.25l/ha (25 cc/hl) Volume de bouillie:800-1000 l -pulvérisation foliaire -1 à 2 traitements par saison -au début de l'attaque, lorsque les premiers symptômes sont visibles. -DAR:0 jours. (COMM 08/06/22) Pomme de terre de conservation :Teigne :5cc/hl -pulvérisation sur tubercules, par trempage -moment: pendant la conservation. -DAR:0 jours AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (comm22/05/2024)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 38 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
220	Spinosade	480 g/l	SC	Spanvic	I.13-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :25 ml/hl 1 à 2 applications Volume de bouillie:600-900 l/ha (COMM 28/12/2023)
221	Spinosade	480 g/l	SC	SPINOR 480 SC	I.12-24	PLANETE VERTE	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :25 ml/hl 1 à 2 applications Volume de bouillie:600-900 l/ha (COMM 22/05/2024)
223	Spinosade	240 g/L	SC	LASER 240 SC	I.010-13/23	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCE/c ortevaagriscience	Tomate : Tutaabsoluta : 50 cc/hl Tomates s/serres : Mouches mineuses : 60 cc/hl Cultures s/serres : Mouches blanches : 60 cc/hl Vigne, fraisier : Thrips: 40 cc/hl P. de terre de conservation : Teigne : 10 cc/hl par pulvérisation ou trempage(COMM 19 avril 2023)
224	Spinosade	0,24 g/L	CB	Spintor	I.007-14/24	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCE	Agrumes : Cératite : - 1 L/ha T.Terrestre- - 1.25 L/ha T.Aérien Olivier : Mouches de l'olivier:1L/ha T.Terrestre 10 à 50 L bouillie1L/ha T.Aérien 1 L/0,5 ha par bande (comm 22 mai 2024)
225	Spinosade	480 g/l	SC	SPINOBEST	I.53-23	TASMID	BAICO BIOTECH CO,LTD/	Tomate sous serre :Tuta absoluta:0.25l/ha (25 cc/hl) Volume de bouillie:800-1000 l -pulvérisation foliaire -1 à 2 traitements par saison -au début de l'attaque, lorsque les premiers symptômes sont visibles. -DAR:0 jours. (COMM 28/12/2023)
226	Spinosad	10%	SC	SUCCESS SC	I.16-23	PROTAGRI	NANJING AGROHEMICAL CHINE	TOMATE SOUS SERRE : Tutaabsoluta :120 cc/hl Traitement des parties aeriennes Intervalle de traitement 7-14 jours DAR:35 jours (COMM 28/12/2023)
227	Spirodiclofen	24%	SC	SPIRIDOR 240 SC	I.01-21	SHARDA CROPCHEN Tunisie	SHARDA CROPCHEN	Agrumes :Acariens(TetranychusUrticae) :40 cc/hl le produit présente un effet toxique significatif sur les prédateurs respectivement aux 14ème et 21ème jours après traitement.(COMM09/02/21)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 39 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
228	Spiropidion	300g/l	SC	ELESTAL300 SC	I.01-23	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Agrumes :Cochenille : Pou rouge de floride (<i>chrysomphalusaonidum</i>) ;Pou rouge de Californie <i>aonidiella Aurantii</i> :0.8l/ha Volume de bouillie:500-600 l/ha 1 à 2 applications (COMM 28 dec 2023) (COMM22/05/2024)
229	Spirodiclofen	24%	SC	SPIDER EXTRA SC	I.026-22	SANABEL AGRO	SHARDA CROPCHEM	Agrumes :Acariens(TetranychusUrticae) :40 cc/hlle produit présente un effet toxique significatif sur les prédateurs respectivement aux 14ème et 21ème jours après traitement (COMM 08/06/22) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasiticus " :40ml/Hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
230	Spirodiclofen	240 g/L	SC	Bolido 240 SC	IA.114-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPCSCIENCE/G OWAN	Poirier : Psylle : 60 cc/hl Pommier, tomate, vignem,Agrumes : Acariens : 40 ml/100 L soit 0,4 L/ha Tomate : Mouches blanches : 40 ml/100 L soit 0,4 L/ha
231	Spirodiclofen	240 g/L	SC	Envidor	IA.115-11/21	STEC	BAYER CROPCSCIENCE/g owan	Pommiers; Agrumes : Acariens : 40 cc/hl Poirier : Psylle : 60 cc/hl Pommier, tomate, vigne : Acariens : 40 ml/100 L soit 0,4 L/ha Tomate : Mouches blanches : 40 ml/100 L soit 0,4 L/ha
232	Spirodiclofen	240 g/l	SC	ASKARI 240 SC	I.002-22	SEPCM	AAKO	Agrumes :Acariens(Tetranychusurticae):40 cc/hl -volume de bouillie :1000 l/ha Intervention:dés que les œufs sont en cours d'éclosion pour obtenir une efficacité optimale. Stade d'application: à la chute des pétales jusqu'au début de maturation des fruits. DAR:14 jours(COMM 08/06/22)
233	Spirodiclofen	240 g/l	SC	ACAROS SC	I.012-22	STEC	Shandong Kangqiao NANJING Agrochemical	Tomate sous serre :Mouche blanche(Bemisiatabaci):40 cc/hl Volume de bouillie:600-1000 l -pulvérisation foliaire -01 app par cycle (COMM 08/06/22)
234	Spirodiclofen	240 g/l	SC	SPIROFEN	01-24.I	Ste ELKHADRA	EASTCHEM CO.Ltd	Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasiticus " :40 cc/Hl

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 40 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Volume de Bouillie :800-1000L/Ha DAR 14 jours Nbre d'app :1à 2 applications/saison AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
235	Spiromesifen	240 g/L	SC	Oberon 240 SC	IA.116-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Tomate : Acariens : 60 cc/hl Piment : Mouches blanches : 50 cc/hl Pommier : Acariens : 40 cc/hl Concombre : acariens : 50 cc/hl (comm12/01/2018) Agrumes :Acariens (Tetranychusurticae):50 cc/hl avec un volume de bouillie :1000-2500 l/ha Stade d'application:BBCH85-89 (Ext ; COMM 08/06/22) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :50 cc/Hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
236	Spirotetramat	150 g/L	OD	Movento 150 OD	I.117-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Agrumes : Cochenilles : 120 cc/hl soit 1,2 L/ha Pecher : Pou de San Jose :1 l /ha Tomate : Tutaabsoluta : 50 cc/hl Vigne : Cochenille farineuse : 1,2 L/ha (COMM 06/12/2012) PIMENT SOUS SERRE :Thrips :0.5 l/ha Volume de bouillie :400-1000 l/ha pulvérisation foliaire Dés l'apparition des symptômes(COMM28/12/2023)
237	Spirotetramat	240g/l	SC	Natramat 240SC	I.02-23	AGRIPROTEC	Jiangsu United Agrochemical	Agrume : Cochenille : Pou rouge de floride (<i>chrysomphalusaonidum</i>):1.2 L/ha Volume de bouillie:1000 l Mode de traitement: foliaire Période de traitement (Préventif ou Curatif) : Curatif Nombre de traitements : 02 Calendrier des applications : Utilisez avec un intervalle de 21-35 jours DAR : 20 jours(COMM 28/12/2023)
238	Spirotetramat	22.4%	SC	MAGNUS SC	I.29-23	STEC	AAKO	TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche (Bemisiatabaci):0.4 l/ha 800-1000 l/ha Appliquer au tout début des infestations et /opudés

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 41 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								l'arrivée des adultes sur la culture Repete l'application selon intervalle de 14 jours en cas de forte pression du ravageur DAR:3 jours(COMM 28/12/2023)
239	Spinetoram + Sulfoxaflor(Isoclast TM active)	100g/kg+300g/kg	WG	FIDELITY WG	I.32-23	SEPCM	CORTEVA	TOMATE SOUS SERRE :Pucerons :0.08 kg/ha -3 trait. dès l'apparition des ravageurs -Intervalle de trait 7j -répéter selon l'ampleur de l'infestation -volume de bouillie 1000 l/ha -DAR :7j TOMATE SOUS SERRE: Thrips :0.25 kg/ha -3 trait. dès l'apparition des ravageurs -Intervalle de trait 7j -répéter selon l'ampleur de l'infestation -volume de bouillie 1000 l/ha -DAR :7j(COMM 28/12/2023)
240	SpliNPV (Spodopteralittoralisnucleopolyhedrovirus)	5 x 1011 corps viraux/litre	SC	LITTOVIR	I.007-19	ALOHA AGRICULTURE	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Fraisier : Noctuelle: 200 cc/hl;(COMM 23/04/2019)
241	Spores de lecanicilliummuscarium souche 1979	48 g/kg (1.1*1010 spores/g)	WG	MYCOTAL WG	I.004-18	NUTRIPLANT	KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEM	Tomate : Aleurodes;(mouches blanches) 1g/l de produit + 2.5 ml/l de adpro (adjuvant) (12/01/2018)
242	Sulfoxaflor	240 g/l	SC	Closer 240 SC	I.008-15	SEPCM	DOW AGROSCIENCE/c orteva	Agrumes : Cochenilles : 20 cc/hl Agrumes : Pucerons : 12.5 cc/hl Tomate : Mouche blanche : 250 ml/ha (COMM 12/01/2018)
243	Sulfoxaflor	240 g/l	SC	TRANSFORM SC	I.55-23	EL BARAKA	DOW AGROSCIENCE/c orteva	Agrumes : Cochenilles : 20 cc/hl Agrumes : Pucerons : 12.5 cc/hl Tomate : Mouche blanche : 250 ml/ha (COMM 12/01/2018)(COMM 28 dec2023)
244	Tau-fluvalinate	240 g/L	EW	Mavrik 2 F	I.173-11/21	STEC	AAKO	Tomate, piment, pommier : Pucerons : 100 cc/hl Pommier : Carpocapse : 100 cc/hl
245	Tebufenpyrad	20%	WP	MASAI	I.A.007-13/23	AGRIPROTEC	BASF/belchim/CeratisBelchimN.V	Pommier : Acariens: 50 g/hl Agrume :Acariens:50g/hl (COMM 17/05/2016). Fraisier : Acariens "Tetranychusurticae" -Mode d'action : contact et ingestion:50g/hl - Le produit montre une écotoxicité inacceptable pour le prédateur Phytoseiuluspersimilis durant quelques jours après le traitement (COMM 23/04/2019) (COMM 19 avril 2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 42 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :50 g/Hl Volume de Bouillie :1000 L/Ha Période de traitement: curatif Nbre de traitement: 01 Calendrier des applications: début d'attaque DAR:21 jours AUTORISATION PROVISoire DE VENTE (COMM 22/02/2024)
246	Tefluthrine	0,50%	GR	VOLTRA 0.5 G	I.005-20	COTUGRAIN	SYNGENTA	Piment : Insectes du sol : 15 Kg/ha Pomme de terre : Taupins : 15 kg/ha (application localisée par ligne au stade 2-3 feuilles) Betterave : Taupins (Vers fil de fer) : 15 Kg/ha(COMM13/02/2020).
247	Tefluthrine	0.5%	GR	DIASTAR MAXI GR	I.05-21	RAYEN PHYTAGRI	DIACHEM	Pomme de terre : Insectes du sol (vers fil de fer) :15Kg/ha -Epandage localisé sur la ligne de plantation -1 Application par cycle de culture - Appliqué à la plantation (repiquage) ou au semis(COMM09/02/21)
248	Tolfenpyrade	150 g/l	EC	HACHI-HACHI EC	I.20-23	EL KHADRA	SIPCAM INAGRA	TOMATE SOUS SERRE : <i>Tuta absoluta</i> :50 cc/hl PIMENT SOUS SERRE :Mouche blanche (Bemisiatabaci):50 cc/hl -Traitement foliaire -Bouillie : 700 à 1000 l d'eau/ha Traitement : *1 ^{er} trait. Quand un seuil de 10 insectes (larves et adultes) par plante est atteint *2 ^{ème} trait. De 7 à 10 jours après le premier traitement. (COMM 28/12/2023)

II. FONGICIDES

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
----	------------------	-------	------	--------	-------	---------	-----------	-------

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 43 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	Adepidyn+ Difenconazole	75 g/l+125 g/l	SC	Miravis duo Sc	F.11-21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Tomate: Alternaria(Alternariasolani):0.75 l/ha -Trois applications /cycle/15 jours Pastèque: Oidium (Sphaerothecafuliginea);0.75 l/ha 03 traitement/cycles/ 15 jours -1ere application après 15 jours de repiquage Vigne: Oidium(Uncinulanecator):0.65 l/ha(COMM09/02/21)
02	Ametoctradin+ Dimethomorph	300 g/L + 225 g/L	SC	Orvego	F.002-14/24	AGRIPROTEC	BASF	Pomme de terre : Mildiou : 0.8 l/ha(comm 22 mai 2024)
03	Ametoctradine	200 g/l	SC	SNOOKER SC	F.003-19	STIMA	BASF	Tomate: Mildiou:150 cc/hl(1.5 l/ha),-pulvérisation foliaire;-nbre de traitement max :3 (COMM23/04/2019)
04	Amisulbrom	200g/l	SC	LEIMAY 20 SC	F.014-17	EL MOUSSEM AGRICOLE	NISSAN CHEMICAL EUROPE SAS/ARYSTA LIFESCIENCES/UPL	Tomate : Mildiou: 600 ml/ha; Pomme de terre : Mildiou : 500 ml/ha;(COMM du 20/06/2017); Vigne : Mildiou : 375 ml/ha(COMM 18/10/2017)
05	Aureobasidiumpullulans DSM 14940 et aureobasidiumpullulans DSM 14941	500g/kg(2.5*10 ⁹ CFU/g)500g/kg(2.5*10 ⁹ CFU/g) ou 50%+50%	WG	BOTECTOR WG	F.22-21	STIMA	BIOFERM/SAN AGROW/autriche	Vigne: Pourriture grise(Botrytis cinerea): 1 kg/ha 04 Applications au total: -BBCH 68-89 (soit 80% des chapeaux floraux tombés, -BBCH77 soit avant la fermeture de la grappe, -BBCH85 soit avant la véraison, pendant le ramollissement des baies ,ou pendant la maturation, -BBCH85-89 entre la véraison et le vendange(COMM09/02/21)
06	Azoxystrobine	25%	SC	SORBISTAR	F.040-22	SOCOOPEC	ZHEJIANG E-TONG CHEMICAL	Melon: Oidium:30 cc/hl (COMM 08/06/22)
07	Azoxystrobine	25%	EC	ASTRO EC	F.26-23	TASMID	ZHEJIANG E-TONG CHEMICAL	Melon: Oidium:30 cc/hl (COMM 28/12/23)
08	Azoxystrobine	250 g/l	SC	LEGADO 250 SC	F.014-18	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Blé : Rouille : 0.8 l/ha (300-400 l/ha) (Pulvérisation foliaire; nbre de Trait. :2 au max (intervalle min de 14 j)/par cycle de culture; Calendrier des applications :1 ^{er} trait à BBCH31-39 et le 2 ^{ème} à la fin de la floraison (BBCH69) (la s.adoit être appliquée avant ou au début de l'infection);DAR : 35 j;(COMM 18/10/2018)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 44 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
09	Azoxystrobine	250 g/l	SC	Azox SC	F.039-17	Ets MEZGHANNI	JIANGYIN SULI CHEMICAL CO.LTDi,Q,Key	Blés : Septoriose: 0.8 l/ha (300 l/ha)(COMM 18/10/2017); Blé : Rouille : 0.8 l/ha;traitement foliaire; DAR : 42 jours)(COMM 18/10/2018)
10	Azoxystrobine	50%	WG	AXYTOP 50WG	F.060-22	EXCEL AGRI	SHARDA	Blé dur : Septoriose : 0.4 kg/ha (COMM 08/06/2022)
11	Azoxystrobine	50%	WG	Cayen 500 WG	F.035-16	RAYEN PHYTAGRI	SHARDA	Blé dur : Septoriose : 0.4 kg/ha
12	Azoxystrobine	250 g/l	SC	SINSTAR SC	F.030-17	SANABEL AGRO	SINON CORPORATION	Blés : Septoriose: 0.8 l/ha (COMM 18/10/2017); Féverole :Botrytis : 0.75 l/ha ;(300 l/ha)(Pulvérisation foliaire;01 traitement par cycle à l'apparition des premiers symptômes; 4 semaines de protection)(COMM18/10/2018)
13	Azoxystrobine	250 g/L	SC	Globaztar 250 SC	F.017-13/23	AGROSYSTEMES	Globachem	Blé : Septoriose : 0,8 l/ha(COMM 19 avril 2023)
14	Azoxystrobine	250 g/L	SC	Zaftra SC	F.034-15	AMINCO	Globachem	Blé : Septoriose : 0,8 l/ha
15	Azoxystrobine	250 g/L	SC	azimut SC	F.48-21	ATLAS AGRICOLE	NUFARM	Blé : Septoriose, rouille : 0,8 l /ha Orge : Helminthosporiose ,Rinchosporiose: 0.8 l /ha(COMM09/02/21)
16	Azoxystrobine	250 g/L	SC	Tazer 250 SC	F.024-15	EL MOUSSEM AGRICOLE	NUFARM	Blé : Septoriose, rouille : 0,8 l /ha Orge : Helminthosporiose : 0.8 l /ha COMM 04/11/15 Orge :Rinchosporiose:0.8 l/ha(COMM09/02/21)
17	Azoxystrobine	250 g/L	SC	Affix 250SC	F.030-16	PROTAGRI	UPL	Blé dur : rouilles : 0,8 l /ha
18	Azoxystrobine	250 g/L	SC	Aroxy 250SC	F.074-22	AGRIMATCO	UPL	Blé dur : rouilles : 0,8 l /ha (COMM 27/12/22)
19	Azoxystrobine	250 g/L	SC	HYDO 250 SC	F.34-21	STEC	nanjing agrochemical/JIANGYIN SULI CHEMICAL	Blé dur :Septoriose(Septoriatritici) :0.8 l/ha(300 l/ha) -pulvérisation foliaire -nbre max :2/an -DAR:42 jours(COMM09/02/21)
20	Azoxystrobine +Cyproconazole	200g/l + 80 g/l	SC	COUGAR SC	F.016-18	PROTAGRI	UPL LIMITED	Blé : septoriose : 0.5 l/ha (Traitement par pulvérisation)(COMM 18/10/2018)
21	Azoxystrobine +Cyproconazole	200g/l + 80 g/l	SC	DOUBLE FORCE	F. 029-17	SANABEL AGRO	SHARDA	Blés : Septoriose: 0.75 l/ha (COMM 18/10/2017)
22	Azoxystrobine +Difenoconazole	200 g/l+125 g/l	SC	ALLIANCE TOP SC	F.011-22	AGRI PLUS	NANJING AGROCHEMICAL	Vigne : Mildiou Plasmopara viticola : 50 cc/hl -le produit s'applique en préventif et curatif par pulvérisation foliaire, juste avant ou au début de

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 45 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								l'infection. -une bonne efficacité après 10 jours de la dernière application -DAR :7 jours (COMM 08/06/22)
23	Azoxystrobine +Difenoconazole	200 g/l+125 g/l	SC	AMISCORE SC	F.014-22	PROTAGRI	NANJING AGROCHEMICAL	Vigne: Mildiou (Plasmopara viticola):50 cc/hl Appliquer dès l'apparition des premières symptômes.lorsque le risqué d'infection est grand repete à intervalles réguliers-DAR:14 jours (COMM 08/06/2022)
24	Azoxystrobine +Difeconazole	125 g/l+125 g/l	SC	PRIORI GOLD 250 SC	F.40-21	SOLAGRI	SYNGENTA Crop Protection	Blé dur: Septoriose(Septoriatriitici) ,Rouille :1 l/ha(250-350 l/ha) :1 l/ha(250-350 l/ha) -application foliaire -nbre max :2 -intervalle d'application minimame : 14 jours -DAR:35jours(COMM09/02/21)
25	Azoxystrobine +difenoconazole	200 g/l+125 g/l	SC	Black panther SC	F.009-22	FERTITECH	HANGZHOU TOPAGRO BIOSCIENCE	Vigne: Oidium(Uncinulanecator): 450 ml/ha -volume de bouillie:1000 l/ha - Traitement foliaire Nbre max de traitement 3 app Intervalle entre les traitements :7-15 jours DAR :7 jours(COMM 08/06/22)
26	Azoxystrobin + Flutriafol	25%+12.5%	SC	CURAX EXTRA SC	F.009-20	SHARDA CROPCHAM TUNISIE	SHARDA CROPCHAM	Blé: Rouille(puccinia spp):0.5 l/ha -2 applications d'intervalle 3 semaines (COMM13/02/2020)
27	Azoxystrobin + Flutriafol	25%+12.5%	SC	CURATEX EXTRA SC	F.63-21	AGRIMED DISTRIBUTION	SHARDA CROPCHAM	Blé: Rouille (puccinia spp):0.5 l/ha -2 applications d'intervalle 3 semaines (COMM09/02/21)(COMM08/06/22)(COMM 28 dec2023)
28	Azoxystrobine +flutriafol	125 g/l+125 g/l	SC	Impact max SC	F.037-22	AGRIPROTEC	Cheminova/FMC	Blé tendre: Rouille:0.6 l/ha Volume de bouillie:200-400 l/ha Pulvérisation foliaire Période de traitement :préventif ou curatif Nombre max de traitement :2 Stade d'application :dès l'apparition des premiers symptômes DAR :30 jours(com 27/12/22)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 46 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
29	Azoxystrobine +flutriafol	296 g/l+218 g/l	SC	NANOK	F.16-23	AGRIPROTEC	FMC	TOMATE SOUS SERRE :Oidium(<i>Leveillulataurica</i>) :0.3 l/ha Volume de bouillie :500-1000 l Pulvérisation foliare Préventif en conditions favorables du developpement de la maladie nbre d'app:4/saison app à un intervalle de 7-21 jours DAR:1 jour (COMM 28/12/2023)
30	Azoxystrobine + Tebuconazole	200g/l + 200 g/l	SC	START-UP	F.038-15	BIOPROTECTION	AAKO	Blé: Septoriose:1 l/ha(COMM 04/11/2015)
31	Azoxystrobine + Tebuconazole	80 g/l + 160g/l	SC	Altitud Gold 240SC	F.025-16	SANABEL AGRO	ROTAM AGROCHEMICALS/rivale	Blé dur : Rouilles : 1l/ha; Vigne : Oïdium : 50 cc/hl (COMM 18/10/2017)
32	Azoxystrobine +Difenoconazole	200 g/L +125 g/L	SC	AZ-TOP SC	F.003-20	SLDA	Sharda cropchemlimited	Féverole: Anthracnose (Aschochytafabae):0.5l/ha; -Application foliaire (un seul traitement par cycle);-Traiter dès l'observation des premiers symptômes d'attaque. -La durée de protection est variable de 14 à 21j suivant le degré d'infestation et les conditions climatiques(COMM13/02/2020)
33	Azoxystrobine +Difenoconazole	200 g/L +125 g/L	SC	Ortiva TOP	F.004-18	SLOGRI	SYNGENTA	Vigne : Oïdium, black-rot : 50 cc/hl; Légumineuses : Anthracnose : 50 cc/hl; Cucurbitacées : Mildiou, oïdium : 50 cc/hl; Tomate : Mildiou, oïdium : 50 cc/hl; Oignon, ail : Rouille : 50 cc/hl; Vigne : Mildiou : 50 cc/hl. Betterave : Cercosporiose : 50 cc/hl,
34	Azoxystrobine +Mefenoxam(metalaxyl-M)	322 g/l + 124 g/l	SE	UNIFORM 446	F.132-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Pastèque,Melon : Monosporascus, Macrophomina (pourriture charbonneuse): 1 l/ha ; Fraisier : déperissement (Phytophthora spp) : 1l/ha; Tomate,Piment : pourriture brune du collet : 1l/ha
35	Bacillus amyloliquefaciens QST713SCmin	1.0 x109 cfu/g de bacillus subtilis QST 713	SC	SERENADE PRIME	F.13-21	EL MOUSSEM	Bayer AG	Tomate sous serre : Pourriture grise(Botrytis cinerea) :6 L/ha -3 applications à un intervalle de 10-15 jours.(COMM09/02/21) Laitue: Pourritures (Sclerotiniasclerotiorum&Botrytis cinerea: 6 L/ha par pulvérisation foliaire(COMM 08/06/22) COURGETTE SOUS SERRE : pourriture grise(Botrytis cinerea): 6 l/ha

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 47 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								(comm28/12/2023)
36	Bacillus subtilis de souche Y 1336	1x10 ⁹ CFU/g	WP	BIOBAC	F.131-11/21	BIOPROTECTION	BION TECH INC/ AAKO	Fraisier, Tomato: Botrytis : 150 g/hl soit 1.5 kg/ha Palmier dattier : Dessèchement Foliaire(Alternariamaliet ,Alternariaarborescens) :150g/hl traitement en curatif dès l'apparition des symptômes de dessèchement sur les palmiers(APV)(COMM09/02/21)
37	Bacillus amyloliquefaciens souche FZB24:	130 g/kg	WP	Taegro	F.006-22	COTUGRAIN	Novozymesbiologicalsinc/ syngenta	Vigne: Oidium(Uncinulanecator):370 g/ha nbre d'app:10 app à un intervalle de 07 jours stade d'app:BBCH11-BBCH89 DAR:4 heures Tomate sous serre: Oidium(Leveillulataurica):185 g/ha Nbre d'app:12 avec un intervalle de 03 jours entre les applications Stade d'app:BBCH11-BBCH89 DAR:4 heures(COMM 08/06/22)
38	Bacillus subtilis strain IAB/BS03	1x10 ⁸ ufc/g	SL	Fungisei SL	F.008-22	ATLAS AGRICOLE	SEIPASA S A/	Vigne: Oidium Uncinulanecator:150 ml/hl(1.5 l/ha) -volume de bouillie:400 l/ha Application foliaire Intervalle entre application :7 à10 jours Tomate sous serre: Pourriture grise (Botrytis cinerea):150 ml/hl ou 1.5 l/ha) Application foliaire ; Intervalle entre application :7 à10 jours COMM 08/06/22
39	Borax	10 g/L	SL	Orotun	I.A.F.017-16	RAYEN PHYTAGRI	ORO AGRI	Vigne, fraise : Mildiou,Cochenillefarineuse,pourriture :30 0 cc/hl; Vigne : Oïdium : 200 cc/hl; Tomate : Acariens : 300 cc/hl; Tomate : Mouches blanches : 320 cc/hl
40	Boscalid	50%	WG	Cantus WG	F.005-11/21	STIMA	BASF	Vigne : Botrytis : 75 g/hl
41	Boscalid	50%	WG	MASTOR WG	F.47-21	rayenphytagri	BASF	Vigne : Botrytis : 75 g/hl(COMM09/02/21)
42	Boscalid +Krésoxym-Methyl	200 g/L +100 g/L	SC	hexagon SC	F.45-21	cotugrain	BASF	Vigne : Botrytis, oïdium : 40 cc/hl (au stade floraison à la véraison de la culture)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 48 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								(COMM09/02/21)
43	Boscalid +Krésoxym-Methyl	200 g/L +100 g/L	SC	Collis 300SC	F.007-11/21	STIMA	BASF	Vigne : Botrytis, oïdium : 40 cc/hl (au stade floraison à la véraison de la culture)
44	Boscalid +Pyraclostrobin	25,2 % +12,8%	WG	Pristine WG	F.006-11/21	AGRIPROTEC	BASF	Vigne : Botrytis, oïdium : 650 g/ha; Poirier : Maladies de conservation : 800g/ha; Pommier :Tavelure :50g/hl;COMM17/05/2016). Pêcher : cloque : 50 g/hl (COMM 12/001/2018)
45	Boscalid +Pyraclostrobin	267 g/kg +67 g/kg	WG	Signum WG	015-14/24F.	COTUGRAIN IMPEX	BASF	Tomate, Fraisier :Botrytis 125 g/hl en 3 applications au max. (comm22mai2024)
46	Bromuconazole	100g/l	SC	Vectra 10 SC	F.037-15	STEC	SUMITOMO	Vigne, Concombre : oïdium 30 cc/hl
47	Bupirimate	250 g/L	EC	Nimrod	F.008-11/21	SEPCM	AAKO BV	Arbo, cucurbitacées : Oïdium : 100 cc/hl TOMATE SOUS SERRE :Oidium (Leveillulataurica) :100 cc/hl Nb de traitement :2 (COMM 28/12/2023)
48	Captane	80%	WG	CAPITOL 80 WG	F.023-17	EXCEL AGRI	SHARDA	Pommier :Tavelure: 200g/hl (COMM 28/12/2023)
49	Captane	80%	WG	Malvin80 WG	F.135-11/21	BIOPROTECTION	UPL/ARYSTA LIFESCIENCE	Poirier : Tavelure : 200 g/hl soit 2 kg/ha; Pomme de terre : Mildiou : 2 kg/ha
50	Captane	500 g/kg	WP	PROTHANE	F.020-16	DELTA AGRICOLE PLUS	SHARDA	Pommier : Tavelure : 350g/hl
51	Captane	80%	WG	MITANE	F.016-16	SOCOOPEC	SHARDA	Pommier :Tavelure: 200g/hl
52	Captane	480 g/l	EC	CAPLANT EC	F.008-19	FERTIPLANT	Sharda Cropchem Limited	Pommier :Tavelure:300 ml/100l d'eau (3 l/ha) -Pulvérisation foliaire L'efficacité de produit s'étale sur 7 jours(COMM23/04/19)
53	captane	480 g/l	EC	KAPI-TOP 48 EC	F.67-21	Agrinova	SHARDA CROPCHAM	Pommier :Tavelure:300 ml/100l d'eau (3 l/ha) -Pulvérisation foliaire L'efficacité de produit s'étale sur 7 jours(COMM09/02/21)
54	Captane	83%	WP	FILDER	F.058-22	EL MOUSSEM	ARYSTA LIFESCIENCE/UPL	Vigne,P de Terre : Mildiou : 200 g/hl; Pommier, Poirier : Tavelure : 200 g/hl (COMM08/06/22)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 49 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
55	Captane	83%	WP	Captan 83 WP	F.009-11/21	AGRIPROTEC	ARYSTA LIFESCIENCE/UPL	Vigne,P de Terre : Mildiou : 200 g/hl; Pommier, Poirier : Tavelure : 200 g/hl
56	Captane	83%	WP	Akotan 830 WP	F.010-11/21	SEPCM	AAKO	Vigne,P de Terre : Mildiou : 200 g/hl; Pommier, Poirier : Tavelure : 200 g/hl
57	CINNAMOMUM ZEYLANICUM :Extrait de Cannelle (Cinnamaldehyde)	22.03% (équivalent à 232,50 g d'aldéhyde cinnamique/L)	EC	Cynam EC	F.004-22	COTUGRAIN	LIDA	Vigne: oidium(Uncinulanecator):2.5 l/ha -volume de bouillie:500-600 l/ha -03 app à un intervalle de 07 jours. (COMM 08/06/22)
58	Chinozole	500 g/L	SL	Beltanol-L	F.011-11/21	AGRIPROTEC	PROBELTE	Cucurbitacées : Fusarium : 4 L/ha dans l'eau d'irrigation goutte à goutte juste après le repiquage
59	Chinozole	500 g/L	SL	V-NOL	F.025-18	AGROSYSTEMES	PROBELTE	Cucurbitacées : Fusarium : 4 L/ha dans l'eau d'irrigation goutte à goutte juste après le repiquage(COMM18/10/2018)
60	Cuivre	360 g/L	SC	Hydro Flo	F.209-11/21	BIOPROTECTION	NUFARM	Arbo : Traitement d'hiver : 5 L/ha; Tomate : Mildiou : 200 cc/hl; Vigne: Mildiou:200 cc/hl;(COMM 18/10/2017); Tomate : Bactériose : 400 cc/hl (COMM 12/01/2018)
61	Cuivre	600 g/l	SC	Siscop 60 SC	F.041-17	SEPCM	AAKO BV	Vigne: Mildiou: 1,5 l/ha;(COMM 18/10/2017)
62	Cuivre Métal	35%	WG	AIRONE	F.004-17	AGRIMATCO	ISAGRO/distribue par frarimpex GOWAN CROP	Pomme de terre : Mildiou : 150 g/hl;(COMM 20/06/2017)
63	Cuivre Métal	20%	WP	Comac	F.214-11/21	AGRIPROTEC	NUFARM	Vigne : Mildiou : 1,5 Kg/hl
64	Cuivre Métal	50%	WP	OSSICLOR 50 PB MANICA	F.015-17	ATLAS AGRICOLE	MANICA Spa	Tomate: Mildiou: 400 g/hl (COMM 20/06/2017)
65	Cuivre Métal	20%	WP	Super Bordeaux	F.003-13/23	BIOPROTECTION	NUFARM	Vigne : Mildiou : 1,5 Kg/hl; Pomme de Terre : Mildiou : 500 g/hl (COMM 17/05/2016); Olivier : Œil de paon (Tavelure) : 375g/hl (comm20/06/2017); Tomate : Bactériose, mildiou : 500 g/hl (COMM 12/01/2018) (COMM 19 avril 2023)
66	Cuivre Métal	75%	WG	COBRE NORDOX	F.047-17	COTUGRAIN	NORDOX INDUSTRIER A(fabricant)/S;COMMerci alquimecamasso(four)	Vigne: Mildiou: 1 kg/ha;(COMM 18/10/2017)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 50 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
67	Cuivre Métal	20%	WP	POLTIGLIA 20 PB	F.035-17	ATLAS AGRICOLE	MANICA S.P.A	Vigne: Mildiou: 1.5 kg/ha; (COMM 18/10/2017)
68	Cuivre Métal	20%	WG	Cuperval WG	F.005-13/23	SANABEL AGRO	I.Q.V. DELVALLES	Vigne : Mildiou : 1,5 Kg/hl(COMM 19 avril 2023)
69	Cuivre Métal	20%	WG	Bouillie Bordelaise	F.203-11/21	SEPCM	Cerexagri/UPL Ltd	Vigne : Mildiou : 1,5 Kg/hl
70	Cuivre Métal	20%	WG	Bordo valles WG	F.154-11/21	SOCOOPEC	I.Q.V. DELVALLES	Vigne : Mildiou : 1,5 Kg/hl
71	Cuivre Métal	35%	WG	Kocide 2000	F.019-11/21	AGRIPROTEC	MITSUI & Co Ltd/kocide LLC/cosacoLLC(japon)	Pommier : Tavelure : 150 g/hl; Pêcher : Cloque : 200 g/hl ; Tomate, P.de terre,Vigne : Mildiou : 150 g/hl; Vigne : Bactériose : 150 g/hl; Arbres fruitiers : Traitement d'hiver : 400 g/hl
72	Cuivre Métal	50%	WP	COPSIP	F.019-18	AGRIPROTEC	SIPCAM INAGRA	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo: bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl(COMM18/10/18)
73	Cuivre Métal	50%	WP	Inacop PM	F.003-14/24	ATLAS AGRICOLE	SIPCAM INAGRA	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo: bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl(comm 22 mai 2024)
74	Cuivre Métal	50%	WP	Copezine 50	F.023-16	EL KHADRA	SIPCAM QUIMAGRO	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo: bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 51 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
75	Cuivre Métal	50%	WP	CobreKey	F.018-11/21	ETS MEZGHANI	INDUSTRI. QUIMICAKEY	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo: bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
76	Cuivre Métal	50%	WP	Cuprene	F.167-11/21	promochimie	SIPCAM QUIMAGRO	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo: bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl (COMM09/02/21)
77	Cuivre Métal	50%	WP	Roxon 50	F.008-13/23	SANABEL AGRO	I.Q.V. – Espagne	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo: bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl(COMM 19 avril 2023)
78	Cuivre Métal	50%	WP	Cuprocuivre	F.151-11/21	SEPCM	I.Q.V. – Espagne	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo: bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
79	Cuivre Métal	50%	WP	Curenox	F.152-11/21	SOCOOPEC	I.Q.V. – Espagne	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo: bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 52 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
80	Cuivre Métal	50%	WP	Hidrocobre 50 valles	F.153-11/21	SOCOOPEC	IQV DEL VALLES	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo :bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl Agrumes : Black spot -maladies des taches noires des agrumes (Phyllostictacitricarpa) :200 g/hl Pulvérisation foliaire en post floraison- -2 applications à 16 semaines d'intervalle -Volume de bouillie:700-1000 l/ha DAR:1 jour. (COMM 08/06/22)
81	Cuivre Métal	50%	WP	Cuivox	F.150-11/21	STEC	I.Q.V. – Espagne	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo :bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
82	Cuivre métal(xyde de cuivre)	40%	WG	HYDRO 40 WG	F.001-19	SANABEL AGRO	IndustriasQuimicas Del Vallés (IQV)	Pomme de terre : Mildiou :300 g/hl(3 kg/ha) -Pulvérisation foliaire -2 traitements/cycle en préventif ou curatif -14j de protection(COMM 23/04/2019)
83	Cuivre(Oxychlorure de cuivre)	57%	WP	50	F.066-22	AGRIMED DISTRIBUTION	Shyhamchemical /FITOGAL	Pomme de terre : Mildiou :500 g/hl Parties aériennes, conditions favorables à l'apparition de la maladie (COMM09/02/21), (COMM08/06/22)
84	Cuivre(oxychlorure de cuivre)	57%	WP	COOPOX WP	F.02-21	AMINCO	Shyhamchemical	Pomme de terre :Mildiou :500 g/hl Parties aériennes, conditions favorables à l'apparition de la maladie(COMM09/02/21)
85	Cuivre(oxychlorure de cuivre 605 g/kg)	350g/kg	WG	RAMCU 35 WG	F.002-19	STIMA	Manica S.P.A	Pomme de terre : Mildiou:350 g/hl; -3 applications; -durée de protection : 7-10j; (COMM 23/04/2019)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 53 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
86	Cuivre +cymoxanil	200 g/l+40 g/l	WG	Cuprofix C WG	F.019-22	EL MOUSSEM	UPL	Vigne: Mildiou(Plasmopara viticola)::2 kg/ha(200 g/hl) -App foliaire -nbre max d'app par cycle:4 app -Débuter l'app avant le dvp de la maladie et continuer à un intervalle de 7 à10 jours -stade d'app sur la culture :BBCH13-BBCH83 DAR:28 jours LMR:cymoxanil:0.01mg/kg ; Cuivre:5 mg/kg. (COMM 08/06/22) TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) :2,5 kg/ha (250 g/hl) -App foliaire -nbre max d'app par cycle:6 app Débuter l'app avant le dvp de la maladie etcontinuer à un intervalle de 7 à 9 jours -stade d'app sur la culture :BBCH21-BBCH95 DAR:7 jours LMR:cymoxanil:0.01mg/kg Cuivre:5 mg/kg (COMM 28/12/2023)
87	Cuivre+ Métalaxyl	40% + 8%	WP	Armetil cuivre	F.159-11/21	SOCOOPEC	IQV DEL VALLES	Vigne : Mildiou: 250 g/hl
88	Cuivre +Metalaxyl	40% + 8%	WP	Mevaxil Cuivre WP	F.043-22	NEGANOR	IQV DEL VALLES	Vigne : Mildiou : 250 g/hl; (COMM 08/06/22)
89	Cyazofamid	160g/l	SC	RANMAN TOP SC	F.05-21	AGRIPROTEC	ISK Biosciences Europe N.V	Pomme de terre: Mildiou:50 cc/hl(0.5 l/ha) -Mode de traitement. : foliaire-stade des app :dés les premiers signes d'infestation.-DAR :7 jours Tomate : Mildiou(Phytophthora infestans):50 cc/hl (0.5 l/ha) APV(produit de contact)-Mode de trait. : foliaire- Calendrier des app :dés les premiers signes d'infestation.-DAR : 7 jours(COMM09/02/21)
90	Cyflufenamid	50g/l	EW	CONFIRM 5 EW	F.25-21	EL MOUSSEM	NIPPON SODA/ Nisso Chemical Europe GmbH	Vigne: oidium(Uncinulanecator) 0.35 l/ha (35 ml/hl) -app foliaire -période d'app : à partir du stade feuilles étalées jusqu'au stade véraison -Renouveler les app en 12 à 14 jours en période de faible pression et de 10 à 12 jours en cas de forte pression

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 54 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								-3 app au max/cycle -DAR :21 jours -LMR :0.05 mg/kg
91	Cymoxanil	450 g/kg	GR	Cymbal 45	F.09-21	NEGANOR	BELCHIM CROP PROTECTION/CERITIS BELCHIM NV	Pomme de terre: Mildiou:0.2 kg/ha -Stade d'application :emergence- défanage(COMM09/02/21)
92	Cymoxanil +Oxychlorure de cuivre	4% (40 g/kg)+ 40% (400 g/kg)		CIMOXATE C WG	F.12-23	AGROSYSTEMES	ASCENZA GRO S.APORTUGAL	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) :3 kg/ha (300 g/hl) -Des applications préventives à la première apparition des symptômes -nbre d'application:3 DAR :03 jours(COMM 28/12/2023)
93	Cymoxanil +Famoxad one	30 % +22,5%	WG	Equation Pro	F.020-11/21	SEPCM	DU PONT (Taiwan) AGRISCIENCE	P. de terre : Mildiou : 40 g/hl TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) :400 g/ha Nbres d'app :3(COMM 28/12/2023)
94	Cymoxanil + Métirame de Zinc	4,8 % +64%	WG	BATO	F.61-21	AGRIMATCO	BASF	P. de terre, vigne : Mildiou : 150 g/hl(COMM09/02/21)
95	Cymoxanil + Métirame de Zinc	4,8 % +64%	WG	Aviso DF	F.023-11/21	STIMA	BASF	P. de terre, vigne : Mildiou : 150 g/hl
96	Cymoxanil+ Zoxamid	33%+33%	WG	REBOOT WG	F.013-22	AGRIMATCO	GOWAN CROP PROTECTION LIMITED	Vigne: Mildiou (plasmoporaviticola):45 g/hl (soit 450g/ha) -pulvérisation foliaire -application dès le début d'infestation -intervalle d'application:7-10 jours(COMM 08/06/22)
97	Cyproconazole	10%	WG	Atemi 10 WG	F.002-15	AGRIPROTEC	SYNGENTA CROP PROTECTION	Vigne : Oïdium : 0.3 kg/ha
98	Cyproconazole	10%	WG	Xpert WG	F.013-16	EL KHADRA	Sharda	Vigne: Oïdium : 12g/hl
99	Cyproconazole +Azoxystrobin	80 g/L +200 g/L	SC	Priori Xtra	F.003-18	SOLAGRI	SYNGENTA	Blé : Oïdium, Rouille, Septoriose : 0,5 L/ha (12/01/2018)
100	Cyproconazole + chlorothalonil	4% + 37.5 %	SC	CHAMPION	F.019-17	SOCOOPEC	SHARDA CROPCHAM	Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses(date d'effet:13/07/2023)
101	Cyproconazole +chlorothalonil	4%+37.5 %	SC	CYCLONE	F.015-19	SANABEL AGRO	SHARDA CROPCHAM	Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses(date d'effet:13/07/2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 55 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
102	Cyprodinil	50%	WG	arnatin WG	F.68-21	SOLAGRI	SYNGENTA	Pommier, Poirier : Tavelure : 50 g/hl; Pêcher : Moniliose : 50g/hl (COMM09/02/21)
103	Diethofencarb	250 g/l	SC	FRUGICO SC	F.019-16	AGROSYTEME	GLOBACHEM	Pommier : Botrytis : 1.5 L/ha
104	Difenoconazole	250 g/L	EC	Difcor	F.027-11/21	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Pommier, Poirier : Tavelure : 20 cc/hl ; Vigne : Oïdium : 20 cc/hl; Arbo : Moniliose : 20 cc/hl
105	Difenoconazole	30 g/L	FS	Difender 30 FS	006-14/24F.	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Semences de blé : Carie, Charbon : 200 cc du Produit + 0,75 L d'eau/Ql
106	Difenoconazole	250 g/L	EC	Protector	F.032-15	AMINCO	GLOBACHEM	Pommier, Poirier : Tavelure : 20 cc/hl ; Vigne : Oïdium : 20 cc/hl; Arbo : Moniliose : 20 cc/hl
107	Difenoconazole	250 g/L	EC	Score 250 EC	F.028-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Pommier, Poirier : Tavelure : 20 cc/hl ; Vigne : Oïdium : 20 cc/hl; Arbo : Moniliose : 20 cc/hl; Cucurbitacées : Oïdium : 40 cc/hl (COMM 06/12/2012) Olivier : œil de paon(<i>spilocaeaoleagina</i>) :50cc/hl Volume de bouillie :800-1000 l/ha -Stade d'application:En préventif -Type:foliaire -Nb de d'application:2/saison -Durée entre les applications:10-14 jours DAR:30 jours TOMATE SOUS SERRE : Alternaria (<i>Alternariasolani</i>) :0.5 l/ha Volume de bouillie:200-600 l/ha -BBCH19 nb de d'application/saison:03 Durée entre les applications:07 jours DAR:03 jours (COMM 28/12/2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 56 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
108	Difenoconazole	30 g/L	FS	Spectro 30 FS	F.029-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Semences de blé :Carie, Charbon : 200 cc/Ql + 0,5 à 0,75 L d'eau; Blés : Charbon, carie : 200 ml PC + 600 ml eau/Ql; Orge : Charbon, Charbon nu, Helminthosporiose : 200 ml PC + 600 ml eau/Ql.
109	Difenoconazole	250 g/L	EC	CURYGEN EC	F.015-20	EL KHADRA	JSC AVGUST INC	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl (COMM3/02/2020)
110	Difenoconazole	250 g/L	EC	PROZOLE 250 EC	F.022-18	Ets MEZGHANI	ASTRACHEM	Pommier, Poirier : Tavelure : 20 cc/hl ; Vigne : Oïdium : 20 cc/hl; Arbo : Moniliose : 20 cc/hl;(COMM 18/10/2018)
111	Difenoconazole	250 g/L	EC	RAYOK	F.046-17	HALAB TUNISIE	JSC AUGUST INC	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl
112	Difenoconazole	250 g/L	EC	Festival 250 EC	F.006-15	SANABEL AGRO	Sharda World Wide	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl; Pommier :Tavelure : 20cc/hl (COMM 17/05/2016)
113	Difenoconazole	30 g/l	FS	SITARA FS	F.001-20	SANABEL AGRO	SHARDA CROPCHEM	Semence de blé :Carie, Charbon:200 cc/Ql; Volume de bouillie:800 ml eau (COMM13//02/2020)
114	Difenoconazole	250 g/L	EC	Divisole	F.194-11/21	TASMID	ASTRACHEM	Pommier, Poirier : Tavelure : 20 cc/hl ; Vigne : Oïdium : 20 cc/hl;Arbo : Moniliose : 20 cc/hl PIMENT SOUS SERRE :Oïdium (Leveillulataurica):50 cc/hl -Nbre max de traitement:3 (COMM 28/12/23)
115	Difenoconazole+Cyflufenamid	60g/l+30g/l	DC	DYNALI DC	F.002-22	SOLAGRI	SYNGENTA	Vigne :Oïdium(Uncinulanecator):0.6 l/ha pour un volume de bouillie de 400 à 600 L d'eau/ha -Application foliaire-maximum 2 fois durant la saison à un intervalle de 14 jours-BBCH 61 à BBCH 75 (COMM 08/06/22)
116	Difenoconazole + Fludioxonil	25 g/l +25 g/l	FS	DIFEND EXTRA FS	F.017-18	AGROSYSTEMES	Globachem	Semence de blé : septoriose : 0.1 l/q (100ml+600 à 800 ml d'eau/ql de semences) ; - Semence de blé : Carie &charbon: 0.2 l/q(200ml+600 à 800 ml d'eau/ql de semences) ; - Semence de blé : Fusariose : 0.2 l/q(200ml+600 à 800 ml d'eau/qldesemences) ; Semenced'orge :Helminthosporiose : 0.2l/q (200ml+60 0 à 800 ml d'eau/ql de semences (COMM : 18/10/18)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 57 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
117	Difenoconazole + Fludioxonil	25 g/L + 25 g/L	FS	Celest Extra 50 FS	F.030-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Blés : Carie, charbon, septoriose, fusarium des semences, provenant des semences : 100 ml+600 à 800 ml d'eau/Ql de semences; Blés : fusarium des semences, provenant du sol : 200 ml+600 à 800 ml d'eau/Quintal de semences; Orge : Helminthosporiose : 100 ml+600 à 800 ml d'eau/Ql de semences
118	Difenoconazole + Fludioxonil +Sedexane	25 g/l + 25 g/l + 50 g/l	FS	Vibrance Gold	F.013-15	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Semences de blé : Maladies transmissibles par les semences (Carie, charbon, septoriose, fusariose) : 200 ml/100 kg
119	Difenoconazole +Cyflufenamid	125g/L +15g/L	DC	CIDELY TOP 140 DC	F.026-17	AGRIPROTEC	SYNGENTA	Vigne : Oidium: 0.75 l/ha;(COMM 18/10/2017)
120	Difenoconazole +Cyflufenamid	125g/L +15g/L	DC	MELCAR TOP 140 DC	F.027-18	COTUGRAIN IMPEX	SYNGENTA	Vigne : Oidium: 0.75 l/ha;(cmm18/10/2018)
121	Difenoconazole +Métalaxyl-M	92 g/l + 23 g/l	FS	SpectroExtreme 115 FS	F.008-14/24	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Semences de blé : Carie, Charbon : 65 cc du Produit + 0,5 L d'eau/Ql(comm22/05/2024)
122	Difenoconazole +Métalaxyl-M	92 g/l + 23 g/l	FS	DIVIDEND EXTREME 115 FS	F.006-18	SOLAGRI	SYNGENTA	Semences de blé : Carie, Charbon : 65 cc du Produit + 0,5 L d'eau/Ql;(COMM 18/10/2018) Semences des féveroles :Anthracnose, Fusariose, Pythium:150cc/0.5l eau/Ql(COMM 08/06/22)
123	Diméthomorphe +Fluazinam	200 g/l +200 g/l	SC	FOLY STAR 400 SC	F.007-16	SEPCM	AAKO	Pomme de Terre : Mildiou :75 cc/hl
124	Dimetomorphe +Folpel	11.3% +60%	WG	MORPHEE 71.3 WG	F.036-17	BIOPROTECTION	AAKO	Vigne : Mildiou : 2 Kg/ha; (COMM 18/10/2017)
125	Dimetomorphe +Folpel	11.3% +60%	WG	DENIM	F.007-17	RAYEN PHYTAGRI	Sharda cropchem	Pomme de terre : Mildiou : 200 g/ha(COMM20/06/2017)
126	Dimetomorphe +Folpel	11.3% +60%	WG	FLOPY DUO	F.65-21	AGRINOVA	Sharda cropchem	Pomme de terre : Mildiou : 200 g/ha(COMM09/02/21)
127	Dimeyhomorph+ cymoxanil	50%+20%	WG	DIMANYL WG	F.07-23	EL KHADRA	HANGZOU TOPAGRO BIOSCIENCE	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) :50 g/hl Volume de bouillie : 800-1000 l/ha -application foliaire - Nbre d'app :3 (COMM 28/12/2023)
128	Dinocap Meptyl + Myclobutanil	105 g/L + 45 g/L	EC	AGRIKAR STAR	F.029-18	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCES	Vigne : Oidium : 100 cc/hl (COMM 18/10/2018)(COMM09/02/21)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 58 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
129	Dithianon	500 g/l	SC	DELAN 500 SC	F.050-22	BIOPROTECTION	BASF	Pommier: Tavelure(Venturia inaequalis): 0.5 l/ha -volume de bouillie: 1000 l/haApplication foliaire- -Eclatement des bourgeons-avant floraison-nbre d'application:6-Durée entre application:7 à 14 jours. DAR:21 jours. (COMM08/06/22)
130	Dithianon	70%	WG	ASTRONE	F.056-22	SANABEL AGRO	SHARDA CROPCHAM	Pommier: Tavelure(Venturia inaequalis) :0.75 kg/ha avec un vomule de bouillie de 1000 l d'eau/ha. -stade BBCH 53-79 -3 applications avec un intervalle de 20jrs(COMM 08/06/22)
131	Dithianon	12 % + 4%	WG	shanon	F.32-21	AGRIMED DISTRIBUTION	shardacropchem	Pommier: Tavelure(Venturia inaequalis) :0.75 kg/ha avec un vomule de bouillie de 1000 l d'eau/ha. -stade BBCH 53-79 -3 applications avec un intervalle de 20j(COMM09/02/21)'COMM28 dec2023
132	Dithianon +Pyrachlostrobin	70%	WDG	MACCANI	F.014-16	COTUGRAIN IMPEX	BASF	Pommier : Tavelure;oidium : 2.5 Kg/ha
133	Dodine	400 g/L	SC	Syllit 400 SC	F.172-11/21	PROTAGRI	ARYSTA Life Science Benelux / Belgique/UPL	Pêcher : Clôque : 0,8 L/ha Pommier : Tavelure : 1,2 L/ha Poirier : Tavelure : 1,5 L/ha Olivier: Œil De Paon(Spilocaeaoleaginum) :150 ml/hl 03 applications: -01 app en automne (mi-octobre) -2eme applications au printemps en mi-mars -3eme applications au printemps en mi- mai.(COMM09/02/21)
134	Dodine	400 g/L	SC	Efluzin 400 SC	F.010-15	SEPCM	ARYSTA Life Science Benelux / Belgique/ARYSTA	Pêcher : Clôque : 0,8 L/ha Pommier : Tavelure : 1,2 L/ha Poirier : Tavelure : 1,5 L/ha
135	EXTRAIT de SWINGLEA GLUTINOSA	820g/l(82%)	SL	PERIMETER SL	F.22-23	AGRIPROTEC	GOWAN CROP PROTECTION LIMITED	Fraise :Pourriture grise (Botrytis cinerea) : 3l/ha Volume de bouillie:1000 l/ha Traitement foliaire Traitement préventif Nbre de traitement:01 Stade d'app:début d'attaque DAR:0j (COMM 28/12/2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 59 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
136	Famoxadone +cymoxanil	22,5%+30%	WG	VENUS WG	F.045-22	STIMA	Shengnong Pesticide, Co. Ltd/hangzhouTopagro Bioscience	Concombre: Mildiou (Pseudoperonosporacubensis): 450 g/ha 02 app max au cours du cycle végétatif. (COMM08/06/22)
137	Fenhexamide	53,70%	WG	Teldor	F.040-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPSCIENCE	Vigne, Tomate, Fraisier : Botrytis : 75 g/hl; Pêcher : Moniliose : 100 g/hl;comm 20/06/2017
138	Fenpyrazamine	50%	WG	PROLECTUS 50WG	F.040-17	SEPCM	SUMITOMO CHEMICAL AGRO Europe	Vigne : Botrytis: 100 g/hl;(COMM 18/10/2017)
139	Fluazinam	500 g/l	SC	Nando	F.045-11/21	BIOPROTECTION	NUFARM	Pomme de terre ; Tomate : Mildiou :0.4 l/ha; Vigne : Botrytis : 1.5 L/ha
140	Fluazinam	500 g/l	SC	VERTIGO	F.208-11/21	Sanabel agro	NUFARM	Pomme de terre ; Tomate : Mildiou :0.4 l/ha(COMM27/12/22)
141	Fluazinam +Azoxystrobine	375 g/l+150 g/l	SC	VENDETTA SC	F.055-22	STEC	FMC	Pomme de terre: Mildiou (Phytophthora infestans):0.5 l/ha -pulvérisation foliaire -conditions favorables à l'apparition de la maladie -03 applications max -positionnement au stade végétation stabilisée -DAR:3 jours. (COMM 08/06/22)
142	Fludioxinil	230 g/l	SC	SCHOLAR 230 SC	F.052-22	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Agrumes: Penicillium SPP:150 ml en Post-récolte Volume:Bouillie 100-200 l d'eau(COMM 08/06/22) Pommier : Maladies de conservation (penicillium expansum;colletotrichumgloeosporioides; Cactuatum ;Botrytis cinerea;) :150 ml/100 l En Post récolte Trompage/douchage Nb de d'application:1(COMM 28/12/2023)
143	Fludioxonil	100 g/L	FS	Maxim 100 FS	F.042-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	P.de terre (Traitement des semences) : Rhizoctoniasolani, fusarium spp, Helminthosporium solani : 200 cc PC/T de semences
144	Fludioxonil +Cyprodinil	25% +37,5%	WG	switch 62,5 WG	F.043-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Vigne : Botrytis cinerea : 120 g/hl

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 60 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
145	Fludioxonil +Cyprodinil	25% +37,5%	WG	Chorus Double	F.044-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Vigne : Botrytis cinerea : 120 g/hl; Tomate s/serre : Pourriture : 60 g/hl ; Cucurbitacées : Botrytis : 60 g/hl; Fraisier : Botrytis : 800 g/ha: Arbo : Moniliose : 30 g/hl
146	Fluopicolide + PropamocarbHydrochloride	625 g/l+ 625 g/l	SC	PICOCARB SC	F.11-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) : 150 ml/ha Nbre d'app :3 -volume de bouillie 500-600 l/ha -dés l'apparition des symptômes (COMM 28/12/2023)
147	Fluopicolide + PropamocarbHydrochloride	625 g/l+ 625 g/l	SC	ULTIMA SC	F.10-24	NEGANOR FFT	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) : 150 ml/ha Nbre d'app :3 -volume de bouillie 500-600 l/ha -dés l'apparition des symptômes (COMM 22/05/2024)
148	Fluopyram + Tebuconazole	200 g/L + 200 g/l	SC	Luna Experience 400 SC	F.023-13/23	SEPCM	BAYER CROPSCIENCE	Vigne : Oïdium : 0.4 l/ha; Pommier :Tavelure :0.25L/ha; Pommier : Oïdium : 0.25 L/ha;(comm 17/05/2016); Pêcher : Moniliose : 0.5 l/ha;(comm20/06/2017) (COMM 19 avril 2023)
149	Fluopyram + Tebuconazole	200 g/L + 200 g/l	SC	Moon Experience SC	F.04-24	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Vigne : Oïdium : 0.4 l/ha; Pommier :Tavelure :0.25L/ha; Pommier : Oïdium : 0.25 L/ha;(comm 17/05/2016); Pêcher : Moniliose : 0.5 l/ha; (COMM 22/ 05/ 2024)
150	Fluopyram + Trifloxystrobine	250 g/L + 250 g/L	SC	Luna sensation	F.019-13/23	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Fraisier : Botrytis : 60 cc/hl ; Tomate : Botrytis : 50 cc/hl; Vigne : Botrytis : 50 cc/hl; Piment :Oïdium :25 ml/hl;(comm17/05/2016) (COMM 19 avril 2023)
151	Fluoxastrobine	480g/l	SC	EVITO 480 SC	F010-17	EL MOUSSEM AGRICOLE	ARYSTA LIFESCIENCE/UPL	Tomate, Pomme de terre : Mildiou : 500 ml/ha(COMM 20/06/2017)
152	Fluoxastrobine + Tebuconazole	200 g/l + 277 g/l de	SC	Evito T	F.033-16	EL MOUSSEM AGRICOLE	ARYSTA LIFESCIENCE/UPL	Blé dur : rouille, septoriose : 0.5 l/ha (entre stade 2 nœuds et floraison)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 61 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
153	Flutriafol	125 g/L	SC	Impact SC	F.047-11/21	AGRIPROTEC	CHEMINOVA/FMC	Blé : Rouille, Oidium, Septoriose : 1 L/300 à 500 L d'eau Betterave : Cercosporiose : 1 L/ha Féverole : Anthracnose : 1 l/ha (Traitement foliaire) (COMM 18/10/2018) Avoine : Rouille couronnée : 1l/ha en Traitement foliaire (COMM09/02/21) Pommier : Tavelure (Venturia inaequalis) + Oidium (Podosphaera leucotricha): 25 ml/hl -volume de bouillie: 1000 l/ha -Mode de trait: pulvérisation foliaire -période de trait: préventif ou curatif -Nb de trait: 3 -DAR: 3 jours Vigne de cuve : Oidium (Uncinula necator): 25 ml/hl -volume de bouillie: 1000 l/ha -Mode de trait: pulvérisation foliaire période de trait: préventif ou curatif -Nb de trait: 3 -DAR: 21 jours. (COMM 08/06/22) PIMENT SOUS SERRE : Oidium (Leveillulataurica): 750 ml/ha Volume de bouillie 1000 l/ha -Mode de trait: pulvérisation foliaire période de trait: préventif ou curatif -Nb de trait: 3 -DAR: 3 jours (COMM 28/12/2023)
154	Flutriafol	125 g/L	SC	Radikal SC	F.73-21	AGRIMED DISTRIBUTION	SHARDA	Légumineuses : Rouille : 1 l/ha (COMM09/02/21)
155	Flutriafol	125 g/L	SC	Flutri 125 SC	F.032-16	RAYEN PHYTAGRI	SHARDA	Légumineuses : Rouille : 1 l/ha
156	Flutriafol + Thiabendazole	25 g/L + 25 g/L	FLO (FS)	Vincit F	F.048-11/21	AGRIPROTEC	CHEMINOVA/FMC	Blé : Carie : 200 cc/ql Blé : Charbon : 200 cc/ql Semences d'orge : Maladies charbonneuses : 200 cc + 600 ml d'eau/ql (comm23/10/2014) Semences de blé : Fusariose (Fusarium spp) : 400 ml/ql dans 600 à 800 litres d'eau (COMM09/02/21)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 62 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
157	Flutriafol + Tébuconazole	75 g/l + 225 g/l	SC	Pointer Duo	F.028-16	AGROSYSTEMES	CHEMINOVA/FMC	Blé dur : Rouilles : 0.75 l/ha; Vigne : Oïdium : 20 cc/hl(comm18/10/2017)
158	Fluxapyroxad + Pyraclostrobine	75 g/l+150 g/l	SE	PRIAXOR SE	18-010F.	COTUGRAIN IMPEX	BASF	Blé : Rouille; septoriose: 0.8 l/ha; (Application foliaire; stade d'application BBCH 32 à 59; nbre d'application : 2;DAR : 35 jours) ;(COMM 18/10/2018)
159	Fluoxastrobine + Propamocarbhydrochloride	75 g/l+400 g/l	SC	EVITO P	F.044-22	EL MOUSSEM	ARYSTA LIFESCIENCE/ UPL	Melon :Mildiou de cuba(Pseudoperenosporacubensis):0.45 l/ha (45 ml/hl) -Application foliaire -DAR:28 jours -ne pas dépasser 5 traitements/cycle -LMR: fluox:0.01 mg/kg P-HCl:5 mg/kg -l'application se fait lorsque les conditions environnementales favorables ou les premiers symptômes de la maladie pour le développement de la maladie se produisent Tomate :Mildiou du sol(fente de semis):Pythium spp:1.5 l/ha (100 ml/hl) -Application goutte à goutte -DAR: 3 jours -effectuer 2 applications par cycle, la première est au moment de la plantation jusqu'au fond de la rainure et la deuxième suivra 30 jours après -LMR: fluox:0.01 mg/kg(COMM 08/06/22)
160	Folpel	80%	WP	Solfol	F.034-17	ATLAS AGRICOLE	BELCHIM CROP PROTECTION	Vigne :Mildiou: 300 g/ha;(COMM 18/10/2017)
161	Folpet+ Foséthyl-Al	25%+50%	WG	Mikal Flash	F.049-11/21	SEPCM	BAYER CROPSCIENCE	Vigne : Mildiou : 200 g/hl
162	Folpet+ Foséthyl-Al	25%+50%	WG	DUO Flash WG	F.01-24	El Moussem Agricole	BAYER CROPSCIENCE	Vigne : Mildiou : 200 g/hl (Comm 22/05/24)
163	Fosethyl al + Folpel + Iprovalicarbe	50 % +25 % + 4%	WG	CASSIOPEE WG	F.044-17	PROMOCHIMIE	BAYER AG	Vigne :Mildiou: 2 kg/ha;(COMM 18/10/2017)
164	Foséthyl-Al	80%	WP	Filal	F.175-11/21	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Agrumes : Gommose : 250 g/hl; Melon : Mildiou de cuba : 300 g/hl; Vigne : Mildiou : 300 g/hl (COMM 18/10/2017)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 63 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
165	Foséthyl-Al	80%	WP	Alial	F.050-11/21	AGRIPROTEC	PROPLAN/QUMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Agrumes : Gommose : 250 g/hl; Melon : Mildiou de cuba : 300 g/hl
166	Foséthyl-Al	80%	WP	ROMERAL	F.08-24	NEGANOR FFT	PROPLAN/QUMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Agrumes : Gommose : 250 g/hl; Melon : Mildiou de cuba : 300 g/hl (Comm 22/05/24)
167	Foséthyl-Al	80%	WG	Aliette express	F.051-11/21	SEPCM	BAYER CROPSCIENCE	Agrumes : Gommose : 250 g/hl; Melon : Mildiou de cuba : 300 g/hl
168	Foséthyl-Al	80%	WG	ELIOS	F.02-24	El Moussem Agricole	BAYER CROPSCIENCE	Agrumes : Gommose : 250 g/hl; Melon : Mildiou de cuba : 300 g/hl (Comm 22/05/24)
169	Fosetyl aluminium	80%	WP	CLEANER WP	F.017-22	FERTITECH	HANGZHOU TOPAGRO BIOSCIENCE	Vigne en plein champ :Mildiou:350 g/hl (3500 g/ha) le produit doit être appliqué sur les raisins au stade initial de la mildiou de la vigne. Intervalle d'application:14 jours Fréquence d'application:3 fois Méthode d'app:par pulvérisation DAR:21 jours.(COMM 08/06/22)
170	Fostetyl –aluminium	80% (800 g/kg)	WP	STIN 80 WP	F.06-23	PLANETE VERTE	ASTRANOVA	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) :250 g/hl Nbre d'app :3 DAR:7 jours (COMM 28/12/2023)
171	Fosethyl-Al +Cymoxanil + Folpel	50 % +4 % + 25%	WP	BELKAP EXTRA	F.026.18	AGROSYSTEMES	PROBELTE	Vigne, P.de terre, Tomate : Mildiou : 300 g/hl; Vigne : Black-rot : 300 g/hl;(COMM. 18/10/18)
172	Fosethyl-Al +Cymoxanil + Folpel	50% +4% + 25%	WG	Anteor flash	F.019-14/24	ATLAS AGRICOLE	BAYER AG	Tomate :Mildiou : 2.5 kg/ha :250 g/hl; Pomme de Terre : Mildiou : 2.5kg/ha (comm17/05/2016); Vigne :Mildiou: 2.5 kg/ha;(COMM 18/10/2017) (comm 22 mai 2024)
173	Fosethyl-Al +Cymoxanil +Folpet	50 % +4 % +25%	WP	Fosbel extra	F.052.11	AGRIPROTEC	PROBELTE	Vigne, P.de terre, Tomate : Mildiou : 300 g/hl; Vigne : Black-rot : 300 g/hl
174	Fosethyl-Al +Cymoxanil +Folpet	50 % +4 % +25%	WP	Magma Triple	F.137-11/21	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Vigne, Pomme de terre : Mildiou (Stade de nouaison) à la dose de 300 g/hl; Tomate :Mildiou: 250 g/hl

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 64 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
175	Fosethyl-Al +Cymoxanil +Folpet	50 % +4 % +25%	WP	Katanga Triple WP	F.04-21	NEGANOR	PROPLAN/QUMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Pomme de terre: Mildiou :300 g/hl -Nbre des trait. :1 -stade d'app:Début de l'attaque -Durée de protection :14 j (COMM09/02/21) (COMM 08/06/22)
176	Fosethyl-Al +Fluopicolide	66,7 % +4,4%	WG	Profiler	F.053-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER AG	Vigne : mildiou (stade de nouaison à la grappe « petit pois ») à la dose de 200 g/hl soit 02Kg/ha
177	Foséthyl –Al	80%	WG	FILAL PLUS WG	F.051-22	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Agrumes: Gommose (phytophthora spp):250 g/hl -pulvérisation foliaire -3 traitements au cours des mois d'avril, juillet et octobre/novembre : *1 ère application : pendant la floraison (avril) *2 ème application :en juillet *3 ème application : en octobre/novembre . (COMM08/06/22)
178	Fosetyl –al	80%	WP	ALU-VITE WP	F.74-21	TASMID	LIMIN CHEMICAL CO.LTD	Agrumes: Gommose:250 g/hl(COMM09/02/21)
179	Fosetyl –al	80%	WG	ALLUM WG	F.009-16	EL MOUSSEM AGRICOLE	NUFARM	Agrumes: Gommose: 250g/hl; Melon : Mildiou de cuba: 300 g/hl (comm12/01/2018)
180	Fosetyl –al	80%	WG	lotus	F.49-21	SANABEL AGRO	NUFARM	Agrumes: Gommose: 250g/hl; Melon : Mildiou de cuba: 300 g/hl (COMM09/02/21)
181	Fosetyl-Al	80%	WP	KEYFOL 80 WP	F.004-19	Ets MEZGHANI	LIMIN CHEMICAL CO.LTD	Agrumes: Gommose:250 g/hl;COMM 23/04/2019
182	Fosethyl-al +sulfate de cuivre tribasique	200 g/kg+150 g/kg	WG	Optix R WG	F.021-22	BIOPROTECTION	UPL	Vigne: Mildiou: 5 kg/ha -volume de bouillie:100-1000 l/ha Nbre d'app :6/saison Durée entre les app :10 jours Traitement foliaire BBCH13-BBCH12-95 DAR :28 jours. (COMM 08/06/22) Agrumes : phytophthora : 05 kg /ha Nbre max : 04 01 à 02 applications en automne avant la récolte avec un intervalle min de 21 jours 01 application en hiver avant la reprise végétative DAR : 04 jours (COMM 22/05/24)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 65 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
183	Huile essentielle de thym (thymol)	81.87 g/l	EW	NOPATH EW	F.006-19	NUTRIPLANT	KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEM	Fraisier: Pourriture grise (Botrytis cinerea) :1,5 L/ha au stade de jeunes plants;-Application par pulvérisation ;-Application via le système d'irrigation goutte à goutte;-Répéter le traitement tous les 14j à 21j;(COMM 23/04/2019)
184	Hydroxyde de cuivre	77% soit 50% sous forme de cuivre métal	WP	Copper Progress	F.169-11/21	AGROSYSTEMES	SPEISS URANIA/COSACO GmbH	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl; Vigne : Mildiou, black-rot,bactériose : 1 Kg/hl; Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl; Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl; Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl; Arbo : bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
185	Hydroxyde de cuivre	77% soit 50% sous forme de cuivre métal	WP	Patrol 50 WP	F.028-15	AMINCO	SPEISS URANIA/COSACO GmbH	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl; Vigne : Mildiou, black-rot,bactériose : 1 Kg/hl; Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl; Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl; Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl; Arbo : bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
186	Hydroxyde de cuivre	250 g/kg	WG	BLUE SHIELD 25 WG	F.016-22	SOLAGRI	Albaugh.LLC	Vigne: Mildiou(Plasmopara viticola):3kg/ha Application foliaire Intervalle entre les applications:7-14 jours Max:5 applications. (COMM 08/06/22)
187	Hydroxyde de Cuivre (400 g/l de cuivre métal)	645 g/l	SC	Heliocuire	F.211-11/21	BIOPROTECTION	Action Pin/AAKO	Vigne : Mildiou : 125 cc/hl; Tomate : Mildiou 150 cc/hl Olivier: Oeil de Paon (Spilocaeaoleaginum) :150 ml/hl 03 applications: -01 app en automne (mi-octobre) -2eme applications au printemps en mi-mars -3eme applications au printemps en mi-mai.(COMM09/02/21)
188	Hydroxyde de cuivre	40% Cu	WG	Hidrocure WG	F.049-22	FERTITECH	ALINTRA	Tomate: Mildiou(Phytophthora infestans):0.5 kg/hl volume de bouillie:400-1000 l/ha - Traitement foliaire -stade de traitement :BBCH15-BBCH89 Nbre max de traitement 6 app Intervalle entre les traitements :7 jours

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 66 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								DAR :15 jours (COMM 08/06/22)
189	Hydroxyde de cuivre +Métalaxyl	237,7 g/l+45 g/l	SC	CYCLO-R- LIQUIDE	21-16.F	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Tomate :Mildiou(Phytophthora infestans):250 cc/hl(produit systémique); -pulvérisation foliaire;-1 à 3 traitements par cycle de la culture (du stade après floraison BBCH 61- 69);-DAR : 28 jours. (COMM 09/02/21)
190	Hymexazole	300 g/L	SL	Tachigaren	F.056-11/21	AGRIPROTEC	Mitsui Chemicals Agro,Inc/summit agro	Tomate, piment, cucurbitacées : Fusarium : 200 cc/hl;(3 Litres de bouillie/m²)
191	Iprovalicarbe +Oxychlorure de cuivre	8,4 % +40,6%	WG	Positron 49	F.058-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Vigne : Mildiou : 150 g/hl; Tomate : Mildiou : 175 g/hl
192	Isofetamid	400 g/l	SC	Kenja SC	F.20-21	Agriprotec	ISK Biosciences Europe N.V(fabricant)/upl(fourniss eur)	Vigne :Pourriture grise(Botrytis cinerea) :120 cc/hl(1.2 l/ha) -Mode de trait. : foliaire -Calendrier des app :dés les premiers signes d'infestation. -Nb de trait :max 2 par saison avec intervalle min de 21 jours -DAR :21 jours(COMM09/02/21)
193	Kreoxim-methyl	500 g/kg	WG	SUGOBY WG	F.02-23	RAYEN PHYTAGRI	LAINCO ,S,A/ESPAGNE	OLIVIER :Œil de paon(spilocaeaoleagina)) :0.2 kg/ha(20 g/hl) nbre d'application:2 (COMM 28/12/2023)
194	Krésoxim-méthyl	50%	WG	QUIMERA WG	F.001-22	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Vigne de cuve :Oidium(Uncinulanecator)::20g/hl avec un volume de bouillie 800-1000l d'eau/ha - Stade:1ère application lorsque les premiers signes apparaissent (BBCH19-81) - Intervalle entre 02 traitements:14 jours-Nbre d'app:3 DAR:35jours (COMM 08/06/22)
195	Krésoxim-méthyl	50%	WG	ALLIAGE DF	F.60-21	AGRIMATCO	BASF	Vigne : Oïdium : 20 g/hl Pommier : Tavelure : 20 g/hl(COMM09/02/21)
196	Krésoxim-méthyl	350g/l	SC	Kresoxystar 350SC	F.030-22	Ets Mezghani	ANHUI HUAXING CHEMICAL INDUSTRY CO.Ltd/CHINE(Nanjing agrochemical	Blé dur :Oidium: 600 ml/ha (COMM 08/06/22)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 67 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
197	Krésoxim-méthyl	50%	WG	Stroby DF	F.059-11/21	STIMA	BASF	Vigne : Oïdium : 20 g/hl Pommier : Tavelure : 20 g/hl
198	Krésoxim-méthyl + difenoconazole	250 g/kg +125g/kg	WG	DECIBEL MAX WG	F.01-23	AGROSYSTEMES	ASCENZA GRO S.APORTUGAL	OLIVER : oeil de paon(spilocaeaoleagina) :0.3 kg/ha (30g/hl) Au printemps à BBCH 50-59 (pendant le développement de l'inflorescence et avant l'ouverture des premières fleurs) DAR: Non requis -nbre d'application:2 (COMM 28/12/2023)
199	Laminarin	45g/l	SL	VACCIPLANT	F.28-21	EL MOUSSEM	GOEMAR SAS/ARYSTA/UPL	Vigne :Oidium(Uncinulanecator):150 cc/hl(1.5 l/ha)-application foliaire-nbre max d'app par cycle:10-Débuter les app avant le dvp de la maladie et continuer à un intervalle de 7 à10 jours.-le produit peut être appliquer de la floraison à la récolte Fraisier :Oidium(Podosphaeraaphanis):150 cc/hl(1.5 l/ha)-application foliaire-nbre max d'app par cycle:10-Débuter les app avant le dvp de la maladie et continuer à un intervalle de 10 jours.-le produit peut etre appliquer au démarrage de la végétation Fraisier :Pourriture grise (Botrytis cinerea) :150 cc/hl(1.5 l/ha)-application foliaire-nbre max d'app par cycle:10-Débuter les app avant le dvp de la maladie et continuer à un intervalle de 10 jours.-le produit peut être appliquer de la floraison à la récolte(COMM09/02/21) Tomate sous serre :Pourriture grise (Botrytis cinerea):150 cc/hl (1.5 l/ha)-application foliaire- nbre max d'app par cycle:10-Débuter les app avant le dvp de la maladie et continuer à un intervalle de 10 jours.-le produit peut être appliquer de la floraison à la récolte. (COMM 08/06/22)
200	Mandipropamide	250 g/L	SC	amphore SC	F.69-21	SOLAGRI	SYNGENTA	Pomme de terre : Mildiou : 40 cc/hl; Tomate : Mildiou : 50 cc/hl (COMM09/02/21)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 68 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
201	Mandipropamide +Difenoconazole	250 g/l + 250 g/l	SC	CARIAL TOP	F.006-16	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Pomme de Terre : Mildiou : 50 cc/hl; Melon :Alternariose: 50 cc/hl; Tomate :Mildiou :50 cc/hl; comm 20/06/2017
202	Mandipropamid+ Oxathiapiprolin	250g/l +30 g/l	SC	ORONDIS ULTRA280 SC	F.77-21	Cotugrain	Syngenta Crop Protection	Tomate :Mildiou(Phytophthora infestan): 0.4 l/ha -Intervalle minimum entre les applications:15 jours -Nbre d'applications au max :3 /cycle -1è reapplication est faite une semaine après le repiquage - en préventif -DAR:3 jours (APV/COMM09/02/21, Homologation/COMM 08/06/2022) Vigne :Mildiou:0.7 l/ha -application foliaire -intervalle min entre application:10 jours Nombre d'application maximum :3 /cycle - <u>en préventif</u> -DAR:21 jours(com 27/12/22)
203	Manipropamide +zoxamid	250 g/kg+240 g/kg	WG	Ampexio WG	F.022-22	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Vigne :Mildiou:0.5 kg/ha -volume de bouillie:400-1000 l Stade préventive Nbre max :3/saison Durée entre les app 10 jours DAR :21 jours. (COMM 08/06/22)
204	Méfenoxam + Folpel	5% + 40 %	WG	Ridomil Gold Combi WG	F.072-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Vigne : Mildiou : 200 g/hl soit 2 Kg/ha ; Tomate : Mildiou: 200 g/hl(COMM27/12/22)
205	Mefentrifluconazole	10%	EC	REVYSTAR EC	F.035-22	AGRIMATCO	BASF	Blé tendre : Rouille: 0.75 l/ha Volume de bouillie: 300 l/ha -pulvérisation foliaire -stade d'application: BBCH32-BBCH59 -nbre d'app:02 traitement au max, intervalle de 21 à 28 jours DAR:35 jours (COMM 08/06/22)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 69 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
206	Mefentrifluconazole +Fluxapyroxade	100 g/l+50g/l	EC	VERYDOR	F.032-22	COTUGRAIN	BASF	Blé dur: Oidium:0.75 l/haVolume de bouillie:300-400l/hapulvérisation foliaire-stade d'application:BBCH 32-BBCH59 -nbre d'app:02 traitements au max, -intervalle de 21 à 28 jours-DAR:35 jours Blé tendre: Rouille:0.75 l/haVolume de bouillie:300-400l/ha-pulvérisation foliaire-stade d'application:BBCH 32-BBCH59 -nbre d'app:02 traitements au max, -intervalle de 21 à 28 jours-DAR:35 jours. (COMM 08/06/22)
207	Mefentrifluconazole+Fluxapyroxade	66,7g/l +66,7g/l	EC	REVYTREX EC	F.031-22	BIOPROTECTION	BASF	Blé dur: Oidium:1 l/ha Volume de bouillie:300-400l/ha pulvérisation foliaire -stade d'application: le 2ème nœud-fin épiaison -nbre d'app:02 traitements au max, intervalle de 21 à 28 jours -DAR:30 jours (COMM 08/06/22) Blé tendre: Rouille :1 l/ha 300-400l/ha pulvérisation foliaire -stade d'application: le 2ème nœud-fin épiaison -nbre d'app:02 traitements au max, intervalle de 21 à 28 jours -DAR:30 jours. (COMM 08/06/22)
208	Mefentrifluconazole + Pyraclostrobin	10%+10%	EC	REVYCARE EC	F.036-22	AGRIPROTEC	BASF	Blé tendre : Rouille: 0.75 l/ha Volume de bouillie:300-400l/ha pulvérisation foliaire -stade d'application: le 2ème nœud-fin épiaison -nbre d'app:02 traitements au max, intervalle de 21 à 28 jours -DAR:30 jours. (COMM 08/06/22)
209	Melaleucaalternifolia(extrait d'arbre a thé)	25%	EC	TIMOREX GOLD EC	F.15-23	ATLAS AGRICOLE	SIPCAM INAGRA	TOMATE SOUS SERRE : oidium (Leveillulataurica):150 cc/hl Volume de bouillie :400 l/ha Traitement foliaire Nbre max de traitement 4 app/an (COMM 28/12/2023)
210	Meptyldinocap	350 g/L	EC	Karathane 350 EC	F.077-11/21	SEPCM	DOW AGROSCIENCES/CORT EVA	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 **70 sur 122**

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
211	Meptyldinocap	350 g/L	EC	AGRIKAR EC	F.28-23	EL BARAKA	DOW AGROSCIENCES/CORT EVA	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl COMM 28 dec 2023
212	Metalaxyl	25%	WP	milor 25 WP	F.30-21	SANABEL AGRO	IQV	Fraisier : Pourriture du collet (Phytophthora spp) :1.5 kg/ha -Par pulvérisation foliaire - 2 applications/cycle 1 mois de protection-(COMM09/02/21) (COMM 19 avril 2023)
213	Metalaxyl	317 g/l	FS	RAMPART FS	F.42-21	AGRIPROTEC	UPL LIMITED	Semences de blé : Fusariose (Fusarium spp) :20 ml/100 kg de semences (500 ml d'eau/100 kg de semences)-traitement de semences à appliquer avant semis-traitement préventif et curatif-Nbre de traitement:1 (COMM09/02/21)
214	Metalaxyl +Folpet	10%+40%	WP	ARMETIL COMBI	F.015-22	SOCOOPEC	IQV	Vigne : Mildiou Plasmopara viticola:200 g/hl -volume de bouillie:1000 l/ha Pulvérisation foliaire -max 04 app à min -10 jours d'intervalle DAR:28 jours. (COMM 08/06/22)
215	Metalaxyl +Folpet	10%+40%	WP	MEVAXIL F	F.09-24	NEGANOR FFT	IQV	Vigne : Mildiou Plasmopara viticola:200 g/hl -volume de bouillie:1000 l/ha Pulvérisation foliaire -max 04 app à min -10 jours d'intervalle DAR:28 jours. (COMM 22/05/24)
216	Metalaxyl-M 37.51g/l+fludioxinil 25.04g/l+ sedaxane 49.98 g/l	37,5%+25,04%+ 49,98g/l	FS	VIBRANCE MAXX FS	F.029-22	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Semences des féveroles : Anthracnose, Fusariose, Pythium:100 ml/100 kg de semences -avant semis -completer avec 900 ml d'eau pour 100 kg de semences -nbre d'application:1 (COMM 08/06/22)
217	metalaxyl-M +hydroxyde de cuivre	28.5 g/l+215 g/l	SC	CYCLO MAX SC	F.08-23	EL KHADRA	AFRASA INDUSTRIALS/ESPAGN E/ ALBAUGH EUROPE SARL ALBAUGH EUROPE SARL	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) :300 cc/hl (03 l/ha) Volume de bouillie 500-1000 l d'eau/ha -application foliaire -stade végétative BBCH 36-81 mode d'application:bommspraying: jet de vol élevé; utilisation professionnelle sur le terrain -DAR:03 jours

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 71 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								-nbre d'application:03 app/an espacée de 7 à 10 jours (COMM 28/12/2023)
218	Metirame de zinc	80%	WP	Polyram DF	F.078-11/21	STIMA	BASF	Laitue , Tomate, p.de terre,vigne: Mildiou : 200 g/hl
219	Metirame de zinc	80%	WG	LUTIRAM WG	F.53-21	AGRIPROTEC	BASF	Laitue , Tomate, p.de terre,vigne: Mildiou : 200 g/hl(COMM09/02/21)
220	Metrafenone	500g/L	SC	VIVANDO	F.015-13/23	AGRIPROTEC	BASF / SBM FORMULATION	Blé : Piétin verse : 0.3 l/ha; Vigne : Oïdium :0.2 l/ha (comm 17/05/2016) Piment: Oïdium:0.2 l/ha -Volume de bouillie:1000 l/ha-Mode de trait: - Pulvérisation foliaire-période de trait:preventif -Nb्रे max de trai:2-Calendrier des trai: conditions favorables au developpement de la maladie -DAR:3 jours. Melon: Oïdium:0.2 l/ha -Volume de bouillie:1000 l/ha-Mode de trait: pulvérisation foliaire-période de trait:preventif- Nb्रे max de trai:2-Calendrier des trai: conditions favorables au développement de la maladie -DAR:3 jours Tomate sous serre: Oïdium(Leveillulataurica):0.2 l/ha Volume de bouillie:1000 l-Mode de trait: pulvérisation foliaire-période de trait:preventif- Nb्रे max de trai:2-Calendrier des trai: conditions favorables au développement de la maladie -DAR:3 jours (COMM 08/06/22)(COMM 19 avril 2023)
221	Myclobutanil	240 g/L	EC	MYCLAS	F.014-19	SANABEL AGRO	SHARDA CROPChem Ltd	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl; COMM 23/04/2019
222	Myclobutanil	200 g/l	EW	TOPOGAN	F.011-19	SANABEL AGRO	SHARDA Cropchem	Vigne: Oïdium:30 cc/hl(0.3 l/ha); -Pulvérisation foliaire;-2 à 3 traitements /saison;- 14 j de protection;(COMM 23/04/2019)
223	Myclobutanil	240 g/L	EC	MYCLONE 24 EC	F.002-18	RayenPhytagri	Sharda Cropchem	Melon :Oïdium : 30 cc/hl (COMM 12/01/2018)
224	myclobutanil	240 g/l	EC	PROMY	F.64-21	AGRINOVA	Sharda Cropchem	Melon :Oïdium : 30 cc/hl (COMM 09/02/21)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 72 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
225	Myclobutanil	240 g/L	EC	Systhane 240 EC	F.081-11/21	SEPCM	DOW AGROSCIENCES/corteva	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl
226	Myclobutanil	240 g/L	EC	DAYZER	F.043-17	SOCOOPEC	SHARDA	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl; (COMM 18/10/2017)
227	Myclobutanil	125 g/l	EC	MYCLO EC	F.41-21	NEGANOR	indofil industries limited	Vigne :Oïdium(Uncinulanecator):40 cc/hl(1000 l/ha) -mode de traitement: application foliaire en préventif et curatif -stade d'application: première fleures ouvertes jusqu'au début de la coloration des fruits. -1-3 applications/cycle -intervalle entre les applications:10 joursDAR:15 jours (COMM09/02/21)
228	Myclobutanil	125 g/l	EC	FLUANCE 125 EC	F.25-23	EL MOUSSEM AGRICOLE	Indofil Industries Limited/ARISTEAS Agro	Vigne :Oïdium(Uncinulanecator):40 cc/hl(1000 l/ha) -mode de traitement: application foliaire en préventif et curatif -stade d'application: première fleures ouvertes jusqu'au début de la coloration des fruits. -1-3 applications/cycle -intervalle entre les applications:10 jours DAR:15 jours (COMM 28/12/2023)
229	Oxathiapiprolin +famoxadone	30 g/l+300 g/l	SE	Zorvecencantia SE	F.048-22	EL BARAKA	CORTEVA	Tomate :Mildiou(Phytophthora infestans): 0.5 l/ha avec un volume de bouillie:200-1000 l/ha DAR:3 jours Nbre max d'app:3/culture(6par saison-serre) (COMM08/06/22)
230	Oxathiapiprolin +zoxamide	40 g/l+300 g/l	SE	ZorvecVinabel SE	F.020-22	ATLAS AGRICOLE	CORTEVA	Vigne:Mildiou:0.5 l/ha nbre d'app:2 avec intervalle de 10 jours stade d'app:BBCH15-BBCH79 DAR:28 jours(COMM 08/06/22)(COMM27/12/22)
231	Oxychlorure de cuivre	678.6 g/l (équivalent à 380 g/l cuivre métal)	SC	Valtonexflow SC	F.018-22	NEGANOR	IQV	Vigne :Mildiou(plasmopara viticola): 200 ml/hl (2 l/ha) -volume de bouillie:1000 l/ha -Mode de trait: pulvérisation foliaire -période de trait:preventif -Nbre max de trai:6/saison -stade phénologiques BBCH:15-81&91 -min intervalle entre applications:7 jours

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 **73 sur 122**

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								-DAR:21 jours.(COMM08/06/22)
232	Oxychlorure de Cuivre	85 % (50 % de cuivre metal)	WP	Agrocuivre	F.168-11/21	AGROSYSTEMES	SPEISS URANIA/COSACO GmbH	Pomme de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arboriculture : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Arboriculture :Bactériose, Coryneum, chancre Cloque, feu bactérien, Tavelure, septoriose :500g/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl
233	Oxychlorure de cuivre	877 g/kg (500 g/kg cuivre métal)	WP	CUPROCAFFAR O WP	F.14-23	LIEN AGRICOLE	ISAGRO SPA/GOWAN	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) :3.5 kg/ha(350g/hl) Volume de bouillie 600-800 l/ha Nbre d'app :4 -BBCH:15-85 -durée de protection 14 jours (COMM 28/12/2023)
234	Oxychlorure de Cuivre	85 % (50 % de cuivre metal)	WP	Cuprumax 50 WP	F.027-15	AMINCO	SPEISS URANIA/COSACO GmbH	Pomme de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arboriculture : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Arboriculture :Bactériose, Coryneum, chancre Cloque, feu bactérien, Tavelure, septoriose :500g/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl
235	Oxychlorure de cuivre +cymoxanil	25%+4%	WG	Curame 25 WG	F.023-22	ATLAS AGRICOLE	Manica SPA	Vigne :Mildiou: 3 kg/ha (300g/hl) -volume de bouillie:800 l/ha Application foliaire Nbre max de traitement :4/cycle Tomate : Mildiou(Phytophthora infestans):3 kg/ha (300g/hl) volume de bouillie: 400 l/ha Application foliaire Nbre max de traitement :5/cycle Intervalle entre application :8 à10 jours (COMM 08/06/22)
236	Penconazole	100 g/L	EC	Topenco 100 EC	F.082-11/21	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Vigne : Oïdium : 25 cc/hl; Tomate, Pommier : Oïdium : 50 ml/hl

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 **74 sur 122**

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
237	Penconazole	100 g/L	EC	BuckleR	F.033-15	AMINCO	GLOBACHEM	Vigne : Oïdium : 25 cc/hl; Tomate, Pommier : Oïdium : 50 ml/hl
238	Penconazole	100 g/L	EC	Topaze 100	F.083-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Vigne : Oïdium : 25 cc/hl; Tomate, Pommier : Oïdium : 50 ml/hl
239	Pencycuron	250 g/L	EC	Monceren	F.085-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPSCIENCE/GowanCrop Protection	Semences de p.de terre : Rhizoctoniasolani : traitement des semences : 60 ml PC/100 Kg
240	Penthiopyrad	205 g/l	SC	KABUTO	F.026-22	EL MOUSSEM	Mitsui Chemicals crop&lifesolutions,Inc(fab) / Summit Agro International Ltd(fournisseur)	Vigne de table :Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>):150 cc/hl (1.5 l/ha) -application fopliaire -Nbres max d'app par cycle:3 -débuter les app avant le dvp de la maladie et continuer à un intervalle de 10 à 14 jours -utiliser le taux le plus élevé et l'intervalle le plus court lorsque la pression de la maladie est élevée. -ne pas faire plus de 2 app séquentielles avant de passer ayant un mode d'action différent. -DAR:7 jours -LMR:0.01 mg/kg (COMM 08/06/22) TOMATE SOUS SERRE : Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>): 150 cc/hl (1.5 l/ha) -application foliaire -Nbres max d'app par cycle:4 -débuter les app avant le dvp de la maladie et continuer à un intervalle de 7 à 14 jours utiliser le taux le plus élevé et l'intervalle le plus court lorsque la pression de la maladie est élevée. -ne pas faire plus de 2 app séquentielles de fongicides RAMPART avant de passer ayant un mode d'action différent -DAR:1 jours -LMR:2 mg/kg (COMM 28/12/2023)
241	Pyraclostrobin +Boscalid	10%+20%	SC	FOXTON 30 SC	F.24-23	AGRIMATCO	LoatingYoloo Bio-Technology Co ,Ltd/chine	Fraise : Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) :1.25 l/ha Pulvérisation foliaire, Max 02 application/saison, intervalle de 7 à 10 jours entre deux applications. (COMM 28/12/23)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 75 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
242	Pyrimethanil	400 g/l	SC	LAITANE SC	F.23-23	RAYEN PHYTAGRI	LAINCO ,S,A/ESPAGNE	Fraise : Pourriture grise (Botrytis cinerea) :2 l/ha Appliquer pendant BBCH 60-89 COMM 28/12/2023)
243	Prochloraze +Triticonazole	60 g/l +20 g/l	FS	REAL SUPER	F.025-17	AGRIPROTEC	BASF	Semences de blé : Carie, Charbon : 200 cc du Produit + 0.5 L d'eau/QL; (COMM20/06/2017); Semences de blé : Fusariose:200 cc du Produit + 0.5 L d'eau/QL; Mode de traitement : traitement des semences;Nombre des traitements :1;Calendrier des applications : avant semis (COMM13/02/2020)
244	Propamocarbe	722 g/L	SL	PROMORE 722 SL	F.021-18	Ets MEZGHANI	ASTRACHEM	Concombre, Melon s/serre : Mildiou de cuba :200 cc/hl; Concombre : Pythium : 250 cc/hl; P. de terre : Mildiou : 200 cc/hl;(COMM 18/10/2018)
245	Propamocarbe	722 g/L	SL	Promess	F.012-15	JADWA AGROTEC	ARYSTA Life Science Benelux / Belgique/arystalifescience	Concombre, Melon s/serre : Mildiou de cuba :200 cc/hl; Concombre : Pythium : 250 cc/hl; P. de terre : Mildiou : 200 cc/hl
246	Propamocarbe	722 g/L	SL	PROPLANT	F.199-11/21	PROTAGRI	ARYSTA Life Science Benelux / Belgique	Concombre, Melon s/serre : Mildiou de cuba :200 cc/hl; Concombre : Pythium : 250 cc/hl; P. de terre : Mildiou : 200 cc/hl
247	Promocarb	722g/l	SL	omix 607 SL	F.17-21	NEGANOR	Agria	Tomate :Fonte de semis(P ythium spp) :2.5 l/ha (1000 l d'eau) -le produit s'applique en traitement du sol -effectuer la première application à la transplantation -02 applications peuvent être faites après la transplantation à un intervalle de 7 à 10 jours -nombre maximum de traitement:3(COMM09/02/21)
248	Promocarb	722g/l	SL	PROPAMIX SL	F.11-24	TASMID	AGRIA	Tomate :Fonte de semis(P ythium spp) :2.5 l/ha (1000 l d'eau) -le produit s'applique en traitement du sol -effectuer la première application à la transplantation -02 applications peuvent être faites après la transplantation à un intervalle de 7 à 10 jours -nombre maximum de traitement:3

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 76 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								(COMM 22/05/24)
249	Promocarb	72.2 %	SL	PRO-CARB SL	F.20-23	SHARDA CROPCHEM TUNISIA	SHARDA CROPCHEM INDE	CONCOMBRE : Phythium : 250 cc/hl 02 app au max preventif ou curatif (COMM 28/12/2023)
250	Promocarb	72.2 %	SL	PRIVATE SL	F.12-24	SANABEL AGRO	SHARDA CROPCHEM INDE	CONCOMBRE : Phythium : 250 cc/hl 02 app au max preventif ou curatif (COMM 22/05/2024)
251	Promocarb +Cymoxanil	400 g/l+50g/l	SC	proxanil 450 SC	F.06-21	BIOPROTECTION	arystalifescience	Pomme de terre :Mildiou :2.5 l/ha-préventif et curatif -conditions favorables à l'apparition de la maladie- DAR : 14 jours Tomate : Mildiou(Phytophthora infestans):2,5l/ha(produit systémique) (APV avec reconduction de l'essai)-préventif et curatif- conditions favorables à l'apparition de la maladie- 03 applications au max-Intervalle d'application : 7 jours-DAR : 3 jours (COMM09/02/21)
252	Promocarb +Cymoxanil	400 g/l+50g/l	SC	Rival duo 450 SC	F.07-21	AGRONOMIC Land	Agria	Pomme de terre :Mildiou: 1.5 l/ha -pulvérisation foliaire -nbre d'application :6 -DAR : 14 jours(COMM09/02/21)
253	Promocarb +Cymoxanil	400 g/l+50g/l	SC	OMIX DUO 450 SC	F.071-22	NEGANOR	Agria	Pomme de terre :Mildiou: 1.5 l/ha -pulvérisation foliaire -nbre d'application :6 -DAR : 14 jours(COMM27/12/22)
254	Propamocarbe + Fluopicolide	625 g/l + 62,5 g/l	SC	Volare	F.091-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	BAYER AG	P. de terre, Tomate, Piment : Mildiou : 150 cc/hl; Oignon :Mildiou :150 cc/hl; comm 20/06/2017
255	Propamocarbe +Fosethyl-Al	530 g/L +310 g/L	SL	Filex Energy	F.089-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	P. de terre : Mildiou : 1,5 L/ha; Cucurbitacées : Phytium : 2 L/ha; Concombre, Melon : Mildiou de cuba : 1,5 L/ha TOMATE SOUS SERRE : Fonte de semis :3 l/ha -dans le système d'irrigation -NBBCH01-BBCH19 Nbre d'app :2 app(1 traitement au moment du repiquage et l'autre 30 jours après) (COMM 28/12/2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 77 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
256	Propamocarbe +Fosethyl-Al	530 g/L +310 g/L	SL	Previcur Energy	F.023-14/24	EL MOUSSEM AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	P. de terre : Mildiou : 1,5 L/ha; Cucurbitacées : Phytium : 2 L/ha; Concombre, Melon : Mildiou de cuba : 1,5 L/ha
257	Propamocarb Hydrochloride	722 g/l	SL	RIVAL 607 SL	F.17-23	AGRIPROTEC	AGRIA	MELON SOUS SERRE : Mildiou de cuba :200 cc/hl Traitement foliaire nbre d'app2(COMM 28/12/2023)
262	Proquinazid	200 g/l	EC	Talendo	F.101-11/21	SEPCM	DU PONT	Arbo: Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe): 25 cc/hl
263	Proquinazid	200 g/l	EC	ASSOCIATE EC	F.27-23	EL BARAKA	DU PONT	Arbo: Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe): 25 cc/hl (COMM28 dec2023)
264	Prothioconazole	25%	EC	PROTEZOLE EC	F.057-22	SANABEL AGRO	SHARDA CROPCHAM	Blé dur: Rouille:0.8 L/ha(500 l/ha) (COMM 08/06/22)
265	Prothioconazole	25%	EC	Mirage EC	F.35-21	SHARDA CROPCHAM tunisie	SHARDA CROPCHAM	Blé dur: Rouille:0.8 L/ha(500 l/ha) -stade BBCH 31-65(COMM09/02/21)
266	Prothioconazole +benzovindiflupyr(SOLATEN OL)	150 g/l+75 g/l	EC	CERATAVO ERA	F.034-22	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Blé tendre: Rouille: 1 l/ha Volume de bouillie:300 à 400l Foliaire en préventif et en curatif- -Stade d'application: BBCH 31-69(Epi 1 cm-fin floraison) -nbre d'application:2 -durée entre les applications:2-3 semaines(en fonction de l'intensité de l'attaque) -DAR:35 jours. (COMM 08/06/22)(COMM27/12/22)
267	Prothioconazole + Trifloxystrobine	175 g/L+ 88 g/L	SC	Madison 263 SC	F020-13/23	SEPCM	BAYER CROPSCIENCE	Blé : Septoriose : 0.75 L/ha; Blé : Rouille,Fusariose: 1 l/ha;(COMM18/10/2018) (COMM 19 avril 2023)
268	Prothioconazole + Trifloxystrobine	175 g/L+ 88 g/L	SC	DELARO DUO SC	F.03-24	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Blé : Septoriose : 0.75 L/ha; Blé : Rouille,Fusariose: 1 l/ha;(COMM 22/05/24)
269	Prothioconazole +Tebuconazole	12,5% +12,5%	EC	PROTECT PLUS EC	F.061-22	EXCEL AGRI	SHARDA CROPCHAM	Blé dur: Rouille :1 l/ha(100-300l/ha) -stade BBCH 31-32 ne dépasser BBCH 71 -02 app d'un intervalle de 21 jours entre les 2. (COMM09/02/2021) ; COMM08/06/2022)
270	Prothioconazole +Tebuconazole	12,5% +12,5%	EC	Perfecto EC	F.36-21	SHARDA CROPCHAM tunisie	Sharda Cropchem	Blé dur: Rouille :1 l/ha(100-300l/ha) -stade BBCH 31-32 ne dépasser BBCH 71 -02 app d'un intervalle de 21 jours entre les 2(COMM09/02/21)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 78 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
271	Prothioconazole +Tebuconazole	160 g/L +80 g/L		Kestrel 240 SC	F.016-15	JADWA AGROTEC	BAYER CROPSCIENCE	Blé :Spetoriose :0.8 l /ha
272	Prothioconazole +Tebuconazole	125 g/L +125 g/L	EC	Prosaro 250 EC	F.098-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPSCIENCE	Céréales : Septoriose, rouille, oïdium, Fusarium : 0,8 L/ha
273	Prothioconazole +Tebuconazole + Spiroxamine	100 g/L + 100 g/L + 250 g/L	EC	Cello	F.021-17	AGRONOMIC Land	BAYER CROPSCIENCE	Blé : Septoriose :1 l /ha(COMM 20/06/2017)
274	Prothioconazole +Tebuconazole+Bixafen	100 g/l+100 g/l+75 g/l	EC	SKYWAY XPRO EC	F.012-18	PROMOCHIMIE	BAYER AG	Blé : Rouille: septoriose : Fusariose : 1 l/ha (Application foliaire; DAR : 30 jours); (COMM 18/10/2018) ; Blé :Piétin verse(1 à 2 noeuds):1.25 l/ha; -application foliaire(COMM13/02/2020)
275	Pyraclostrobine Metconazole	130 g/l +80 g/l	EC	OPTIMO DUO EC	013-18F.	AGRIPROTEC	BASF	Blé : Rouille, septoriose : 0.75 l/ha (Pulvérisation foliaire; Stade BBCH 32 à 59;Max d'app.:2; DAR : 35 jours)(COMM 18/10/2018)
276	Pyraclostrobine +Tebuconazole	115 g/l+230 g/l	SC	PILARTEP SC	F.04-23	RAYEN PHYTAGRI	PILARQUIIM (jiangsu) CO.LTD CHINE	Agrumes : Anthracnose (Colletotricumgleosporoides ou/et Colletotrichumacutatum):50 cc/hl(0.5 l/ha) Volume de bouillie:1000 l/ha -appliquer en pulvérisation foliaire -appliquer en préventif ou dès l'apparition des premiers symptômes (COMM 28/12/2023)
277	Pyraclostrobin + Boscalid	6,7%+26,7%	WDG	MIRACLE WDG	F.038-22	SHARDA CROPCHAM Tunisie	SHARDA CROPCHAM LIMITED	Tomate: Mildiou (Phytophthora infestan):1 kg/ha -Intervalle min entre app:15 jours Nbre d'app au max :3 /cycle -1 ^{ère} applicationest faite une semaine après le repiquage (COMM 08/06/2022)
278	Pyraclostrobin + Boscalid	6,7%+26,7%	WDG	ORACLE 33 WG WDG	F.076-22	SLDA	SHARDA CROPCHAM LIMITED	Tomate: Mildiou (Phytophthora infestan):1 kg/ha -Intervalle min entre app:15 jours Nbre d'app au max :3 /cycle -1 ^{ère} applicationest faite une semaine après le repiquage (COMM 27/12/22)
279	Pyraclostrobine + Dimethomorphe	40 g/l + 72 g/l	EC	Cabrio Duo	F.001-14/24	AGRIPROTEC	BASF	Pomme de terre : Mildiou : 2.5 l/ha; Vigne : Oïdium : 2.5 l/ha (comm18/10/2017) (comm 22 mai 2024)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 79 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
280	Pyraclostrobin +Fenpropimorph	100g/l+375 g/l	EC	COMET PLUS EC	F.38-21	Agriprotec	BASF	Blé dur: Rouille;Septoriose :1 l/ha(200-300 l/ha) -pulvérisation foliaire Calendrier d'app:BBCH 25-69 -nbre max :2 -intervalle d'application: de 21-28 jours -DAR:35jours(COMM09/02/21)
281	Pyraclostrobin +fluxapyroxad	333 g/l+167 g/l	SC	ORKESTRA SC	F.033-22	BIOPROTECTION	BASF	Blé tendre : Rouille: 0.4 l/ha Volume de bouillie: 300 à 400 l -Application foliaire -Stade d'application:Le 2 émenoued-fin épiaison -nbre d'application:2 -durée entre les applications:;21 à 28 jours DAR:30 jours.(COMM 08/06/22)
282	Pyraclostrobin +boscalid	12,8%+25,2%	SC	Crystal SC	F.027-22	FERTITECH	HANGZHOU TOPAGRO BIOSCIENCE	Vigne de table: Pourriture grise (Botrytis cinerea): 285 g/ha - Traitement foliaire Nbre max de traitement 3 app Intervalle entre les traitements :21 jours DAR :7 jours.(COMM 08/06/22)
283	Pyriofenone	300 g/l	SC	KUSABI SC	F.23-21	AGRIPROTEC	ISK Biosciences Europe N.V/UPL	Vigne: Oïdium(Uncinulanecator):30 cc/hl(0.3 l/ha) -Mode de trait. : foliaire -stade d' application : dès les premiers signes d'infestation. -DAR : 28 jours(COMM09/02/21)
284	Pyrimethanil	60 g/l	SC	ETHPYRI SC	F.18-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : Pourriture grise(<i>Botrytis cinerea</i>) : 125 ml/hl Volume de bouillie :500-600 l/ha Nbre d'application :04(COMM 28/12/2023)
285	Pyrimethanil	60 g/l	SC	PYROS SC	F.07-24	COTUGRAIN Impex	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : Pourriture grise(<i>Botrytis cinerea</i>) : 125 ml/hl Volume de bouillie :500-600 l/ha Nbre d'application :04 (COMM 22/05/2024)
286	Pyrimethanil	400 g/l	SC	PRETIL SC	F.21-23	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRASA S.A / ALBAUGH EUROPE SARL	Fraise : Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) :200 cc/hl(2l/ha) Volume de bouillie :400-1000 l/ha -application foliaire -stade vegetative BBCH60-89 mode d'application:bommsprymjet de vol

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 80 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								élevé;utilisation professionnelle sur le terrain -DAR:03 jours -nbre d'application:02 app/an (COMM 28/12/2023)
287	Pyriméthanil	300 g/L	SC	Scala 300 SC	F.102-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Vigne, Fraisier, Tomate : Botrytis : 250 cc/hl; Pommier : Tavelure : 100 cc/hl
288	Pyriméthanil	300 g/L	SC	Mythos300 SC	F.103-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Vigne, Fraisier, Tomate : Botrytis : 250 cc/hl; Pommier : Tavelure : 100 cc/hl
289	Pyriméthanil	40%	SC	PYRAMIDE	F.062-22	FERTITECH	SHARDA CROPCHAM	Tomate : Pourriture grise(Botrytis cinerea) :150 cc/hl -3 applications à un intervalle de 10-15 jours. (COMM09/02/21) ; COMM 08/06/22)
290	Pyriméthanil	40%	SC	pyrma SC	F.12-21	SHARDA CROPCHAM tunisie	SHARDA CROPCHAM	Tomate :Pourriture grise(Botrytis cinerea) :150 cc/hl -3 applications à un intervalle de 10-15 jours.(COMM09/02/21)
291	Pyriméthanil	400 g/l	SC	PYRUS 400 SC	F.025-22	STEC	UPL	Vigne de table: Pourriture grise (Botrytis cinerea): 2 l/ha -volume de bouillie:1000 l/ha -par pulvérisation foliaire -DAR:21 jours. (COMM 08/06/22)
292	Pythiumoligandrum	1*10 ⁶ oospores(10-25% w/w) de polyversum	WP	POLYVERSUM	F.038-17	FERTIPLANT	BIOPREPARATY	Blé (Traitement de semences) : Fusarium spp, caries, Septoriose : 0.75 kg/T de semences (+5 l d'eau) (COMM 18/10/2017); Tomate : Botrytis cinerea(Pourriture grise) : 200 g/ha(20 – 25 g/100L d'eau Bouillie100L d'eau/ha) (comm 12/01/2018); Blé : Fusariose :100g/ha(30-40 g/100 l d'eau) pour une bouillie de 300 à 400 L d'eau/ha(Pulvérisation foliaire;Max3 applications;Stades :BBCH13-15;BBCH25-37;BBCH55-65);(COMM18/10/2018); Fraisier : Pourriture grise(Botrytis cinerea) :200 g/ha avec bouillie de 800 à 1000 l d'eau;- Pulvérisation foliaire, COMMencer au début de cycle;-Traitement Préventif : 3-4 applications /10-15j d'intervalle; Vigne: Pourriture grise (Botrytis Cinerea): 250g/ha (ou 25 g/100 l d'eau) pour une bouillie de

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 81 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								800 L d'eau/ha;-Pulvérisation foliaire;-nombre d'application Préventive : 4 à 7-10 j d'intervalle; (COMM 23/04/2019) Palmier dattier : Dessèchement Foliaire (Alternaria mali et Alternaria arborescens) :80g/hl pour traitement en curatif dès l'apparition des symptômes de des sèchement sur les palmiers(Autorisation provisoire de vente)(AUTORISATION PROVISoire DE VENTE)(COMM09/02/21) Semences des féveroles: Anthracnose, Fusariose, Pythium: 250 g/tonne (5-10 l d'eau) Traitement des semences:enrobage ou pulvérisation des semences juste avant semis (COMM08/06/22)
293	Reynoutriasachalinensis(Extrait de la plante Renouée de Sakhaline)	20%	SC	REYSANA SC	F.016-14/24	BIOPROTECTION	Syngenta/ Marrone Bio Innovation(fab)/ ELEPHANT VERT EUROPE SA(dis)	Tomate, Vigne : Botrytis : 150 cc/hl; Vigne, Piment : Oïdium : 150 cc/hl(comm22mai2024)
294	Sedaxane+Fludioxonil	25 g/l+25 g/l	FS	VIBRANCE DUO FS	F.002-20	BIOPROTECTION	SYNGENTA AGRO AG	Semence de blé: Fusariose ,Septoriose, Carie, Charbon: 200 ml/ql+600 à 800 ml d'eau /ql; Semence d'orge: helminthosporiose de l'orge:200 ml/ql+600 à 800 ml d'eau /ql;(COMM13/02/2020)
295	Soufre	80%	WG	Sulpex	F.028-13/23	AGRIMATCO	AgrostullnGmbH/frarimpe x(D)	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha; Vigne : excoriose, acariose: 1 Kg/hl; C. maraîchères: Oïdium : 250 g/hl Acariose bronzé de la tomate: 600 g/hl; Arbo+ Vigne : Oïdium : 400 g/hl; C. ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires: 400 g/hl(COMM 19 avril 2023)
296	Soufre	80%	WG	COSAMIL-DF	F.26-21	SOCOOPEC	Sulphur Mills Limited	Vigne: Oïdium(unicinulanecator):400g/hl; -Traitement foliaire ;-02 à03 app dès la floraison;(COMM 09/02/21)
297	Soufre	80%	WG	COSAVET-DF	F.010-19	AGRIPROTEC	Sulphur Mills Limited	Vigne: Oïdium:1 kg/hl; -Traitement foliaire ;-02 app a partir du stade feuille étalée jusqu'au Véraison;- L'efficacité de produit s'étale sur 7 jours;(COMM 23/04/2019) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :300g/hl Volume de bouillie: 1000 l/ha Traitement préventif

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 82 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Nombre d'application:01 Calendrier des applications: début de l'attaque DAR:5 jours (COMM 22/02/2024)
298	Soufre	80%	WG	Agrosoufre	F.163-11/21	AGROSYSTEMES	AgrostullnGmbH	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl.
299	Soufre	98%	DP	Cabridust	F.107-11/21	AGROSYSTEMES	The national company for agrochemicals(AGROCHE M)	Vigne : Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) :15 Kg/ha
300	Soufre	80%	WG	Soufrustulln	F.031-15	AMINCO	AgrostullnGmbH	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl.
301	Soufre	80%	WP	TIOSOL 80	F.004-14/24	ATLAS AGRICOLE	SIPCAM	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl.
302	Soufre	80%	WP	Mistral	11-212F.	BIOPROTECTION	ESSECO sarl/AAKO	Vigne :Oïdium : 400g/hl; Piment :Oïdium: 250 g/hl
303	Soufre	80%	WG	THIOMAX JET	F.005-20	COTUGRAIN	SYNGENTA	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl. (COMM13/02/2020)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 83 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
304	Soufre	98%	DP	AzufreMicronizado	F.025-13/23	EL KHADRA	AFEPASA S.A	Vigne : Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) : 15 Kg/ha(COMM 19 avril 2023)
305	Soufre	80%	WG	Azumo	F.026-13/23	EL KHADRA	AFEPASA S.A	Vigne : Oïdium : 400g/hl (COMM 19 avril 2023) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :300 g/hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
306	Soufre	80%	WP	KEY Azufre	F.012-16	Ets MEZGHANI	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	Vigne :Oïdium : 400 g/hl
307	Soufre	98%	DP	STV (Soufre Trituré Ventilé)	F.027-13/23	ETS MEZGHANNI	Sté CHERIFIENNE d'ENGRAIS	Vigne : Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) : 15 Kg/ha(COMM 19 avril 2023)
308	Soufre	80%	WG	soufravit	F.008-16	TASMID	AGROSTULLN/	Piment :Oïdium :600 gr/hl(COMM09/02/21)
309	Soufre	80%	WP	Microsol	F.183-11/21	PROMOCHIMIE	SIPCAM QUIMAGRO	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl. (COMM09/02/21)
310	Soufre	80%	WG	Insuf	F.200-11/21	PROTAGRI	UNITED PHOSPHORUS	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl.
311	Soufre	80%	WG	KIPRIDE WG	F.024-17	SANABEL Agro	AFEPASA S.A	Vigne : Oïdium : 400g/hl
312	Soufre	80%	WG	MICROCROPS WG	F.008-15	SEPCM	AFEPASA S.A	Vigne : Oïdium : 400g/hl
313	Soufre	98%	DP	DP	F.007-15	SEPCM	AFEPASA S.A	Vigne : Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) : 15 Kg/ha
314	Soufre	80%	WG	MicrothiolSpecial	F.184-11/21	STEC	UPL/CEREXAGRI	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 84 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								tâches noires : 400 g/hl.
315	Soufre	80%	WG	Kumulus DF	F.106-11/21	STIMA	BASF	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl.
316	Soufre	80%	WG	SULFOSTAR DF	F.54-21	AGRIPROTEC	BASF	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl.(COMM09/02/21)
317	Soufre	700 g/L	SC	Heliosoufre S	F.213-11/21	BIOPROTECTION	Action Pin/AAKO	Vigne : Oïdium : 0,3 L/hl; Piment :Oïdium : 150 cc/hl Palmier dattier :Acariens des dattes (Oligonychusafrasiaticus):300 ml/hl enTraitement curatif (COMM 08/06/22)
318	Soufre	800 g/l	SC	SULFOMAX	F.009-19	EL KHARDA	AFEPASA	Melon :Oïdium:250 cc/hl; -pulvérisation foliaire -1ère app au début de la maladie;-dernière app 3 j avant la récolte NB :6 app avec intervalle de 10 j; DAR:3j (COMM23/04/2019) ; Vigne:Oïdium(Uncinulanecator):250 cc/hl;- pulvérisation foliaire;-1ère app au stade BBCH 15-18;-dernière app 5 j avant maturation; -NB :8 app avec intervalle de 7 j; DAR:5j(COMM09/02/21)) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasiticus " :250 cc/Hl (COMM 22/02/2024)
319	Soufre	80%	WDG	Micro-cap	F.007-22	NEGANOR	AGROW ALLIED	Vigne :Oïdium (Uncinulanecator):400 g/hl -volume de bouillie:1000 l/ha Traitement foliaire préventive à curative 06 app au max/saison Stade d'app :BBCH15-BBCH85 Min intervalle entre app :7 jours

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 85 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								DAR :3 jours. (COMM 08/06/22)
320	Soufre	80%	WDG	SULFINOVA 80WDG	F.075-22	AGRINOVA	AGROW ALLIED	Vigne: Oidium (Uncinulanecator):400 g/hl -volume de bouillie:1000 l/ha Traitement foliaire préventive à curative 06 app au max/saison Stade d'app :BBCH15-BBCH85 Min intervalle entre app :7 jours (COMM 27/12/22)
321	Soufre	825 g/l	SC	Thiopron SC	F.005-22	BIOPROTECTION	UPL	Vigne: Oidium(Uncinulanecator):250 cc/hl -volume de bouillie:200-1000 l/haMode de trait: pulvérisation foliaire -Nbre max de trai:2-stade phénologiques BBCH 13-81 -min intervalle entre applications:10jours -DAR:3 jours Blé dur: Oidium: 2 l/ha Volume de bouillie:200-600 l -Mode de trait: pulvérisation -BBCHfoliaire -Nbre max de trai:2 -stade phénologiques BBCH 31-59-min intervalle entre applications:14 jours -DAR:3 jours Melon: Oidium: 250 cc/hl Volume de bouillie:500-1000 l Mode de trait: pulvérisation foliaire--Nbre max de trai:2-stade phénologiques BBCH 13-87-min intervalle entre applications:7 jours -DAR:3 jours Pommier: Tavelure(Venturia inaequalis):250 cc/hl -volume de bouillie:500-1200 l-Mode de trait: pulvérisation foliaire -Nbre max de trai:2 -stade phénologiques BBCH 57-85 -min intervalle entre applications:7 jours -DAR:3 jours(COMM 08/06/22)
322	Spiroxamine	300 g/l	CS	PROSPER 300 CS	F.27-21	Atlas agricole	BAYER CROPSCIENCE	Vigne: Oidium(Uncinulanecator):0.8 L/ha

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 86 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								-application foliaire -1000 l/ha -stade d'application :BBCH53-BBCH85(apparition des inflorescence –veraison) -DAR:14 jours (COMM09/02/21)
323	Spiroxamine +difeconazole	400 g/l+50 g/l	EC	SPIROX D EC	F.24-21	BIOPROTECTION	arystalifescience/UPL	Vigne: Oidium(Uncinulanecator):0.5 L/ha -Pulvérisation foliaire en préventive et curative -DAR : 10-14 jours(COMM09/02/21)
324	Spiroxamine	500 g/L	EC	Prosper 500 EC	F.108-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Vigne : Oidium : 50 cc/hl
325	Sulfate de cuivre tribasique	345 g/l (soit 190 g/l cuivre metal)	SC	TRIBASE -FLOW SC	F.71-21	Atlas Agricole	NUFARM	Tomate : Mildiou : 300 cc/hl Vigne : Mildiou 400 cc/ha(COMM09/02/21) OLIVIER : Œil de paon (spilocaeaoleagina) :200 ml/hl Max 3 app/cycle DAR:20 jours (COMM 28/12/23)
326	Sulfate de cuivre tribasique	345 g/l (soit 190 g/l cuivre metal)	SC	Cuproxat	018-14F.	EL MOUSSEM AGRICOLE	NUFARM	Tomate : Mildiou : 300 cc/hl Vigne : Mildiou 400 cc/ha (COMM 18/10/2017) Tomate: Alternariose(Alternariasolani):300 cc/hl (COMM 08/06/22)
327	Sulfate de cuivre tribasique	40%	WG	Novicure	F.033-17	PROTAGRI	UPL	Vigne : Mildiou : 150 g/hl; (COMM 18/10/2017)
328	sulfate de cuivre tribasique	553.5 g/kg (Soit 300 g/kg cuivre métal)	WG	MEXIRAM TRI HI BIO WG	F.09-23	EL MOUSSEM AGRICOLE	ALBAUGH EUROPE SARL	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) : 200 g/hl(2kg/ha) -application foliaire nbre max d'app:4/cycle -débuter les applications avant le developpement de la maladie et continuer à un intervalle de 8 jours -ne pas faire plus de 2 applications séquentielles du fongicide avant de passer à un fongicide ayant un mode d'action différent -DAR:10 jours -LMR:5 mg/kg (COMM 28/12/2023)
329	Sulfate de cuivre tribasique + Cymoxanil	190 g/l +35 g/l	SC	Moltovin	F.037-17	BIOPROTECTION	NUFARM	Vigne : Mildiou : 3.5 l/ha; (COMM 18/10/2017)
330	Sulfate de cuivre tribasique + Zoxamide	266.6 g/l +40 g/l	SC	Amaline Flow	F.027-17	EL MOUSSEM AGRICOLE	NUFARM	Vigne : Mildiou : 2.8 l/ha; (COMM 18/10/2017)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 87 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
331	Sulfate de cuivre tribasique + Zoxamide	266.6 g/l +40 g/l	SC	ventaro	F.75-21	STEC	NUFARM	Vigne : Mildiou : 2.8 l/ha;(COMM 09/02/21)
332	Sulphate de cuivre tribasique	360g/l	SC	CU MAX	F.013-17	RAYEN PHYTAGRI	DIACHEM S.P.A	Tomate :Mildiou: 200cc/hl;(COMM 20/06/2017)
333	Sulfate tetracuvrique tricalcique	20% CU	WG	Bordocure WG	F.024-22	FERTITECH	ALINTRA	Vigne :Mildiou(Plasmopara viticola):1.5 kg/hl -volume de bouillie:500-1000 l/ha - Traitement foliaire -stade de traitement :BBCH15-BBCH91 Nbre max de traitement 6 app Intervalle entre les traitements :7 jours DAR :15 jours. (COMM 08/06/22)
334	sulfatetetracuvrique tricalcique)+ cymoxanil	88.24%p/p(25.5 % cu métal min +3.1%p/p	WP	CUPERTINE SUPER WP	F.10-23	FERTITECH	ALINTRA ESPAGNE	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) :400 g/hl Volume de bouillie 1200 l/ha -pulvérisation foliaire -max 6 applications au min,7 jours d'intervalle -stades phénologiques BBCH:15-89 -DAR:10 j(champ) DAR:3 j(serre) (COMM 28/12/2023)
335	Tebuconazole	250 g/L	EC	SONG EC	F.032-17	ATLAS AGRICOLE	SIPCAM INAGRA	Blé : Septoriose : 1 l/ha; (COMM 18/10/2017)
336	Tebuconazole	250 g/L	SC	KEYZOL SC	F.014-20	EL KHADRA	AVGUST CROP CORPORATION	Vigne : Oïdium : 40 cc/hl soit 400 cc/ha;(COMM13/02/2020)
337	Tebuconazole	60 g/L	FS	Mycoseeds FS 60		EL KHADRA	Sharda World wide	Blé dur et tendre : Charbon, carie : 50ml PC+500 ml eau/Ql;Orge: Helminthosporiose : 50 ml + 500 cc d'eau/Ql; Semences de blé : Carie, Charbon : 50 cc du Produit + 0,5 L d'eau/Ql; Semence de blé : Fusariose:50 cc P.C +500cc d'eau par quintal; -Préparation bouillie : faire mélanger 50cc du PC avec 500 cc d'eau;(Application : Faire mélanger ce volume de bouillie de céréale manuellement ou moyennement une machine de traitement de semences;01 trait/campagne;(COMM18/10/2018)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 88 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
338	Tebuconazole	60 g/L	FS	TEBUSHA 6 FS	F.022-17	AGRINOVA	Sharda World wide	Blé dur et tendre : Charbon, carie : 50ml +500 ml eau/Ql; Orge: Helminthosporiose : 50 ml + 500 ml d'eau/Ql; Semences de blé : Carie, Charbon : 50 ml + 500 ml d'eau/Ql; (COMM20/06/2017) (COMM 08/06/22)
339	Tebuconazole	250 g/L	SC	COLOSSALSous réserve de changement de DC	F.045-17	HALAB TUNISIE	AVGUST CROP CORPORATION	Vigne : Oïdium : 40 cc/hl soit 400 cc/ha;(COMM 18/10/2017)
340	Tebuconazole	60 g/L	FS	Timer FS 060	F.109-11/21	STEC	BAYER CROPSCIENCE	Blé dur et tendre : Charbon, carie : 50ml PC+500 ml eau/Ql; Orge : Helminthosporiose : 50 ml + 500 cc d'eau/Ql; Semences de blé : Carie, Charbon : 50 cc du Produit + 0,5 L d'eau/Ql; Semence de blé : Fusariose:50 cc P.C +500cc d'eau par quintal; -Préparation bouillie : faire mélanger 50cc du PC avec 500 cc d'eau;(Application : Faire mélanger ce volume de bouillie de céréale manuellement ou moyennement une machine de traitement de semences;01 trait/campagne;(COMM18/10/2018)
341	Tébuconazole	430 g/l	SC	SPEEDY SC	F.065-22	EL KHADRA	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE INDUSTRY/Cropidea	Blé : Rouille : 0.5 l/ha; (Pulvérisation foliaire; Stade d'app Espagne fin floraison); (COMM 18/10/2018) ; COMM08/06/22)
342	Tébuconazole	430 g/l	SC	METROSTAR SC	F.009-18	AGRIPLUS	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE INDUSTRY	Blé : Rouille : 0.5 l/ha; (Pulvérisation foliaire; Stade d'app Espagne fin floraison);(COMM 18/10/2018)
343	Tébuconazole	250 g/L	EW	Corail	F.113-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPSCIENCE	Vigne : Oïdium : 40 cc/hl soit 400 cc/ha
344	Tébuconazole	430 g/l	SC	Camaro430SC	F.026-16	RAYEN PHYTAGRI	SHARDA	Blé dur : Rouilles : 0.5 L/ha
345	Tébuconazole	430 g/l	SC	TEBUNOVA SC	F.66-21	AGRINOVA	SHARDA	Blé dur : Rouilles : 0.5 L/ha(COMM09/02/21)
346	Tébuconazole	430 g/l	SC	Matiz	F.004-13/23	SANABEL AGRO	ROTAM AGROCHEMICAL(rival)	Blé : Rouille brune : 0.5 L/ha; Vigne : Oïdium :25 cc/hl (comm17/05/2016); Blé dur : Septoriose : 0.6 l/ha (comm27/09/2016) (COMM 19 avril 2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 89 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
347	Tébuconazole	250 g/L	EW	AZUROS	F.018-19	SLDA	SHARDA CROPCHM Ltd	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage; Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage; Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage; Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha ; Blé : Rouille brune : 1 l/ha;(COMM 23/04/2019)
348	Tébuconazole	250 g/L	EW	Tebucur	F.110-11/21	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage; Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage; Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage; Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha ; Blé : Rouille brune : 1 l/ha;
350	Tébuconazole	250 g/L	EW	Teson	F.036-15	AMINCO	GLOBACHEM	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage; Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage; Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage; Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha ; Blé : Rouille brune : 1 l/ha;
351	Tébuconazole	250 g/L	EW	Konan EW	F.014-13/23	ETS MEZGHANI	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage; Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage; Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage; Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha ; Blé : Rouille brune : 1 l/ha (COMM18/10/2018) (COMM 19 avril 2023)
352	Tébuconazole	250 g/L	EW	Horizon 250 EW	F.111-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPSCIENCE	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage; Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage; Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage; Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha ; Blé : Rouille brune : 1 l/ha; Légumineuses (févrole) : Rouilles : dose 0,5 L/ha Avoine : Rouilles : 1 L/ha
353	Tébuconazole	250 g/L	EW	TEBUZOL 25 EW	F.043-21	Agriprotec	UPL LIMITED	Orge :Helminthosporiose:1 l/ha Nbre des traitement : Appliquer dès la première apparition de la maladie. Une nouvelle app après 3 à 4 semaines si la pression de la maladie reste élevée. -Durée de la protection:3 à 4 semaines -DAR :30 jours(COMM09/02/21)
354	Tébuconazole	250 g/L	EW	SUPREME 25 EW	F.06-24	COTUGRAIN Impex	UPL LIMITED	Orge :Helminthosporiose:1 l/ha Nbre des traitement : Appliquer dès la première apparition de la maladie. Une nouvelle app après 3 à 4 semaines si la pression de la maladie reste élevée. -Durée de la protection:3 à 4 semaines

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 90 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								-DAR :30 jours(COMM22/05/24)
355	Tebuconazole+Prochloraz	200 g/l + 300 g/l	EC	Mystic Pro	F.128-11/21	AGRIPROTEC	NUFARM SAS	Blé : septoriose, rouille brune : 1.25 l/ha; Orge : helminthosporiose : 1.25 l/ha
356	Tebuconazole+Prochloraz	200 g/l + 300 g/l	EC	Winner	F.206-11/21	BIOPROTECTION	NUFARM SAS	Blé : septoriose, rouille brune : 1.25 l/ha Orge : helminthosporiose : 1.25 l/ha
357	Tebuconazole +Trifloxystrobine	200 g/L+ 100 g/L	SC	Nativo 300 SC	F.115-11/21	STEC	BAYER CROPSCIENCE	Céréales : Septoriose, Rouilles à la dose 01 L/ha (au stade montaison au dernier tallage de la culture)
358	Thiabendazole	50 % SC	SC	BENAZOLE	F.059-22	EXCEL AGRI	SHARDA CROPCHAM	Pommier : Pourriture (Penicillium expansum) :210 ml/100 l -appliquer le 1er traitement après 24 h de la récolte-2ème traitement après stockage au froid-tremper dans une solution 30 secondes ou pulvériser /inonder pendant 3 min max. (COMM09/02/21), COMM08/06/22)
359	Thiabendazole	50 % SC	SC	TENAZOLE	F.31-21	SHARDA CROPCHAM Tunisie	SHARDA CROPCHAM	Pommier : Pourriture(Penicillium expansum) :210 ml/100 l -appliquer le 1er traitement après 24 h de la récolte -2ème traitement après stockage au froid -tremper dans une solution 30 secondes ou pulvériser /inonder pendant 3 min max(COMM09/02/21)
360	Trifloxystrobin	50%	WG	Zato 50 WG	F.123-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Cocombre : Oïdium : 25 g/hl; Vigne : Oïdium : 15 g/hl; Pommier : Tavelure : 10 g/hl
361	Trifloxystrobin	50%	WG	Flint	F.124-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPSCIENCE	Piment :Oïdium : 25 g/hl Pommier :Oïdium : 25 g/hl; Concombres :Oïdium : 25 g/hl; Vigne :Oïdium : 15 g/hl; Pommier : Tavelure : 10 g/hl
362	Trichoderma Asperellum ICC012: +Trichoderma Gamsii ICC080:	999 g/kg conidies (5 x10 ⁹ CFU/g)+ 999 g/ conidies (5 x10 ⁹ CFU/g)	WP	REMEDIER WP	F.007-19	STIMA	ISAGRO SPA/GOWAN	Tomate :Fonte de semis (Pythium spp):2 kg/ha;- volume de bouillie:800l/ha;-par pulvérisation;- stade d'app :avant repiquage et au moment de repiquage.-intervalle d'app min :5 jours;-nbre d'app : 2; (COMM 23/04/2019) Vigne :Escadisease (phaeomoniellachlamyospora,Phaeoacremonium nflatipes) (Autorisation provisoire de vente)(Nécroses internes du bois) :2.5 kg/ha(1000 l/ha)-Après la taille (stade BBCH00) et après la fin

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 91 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								du bourgeonnement (stade BBCH 10)-Par pulvérisation-nbre d'application:1 à 2
363	Trichodermaasperellumstrain)	T34 /120g/kg (12.0%w/w)	WP	T34 BIOCONTROL	F.19-21	STIMA	BiocontrolTechnologies,S. L/	Concombre(Sous serre et plein champ) :Fusariose(Fusarium spp) Substrat(pépinière):10g/m3=0.01g/l culture: 0.5 kg/ha en cours de culture -nbre d'application : 4 -1ere application:3 jours après repiquage -les 03 applications/15 jours(COMM09/02/21)
364	Trichoderma asperellum strain Kd (DSM32800) :	2x10 ⁹ spores per gram (3.50 W/W %)	WP	T-protec	F.05-24	ALOHA	Plant Health Products (phy)/Sud d'afrique/Andermatt PHP(Pty) Ltd/ANDERMATT BIOCONTROL GROUP AG	Agrumes :Phytophthora Avec l'eau d'irrigation 0.25 g/l d'eau (min 250 g/ha) Application au sol avec l'eau d'irrigation ou comme pulvérisation sur le sol avec plein d'eau 2 ^{eme} applications aptes 07 j 3 ^{eme} application 28 j Max 05 applications par saison DAR:0 j (COMM 22/05/24)
365	Trichodermaatroviride 77B	2x10 ⁹ cfu/g	WP	T-77 WP	F.29-21	Aloha agriculture	Plant Health Products (phy)/Sud d'afriquePlant Health Products (phy)	Fraisier: Pourriture grise (Botrytis cinerea) :300 g/ha -pulvérisation foliaire -nbre max :3/cycle -intervalle de 10 jours(COMM09/02/21)
366	Zirame	76%	WG	Thionicautodispersible	F.136-11/21	AGROSYSTEMES	TAMINCO/EASTMAN	Poirier : Tavelure : 200 g/hl soit 2 kg/ha Pêcher : Cloque (<i>TaphrinadeFormans</i>): 200g/hl 02 applications : -1 ^{ere} application pendant la période du débourrement -2 ^{eme} 15 jours plus tard (COMM 28/12/2023)
367	Zoxamide + Dimethomorphe	180 g/l+180 g/l	SC	Presidium SC	F.053-22	STEC	Gowan	Pomme de terre: Mildiou: 1 l/ha volume de bouillie:600-1000 l/ha -pulvérisation foliaire-DAR:7 jours -Traitement préventif ou curatif -02 app par cycle. (COMM 08/06/22) Vigne: Mildiou:1 l/ha Volume de bouillie:600-1000 l/ha -pulvérisation foliaire-DAR:28 jours

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 92 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								-Traitement préventif ou curatif -02 applications par cycle -intervalle minimum entre les applications 10 jours. (com 27/12/22)

III. HERBICIDES

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	Aclonifen	600 g/l	SC	Challenge 600SC	H.001-14/24	EL MOUSSEM AGRICOLE	Bayer AG	Féveroles : Dicotylédones: 3.5 l/ha en Pré-émergence;(COMM 18/10/2018); Pois chiche : Adventices dicotylédones:3 l/ha.-Action : par contact de post-semis pré-levée. (COMM13/02/2020) Fenugrec :Adeventices dicotylédones :3 l/ha (COMM09/02/21)(comm22/052024)
02	Aclonifen	60%	SC	ACTION 60 SC	H.026-22	SHARDA CROPCHAM TUNISIA	SHARDA CROPCHAM limited/	Pois chiche : Adventices Dicotylédones annuelles et graminées annuelles(post semis prélevée):3 l/ha -stade d'application: 1 application /an en post semis prélevée actif jusqu'au stade BBCH 8(com 27/12/22)
03	Aclonifen	60%	SC	COSTA SC	H.02-23	SANABEL AGRO	SHARDA CROPCHAM limited/	Pois chiche : Adventices Dicotylédones annuelles et graminées annuelles(post semis prélevée):3 l/ha -stade d'application: 1 application /an en post semis prélevée actif jusqu'au stade BBCH 8(com 27/12/22)COMM028 dec2023
04	Aminopyralydes + Florasulam +2.4 D EHE	10g/l +5g/l +180g/l	SE	Nikos forte	H.010-15	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCES/ CORTEVA	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles(appliqué en post –levée) :0.7l/ha (COMM 27/09/2016)
05	Amidosulfuron + Iodosulfuron +MefempyrDiethyl	100 g/l + 25 g/l + 250g/l	OD	Sekator OD	H.002-17	AGRONOMIC Land	BAYER CROPSCIENCES	Blé : mauvaises herbes Dicotylédones annuelles : 0.15l/ha; (COMM 20/06./2017)
06	Aminopyralydes + Florasulam	350 g/Kg +150 g/Kg	WG	Lancelot NEO 450 WG	H.001-11/21	SEPCM	DOW AGROSCIENCES	Blé, triticale, avoine : Dicotylédones : 33 g/ha (COMM09/02/21)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 93 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
07	Arylex active(halauxifen-methyl) + pyroxsulam +cloquintocet acide	66.67% g/kg en équivalent acide+250 g/kg+354 g/kg	WG	TARZEK + UPTAKE SL (Ecosurf EH-9 Surfactant 73 %(p/p))	H.003-20	COTUGRAIN	Dow Agrosiences	Blé: Mauvaises herbes graminées et dicotylédones:90 g/ha +0.75 l/ha de l'adjuvant UPTAKE en application foliaire;-1 application en association avec l'adjuvant UPTAKE;-appliquer TARZEK du début tallage à fin tallage des céréales.-le stade d'application :dés le stade 3 feuilles sur graminées et entre 2 et 8 feuilles sur dicotylédones.-Traiter en conditions poussantes et éviter les températures basses proches du gel ainsi que les conditions de sécheresse.(COMM13/02/2020) (COMM 28/12/2023)
08	Arylex TM + Forasulam + Cloquintocet acide +SURFER(Adjuvant)	100g/kg+100g/kg+ 70.8 g/kg	WG	CLASSICO WG	H.10-21	SEPCM	Dow Agrosiences	Blé dur: Mauvaises herbes dicotylédones:50 g/ha+75 cc/ha de l'adjuvant surfer(300 l/ha) -pulvérisation foliaire aux stades juvéniles des plantes -1 application -DAR:60 jours(COMM09/02/21)
09	Bentazone	480g/l	SL	BENTA SL	H.019-22	EL KHADRA	NANJING FENGSHAN CHEMICAL GROUP CO,LTD/NANGIN G FENGSHAN	Petit pois: Dicotylédones annuelles:1.25 l/ha ;En post levée (stade de 2 feuilles de la culture);DAR:35-40 jours (COMM13/02/2020) ; COMM08/06/22)
10	Bentazone	480g/l	SL	BASASTAR SL	H.010-20	AGRIPLUS	NANJING FENGSHAN CHEMICAL GROUP CO,LTD	Petit pois: Dicotylédones annuelles:1.25 l/ha ;En post levée (stade de 2 feuilles de la culture);DAR:35-40 jours(COMM13/02/2020)
11	Bentazone	480g/l	SL	BENTAKEY SL	H.007-20	ETS MEZGHANI	SHANDONG BIONNONG TECHNOLOGY CO.LTD/I.Q.Key	Blé: Dicotylédones:4l/ha;Par pulvérisation (COMM13/02/2020)
12	Bentazone	480 g/L	SL	Sharbenta	H.004-13/23	SANABEL AGRO	SHARDA WORLD WIDE	Céréales : Dicotylédones:4 L/ha(COMM 19 avril 2023)
13	Bentazone	480 g/L	SL	TROY 480 SL	H.007-18	AGRIPROTEC	UPL LIMITED	Féveroles : Dicotylédones: 1.25 l/ha en Post levée; Trait foliaire des légumineuses au stade de 8 à 10 cm de la culture et à 1 application). Avec faible efficacité sur "Centaurée"; (COMM 18/10/2018); Fenugrec: Dicotylédones:1.25 l/ha;- Une application stade 2-3 feuilles des légumineuses (COMM13/02/2020)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 94 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
14	Bentazone	480 g/L	SL	Basagran	H.003-11/21	STIMA	BASF	Céréales : Dicotylédones : 4 L/ha Fénugrec, févrole, petit pois : Dicotylédones : 1,25 l/ha en post levée des légumineuses (stade de 8 à 10 cm de la culture)
15	Bentazone	480 g/l	SL	BENTAPROTEKT SL	H.007-22	LIEN AGRICOLE	ANHUI ZHONGSHAN CHEMICAL(fabriqué)/chine(protection phytosanitaire/Es pagne(dist)	Blé :Adventices Dicotylédones: 4 l/ha volume de bouillie: 300 l/ha -en post levée stade 2 à 3 feuilles (COMM 08/06/22)
16	Bentazone	480 g/L	SL	fighter	H.16-21	cotugrain	BASF	Céréales : Dicotylédones : 4 L/ha Fénugrec, févrole, petit pois : Dicotylédones : 1,25 l/ha en post levée des légumineuses (stade de 8 à 10 cm de la culture)(COMM09/02/2021)
17	Bentazone +Imazamox	480 g/l+22.4 g/l	SL	CORUM SL	H.05-21	AGRIPROTEC	BASF	Féveroles :Adventices dicotylédones annuelles :1.25 L+1.25 de ZILLION(adjuvant)(200-300 l) -Traitement foliaire en postlevée (BBCH 12-25) -nombre d'application:1 DAR:35 jours(COMM09/02/21)
18	Chlortoluron	500 g/L	SC	DESPERADO	H.08-21	AGRIPROTEC	Nufarm	Blé dur :Graminées annuelles (raygrass; phalaris; vulpin ;folle avoine) :3.6 l/ha(300 l/ha) -pulvérisation foliaire -en curatif -nbre de trait:1 -en post levée précoce des adventices: raygrass-folle avoine-vulpin et phalaris -DAR: non applicable(COMM09/02/21)
19	Chlortoluron	500 g/L	SC	Tolurex 50	H.006-11/21	SEPCM	AAKO	Blé dur, Blé tendre, Orge : Plantes adventices et folle avoine : 4,8 L/ha
20	Chlortoluron + Isoxabene	500 g/L + 18.7 g/L	SC	FLEXIDOR	H.015-18	ATLAS AGRICOLE	Dow Agrosiences/corteva	Blé : Graminées (ray grass) : 4 l/ha(COMM18/10/2018)
21	Chlortoluron + Isoxabene	500 g/L + 18.7 g/L	SC	Aubaine	H.014-13/23	SEPCM	Dow Agrosiences	Blé : Graminées (ray grass) : 4 l/ha (COMM 19 avril 2023)
22	Chlorotoluron +pendimeyhalin+ diflufenican	250g/l+300g/l+ 40g/l	SC	UMBRA 590 SC	H.030-22	BIOPROTECTIO N	SYNGENTA	Orge, Blé dur : Adventices dicotylédones et graminées <u>sauf ray-grass résistant</u> :2 l/ha Volume de bouillie:200 à 300 l/ha SOIT: Stade1 :Post semis-prélevée de la culture BBCH 00-07

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 95 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								SOIT: Stade2:1 feuille –début tallage de la culture BBCH <u>11-21</u> -nombre d'application:1 DAR:N/A -l'application de l'herbicide peut se faire soit au stade, soit au stade, selon la décision de l'agriculteur(com 27/12/22)
23	Clethodim	240 g/l	SC	ICASSO 240 SC	H.013-20	SANABEL AGRO	RotamAgrochemic al/rival	Colza: Herbicide de post levée : Mauvaises herbes Anti graminées:1 l/ha avec volume de bouillie : 300 litre d'eau; -Pulvérisation foliaire;-Traiter au stade précoce de mauvaise herbe.(COMM13/02/2020)
24	Clethodim	240 g/l	EC	CLETOPROTEKT	H.031-22	LIEN AGRICOLE	Zhejiang tidecropscience/ chine(protektingph ytosanitary/Espagne	Fève: Graminée:0.8 l/ha Volume de bouillie:300 l/ha -en post levée stade 2 à 3 feuilles(com 27/12/22)
25	Cléthodime	120 g/L	EC	Select Super	H.004-11/21	BIOPRO TECTION	UPL/ARYSTA LIFESCIENCE	Petit pois, fève, ail, fénugrec, oignon : Graminées annuelles : 1 L/ha en post-levée de la mauvaise herbe à partir du stade 3 feuilles; Betterave : Mauvaises herbes graminées au stade 3 feuilles et au poste levée de laculture : 1 L/ha. Colza : graminées au stade de post levée de la culture :1 l/ha (comm 04/11/15)
26	Clethodim	240 g/l	EC	CLODIM FORTE 240 EC	H.004-22	SOLAGRI	SYNGENTA	Colza: Graminéesannuelles:0.5 l/ha Pulvérisation foliaire -en post levée de la culture Nb de d'application:1 Stade d'application: stade 3 feuilles mauvaises herbes et en post levée de la culture (COMM 08/06/22) Fève: Graminées annuelles: 0.5 l/ha Pulvérisation foliaire Nombre d'application:1 Stade d'application: stade 3 feuilles mauvaises herbes et en post levée de la culture(COMM27/12/22)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 96 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
27	Cléthodime	120 g/L	EC	Akodim 120 EC	H.005-11/21	SEPCM	AAKO	Petit pois, fève, ail, fénugrec, oignon : Graminées annuelles : 1 L/ha en post-levée de la mauvaise herbe à partir du stade 3 feuilles Betterave : Mauvaises herbes graminées au stade 3 feuilles et au poste levée de laculture : 1 L/ha.
28	Clethodim	12%	EC	FYTODIM EC	H.032-22	FERTITECH	TOPAGRO BIOSCIENCE	Fève :Graminées annuelles:1L/ha -Une application par an en post levée de la culture et des adventices(com 27/12/22)
29	Clodinafop-propagyl +Cloquintocet-mexyl	100g/l +25 g/l	EC	BUGUIS EC	H.008-18	AGRIPROTEC	PROPLAN/QUMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Blé : Graminées: 0.5 l/ha Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes graminées "Brome" et ray grass résistant. Application en Postlevée.Traitement foliaire; nbre de trait. :1). COMM 18/10/2018
30	Clodinafop-propargil	80 g/L	EC	80	H.007-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Blé dur : Graminées sauf ray grass : 900 cc/ha
31	Clodinafop-propargil + Cloquintocet-2-Mexyl	240 g/L +60 g/L	EC	RUBAH	H.026-15	AGRIPLUS	PARIJAT	Blé : Adventices graminées ray grass non résistant (application en post levée):0.3l/ha
32	Clodinafop-propargil +Cloquintocet-2-Mexyl	100 g/L +25 g/L	EC	Uniform 100	H.008-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Blé dur, Blé tendre,Triticale :Antigraminées annuelles , ray grass non résistant : 0,5 L/ha
33	Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl	95 g/l+25 g/l	EC	CICLOPE EC	H.002-20	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Blé :Mauvaises herbes graminées:0.5 l/ha ; -Traitement foliaire;-1 à 2 traitements espacés de 20 jours par cycle de la culture .-Stade d'application : stade végétatif BBCH-39(stade de 3 feuilles jusqu'au début de l'élongation de la tige); NB : Mentionner sur l'étiquette " absence d'efficacité sur le ray grass résistant"(COMM13/02/2020)
34	Clopyralid	100 g/L	EC	VERSATILL	H.014-20	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCE/c orteva	Colza : M. Herbesdicotylédones : 1 L/ha (Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes "Moutarde") en application de post-levée. Avec action systémique.(COMM13/02/2020)
35	Clopyralid	100g/l	SL	GLOPYR 100 SL	H.004-18	AGROSYSTEMES	Globachem	Colza : Dicotylédone graminées: 1.25 l/ha en Post levée; Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes "Moutarde") (COMM 18/10/18)
36	Clopyralid	300g/l	SL	clopyrd 30 SL	H.005-20	SLDA	Sharda cropchem	Blé :Adventices dicotylédones:0,4 l/ha -Pulvérisation foliaire. -une application par saison et par culture -Appliquer au stade de fin tallage à 2 nœuds et quand les mauvaises herbes sont au stade de 4 à 6 feuilles.(COMM09/02/21)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 97 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
	Clopyralid	300g/l	SL	PRYSTAR SL	H.01-24	SANABEL AGRO	Sharda cropchem	Blé: Adventices dicotylédones:0,4 l/ha -Pulvérisation foliaire. -une application par saison et par culture -Appliquer au stade de fin tallage à 2 nœuds et quand les mauvaises herbes sont au stade de 4 à 6 feuilles.(COMM22/05/24)
37	Cycloxdime	100 g/L	EC	Focus Ultra	H.009-11/21	STIMA	BASF	Petit pois, lentille, féverole : Antigraminées : 2L/ha Betterave : Antigraminées : 1,5 à 2 L/haColza : M. Herbes : 2 L/ha
38	Cycloxdime	100 g/L	EC	stratos ultra EC	H.17-21	agriprotec	BASF	Petit pois, lentille, féverole : Antigraminées : 2L/ha Betterave : Antigraminées : 1,5 à 2 L/ha Colza : M. Herbes : 2 L/ha(COMM09/02/2021)
39	Dicamba-Sel Dimethylamine (DMA)	480g/l		procamba	H.13-21	SSCC	ghardachemical	Blé dur : Adventices dicotylédones annuelles :0.5 l/ha Plein à fin tallage de la culture(COMM09/02/21)
40	Dicamba +Prosulfuron	500 g/kg+50 g/kg	WG	CASPER 55 WG	H.004-20	SOLAGRI	Syngenta	Blé: Dicotylédones annuelles et vivaces : 0,3 kg/ha dans une bouillie de 300 l d'eau/ha;-Pulvérisation foliaire en post-levée. - Une seule application par saison au début tallage (stade de 4 à 6 feuilles de la culture). (COMM13/02/2020)
41	Diflufenican	50%	WG	OSSETIA WG	H.008-20	El MOUSSEM	RotamAgrochemic al	Blé: Anti dicotylédones:375 g/ha avec volume de bouillie :300 litre d'eau; En post semis, prélevée précoce des céréales(COMM13/02/2020) (COMM 28/12/2023)
42	Diflufenican+flufenacet	200 g/l + 400g/l	SC	FLOUKAN SC	H.008-22	SANABEL AGRO	shardacropchem	Blés: Désherbage anti dicotylédones et graminées: 0.6 l/ha Volume de bouillie:300 l/ha -application en post semis prélevée précoce (COMM 08/06/22)
43	Diflufenican (ou Diflufenicanil)	500 g/l	SC	Diflanil	H.010-14/24	AGROSYSTEME S	GLOBACHEM	Blé : Dicotylédones : 375 ml/ha
44	Diflufenican + Flufenacet + Flurtamone	60 g/l + 240 g/l + 120 g/l	SC	Vigon 420 SC	H.012-16	PROMOCHIMIE	BAYER CROPSCHIENCE	Blé dur : Adventices graminées et dicotylédones annuelles : 1 L/ha en Post semi et pré-levée de la culture. (COMM 08/06/22)
45	Diflufenican + Metsulfuron-méthyl	60 % +6%	WG	Alliance	H.002-13/23	BIOPROTECTIO N	NUFARM S.A	Blé : Dicotylédones : 75 g/ha(COMM 19 avril 2023)
46	Diflufenican + Metsulfuron-méthyl	60 % +6%	WG	polymer WG	H.19-21	AGRIPROTEC	NUFARM S.A	Blé : Dicotylédones : 75 g/ha(COMM09/02/21)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 98 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
47	Di flufenican + flufenacet	200 g/l+400 g/l	SC	SC	H.009-22	BIOPROTECTIO N	UPL	Blé dur: Adventices graminées et dicotylédones annuelles: 0.6 l/ha Application en post semis-prélevée de la culture (maximum 3 feuilles) (COMM 08/06/22)
48	Dimethenamid-P+Metazachlor +Quinmerac	100g/l+300g/l+100 g/l	SE	BUTISAN AVANT SE	H.012-20	COTUGRAIN	BASF	Colza: Mauvaises herbes dicotylédones:2 l/ha;-Une seule application par pulvérisation;stade d'application :post semis prélevée ou post levée précoce;N/B : Le produit manque d'efficacité sur les mauvaises herbes graminées;(COMM13/02/2020)
49	EthametSulfuron Methyl	750 g/kg	WG	MUSTER 75 WG	H.023-22	SSCC	FMC	COLZA: Dicotylédones:25 g/ha+ huile adjuvant Post levée des adventices ou stade de la culture (BBCH 10-18) (com 27/12/22)
50	Fénoxaprop-p-Ethyl	69g/l	EW	Foxtrot	H.027-15	AGROSYSTEME	FMC	Blé : Adventices graminées, ray grassnon résistant: 1 l/ha (application en pst levée)
51	Fénoxaprop-P-Ethyl +Iodosulfuron-Méthyl Sodium +Méfenpyr – diéthyl	64 g/L +8 g/L + 24 g/L	EC	Puma Evolution	H.015-11/21	JADWA AGROTEC	BAYER CROPS SCIENCE	Céréales : monocotylédones + dicotylédones : 1 L/ha (en post levée des céréales stade 3 à 4 feuilles jusqu'à fin tallage)
52	Florosulame + Flumetsulam	75 g/L + 100 g/L	EC	Derby	H.085-11/21	promochimie	DOW AGROSCIENCES/ corteva	Céréales à pailles: Dicotylédones : 50 cc/ha herbicide de post levée des cereales (COMM09/02/2021)
53	Florasulam +tribenuron-methyl	200 g/kg+600 g/kg	WG	GRANSTAR MAX WG	H.12-21	AGRIPROTEC	chenminova/FMC	Blé dur: Adventicesdicotylédones:25 g/ha(150-300 l/ha) herbicide de post levée -Mode de traitement: pulvérisation -Période de traitement (préventif ou curatif) post émergences des adventices -Nombre de traitements:1 par an(COMM09/02/21) -Calendrier des applications: NA
54	Fluazifop-P-Butyl	125 g/l	EC	FOUZILE EC	H.019-15	ETS MEZGHANI	INDUST. QUIMICA KEY	Féverole: Adventices graminées sauf ray grass : 1.5 l/ha(en post levée); Betterave à sucre : Adventices graminées sauf Ray grass (en post levée) : 3 l/ha(COMM13/02/2020)
55	Fluazifop-P-Butyl	125 g/l	EC	Benfuron	H.013-16	AGRIMED DISTRIBUTION	SHARDA	Féverole : adventices graminées, ray grass non résistant (en post levée) :1.5 l/ha COMM 28 dec 2023
56	Fluazifop-P-Butyl	150 g/l	EC	Fouir	H.013-17	EL KHADRA	SHARDA	Pois-chiche, Féverole : adventices graminées, ray grass non résistant (en post levée) :1.25 l/ha.(COMM 18/10/2017); Betterave à sucre: Mauvaises herbes : monocotylédones et graminées annuelles et vivace

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 99 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								:2.5l/ha -Traitement : Pulvérisation foliaire. -Action ; actif en post levée contre les monocotylédones et les graminées Moment d'applications : -Appliquer une seule fois par culture et par saison au début de croissance végétative et avant floraison de la culture ciblée(COMM09/02/21)
57	Fluazifop-P-Butyl	125 g/L	EC	Trivko	H.001-18	SOLAGRI	SYNGENTA	Betterave : Monocotylédones : 3 L/ha Légumineuses : M.Herbes : 1,5 L/ha
58	Flucarbazone-sodium	70%	WG	Everest 70 WG	H.017-11/21	AGRIPROTEC	ARYSTA LIFESCIENCE	Blés : Phalaris et folle avoine : 42 g/ha +500 cc/ha huile non ionique Blés : Graminées+Brome : 43 g + 0,5 L d'agral / ha
59	Flumetsulam	800 g/kg	WG	BROADSTRIKE WG	H.009-20	PROMOCHIMIE	DOW AGROSCIENCE	Petit pois; Fenugrec :Dicotylédones:25 g/ha; -1 app-DAR:60 j;-Une application stade 2-3 feuilles des légumineuses;Il est obligatoire, essentiellement pour l'usage sur le petit pois, de:Mentionner en clair les reCOMMandations suivantes sur les étiquettes :- NE PAS appliquer le produit sur les cultures qui peuvent être stressées en raison de périodes prolongées de températures extrêmes (moins de 5 ° C ou plus de 30 ° C), de stress hydrique (sol trop saturé d'eau ou affecté par la sécheresse);- NE PAS irriguer (quelle que soit la méthode) la culture ou le pâturage traité pendant 48 heures après l'application.- NE PAS appliquer sur les cultures affectées par un traitement herbicide antérieur (par exemple triazines ou sulfonilurées).(COMM13/02/2020) (COMM 28/12/2023)
60	Fluroxypyr	20%	EC	keynly herbicide EC	H.11-21	etsmezhani	industrialquimicak ey	Blé dur :Adventices dicotylédones :1 l/ha (COMM09/02/21)
61	Fluroxypyr (ester1-methylheptyl)	200 g/l	EC	Flurostar 200	H.011-14/24	AGROSYSTEME S	GLOBACHEM	Blés :Dicotylédones : 1L/ha
62	Fluroxypyr +Clopyralid	150 g/l+60 g/l	EC	VEGA EC	H.006-20	AGRIMED DISTRIBUTION	Sharda cropchem	Blé :Adventices dicotylédones:1 l/ha; Pulvérisation foliaire.Stade d'application : fin tallage à 2 nœuds. Ne pas dépassé le stade BBCH39 (COMM13/02/2020) /, COMM 08/06/22)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 100 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
63	Fluroxypyr +Clopyralid	50 g/l+28g/l	ME	KINVARA ME	H.005-22	AGRIPROTEC	BRACLAY	Blé dur: Mauvaises herbes dicotylédones (annuelles et vivaces):3 l/ha -traitement foliaire -nbre max de traitement:1 -Calendrier des applications :BBCH24-39 DAR:0 jours. (COMM 08/06/22)
64	Glyphosate	360 g/l	SL	GLYFOSTAR	H.002-19	SLDA	SHARDA CROPCHM Ltd	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha; Dés herbant total : 12 l/ha; (COMM 23/04/2019)
65	Glyphosate	360 g/l	SL	GALLUP SUPER SL	H.033-22	AGRIPROTEC	Braclaychemicals	Agrumes: Dés herbage total (chiendent.cyperus.diss):12 l/ha Volume de bouillie:300l -Mode de traitement : pulvérisation foliaire -période de traitement (préventif ou curatif):dés herbage total -Nombre max de traitements:2 -Calendrier des applications :en cas de présence d'adventices en conditions poussantes. (com 27/12/22)
66	Glyphosate	360g/l	SL	Round Up Pro	H.004-15	ATLAS AGRICOLE	MONSANTO/BA YER	Agrumes : Mauvaises herbes annuelles (Graminées et dicotylédones) : 12 l/ha
67	Glyphosate	360 g/l	SL	DRAGON	H.003-19	FERTITECH	SHARDA CROPCHM Lt	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha; Dés herbant total : 12 l/ha ; (COMM 23/04/2019)
68	Glyphosate	360 g/l	SL	SATELITE360 SL	H.001-19	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAU GH EUROPE SARL	PECHER: Mauvaises herbes annuelles: 10 l/ha;- volume de bouillie: 300 à 400 l/ha; -Trait. : Appliquer en pulvérisation dirigée au sol à basse pression;-Mode d'action : Systémique;Le produit est de faible efficacité sur les mauvaises herbes suivantes : Elytrigiasp. , Amaranthusretroflexus ,Robusfruticosus et Rumex acetosella; (COMM23/04/2019)
69	Glyphosate	360 g/l	SL	VERDIS 36 SL	H.009-17	EXCEL AGRI	Sharda Cropchem Limited	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha; Dés herbant total : 12 l/ha ; (COMM 27/12/22)
70	Glyphosate	360 g/l	SL	NOV-UP	H.003-17	AGRINOVA	Sharda Cropchem Limited	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha; Dés herbant total : 12 l/ha ; (COMM 20/06/2017). (COMM 20/06/2017) ;(COMM 08/06/2022)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 101 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
71	Glyphosate	360 g/l	SL	GLYPHO-CAP	H.010-17	NEGANOR FFT	HOCKLEY INTERNATIONA L LIMITED	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha; Désherbant total : 12 l/ha ; (COMM 20/06/2017)
72	Glyphosate	450 g/l	SL	GLYFAST 450 SL	H.034-22	AGRIPROTEC	Braclaychemicals	Agrumes: Mauvaises herbes annuelles: 2 l/ha Agrumes: Mauvaises herbes vivaces: 5 l/ha Volume de bouillie:300l/ha -Mode de traitement : pulvérisation foliaire -période de traitement (préventif ou curatif):désherbage total -Nombre max de traitements:2 -Calendrier des applications :en cas de présence d'adventices(com 27/12/22)
73	Glyphosate	490g/L	SL	GALLUP HI-AKTIV SL	H.001-20	RAYEN PHYTAGRI	Barclay chemicals(R&D) Ltd.	Poirier: Mauvaises herbes <u>vivaces ou annuelles</u> :4.5L/ha avec volume de bouillie:300 l/ha (Sous réserve de bien spécifier la nature des mauvaises herbes : annuelles ou vivaces en fonction de la dose testée) (COMM13/02/2020)
74	Glyphosate	480 g/l	SC	Round up innov	H.003-15	ATLAS AGRICOLE	MONSANTO	Agrumes : Mauvaises herbes annuelles (Graminées et Dicotylédones) : 5 l/ha
75	Glyphosate	70%	SG	Kalach Extra	H.007-16	BIOPROTECTIO N	ARYSTA LIFESCIENCE	Zones non cultivées et vergers mauvaises herbes annuelles et vivaces: 1 kg/hl (une bouillie de 600 l/ha).Pour une forte pression des vivaces : 9 kg/ ha pour une bouillie de 600 l d'eau au maximum.
76	Glyphosate	480 g/l	SL	Herbolex Max	H.008-15	SEPCM	DOW AGROSCIENCE/ CORTEVA/ALBA UGH	Agrumes : Mauvaises herbes annuelles (Graminées et dicotylédones) : 2 l/ha
77	Glyphosate	360 g/l	SL	Kalach 360	H.022-11/21	BIOPROTECTIO N	UPL/ARYSTA LIFESCIENCE	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
78	Glyphosate	450 g/L	SL	Round up Plus	H.029-11/21	ATLAS AGRICOLE	MONSANTO/BA YER	Arboriculture : M. herbes annuelles : 2 L/ha; Arboriculture : M. herbes vivaces : 5 L/ha
79	Glyphosate	360 g/l	SL	Glycel	H.019-11/21	AGRIMATCO	excel crop care/Sumitomo chemical	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
80	Glyphosate	360 g/l	SL	Cible	H.018-11/21	AGRIPROTEC	NUFARM	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 102 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
81	Glyphosate	360 g/l	SL	Agriatech	H.020-11/21	AGROSYSTEME S	AGRIA SA	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
82	Glyphosate	360 g/l	SL	Maynozate	H.025-15	AMINCO	AGRIA SA	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
83	Glyphosate	360 g/l	SL	Glyweed	H.086-11/21	ATLASINDUSTRIE	COROMANDEL Ltd.	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
84	Glyphosate	360 g/l	SL	Kleen Up	H.097-11/21	BIOPROTECTION	NUFARM	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss: 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
85	Glyphosate	360 g/l	SL	Blanca	H.006-13/23	COTUGRAIN IMPEX	Sharda World Wide	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha(COMM 19 avril 2023)
86	Glyphosate	360 g/l	SL	GLISO 360	H.005-16	EL KHADRA	SIPCAM INGARA	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
87	Glyphosate	360 g/l	SL	Weed Killer	H.006-16	EL KHADRA	Sharda World Wide	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
88	Glyphosate	360 g/l	SL	Fortin	H.024-11/21	ETS MEZGHANI	INDUSTRIQUIM ICAKEY	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
89	Glyphosate	360 g/l	SL	Buggy	H.079-11/21	PROMOCHIMIE	SIPCAM INGARA	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
90	Glyphosate	360 g/l	SL	Glyphomax	H.013-14/24	LIEN AGRICOLE	Sharda World Wide	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha (COMM13/02/2020) (comm 22 mai 2024)
91	Glyphosate	360 g/l	SL	Diss	H.093-11/21	PROTAGRI	UNITED PHOSPHORUS	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
92	Glyphosate	360 g/l	SL	Glyster	H.025-11/21	SANABEL AGRO	SINON CORPORATION	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
93	Glyphosate	360 g/l	SL	Nasa 36 SL	H.001-15	SOCOOPEC	ZENITH CROPS SCIENCES/ agria	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 103 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
94	Glyphosate	360 g/l	SL	Glyphotec	H.028-11/21	STEC	AAKO BV	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
95	Glyphosate + Oxyfluorène	200 g/L + 30 g/L	SC	Dipiril Plus	H.016-13/23	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAU GH EUROPE SARL	Arboriculture : M. herbes annuelles et vivaces: 4 L/ha (COMM 19 avril 2023)
96	Glyphosate + Oxyfluorène	360 g/L +30 g/L	SC	Brout	H.030-11/21	SEPCM	AAKO	Agrumes : M. herbes annuelles : 2 L/ha
97	Glyphosate +Carfentrazone-ethyl	360g/l +5g/l	EW	Affinex	H.006-15	COTUGRAIN IMPEX	FMC	Agrumes : Mauvaises herbes annuelles (Graminées et Dicotylédones) : 2.5 l/ha
98	Halauxifen-methyl +aminopyralid +cloquintocet –mexyl	33.7 g/l +27.2g/l+32.3 g/l	EC	TREZAK EC	H.14-21	AGRIPROTC	Dow agrosience	Blé dur :Adventices dicotylédones:0.2 l/ha -Stade d'application :début tallage-2 nœuds -par pulvérisation -01 application par an -DAR:13jours(COMM09/02/21)(COMM28 dec 23)
99	Imazamox + Metazachlor	25 g/l +375 g/l	SC	Nopasaran	H.011-16	COTUGRAIN	BASF	Colza (variétés clearfield) : Graminées et Dicotylédones (Stade 2-4 feuilles au stade 8 feuilles max) : 1.5 L/ha + 1.5 l/ha du mouillant spécifique Dash (45 g/l acide oleique + 205 g/l ester de phosphate d'alcool gras + 345 g/l ester méthylique d'acide gras); NB/ Indiquer sur l'étiquette la mention : Faible action sur liseron et mille pertuis
100	Iodosulfuron +Mesosulfuron +Mefenpyr	6 g/Kg +30 g/Kg +90 g/Kg	WG	Atlantis	H.033-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Céréales : Polyvalent : 500 g/ha
101	Indaziflam	500 g/l	SC	Alion 500 SC	H.013-22	PROMOCHIMIE	BAYER	Vigne :Adventices annuelles graminées et dicotylédones:0.1 l/ha -Application en pré-émergence de l'adventice. (COMM 08/06/22)
102	Lenacil	80 % (800 g/kg)	WG	VENZAR	H.003-22	SEPCM	FMC	Betterave à sucre :Adventices dicotylédones annuels:0.620 kg/ha/cycle de la betterave -En prélevée de la betterave à sucre, le produit s'utilise à la dose de 0.310 kg/ha -En post levée de la betterave à sucre, le produit prévient les levées tardives des mauvaises herbes. 0.310 kg/ha -Volume de bouillie: un minimum de 600-800 litres de bouillie à l'hectare. (COMM 08/06/22)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 104 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
103	Mesosulfuron-Méthyl(Mesomax) +Iodosulfuron +Méfenpyrdiéthyl	30 g/Kg+30 g/Kg +90 g/Kg	WG	Amilcar	H.036-11/21	STEC	BAYER CROPSCIENCE	Blés : Graminées et dicotylédones : 330 g/ha
104	Mesosulfuron-Méthyl+Iodosulfuron – Méthyl Sodium + Méfenpyrdiéthyl (SAFENER)	7,5 g/L + 7,5 g/L+ 22,5 g/L	OD	Amilcar OD	H.037-11/21	STEC	BAYER CROPSCIENCE	Blé dur : Adventices Graminées et dicotylédones (en post levée-tallage) :1.25l/ha; NB/ : faible action sur brome, faux fenouil, fumeterre et coquelicot (Correction de la dose : COMM 27/09/2016)
105	Mésosulfuron- Méthyl+Iodosulfuron- Methyl +Méfenpyrdiéthyl	10 g/l +2 g/l +30 g/l	OD	Atlantis OD	H.012-15	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Blé dur : Adventices Graminées et dicotylédones (en post levée-tallage) :1.5l/ha
106	Mesosulfuron-méthyle +Propoxcarbasone-sodium +Méfenpyr- diéthyle(phytoprotecteur)	45 g/kg +67,5g/kg +90g/kg	WG	OLYMPUS FLEX WG	H.009-18	ATLAS AGRICOLE	BAYER AG	Blé : Adventices graminées : 330 g/ha en Post levée ; Avec faible efficacité sur le "Ray-grass" résistants;(COMM 18/10/2018)
107	Metazachlor	500 g/l	SC	RAPSAN 500 SC	H.002-18	AGROSYSTEME S	Globachem	Colza : Dicotylédone graminées : 2 l/ha enPré- émergence. Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes "Faux fenouil; Chardon; Gaillet; Fumeterre";(COMM 18/10/2018)
108	Metazachlor +Quinmerac	400 g/l +100g/l	SC	RAPSAN TDI SC	H.003-18	AGROSYSTEME S	Globachem	Colza : Dicotylédone graminées : 2.5 l/ha en Pré- émergence. (Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes"Fumeterre;Chrysanthème") (COMM 18/10/2018)
109	Metazachlore	500 g/L	SC	TWIGA	H.022-15	BIOPROTECTIO N	AAKO BV	Colza : Graminées et dicotylédones au stade post semi-prélevée : 2l/ha
110	Metribuzine	75%	WG	Maestro 75 WG	H.042-11/21	BIOPROTECTIO N	AAKO	P. de terre, tomate : M. Herbes : 700 g/ha; Tabac :M. Herbes : 1 Kg/ha
111	Metribuzine	600 g/L	SC	Sencor 600SC	H.089-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPSCIENCE	Pomme de terre : Mauvaises herbes :0,75 L/ha
112	Metribuzine	70%(g/kg)	WG	MAYA	H.017-22	SLDA	UPL	Tomate :Mauvaise herbes ,Dicotylédones annuelles(UNIQUEMENT) : 700g/ha (COMM 08/06/22)
113	Metribuzine	70%(g/kg)	WG	DANCOR 70	H.004-16	PROTAGRI	UPL	Tomate :Mauvaise herbes ,Dicotylédones annuelles(UNIQUEMENT) :700g/ha
114	Metribuzine	700 g/kg	WDG	MATRIX WDG	H.001-17	STIMA	SHARDA CROPCHAM	Pomme de terre : Mauvaises herbes : 700 g/ha ;(COMM 20/06./2017)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 105 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
115	Metribuzine	700 g/kg	WDG	GRAZY 70% WDG	H.20-21	AGRIMED DISTRIBUTION	SHARDA CROPCHেম	Pomme de terre : Mauvaises herbes : 700 g/ha ;(COMM09/02/21) (COMM28 dec 2023)
116	Metribuzine	48%	SC	TUBERON	H.01-21	AGRIMATCO	UPL	Pomme de terre :Mauvaisesherbes:1 l/ha - pulvérisation foliaire en post levée(COMM09/02/21)
117	Metribuzine	480 g/l	SC	buzzin	H.03-21	Delta agricole plus	shardacropchemli mited	Pomme de terre :Mauvaisesherbes:0,9 l/ha,application en prélevée de la culture(COMM09/02/21)
118	Metribuzine	480 g/l	SC	Mitrazе	H.015-22	AGRIMED DISTRIBUTION	shardacropchemli mited	Pomme de terre :Mauvaises herbes:0,9 l/ha, application en prélevée de la culture; (COMM 08/06/22)
119	Metribuzine	700 g/kg	WP	NOVAMET WP	H.037-22	AGRINOVA	AGROW ALLIED	Pomme de terre :Adventices dicotylédones et graminées:700 g/ha volume de bouillie:400 l/ha Mode d'application: pulvérisation foliaire en prélevée (une semaine après semis) ou en post levée de la pomme de terre (la culture ne dépasse pas 10 cm) et l'adventice(stade plantule 4 cm) DAR:60 jours. (COMM 27/12/22)
120	Metribuzine	700 g/kg	WP	POMOCORE WP	H.001-22	NEGANOR	AGROW ALLIED	Pomme de terre :Adventices dicotylédones et graminées:700 g/ha volume de bouillie:400 l/ha Mode d'application: pulvérisation foliaire en prélevée (une semaine après semis) ou en post levée de la pomme de terre (la culture ne dépasse pas 10 cm) et l'adventice(stade plantule 4 cm) DAR:60 jours. (COMM 08/06/22)
121	Metribuzine+Clomazone	233g/l + 60 g/l	CS	CETUS	H.003-16	AGRIPROTEC	FMC	Pomme de terre : Mauvaise herbes, Dicotylédones en prélevée de la culture (pour respecter les LMR) : 1.5l/ha
122	Metsulfuron Méthyl	20%	WG	Isomexx	H.043-11/21	AGRIPROTEC	NUFARM	Céréales : Dicotylédones : 30 g/ha (Traitement aux stades 3 à 4 feuilles de la culture, (Réévaluations de la dose)
123	Metsulfuron Méthyl	20%	WG	Karal	H.003-13/23	BIOPROTECTIO N	NUFARM	Céréales(en post levée) : Dicotylédones : 30 g/ha (Traitement aux stades 3 à 4 feuilles de la culture) (COMM 19 avril 2023)
124	Metsulfuron Méthyl	20%	WG	Metsy WG	H.009-16	PROTAGRI	UNITED PHOSPHORUS	Blé dur (en post levée) : Dicotylédones(Traitement aux stades 3 à 4 feuilles de la culture) : 30 g/ha

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 106 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
125	Metsulfuron Méthyl	20%	WG	METRON WG	H.038-22	AGRIMATCO	UNITED PHOSPHORUS	Blé dur (en post levée) : Dicotylédones(Traitement aux stades 3 à 4 feuilles de la culture) : 30 g/ha (COMM 27/12/22)
126	Metsulfuron-méthyl + Bensulfuron-méthyl	40g/kg+500 g/kg	WG	XANADU	H.029-22	BIOPROTECTIO N	UPL limited	Blé tendre, Orge: Adventices dicotylédones:100g/ha -Stade d'application du stade début tallage au stade fin tallage (com 27/12/22)
127	Metrobromuron	500g/l	SC	PROMAN	H.02-21	NEGANOR	BELCHIM CROP PROTECTION/CE RITIS BELCHIM NV	Pomme de terre: Mauvaises herbes: graminées annuelles & dicotylédones annuelles :3.5 l/ha -stade d'applicatuion :pré-emergence, après butage -1 app/culture -le traitement ne peut plus avoir lieu lorsque les pommes de terre lèvent et COMMencent à pointer hors sol.(COMM09/02/21)
128	Oxyfluorfen	240 g/L	EC	Goal	H.081-11/21	promochimie	HANGZHOU NUTRICHEM/su mittimo	Oignons : Mauvaises herbes graminées et dicotylédones : 1,5 L/ha
129	Oxyfluorfen	240 g/L	EC	OXIFEN EC	H.046-11/21	Ets MEZGHANI	INDUST. QUIMICA KEY	Oignons : Graminées et dicotylédones : 1,5 L/ha (COMM13/02/2020)
130	Oxyfluorfen	240 g/L	EC	Clenofen 240	H.005-13/23	SANABEL AGRO	ZHEJIANG E-TONG CHEMICALCO LTD	Oignons : Graminées et dicotylédones : 1,5 L/ha(COMM 19 avril 2023)
131	Oxyfluorfen	240 g/L	EC	Oxistar 24%	H.087-11/21	SOCOOPEC	ZHEJIANG E-TONG CHEMICALCO LTD/shandongqiao chang modern agriculture	Oignons : Graminées et dicotylédones : 1,5 L/ha
132	Oxyfluorfen	240 g/l	EC	FENFEN EC	H.041-22	ATLAS AGRICOLE	LAINCO	Agrumes: Adventices annuelles dicotylédones et graminées:4 l/ha Volume de bouillie:400 l/ha Mode d'application: pulvérisation foliaire en pré et post émergences(stade 4 feuilles ou plus d'adventices,4 cm de hauteur) DAR:21 jours Nombre d'applications:1 application/an(com 27/12/22)
133	Oxyfluorfen	240 g/l	EC	VERIN EC	H.035-22	NEGANOR	LAINCO	Agrumes: Adventices annuelles dicotylédones et graminées:4 l/ha

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 107 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Volume de bouillie:400 l/ha Mode d'application: pulvérisation foliaire en pré et post émergences(stade 4 feuilles ou plus d'adventices,4 cm de hauteur) DAR:21 jours Nombre d'applications:1 application/an(com 27/12/22)
134	Pendimethaline	400 g/L	SC	HERBOL	H.008-17	EXCEL AGRI	SHARDA	Oignon : mauvaises herbes graminées et dicotylédones : 3 L/ha (COMM 27/12/22)
135	Pendimethaline	400 g/L	SC	Penda	16-010H.	DELTA AGRICOLE PLUS	SHARDA	Oignon : mauvaises herbes graminées et dicotylédones : 3 L/ha
136	Pendimethaline	400 g/L	EC	TERAPUR	H.002-16	Ets MEZGHANI	IndustrialQuimica Key	Pomme de terre : Adventices Dicot. ANNUELLES UNIQUEMENT) : 3 L/ha
137	Pendimethaline	455 g/L	EC	Stomp Aqua	H.048-11/21	STIMA	BASF	Tomate transplantée : Dicotylédone et graminées : 3 L/ha avant repiquage, irriguer après application et transplanter les tomates 48 heures après Ail, maïs :Dicotylédone et graminées :3 L/ha post semis, prélevée.
138	Pendimethaline	455 g/L	EC	prowl aqua EC	H.15-21	cotugrain	BASF	Tomate transplantée : Dicotylédone et graminées : 3 L/ha avant repiquage, irriguer après application et transplanter les tomates 48 heures après Ail, maïs :Dicotylédone et graminées :3 L/ha post semis, prélevée.(COMM09/02/2021)
139	Pendimethaline +Clomazon	333g/l+30 g/l	CS	STALLION	H.07-21	AGRIPROTEC	FMC	Féverole :Graminées et dicotylédones annuelles :2.5 l/ha -traitement en post semis/pré- emergence(COMM09/02/21)
140	Phenmedipham + Desmedipham +Ethofumesate	75 g/l+15 g/l+115 g/l	SC	BETASANA TRIO	H.016-20	AGRIPROTEC	UPL Limited	Betteraves à sucre : Mauvaises herbes dicotylédones :2.5 L/ha;Traitement foliaire en post émergence;nbre de trait. :1;calendrier des applications : ultime stade d'intervention : stade BBCH 18 (stade 8 feuilles étalées).(COMM13/02/2020)
141	Phenmediphame + Desmedipham + Ethofumesate	91 g/L +71 g/L + 112 g/L	EC	Betanal Expert 274EC	H.049-11/21	SEPCM	BAYER CROPS SCIENCE	Betterave : Toutes les mauvaises herbes au stade 3 feuilles et au poste levée de laculture : 4 L/ha (fractionnées en 2 applications de 2 L/ha espacées de 14 jours)
142	Pinoxaden +Florasulam +Safener (cloquintocet-mexyl)	45 g/l + 5 g/l +11.25 g/l	EC	Navigator	H.005-14/24	BIOPROTECTIO N	SYNGENTA	Blé tendre, orge : Graminées + dicotylédones : 1 l/ha (stade 2-3 feuilles jusqu'au stade dernière feuille pointante)(COMM09/02/21) (comm22mai2024)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 108 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
143	Pinoxaden +Clodinafop-propargyl+Cloquintocet-mexyl	25g/l +25g/l +6.25 g/l	EC	Traxospratic	H.014-15	BIOPROTECTIO N	Syngenta	Blé dur, Blé tendre : adventices Graminées annuelles (Ray-gras et folle avoine) au stade début tallage-fin tallage de la culture : 1 l/ha
144	Pinoxaden +Clodinafop-propargyl+Florasulam+cloquintocet-mexyl	30g/l +30g/l +7,5 g/l+7,5 g/l	EC	Swipe	H.013-15	BIOPROTECTON	Syngenta	Blé dur : Adventices graminées et dicotylédones (en post levée-tallage) :1 l/ha (COMM09/02/21) Blé tendre :Adventices graminées et dicotylédones: 1 l/ha: début –fin tallage. (COMM 08/06/22)
145	Pinoxaden +Cloquintocet-mexyl	50 g/l +12.5 g/l	EC	Axial pratic	H.015-15	BIOPROTECTIO N	Syngenta	Orge, Blé tendre : Adventices graminées au stade début tallage-fin tallage de la culture : 0.8 l/ha
146	prometryn	500 g/l	SC	gesagard 500 FW	H.06-21	bioprotection	syngentacrop protection	Féverole :Adventices dicotylédones et graminées :3 l/ha En post semis pré-levée(COMM09/02/21)
147	Propaquizafop	10%	EC	PRODIGE	H.024-22	SHARDA CROPCH EM TUNISIA	SHARDA CROPCH EM limited	COLZA : <u>Adventices graminées annuelles (post levée)(ray grass)</u> : l/ha Utiliser 1 litre d'huile adjuvante d'origine végétale systématiquement stade d'application: 1 application /an en post levée de la culture et des adventices -ne pas dépasser stade BBCH 20 des adventices(COMM 27/12/22)
148	Propaquizafop	10%	EC	KIFEN EC	H.01-23	SANABEL AGRO	SHARDA CROPCH EM limited	COLZA : <u>Adventices graminées annuelles (post levée)(ray grass)</u> : l/ha Utiliser 1 litre d'huile adjuvante d'origine végétale systématiquement stade d'application: 1 application /an en post levée de la culture et des adventices -ne pas dépasser stade BBCH 20 des adventices(COMM 27/12/22)(COMM28 dec 2023)
149	Propyzamide	400g/l	SC	PROPYZ	H.013-18	AGRIPROTEC	BARCLAY CHEMICALS Ltd	Féveroles : Mauvaises herbes dicotylédones : 2l/ha.(COMM 18/10/2018)
150	Propyzamide	400g/l	SC	PROPER FLO SC	H.005-18	AGROSYSTEME S	Globachem	Colza : Graminées : 1.875 l/ha (Post levée)(Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes graminées "Ray-grass résistant; Folle avoine".(COMM 18/10/2018)
151	Propyzamide	400g/l	SC	CADDY SC	H.016-17	RAYEN PHYTAGRI	BARCLAY CHEMICALS Ltd	Féveroles : Mauvaises herbes dicotylédones : 2l/ha. (COMM 18/10/2017) Colza : Mauvaises herbes graminées et dicotylédones:2

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 109 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								l/ha -Stade d'application :4-6 feuilles (4 feuilles vraies,5 ème et 6 ème naissantes) -Stade adventices : soit en prélevée des adventices afin d'empêcher leur levée, soit en post levée à un stade jeune afin de bloquer leur croissance. Les graminées ne doivent en aucun cas dépasser le stade fin tallage. -Conditions pédoclimatiques : la meilleure efficacité est obtenue lors d'applications avec des conditions météorologiques fraîches et des sols humides.(COMM13/02/2020)
152	Prosulfocarb	80%	EC	PROXER	H.09-21	AGRIMED DISTRIBUTION	shardacrochem	Blé dur d'hiver :Adventices monocotylédones:4 l/ha en prélevé (300l/ha) -en post levée précoce -1 application(COMM09/02/21) (COMM28 dec 2023)
153	Prosulfocarb	80%	EC	ROXANE EC	H.036-22	COTUGRAIN	shardacrochem	Blé dur d'hiver :Adventices monocotylédones:4 l/ha en prélevé (300l/ha) -en post levée précoce -1 application(COMM27/12/22)
154	Prosulfocarb	800 g/L	EC	Roxy	H.052-11/21	AGROSYSTEME S	GLOBACHEM	Blés : Graminées : 4 l/ha
155	Prosulfocarb	800 g/L	EC	Fidox 800 EC	H.024-15	AMINCO	GLOBACHEM	Blés : Graminées : 4 l/ha
156	Prosulfocarb	800 g/L	EC	Boxer	H.053-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Blés : Graminées : 4 l/ha
157	Pyroxsulam	46,6 g/L	OD	PRIORITY	H.016-18	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCES/ corteva	Blés : Brome : 0,5 L/ha + 0,1 L d'adjuvant « Liberate » (au stade 2 à 3 feuille à fin tallage). (COMM 18/10/2018)
158	Pyroxsulam	46,6 g/L	OD	Pallas 45 OD	H.054-11/21	SEPCM	DOW AGROSCIENCES	Blés : Brome : 0,5 L/ha + 0,1 L d'adjuvant « Liberate » (au stade 2 à 3 feuille à fin tallage).
159	Pyroxasulfone	85 %	WG	YAMATO 85 WG	H.027-22	AGRIMATCO	Kumaichemicalindustry	Blé tendre : Mauvaises herbes graminées sauf ray grass résistant :125 g/ha Volume de bouillie:300 l/ha Pulvérisation sur lit de semis bien préparé en post semis et prélevée de la culture et des mauvaises herbes -1 application (COMM 27/12/22)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 110 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
160	Pyroxsulam +Florasulam +Cloquintocetmexyl	70,8 g/kg +14,2g/kg + 70,8g/hg	WG	Broadway	H.014-18	agriprotec	DOW AGROSCIENCES/ CORTEVA	Blés : Dicotylédones + graminées : 320 g/ha (avec une bouillie de 200-300l/ha) en post levée.(COMM18/10/2018)(COMM09/02/21)
161	Pyraflufen-ethyl	26,5 g/l	EC	VOLCAN EC	H.014-22	ATLAS AGRICOLE	SPICAM INAGRA SA	Agrumes :Mauvaisesherbesdicotylédonesannuelles:0.3 5l/ha volume de bouillie:250- 300 l/ha Application entre les lignes sans toucher la culture Nbre d'applications:1 app/an COMM 08/06/22
162	Saflufenacil	700g/kg	WG	Heat	H.005-15	AGRIPROTEC	BASF CORPORATION	Agrumes : Mauvaises herbes annuelles (Graminées et Dicotylédones) : 70g/ha
163	Simazine	500 g/L	SC	SIMAKEY	H.091-11/21	Ets MEZGHANI	INDUSTRIAL QUIMICA KEY/ Espagne	Légumineuses : mauvaises herbes : 1,5 L/ha
164	Terbuthylazine	750g/kg	WG	TERBYNE 75 WG	H.017-20	EL KHADRA	SIPCAM INAGRA	Agrumes : Mauvaises herbes annuelles (Graminées et Dicotylédones)(prélevée ou post levée précoce : 1.3 kg /ha (COMM13/02/2020)
165	Terbuthylazine	750g/kg	WG	Terbuzine 75 WG	H.007-15	promochimie	SIPCAM INAGRA	Agrumes : Mauvaises herbes annuelles (Graminées et Dicotylédones)(prélevée ou post levée précoce : 1.3 kg /ha(COMM09/02/2021)
166	Triflusalufuronmethyl	500 g/kg	WG	SAFARI 50 WG	H.002-22	SEPCM	FMC	Betterave à sucre :Adventices dicotylédones annuels:30 g/ha -post levée(70 à 90% de plantes levées) -volume de bouillie:100-300 l/ha -02 applications espacées de 7à15 jours -stade de la culture: après la levée (70à90% de plantes levées à la fermeture des rangs) -SAFARI est peu sélectif de la betterave à sucre en prélevée. -Stade des adventices: traiter sur des adventices jeunes de la levée à 3 feuilles) -DAR:90 jours (COMM 08/06/22)
167	Thifensulfuron-methyl +Tribuneron-methyl	40 % + 15 %	WG	Gipsy	H. 003-14/24	EL MOUSSEM	ROTAM AGROCHEMICA L	Blés : Dicotylédones : 60 g/ha (COMM 28/12/2023)
168	Triallate	450 g/l	CS	AVADDEX FACTOR CS	H.025-22	ATLAS AGRICOLE	GOWAN CROP PROTECTION LIMITED	Blé dur : Mauvaises herbes graminées en post semis prélevée : ray grass résistant :3.6 l/ha -Appliquer sur sol humide en prélevée des céréales et

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 111 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								avant émergence des mauvaises herbes -semences du blé doivent être à 4 cm de profondeur -éviter l'application en conditions de sécheresse -1 application/an(com 27/12/22)
169	Tribenuronmethyl + Florasulam	56.3 %+ 18.7 %	WG	BOMBA WG	H.011-18	EL KHADRA	JSC(AVGUST)	Blé dur : Dicotylédones : 20 g/ha (300 à 400 l de bouillie/ha);(COMM 18/10/2018)
170	Tribenuron-Methyl	75%	WG	TOSCANA	H.010-18	AGRIPROTEC	PROPLAN/QUMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Blé dur : Dicotylédones : 30 g/ha (200 L/ha) en Post levée; Traitement foliaire; nbre de trait. :1). Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes "Liseron";(COMM 18/10/2018)
171	Tribenuron-Methyl	75%	WG	SKYLLA WDG	H.012-18	AGRONOMIC LAND	ROTAM AGROCHEMICAL CO.LTD	Blé dur : Dicotylédones : 12.5 g/ha en Post levée; Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes "Liseron";(COMM 18/10/2018)
172	Tribenuron-Methyl	75%	WG	Volteo 75 WG	16-008H.	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Blé dur : Dicotylédones : 20 g/ha en post levée (NB/Indiquer sur l'étiquette : Faible action surmoutarde et ravenelle)
174	Tribenuron-Methyl	75%	WG	TRISTAR WG	H.020-18	SANABEL AGRO	Sharda Cropchem	Blé dur : Dicotylédones : 25 g/ha (300 L de bouillie/ha). En Post levée;Traitement foliaire).Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes"Liseron". (COMM 18/10/2018)
175	Tribenuron-Methyl	75%	WG	TRYBERON 75 WG	H.02-24	AGRIMED DISTRIBUTION	Sharda Cropchem	Blé dur : Dicotylédones : 25 g/ha (300 L de bouillie/ha). En Post levée;Traitement foliaire).Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes"Liseron". (COMM 22/05/2024)
176	Tribenuron-Methyl	75%	WG	Granstar	H.057-11/21	SEPCM	DU PONT	Céréales : Dicotylédones : 25 g/ha
177	Tribenuron-Methyl	75%	WG	Corida 75 WG	H.088-11/21	SOCOOPEC	AGRIA	Céréales : Dicotylédones : 25 g/ha
178	Tribenuron-Methyl	75%	WG	TRIBUNEO 75 G	H.015-20	SSCC	AGRIA	Céréales : Dicotylédones : 25 g/ha;(COMM13/02/2020)
179	Trebuniron-methyl + Florasulame	250g/l+104g/kg	SG	FLAME DUO SG	H.006-22	SOLAGRI	ALBAUGH	Blé :Mauvaises herbes dicotylédones :60 g/ha volume de bouillie: 300-400 l/ha -application foliaire après apparition des mauvaises herbes -nbre d'application:1 -appliquer les stades BBCH 23-39, stade jeunes des mauvaises herbes. (COMM 08/06/22)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 112 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
180	Trifluraline	480 g/L	EC	Herboline	H.058-11/21	SEPCM	AAKO	Tournesol, Légumineuses : M.Herbes : 2 L/ha
181	Trifluraline	480 g/L	EC	RALINE 480 EC	H.021-22	EL KHADRA	JIANGSU FENGSHAN GROUP CO,LTD (FAB)/NANJING FENGSHAN CHEMICAL(FOU RNISSEUR)	Petit pois : Graminées:2 l/ha ;Appliqué 1 à 4 semaines avant le semis (COMM13/02/2020) ; COMM08/06/22)
182	Trifluraline	480 g/L	EC	HERBASTAR EC	H.011-20	AGRIPLUS	JIANGSU FENGSHAN GROUP CO,LTD (FAB)/NANJING FENGSHAN CHEMICAL(FOU RNISSEUR)	Petit pois : Graminées:2 l/ha ;Appliqué 1 à 4 semaines avant le semis (COMM13/02/2020)
183	Trifluraline	480 g/L	EC	Flural	H.092-11/21	Ets MEZGHANI	INDUSTRIAL Q. KEY	Tournesol, Légumineuses : M.Herbes : 2 L/ha
184	Trifluraline	480 g/L	EC	Ridaline	H.082-11/21	SEPCM	DOW AGROSCIENCES	Tournesol, Légumineuses : M.Herbes : 2 L/ha
185	Trifluraline	480 g/L	EC	Triflex	H.006-17	STEC	AAKO	Tournesol, Légumineuses : M.Herbes : 2 L/ha; COMM 20/06/2017
186	2,4- D + MCPA	345 g/l +345 g/l	SL	Weedone Plus	H.001-13/23	BIOPROTECTIO N	NUFARM	Blés : Dicotylédones : 1,5 L/ha(COMM 19 avril 2023)
187	2,4- D + MCPA	345 g/l +345 g/l	SL	DAMEX FORTE SUPER	H.21-21	SOCOOPEC	NUFARM	Blés : Dicotylédones : 1,5 L/ha(COMM09/02/21)
188	2,4 –D EHE	904,5 g/L	EC	certrol DS EC	H.18-21	agriprotec	A H MARKS / NUFARM	Blé, orge, avoine : Dicotylédones : 0,8 L/ha(COMM09/02/21)
189	2,4 D –Ester butylglycol	600 g/L	EC	Weedone	H.060-11/21	BIOPROTECTIO N	NUFARM	Céréales : Dicotylédones: 1 L/ha
190	2,4 D –Ester butylglycol	600 g/L	EC	Desormone lourd	H.078-11/21	SEPCM	NUFARM	Céréales : Dicotylédones: 1 L/ha
191	2,4-D Acide +Florasulam	300 g/L +6,25 g/L	SE	Nikos 306 SE	H.011-13/23	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCES/ corteva	Blés : Dicotylédones : 0,6 L/ha(COMM 19 avril 2023)
192	2,4-D Sel d'amine	720 g/L	SL	Dicopur 720 SL	H.008-13/23	AGRIPROTEC	NUFARM	Céréales : Dicotylédones : 0,6 L/ha(COMM 19 avril 2023)
193	2,4-D Sel d'amine	720 g/L	SL	Sanaphen D 720 SL	H.013-13/23	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCES	Céréales : Dicotylédones : 0,6 L/ha(COMM 19 avril 2023)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 113 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
194	2,4-D Sel d'amine	720g/l	SL	Topol	H.009-15	EL KHADRA	SHARDA	Blé dur :Mauvaises herbes dicotylédones annuelles : 0.8 l /ha
195	2,4-D Sel d'amine	720g/l	SL	SHARMINA 720 SL	H.005-17	AGRINOVA	SHARDA	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles : 0.8 l /ha;(COMM 20/06/2017) (COMM 08/06/22)
196	2,4-D Sel d'amine	720g/l	SL	Stopweeds	H.011-15	SANABEL AGRO	SHARDA	Blé dur :Mauvaises herbes dicotylédones annuelles(en post levée) : 0.8 l /ha
197	2,4-D Sel de Dimethylamine	860g/l	SL	Amanora	H.014-17	AGRIMATCO	UPL	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles (en post levée) : 0.8 l /ha;(COMM 20/06/2017)
198	2,4-D Sel de Dimethylamine	860g/l	SL	DIAMEX SL	H.037-22	COTUGRAIN	UPL	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles (en post levée) : 0.8 l /ha;(COMM 27/12/22)
199	2,4-D Sel de Dimethylamine	720g/l	SL	BLITZ 720 SL	H.022-22	EL KHADRA	JIANGSU FENGSHAN GROUP CO,LTD (FAB)/NANJING FENGSHAN CHEMICAL(FR)	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles (en post levée) : 0.8 l /ha (COMM 20/06/2017) (COMM08/06/22)
200	2,4-D Sel de Dimethylamine	720g/l	SL	BOZAR	H.012-17	AGRIPLUS	JIANGSU FENGSHAN GROUP CO,LTD (FAB)/NANJING FENGSHAN CHEMICAL(F)	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles (en post levée) : 0.8 l /ha (COMM 20/06/2017)
201	Dicamba +2,4 – D	120 g/L +344 g/L	SL	Dialen Super	H.011-11/21	BIOPROTECTIO N	SYNGENTA	Blé dur : Dicotylédones : 0,8 L/ha stade fin tallage début montaison; Orge : Dicotylédone : 0,8 L/ha ; Avoine : Dicotylédones: 0.8 L/ha
202	2,4-D +Glyphosate	160 g/l+240 g/l	SL	KYLEO	H.011-22	EL MOUSSEM AGRICOLE	NUFARM	Agrumes :Mauvaises herbes annuelles:3 l/ha (COMM 08/06/22)
203	2,4-D +Glyphosate	160 g/l+240 g/l	SL	NUFOSATESL	H.040-22	SANABEL AGRO	NUFARM	Agrumes :Mauvaises herbes annuelles:3 l/ha (com 27/12/22)(COMM28 dec 2023)
204	2,4-D-ethylhexyl + Florasulam	453g/l+6g/l	SE	BOOSTER SE	H.028-22	FERTITECH	TOPAGRO BIOSCIENCE	Blé tendre :Dicotylédones annuelles:0.6L/ha -Application en post levée des adventices -Bouillie: 300L/ha(com 27/12/22)

IV. DIVERS

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 114 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	(E,Z,Z)-3,8,11Tetradecatrien 1-y acetate (E,Z)-3,8Tetradecatrien1- y acetate	0.5 mg /unité		PHERODIS Tutaabsoluta	D.007-16	NUTRIPLANT	KOPPERT	Tomate : Tutaabsoluta : 30 pièges/ha
02	4-methyl-5-nonanol et 4-methyl-5-nonanone			Ferrolure +(pheromone)	D.002-22	BIOPROTECTION	Chemitica international	Palmier ornemental(Phoenix canariensis) : Charançon rouge des palmiers rhynchophorusferrugineus: 700 mg par sachet et par piège (10 piège/ha)(30-50 mètre) -stade d'application:adulte -type attractif -nbre max d'application:3-6/an selon l'infestation -accrocher sous le couvercle du piège en association avec le kairomone"WEEVIL MAGNET" lespieges sont placés à l'ombre, distants de 2m du tronc de palmiers et éloignés les uns des autres de 30 à 50 metres. -le piège doit être contenir de l'eau+pate de date DAR:0 jours(COMM 08/06/22)
03	Acétate d'ammonium min 8.75 g/sachet +Trimethylaminehydrochloride 1.25 g/sachet + diaminobutane 0.04 g/sachet +KILLDISC insecticide à base d'Esfenvalerate 0.04 g/piège			PherosanCeratitis	D.004-17	NUTRIPLANT	SANSAN PRODESING/	Agrumes : Cératite: 40 pièges/ha Installation des pièges bien avant le début de la véraison des fruits au coté Sud-Est de l'arbre à une hauteur de 1.5 -2m. Durée de l'action : 120j;(COMM22mai2024).
04	Acetate d'ammonium + TrimethylamineHCl +1,4-diaminobutane (Putrescine) +DDVP	75%+8.2%+0.29%+20%(w/w)	-	MERCERATITE KEY	D.006-16	Ets MEZGHANI	Key	Agrumes :Cératites:40 pièges/ha
05	Acide Beta indolbutirique	4 g/l	SL	Exuberone	D.005-11/21	SEPCM		Pépinières fruitières, forestières et ornementales : Substance phytosanitaire : 2,5 à 100 cc/L; Bouturage de la vigne : Traitement. Phytosanitaires contre la transmission des maladies du sol : Trempage prolongé 24 H dans la bouillie: 1 l/25 l
06	Acide chloro 4 phénoxyacétique +Naphoxy 2acétamide	0,75g/L+2,5 g/L	SL	Procarpil	D.013-11/21	SEPCM	CMPA	Tomate s/serres et la 1 ère grappe florale en culture en plein air :Trait. Phytohormoné : 5 cc/L -Tomate plein champs sauf

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 115 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								traitement de la 1 ère grappe florale : 10 cc/L
07	Acide gibberellique	10%	TB	Gibb 3	D.001-11/21	AGROSYSTEMES	LOBACHEM	Pêcher : Modification de niveau de nouaison P. de terre : Processus de tubérisation Vigne : Croissance des organes aériens Artichaut : Processus de floraison Clémentine, poirier ,pois : Processus de floraison et régulation de la maturation :1g/hl de Gibbérelline
08	Acide gibberellique	10%	TB	Aminogibb	D.008-15	AMINCO	LOBACHEM	Pêcher : Modification de niveau de nouaison P. de terre : Processus de tubérisation Vigne : Croissance des organes aériens Artichaut : Processus de floraison Clémentine, poirier ,pois : Processus de floraison et régulation de la maturation :1g/hl de Gibbérelline
09	Acide gibberellique	40%	SG	progibb 40 SG	D.004-13/23	BIOPROTECTION	VALENTBioscience / SUMITOMO	Vigne : Amélioration du taux de nouaison et de la qualité des fruits : 1 sachet de 1g de SA/hl (COMM 19 avril 2023)
10	Acide gibberellique	20%	ST	Fitogib	D.03-21	BIOPROTECTION	NUFARM	Agrumes : Activation du processus et amélioration de la nouaison : 01comprimé/hl (COMM09/02/21) (COMM 08/06/22)
11	Acide gibberellique	20%	ST	GIB GRO	D.005-16	BIOPROTECTION	NUFARM	Agrumes : Activation du processus et amélioration de la nouaison : 1comprimé/hl
12	Acide gibberellique	9%	ST	Giberkey	D.001-15	ETS MEZGHANNI	IndustrialQuimica Key	Agrumes : Processus de floraison et régulation de la maturation : 1 TS/120 L d'eau
13	Acide gibberellique	10%	TB	Protagibb	D.029-11/21	PROTAGRI	United Phosphorus	Pêcher : Modification de niveau de nouaison P. de terre : Processus de tubérisation Vigne : Croissance des organes aériens Artichaut : Processus de floraison Clémentine, poirier ,pois : Processus de floraison et régulation de la maturation :1g/hl de Gibbérelline

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 116 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
14	Acide gibberellique	40%	SG	Berelex 40 SG	D.003-15	SEPCM	CHEMICAL Agro Europe	Vigne : Amélioration du taux de nouaison et de la qualité des fruits : 1 sachet de 1g de SA/hl
15	Acide gibbérellique +phenothiol	0.5%+1%	EC	FENGIB MAX EC	D.002-20	promochimie	SIPCAM INAGRA S.A	Agrumes : Régulateur de croissance :100 cc/hl ;-Répéter le traitement 10j après le premier (COMM13/02/2020)(COMM09/02/2021)
16	Acide gibbérellique +phenothiol	0.5%+1%	EC	FENGIB EC	D.001-19	INNOVA	SIPCAM INAGRA S.A	Agrumes : Régulateur de croissance :100 cc/hl ;-Répéter le traitement 10j après le premier(COMM23/04/2019)
17	Alkylphenolxy-Ethylène	200 g/L	SC	Etaldyne 95	D.014-11/21	SEPCM	CMPA/Espagne	Mouillant parafinique adhesif : 50 cc/hl
18	Aurebasidiumpillulan(2 souches) :DSM 14940 +DSM 14941	250g/kg +250g/kg		Blossom protect	D.006-15	STIMA	BIO FERM	Poirier : Feu bactérien : 1.5 kg/ha (appliquer à partir de+/- 10% de la floraison en 4 passages en fonction du % d'avancement de la floraison).
19	Capsaicine +Ally Isothiocyanate	0.42 % +3.7 %	SI	Dazitol	D.004-15	EL KHADRA	CHAMPION MILLENIUM CHEMICALS	Tomate : Fusarium (Fusarium oxysporumf.spradicislycopersici FORL) :10 l/ha(en irrigation par système goutte à goutte ou par pulvérisation au niveau du collet après plantation à 100 ml/hl); Tomate :Nématodes: 10 l/ha (Injection par irrigation goutte à goutte);(comm 20/06/2017)
20	Chlormequat-chlorure	750 g/l	SL	Stabilan750	D.034-11/21	AGRIPROTEC	NUFARM	Céréales (variétés de longue paille, ex Nacer) :Raccourcisseur de la paille (limitation de la croissance de la tige) à la dose de 1,2 L/ha
21	Chlormequat-chlorure	750 g/l	SL	Cekwat 750	D.001-13/23	BIOPROTECTION	NUFARM	Céréales (variétés de longue paille, ex Nacer) :Raccourcisseur de la paille (limitation de la croissance de la tige) à la dose de 1,2 L/ha (COMM 19 avril 2023)
22	Chlorprophame	1%	PP	NEO STOP	D.028-11/21	PROTAGRI	AGRIPHAR	P. de terre : Antigerme : 1Kg/Tonne
23	Chlorprophame	500 g/L	HN	Neostop 500 HN	D.016-11/21	PROTAGRI	AGRIPHAR	P. de terre de consevation : Inhibiteur de germination :36 ml/T 2 à 3 fois
24	Cyanamide d'hydrogène	520 g/L	SL	Dormex	D.018-11/21	BIOPROTECTION	DEGUSSA AG/ ARYSTA LifeScience/ALZ-	Vigne : Régulateur de débourrement : 4 L/hl (400 à 500 L de bouillie/ha)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 117 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
							CHEM	Pêcher : Régulateur de débourrement : 2,5 L/hl 35 à 40 jours avant le débourrement naturel (700 à 1000 L de bouillie/ha) Pommier : Régulateur de débourrement : 2,5 L/hl 40 à 60 jours avant le débourrement naturel (700 à 1000 L de bouillie/ha)
25	Deltametrine+Acetate d'ammonium+Trimethylamine HCl+1,4diaminobutane (=Putrescine)	10 mg/ unité+(29.8 %) 6.45 g +(12.4 %)2.75 g +(0.2%)	-	Magnet Med	D.004-16	NUTRIPLANT	KOPPERT	Agrumes :Cératites: 50 pièges/ha. Pêcher de saison :Ceratite : Piégeage de masse en lutte intégrée : 70 pièges/ha
26	Dérivés d'acides gras végétaux +Huile de pin	286 g/l+430 g/l	EC	ACTILANDE TM EC	D.02-21	SEPCM	Action PIN	Blé dur : Adjuvant pour céréales:1l/ha -pulvérisation foliaire (COMM09/02/21)
27	Dichloroprop-p	25 g/L	EC	clementgros	D.04-21	SANABEL AGRO	NUFARM	Agrumes : amélioration de la récolte et du calibre : 100 cc/hl(COMM09/02/21)
28	Huile de colza	95%	EO	codacide EO	D.01-21	AGRIMATCO	Mirocide Ltd	Courgette :Adjuvant : 1 l/ha Par pulvérisation(COMM09/02/21)
29	Huile non ionique	92%	EC	GARAL EC	D.005-20	SOLAGRI	Syngenta	Mouillant : 50cc/hl(COMM13/02/2020)
30	Hydrolysats de Protéines	550 g/L	SL	CeraBait	D.035-11/21	EL MOUSSEM	EVIE MICHAAILIDES	Agrumes : Cératites à la dose de - 300 cc/hl du produit seul /ha - 200 cc/hl du produit + insecticide anti-cératites/ha Olivier :Dacus à la dose de - 300 cc/hl du produit seul /ha - 200 cc/hl du produit + insecticide homologué/ha Agrume : Cératite (Ceratitis capitata) : 0,67 L/Ha par voie aérienne (ULV,ultra bas volume) DAR:0 jours (comm22 mai2024)
31	Hydrolysats de Protéines+Borax	59 g/L+13/0 g/L	SC	Ceratrapp (en bouteilles ou/et en	D.033-11/21	BIOPROTECTION	BIOEBERICA S.A	Agrumes : Cératites à la dose de 100 pièges ou bouteilles (0,6 L de

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 118 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
				pièges jaunes)				produit /piège) à l'ha Pêcher : Cératites : 120 pièges ou bouteilles (0.6 L)/ha (comm23-10-2014)
32	Keromone 42.5 ml acetate d'ethyle			Weevil magnet(keromone)	D.003-22	BIOPROTECTION	Chemtica international	Palmier ornemental(Phoenix canariensis) : Charançon rouge des palmiers) (rhynchophorus ferrugineus:42.5 ml par sachet et par piège (10 piège/ha)(30-50 mètre) -stade d'application:adulte -type attractif -nbre max d'application:3-6/an selon l(infestation -accrocher sous le couvercle du piège en association avec le phéromoneomone"FERROLURE" lespieges sont placés à l'ombre, distants de 2m du tronc de palmiers et éloignés les uns des autres de 30 à 50 metres. -le piège doit être contenir de l'eau+pate de date DAR:0 jours(COMM 08/06/22)
33	Metaldehyde	3%	GR	ALDEM 3% GR	D.002-17	EXCEL AGRI	SHARDA	Agrumes :Limace :7Kg/ha(COMM27/12/22)
34	Metaldehyde	3%	GR	METAX	D.003-16	DELTA AGRICOLE PLUS	SHARDA	Agrumes :Limace : 7Kg/ha
35	Metaldehyde	5%	GB	LIMAGRAM	D.001-20	EL KHADRA	SIPCAM INAGRA	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha (COMM13/02/2020)
36	Metaldehyde	5%	GB	Metakey	D.006-11/21	ETS.MEZGHANI	INDUS QUIMICAKEY	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha
37	Metaldehyde	5%	GB	Metapro	D.030-11/21	PROTAGRI	United Phosphorus	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha
38	Metaldehyde	5%	GB	GHLALA	D.003-19	SANABEL AGRO	UPL	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha; COMM 23/04/2019
39	Metaldehyde	5%	GB	Antilimace granule	D.025-11/21	SEPCM	CEQUISA S.A/UPL	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha
40	Metaldehyde	5%	GB	Super meta	D.007-11/21	STEC	CEQUISA/PHOSPHONIA, SL)/UPL	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 119 sur 122

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Et DE LA PECHE

11

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
41	Methaldehyde	5%	GR	LIMASTOP	D.002-19	COTUGRAIN	SHARDA	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha; Artichaut : Escargots et Limaces : 5 kg/ha; Agrumes : Escargots et Limaces : 5 kg/ha (COMM23/04/2019)
42	Methaldehyde	5%	GR	ESCARGOCHE	D.001-16	SOCOOPEC	SHARDA	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha; Artichaut : Escargots et Limaces : 5 kg/ha; Agrumes : Escargots et Limaces : 5 kg/ha
43	<u>Phéromones appliquée pour la confision sexuelle de la pyrale des dattes(EctomyeloisCeratoniae):(Z,E)-7,9,11-Dodecatrienyl formate(90.80% pure) :2%(22.026 g/kg</u>			SPLAT-EC-O;sous réserve de bien préciser la dose par pied (arbre)	D.004-20	NUTRIPLANT	ISCA TECHNOLOGIES	Palmier dattier :Pyrale des dattes(EctomyeloisCeratoniae): 500 g/ha-A répéter toutes les 8 semaines (soit 3 fois/saison);- A appliquer manuellement ou via le pistolet calfeutreur;- Déposer le produit sur le tronc à une hauteur de 2 m du sol. (COMM13/02/2020)
44	<u>Phéromones de la pyrale des dattes(EctomyeloisCeratoniae):(Z,E)-7,9,11-Dodecatrienyl formate(90.80% pure) :1.594 g/kg</u>			ISCA LURE CAROB MOTH	D.003-20	NUTRIPLANT	ISCA TECHNOLOGIES	Palmier dattier :Pyrale des dattes(EctomyeloisCeratoniae):-2 à 4 pièges/ha pour le monitoring;-12 à 15 piège/ha pour le piégeage de masse;A utiliser dans les pièges type delta;- Renouveler les pièges toutes les 4 semaines(COMM13/02/2020)
45	Polyethermodifiedtrisiloxane + polyether	75%+25%	SL	BREAK THRU SL	D.001-22	ATLAS AGRICOLE	EVONIC	Adjuvant pour bouillies fongicides Cultures maraichères :200 ml/ha (COMM 08/06/22)
46	Polyoxyethylene amine	270 g/l	SL	PHYDEAL SL	D.003-17	FERTIPLANT	SDP/France	Céréales (Blés) : Adjuvant Mouillant : à ajouter à la bouillie des herbicides : 0.25 l/hl ou (0.75 l à 1l/ha pour une bouillie de 300-400 l/ha)(COMM 18/10/2017).
47	Proteines hydrolysées	360 g/L	SL	BIOBAIT	D.002-16	BIOPROTECTION	BIOIBIRICA	Agrumes :Mouche méditerranéenne des fruits (ceratitiscapitata) :1.25 L/hl (Voie terrestre) Olivier : Mouche de l'olivier:1.25 l/hl Voie terrestre : 1/2 litre de bouillie par arbre(com 27/12/22)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 120 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
48	Sodium lauryl ether sulfate (SLES)	276.5 g/l	SL	Biopower SL	D.005-17	ATLAS AGRICOLE	BAYER AG	Céréales (Blés) : Adjuvant mouillant : à ajouter à la bouillie des herbicides : l/ha; (COMM 18/10/2018).
49	Trichodermaharzianum T-22	1.0 x 10 ⁹ CFU/g	WG	Triatum –P	D.F.005-15	NUTRIPLANT	KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS	Tomate : Fusarium (fusarium oxysporumf.spradicislycopersici):30 g/1000 plants en premiere application par pulvérisation du sol au niveau du collet. Semences de blé (enrobage): Fusarium :10 g/kg;(COMM23/04/2019)

V. NEMATICIDES

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	Abamectine	20g/l	SC	TERVIGO 020 SC	IN.001-19	BIOPROTECTION	Syngenta Crop Protection AG	Tomate : Nématode "Meloidogynespp": 2 App au sol par saison (2*4 l/ha); Melon :Nématode "Meloidogynespp": 2 App au sol par saison (2*3 l/ha)Inervalle ;(COMM 23/04/2019)
02	Capsaicine +Ally Isothiocyanate	0.42 % +3.7 %	SI	Dazitol	D.004-15	EL KHADRA	CHAMPION MILLENIUM CHEMICALS	Tomate : Fusarium (Fusarium oxysporumf.spradicislycopersici FORL) :10 l/ha(en irrigation par système goutte à goutte ou par pulvérisation au niveau du collet après plantation à 100 ml/hl); Tomate :Nématodes: 10 l/ha (Injection par irrigation goutte à goutte);(comm20/06/2017)
03	Fluopyram	400 g/l	SC	VELUM PRIME 400 SC	IN.002-19	ATLAS AGRICOLE	BAYER AG	Pomme de terre,Tomate S/S: Nématodes "Meloidogynespp": 1.25 l/ha;-Fractionné en 02 app;-1ére app : 1 à 3 jours après tranplantation;-2éme app : après 14 jours;-Application goutte à goutte (COMM23/04/2019)(comm22/05/2024)
04	Garlicextract	1000 g/l		NEM guard SC	N.001-22	STIMA	Ecospraylimited	Tomate :Nematodes:4 l/ha -06 applications au max par cycle(24 l/ha) -intervalle min d'applicaton:10 jours -application en goutte à goutte ou autre système d'irrigation

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 121 sur 122

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								-Application avant repiquage / semis et après la plantation (COMM 08/06/22)
05	Oxamyl	10%	GR	Vydate GR	N.001-16	AGRIMATCO	DUPONT	Pomme de terre : Nématodes : 25 kg/ha
06	Oxamyl	10%	SL	OXYTANE	N.01-24	Sharda CropchemTunisia	SHARDA CROPCHAM INDE	Tomate sous serre :Nématode :20 l/ha En ferti-irrigation avant la plantation (comm22/05/2024)
07	Oxamyl	240 g/l	SL	RETURN 24 SL	N.02-24	Sanabel Agro	ROTAM AGROCHEMICAL(rivale)	Tomate sous serre :Nématodes :6 l/ha Traitement du sol Application par goutte à goutte 01 application/cycle(comm22/05/2024)
08	Fluazaindoline	500 g/l	SC	SALIBRO 500 SC	N.03-24	BARAKA Agricole	CORTEVA	Tomate sous serre :Nématode :2l/ha Mode d'application:goutte à goutte Volume de bouillie:3900 l Nbre d'app:1/cycle Application:1à 7 jour avant la transplantation(comm22/05/2024)

VI. RATICIDES

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	Brodifacoum	0,005%	RB	Broditop	R.002-11/21	ETS MEZGHANI	ZAPI SPA	Rat, mulot et souris domestiques : selon infestation
02	Brodifacoum	0,005%	RB	Broditop wax block	R.006-11/21	ETS MEZGHANI	ZAPI SPA	Rat, mulot et souris domestiques : selon infestation
03	Brodifacoum	0,005%	RB	Klerat	R.001-11/21	AGRIPROTEC	SYNGENTA	Rat, mulot et souris domestiques : selon infestation
04	Brodifacoum	0,005%	RB	Raticide detia	R.005-11/21	STIMA	DETIA	Rat, mulot et souris domestiques : selon infestation
05	Difenacoum	0.005 %	RB	SOREXA PELLETS	D.001-17	AGRIPROTEC	BASF	Toutes cultures : Rongeurs: Selon infestation (COMM20/06/2017)

L'usage des produits retirés en dates du 13 juillet 2023 et 22 décembre 2023 est autorisé dans la limite des stocks disponibles et de la date de validité.

Liste des produits pesticides homologués en date du 22 mai 2024 122 sur 122