

## Kirill Beskorovainyi. Hausaufgabe 2:

### Aufgabe 1:

a)

Induktionsanfang: Für  $n = 1$

$$\sum_{k=1}^1 (2k - 1) = 2 \times 1 - 1 = 1$$

$$1^2 = 1$$

$$1 = 1$$

Induktionsvoraussetzung:

Für ein beliebiges, aber festes  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 1$  gelte:

$$\sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2$$

Induktionsbehauptung:

Dann gilt auch:

$$\sum_{k=1}^{n+1} (2k - 1) = (n + 1)^2$$

Induktionsschluss:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} (2k - 1) &= \sum_{k=1}^n (2k - 1) + 2(n + 1) - 1 = \\ &= (n^2) + 2n + 1 = (n + 1)^2 \end{aligned}$$

b)

Induktionsanfang: Für  $n = 2$

$$\prod_{k=2}^2 \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) = \frac{3}{4}$$

$$\frac{2 + 1}{2 \times 2} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

Induktionsvoraussetzung:

Für ein beliebiges, aber festes  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$  gelte:

$$\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{n+1}{2n}$$

Induktionsbehauptung:

Dann gilt auch:

$$\prod_{k=2}^{n+1} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{n+2}{2(n+1)}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{aligned} \prod_{k=2}^{n+1} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) &= \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right) = \left(\frac{n+1}{2n}\right) \times \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right) = \\ &= \frac{n+1}{2n} - \frac{n+1}{2n(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2 - 1}{2n(n+1)} = \\ &= \frac{n^2 + 2n}{2n(n+1)} = \frac{n+2}{2(n+1)} = \frac{(n+1)+1}{2(n+1)} \end{aligned}$$

c)

Induktionsanfang: Für  $n = 4$

$$2^4 = 16$$

$$4^2 = 16$$

Induktionsvoraussetzung:

Für ein beliebiges, aber festes  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 4$  gelte:

$$2^n \geq n^2$$

Induktionsbehauptung:

Dann gilt auch:

$$2^{n+1} \geq (n+1)^2$$


Induktionsschluss:

$$\begin{aligned} 2^{n+1} &= 2^n = 2^n + 2^n \\ 2^n + 2^n &\geq n^2 + n^2 \geq n^2 + n \times n \\ n \geq 4 &\Rightarrow 2^{n+1} \geq n^2 + 4n \\ &\geq n^2 + 2n + 2n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\geq n^2 + 2n + 2(4) \\ &\geq n^2 + 2n + 1 \geq (n+1)^2 \end{aligned}$$

Teil 2:

Für  $n = 0, 1, 2, 3$




Für  $[0, 2]$  ist  $n^2 \geq 2^n$ , aber für  $[2, 4]$  ist  $n^2 \leq 2^n$

Also die Aussage gilt für  $n = 0, 1, 2$ , aber nicht für  $n = 3$

Aufgabe 2:

a)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 2e^x$



Seien  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  mit:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$2e^{x_1} = 2e^{x_2}$$

$$e^{x_1} = e^{x_2}$$


$$x_1 = x_2$$

Damit  $f$  ist injektiv.

Angenommen, es existiert ein  $x \in D_f$ , sodass  $f(x) = -1$ . Dann wäre aber  $-1 = f(x) = 2e^x > 0$ , was einen Widerspruch darstellt. Daher ist  $-1$  nicht im Bild von  $f$  und  $f$  ist nicht surjektiv.

Da  $f$  injektiv, aber nicht surjektiv ist, kann sie nicht bijektiv sein.

b)  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|^3$



Die Funktion ist nicht injektiv, da  $g(-1) = 1 = g(1)$ , aber  $1 \neq -1$ .

Angenommen, es existiert ein  $x \in D_g$ , sodass  $f(x) = -2$ . Dann wäre aber  $-2 = f(x) = |x|^3 \geq 0$ , was einen Widerspruch darstellt. Daher ist  $-2$  nicht im Bild von  $g$  und  $g$  ist nicht surjektiv.

Da  $g$  weder injektiv noch surjektiv ist, ist sie nicht bijektiv.

**Aufgabe 3:**

a)  $f_1(x) = x^2 - 4$  ist ein Polynom 2. Grades und im ganzen  $\mathbb{R}$  definiert.

Also:

$$D_{f_1} = \mathbb{R}$$

$f_2(x) = \frac{1}{x^3}$  ist nur dann definiert, wenn  $x^3 \neq 0$ , also  $x \neq 0$ :


Daher ist:

$$D_{f_2} = \mathbb{R}^{\neq 0}$$

$f_3(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \tan(x)$  ist  $\pi$ -periodisch, d.h.  $\tan(\phi + k\pi) = \tan(\phi)$  für alle  $\phi \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Somit ist:

$$D_{f_3} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$



b)  $f_1 \circ f_2 : D_{f_1 \circ f_2} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f_1(f_2(x))$

Sei  $x \in D_{f_1 \circ f_2} \subseteq D_{f_2}$ . Dann gilt:

$$f_1 \circ f_2(x) = f_1(f_2(x)) = \left(\frac{1}{x^3}\right)^2 - 4 = \frac{1}{x^6} - 4$$

Also:

$$D_{f_1 \circ f_2} = \mathbb{R}^{\neq 0}$$

$f_2 \circ f_1 : D_{f_2 \circ f_1} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f_2(f_1(x))$

Sei  $x \in D_{f_2 \circ f_1} \subseteq D_{f_1}$ , dann gilt:

$$f_2 \circ f_1(x) = f_2(f_1(x)) = \frac{1}{(x^2 - 4)^3}$$

$$\Rightarrow (x^2 - 4)^3 \neq 0$$

$$x \neq \pm 2$$

Also:

$$D_{f_2 \circ f_1} = \mathbb{R} \setminus \{2, -2\}$$

c)

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x+4}$$

$$f^{-1}(x) = 0 = \sqrt{x+4} \Rightarrow x = -4$$

$$f^{-1}(x) = 12 = \sqrt{x+4} \Rightarrow x = 140$$

Also das Urbild von  $f^{-1}(x)$  ist:

$$[-4, 140]$$

d)

$$f_1'(x) = 2x$$

$$f_1''(x) = 2$$

$f_1''(x)$  ist für alle  $x \in \mathbb{R}$  positiv. Das heißt das die Funktion einen Minimumpunkt hat, also es ist nur nach unten beschränkt.

e)

$f_1(x) = f_1(-x)$  für alle  $x \in \mathbb{R}$ , also es ist eine gerade Funktion.

$f_2(x) \neq f_2(-x)$  für alle  $x \in \mathbb{R}$ , also es ist eine ungerade Funktion.

Aufgabe 4:

a)

$$y = \frac{2x+3}{x+1} \Rightarrow y(x+1) = 2x+3 \Rightarrow$$

$$yx - 2x = 3 - y \Rightarrow x(y-2) = 3y \Rightarrow$$

$$x = \frac{3y}{y-2} \Rightarrow$$

$$f^{-1}(x) = \frac{3x}{x-2}$$

$$D_{f^{-1}} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

b)

$$\begin{aligned} \frac{2\left(\frac{3x}{x-2}\right) + 3}{\left(\frac{3x}{x-2}\right) + 1} &= \frac{\left(\frac{6x}{x-2}\right) + \left(\frac{3(x-2)}{x-2}\right)}{\left(\frac{3x}{x-2}\right) + \left(\frac{x-2}{x-2}\right)} = \\ &= \frac{9x-6}{4x-2} = \frac{3(3x-2)}{2(2x-1)} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[ \frac{2x+3}{x+1} \right] &= \frac{(x+1)(2) - (2x+3)(1)}{(x+1)^2} = \\ &= -\frac{1}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f'(x) < 0 \text{ für alle } \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -1\}$$

$$\Rightarrow f_1(x) \text{ ist monoton fallend für } [-1, \infty]$$

### Aufgabe 5:

a)

$$\begin{aligned}e^{x^2-9} - 1 &= 0 \\ \Rightarrow e^{x^2-9} &= 1 \\ \Rightarrow \ln(1) &= x^2 - 9 \\ \Rightarrow x^2 - 9 &= 0 \\ x^2 &= 9 \\ x &= \{-3, 3\}\end{aligned}$$

b)

$$\ln\left(\frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 5x + 6}\right)$$

Es muss:  $\frac{x^2-4x+3}{x^2-5x+6} > 0$

Mit Anwendung der p-q Formel findet man die Nullstellen der beiden Polynome:

$$\begin{aligned}x_{1,2} &= \frac{-p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \\ \Rightarrow x_{1,2} &= -\left(\frac{-4}{2}\right) \pm \sqrt{\left(\frac{-4}{2}\right)^2 - 3} = 2 \pm \sqrt{1} \\ \Rightarrow x_1 &= 2 + 1 = 3 \quad \text{und} \quad x_2 = 2 - 1 = 1 \\ x_{3,4} &= \left(-\frac{-5}{2}\right) \pm \sqrt{\left(\frac{-5}{2}\right)^2 - 6} = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}} \\ x_3 &= \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 3 \quad \text{und} \quad x_4 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Wir können zunächst vereinfachen:

$$\begin{aligned}\frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 5x + 6} &> 0 \\ \Leftrightarrow \frac{(x-3)(x-1)}{(x-3)(x-2)} &> 0 \\ \Leftrightarrow \frac{x-1}{x-2} &> 0\end{aligned}$$

Es müss:  $x - 2 \neq 0$ , d.h  $x \neq 2$

Die Ungleichung gilt nur dann, wenn beide Terme entweder positiv oder negativ sind

1.Fall  $x > 1$  und  $x > 2$  d.h  $x > 2$ :

$$L_1 = ]2, \infty[$$

2.Fall  $x < 1$  und  $x < 2$ , d.h  $x < 1$ :

$$L_2 = ]-\infty, 1[$$

Daraus folgt:

$$L = L_1 \cup L_2 = ]-\infty, 1[ \cup ]2, \infty[$$

Somit  $D_{f_2} = \mathbb{R} \setminus \{[1, 2]\}$