



## Построение «нет-зоны» отрезка

Дан отрезок  $p_1p_2$ , а также множество отрезков  $S$ . Концы всех отрезков – МТОП. Обозначим множество концов отрезков из  $S - P$ .




Все другие отрезки разобьем на 4 множества:


1. Обе точки отрезка лежат слева от прямой, проведенной через  $p_1p_2$ . Обозначим  $S_1$ , концы –  $P_1$ .




2. Обе точки отрезка лежат справа от прямой, проведенной через  $p_1p_2$ . Обозначим  $S_2$ , концы –  $P_2$ .



3. Точки отрезка лежат по разные стороны от прямой, проведенной через  $p_1p_2$ . Отрезок пересекает данную прямую со стороны точки  $p_1$ . Обозначим  $S_3$ , концы –  $P_3$ .




4. Точки отрезка лежат по разные стороны от прямой, проведенной через  $p_1p_2$ . Отрезок пересекает данную прямую со стороны точки  $p_2$ . Обозначим  $S_4$ , концы –  $P_4$ .




Любые другие прямые пересекали бы  $p_1p_2$  (не допускаются).


Существование хотя бы одного отрезка в  $S_1$  порождает одну область «нет-зоны», ограниченную двумя лучами и отрезком. Для ее построения достаточно найти такие  $q_1, q_2 \in P_1$ , которые бы минимизировали углы  $q_1p_2p_1$ ,  $q_2p_1p_2$ . Далее строятся прямые на  $q_1p_2$  и  $q_2p_1$ . Искомые лучи лежат на полученных прямых, начинаются с  $p_1$  и  $p_2$ , не включают  $q_1$  и  $q_2$ .




Аналогично для  $S_2$ .



Существование хотя бы одного отрезка в  $S_3$  также порождает одну область «нет-зоны», ограниченную двумя лучами. Для ее построения достаточно найти такие  $q_1, q_2 \in P_3$ , которые бы минимизировали углы  $q_1 p_1 p_2, q_2 p_1 p_2$  при условии того, что  $q_1$  лежит левее  $p_1 p_2$ , а  $q_2$  правее. Далее строятся прямые на  $q_1 p_1$  и  $q_2 p_1$ . Искомые лучи лежат на полученных прямых, начинаются с  $p_1$ , не включают  $q_1$  и  $q_2$ .



Для  $S_4$  минимизируются углы  $q_1 p_2 p_1, q_2 p_2 p_1$ , лучи начинаются с  $p_2$ .




Таким образом,  $S_1$  порождает «нет-зону»: луч- $p_1 p_2$ -луч. Причем лучи непересекающиеся, а зона – подмножество полуплоскости. Аналогично для  $S_2$ .

$S_3$  порождает «нет-зону»: луч- $p_1$ -луч. Вырожденной зона быть не может, если непусто  $S_3$ . Данная зона может быть сколь угодно близкой как к прямой, так и ко всей плоскости. Аналогично для  $S_4$ .



Итоговая «нет-зона» получается пересечением полученных выше. Для данного примера она получается равной всей плоскости, а значит мы получаем досрочный ответ «нет» для задачи видимости.

Все виды итоговых «нет-зон» можно получить перебором:

1. Зоны, порождаемые  $S_1$  и  $S_2$ , непересекаются, так что результат всегда один: множество, ограниченное конструкциями луч- $p_1$ -луч, луч- $p_2$ -луч.






2. Взаимодействие зон, порождаемых  $S_3$  и  $S_4$ , можно поделить на взаимодействие левых и правых лучей. Одни из них всегда пересекаются (обозначим точку пересечения  $k_1$ ). В этой полуплоскости итоговая зона ограничена конструкцией луч- $k_1$ -луч. Во второй полуплоскости возможны два варианта: пересечение лучей в точке  $k_2$  или отсутствие пересечения. Итого результат: множество, ограниченное либо конструкциями луч- $k_1$ -луч, луч- $k_2$ -луч, либо только луч- $k_1$ -луч.





3. Оставшиеся пары ведут себя одинаково, рассмотрим  $S_1$  и  $S_3$ . Обе порождаемые зоны имеют луч с началом в  $p_1$  в правой полуплоскости, один всегда будет «сильнее» второго

и более «слабый» можно отбросить. Если отброшенным оказался луч, порожденный  $S_1$ , то оставшиеся лучи в правой полуплоскости могут пересечься в точке  $k_1$  и вырезать конструкцией луч- $k_1$ -луч кусок из итогового множества. Итого результат: множество, ограниченное либо конструкциями луч- $p_1$ -луч, луч- $k_1$ -луч, либо только луч- $p_1$ -луч.





4. Среди троек имеет смысл рассмотреть случай пустого  $S_2$  (для  $S_1$  аналогично) и пустого  $S_4$  (для  $S_3$  аналогично). В случае пустого  $S_2$  весь интерес сводится к наличию пересечения лучей, порождаемых  $S_3$  и  $S_4$ , в правой полуплоскости. Если пересечения нет, то оно будет в левой полуплоскости, а порождаемая им луч- $k_2$ -луч будет единственным ограничением. Если пересечение есть, то конструкция луч- $k_1$ -луч может пересечься с лучами, порожденными  $S_1$  в 1-2 точках. (обозначим их  $k_3, k_4$ ). Если пересечения нет, то и ограничений в нижней половине нет. Иначе ограничения - конструкции луч- $k_3$ -луч, луч- $k_4$ -луч.

Итого результат: множество, ограниченное в левой полуплоскости либо луч- $k_2$ -луч, либо нечем. В правой: либо луч- $k_3$ -луч, либо луч- $k_4$ -луч, либо луч- $k_3$ -луч, луч- $k_4$ -луч, либо нечем. (8 вариантов, приведем самые интересные)





5. В случае пустого  $S_4$  весь интерес сводится к наличию пересечения лучей  $S_3$  и лучами  $S_1, S_2$  из  $p_2$ . Если пересечение есть (в точках  $k_1, k_2$ ), появляются дополнительные ограничения (может быть только одно). Если пересечения нет, то зона порождаемая  $S_3$  имеет более сильное воздействие, чем 2-4 луча, задающие зоны  $S_1, S_2$ . Итого результат: множество, ограниченное контрукцией луч- $p_1$ -луч и либо луч- $k_1$ -луч, либо луч- $k_2$ -луч, либо луч- $k_1$ -луч, луч- $k_2$ -луч, либо нечем. (4 варианта, приведем самые интересные)





6. Если все множества непустые, ограничения сводятся к порождаемым аналогично предыдущему пункту точкам пересечения  $k_1, k_2, k_3, k_4$ . Итого результат: множество, ограниченное контрукциями луч- $k_1$ -луч, луч- $k_2$ -луч, луч- $k_3$ -луч, луч- $k_4$ -луч в любых комбинациях. От всей плоскости, до всех четырех. (16 вариантов, приведем несколько)



Выводы:

1. Построением всех «нет-зоны» заодно получены и обратные им «да-зоны» (вернее не «нет-зоны»).
2. Алгоритм построения таких зон можно реализовать за  $O(n^2)$  в не зависимости от того, как именно искать пересечение плоскостей, так как их количество (0-10) ограничено. Основное время уйдет на поиск этих плоскостей.

3. Выход такого алгоритма - «да-зона» отрезка, описанная как 0-4 конструкции луч-точка/отрезок-луч. Причем в случае отрезка лучи не пересекаются.
4. Выход может быть пустым, если непусты множества  $S_3$ ,  $S_4$  и одно из  $S_1$ ,  $S_2$ .