



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра системного анализа

Отчёт по практикуму

Динамическое программирование и процессы управления

Студент 415 группы

Егоров К. Ю.

Руководитель практикума

к.ф.-м.н., доцент И. В. Востриков

Москва, 2019

Содержание

1	Об эллипсоидах и сумме Минковского	3
2	Внешняя оценка суммы эллипсоидов	5
3	Внутренняя оценка суммы эллипсоидов	7

1 Об эллипсоидах и сумме Минковского

Определение 1. Назовём *эллипсоидом* множество

$$\mathcal{E}(q, Q) = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle x - q, Q^{-1}(x - q) \rangle \leq 1\}, \quad \text{где } Q = Q^T > 0.$$

Утверждение 1. *Опорная функция и опорный вектор эллипсоида имеют вид:*

$$\rho(l | \mathcal{E}(q, Q)) = \langle l, q \rangle + \langle l, Ql \rangle^{1/2},$$

$$x(l) = q + \frac{Ql}{\langle l, Ql \rangle^{1/2}}.$$

Доказательство.

Будем доказывать для случая $q = 0$. Иначе — аналогично.

Так как по определению $\rho(l | A) = \sup_{x \in A} \langle l, x \rangle$, то мы должны решать задачу максимизации скалярного произведения $\langle l, x \rangle$ при условии, что $\langle x, Q^{-1}x \rangle = 1$. Запишем функцию Лагранжа для этой задачи:

$$\mathcal{L}(l, x, \lambda) = \langle l, x \rangle + \lambda(\langle x, Q^{-1}x \rangle - 1).$$

Тогда

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = l + 2\lambda Q^{-1}x = 0 \implies x(l) = -\frac{1}{2\lambda}Ql.$$

Подставим получившееся выражение для опорного вектора в условие:

$$\left\langle -\frac{1}{2\lambda}Ql, -\frac{1}{2\lambda}Q^{-1}Ql \right\rangle = 1 \implies \lambda = -\frac{1}{2}\langle l, Ql \rangle^{1/2} \implies x(l) = \frac{Ql}{\langle l, Ql \rangle^{1/2}}.$$

В таком случае опорная функция в направлении $l \neq 0$ равна

$$\rho(l | \mathcal{E}(0, Q)) = \left\langle l, \frac{Ql}{\langle l, Ql \rangle^{1/2}} \right\rangle = \langle l, Ql \rangle^{1/2}.$$

■

Определение 2. *Суммой Минковского* множеств A и B называется множество

$$A + B = \{x = a + b : a \in A, b \in B\}.$$

Утверждение 2. *Опорная функция суммы Минковского равна сумме опорных функций каждого из множеств, то есть*

$$\rho\left(l \left| \sum_{i=1}^n A_i \right.\right) = \sum_{i=1}^n \rho(l | A_i).$$




Рис. 1: Эллипсоид с центром $q = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ и матрицей $Q = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$.




Рис. 2: Сумма двух эллипсоидов.

2 Внешняя оценка суммы эллипсоидов

Теорема 1. Для суммы Минковского эллипсоидов справедлива следующая внешняя оценка

$$\sum_{i=1}^n \mathcal{E}(q_i, Q_i) = \bigcap_{\|l\|=1} \mathcal{E}(q_+(l), Q_+(l)),$$

где

$$q_+(l) = \sum_{i=1}^n q_i,$$

$$Q_+(l) = \sum_{i=1}^n p_i \cdot \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{p_i}, \quad \text{где } p_i = \langle l, Q_i l \rangle^{1/2}.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о .

Будем доказывать для случая $q_i = 0$, $i = \overline{1, n}$. Случай с произвольными центрами — аналогично.

Распишем квадрат опорной функции эллипсоида $\mathcal{E}(0, Q_+(l))$:

$$\begin{aligned} \rho^2(l | \mathcal{E}(0, Q_+(l))) &= \sum_{i=1}^n \langle l, Q_i l \rangle + \sum_{i < j} \left\langle l, \left(\frac{p_i}{p_j} Q_j + \frac{p_j}{p_i} Q_i \right) l \right\rangle \geq \\ &\geq \left\{ \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \right\} \geq \sum_{i=1}^n \langle l, Q_i l \rangle + 2 \sum_{i < j} \langle l, Q_i l \rangle^{1/2} \langle l, Q_j l \rangle^{1/2} = \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \langle l, Q_i l \rangle^{1/2} \right)^2 = \rho^2 \left(l \left| \sum_{i=1}^n \mathcal{E}(0, Q_i) \right. \right). \end{aligned}$$

Таким образом, получили, что для любого $l \neq 0$

$$\sum_{i=1}^n \mathcal{E}(0, Q_i) \subseteq \mathcal{E}(0, Q_+(l)),$$

причем, так как равенство опорных функций достигается при $p_i = \langle l, Q_i l \rangle^{1/2}$, то в направлении $l \neq 0$ эллипсоид $\mathcal{E}(0, Q_+)$ касается суммы $\sum_{i=1}^n \mathcal{E}(0, Q_i)$. ■




Рис. 3: Эллипсоидальные аппроксимации для 10 направлений.




Рис. 4: Эллипсоидальные аппроксимации для 100 направлений.

3 Внутренняя оценка суммы эллипсоидов

Определение 3. Сингулярным разложением матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ называется представление матрицы в виде

$$A = V \Sigma U^*,$$

где

$$V \in \mathbb{R}^{n \times n} : V^* = V^{-1},$$

$$U \in \mathbb{R}^{m \times m} : U^* = U^{-1},$$

$$\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_{\min\{n, m\}}) \in \mathbb{R}^{n \times m} : \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_{\min\{n, m\}}.$$

Теорема 2. Сингулярное разложение $A = V \Sigma U^*$ существует для любой комплексной матрицы A . Если матрица A вещественная, то матрицы V , Σ и U также можно выбрать вещественными.

Теорема 3. Старшее сингулярное число σ_1 матрицы $A = V \Sigma U^*$ является её нормой.

Определение 4. Назовём линейное преобразование \mathcal{A} ортогональным, если оно сохраняет скалярное произведение, то есть

$$\langle \mathcal{A}(x), \mathcal{A}(y) \rangle = \langle x, y \rangle.$$

Теорема 4. Необходимым и достаточным условием ортогональности линейного преобразования \mathcal{A} в конечномерном пространстве является унитарность матрицы преобразования A , то есть

$$A^* = A^{-1}.$$

Утверждение 3. Для произвольных векторов $a, b \in \mathbb{R}^n$ таких, что $\|a\| = \|b\|$, существует матрица ортогонального преобразования, переводящего a в b .

Доказательство.

Построим сингулярное разложение для векторов a и b :

$$a = V_a \Sigma_a u_a, \quad b = V_b \Sigma_b u_b,$$

причем $V_a, V_b \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — унитарные матрицы, $u_a, u_b \in \{-1, 1\} \in \mathbb{R}^1$,

$$\Sigma_a = [\sigma_a, 0, \dots, 0]^T \in \mathbb{R}^{n \times 1}, \quad \Sigma_b = [\sigma_b, 0, \dots, 0]^T \in \mathbb{R}^{n \times 1}, \quad \sigma_a, \sigma_b > 0.$$

Согласно Теореме 4 $\sigma_a = \sigma_b$. Тогда преобразуем выражение для вектора b :

$$\begin{aligned} b &= V_b \Sigma_b u_b = V_b (V_a^T V_a) \Sigma_b u_b = V_b V_a^T V_a \left(\Sigma_a \frac{\sigma_b}{\sigma_a} \right) \left(u_a \frac{u_b}{u_a} \right) = \\ &= V_b V_a^T \frac{\sigma_b \cdot u_b}{\sigma_a \cdot u_a} V_a \Sigma_a u_a = \left(V_b V_a^T \frac{\sigma_b \cdot u_b}{\sigma_a \cdot u_a} \right) a. \end{aligned}$$

Так как произведение унитарных матриц есть унитарная матрица, теорема доказана. ■

Следствие 1. Далее под ортогональным преобразованием из вектора a в вектор b таких, что $\|a\| = \|b\|$, будем понимать

$$\text{Orth}(a, b) = u_a u_b V_b V_a^T.$$

Утверждение 4. Для суммы Минковского эллипсоидов справедлива следующая оценка

$$\sum_{i=1}^n \mathcal{E}(q_i, Q_i) = \bigcup_{\|l\|=1} \mathcal{E}(q_-(l), Q_-(l)),$$

где

$$\begin{aligned} q_-(l) &= \sum_{i=1}^n q_i, \\ Q_-(l) &= Q_*^T(l) Q_*(l), \quad Q_*(l) = \sum_{i=1}^n S_i(l) Q_i^{1/2}, \\ S_i(l) &= \text{Orth}(Q_i^{1/2} l, \lambda_i Q_1^{1/2} l), \quad \lambda_i = \frac{\langle l, Q_i l \rangle^{1/2}}{\langle l, Q_1 l \rangle^{1/2}}. \end{aligned}$$

Доказательство.

Будем доказывать для случая $q_i = 0$, $i = \overline{1, n}$. Случай с произвольными центрами — аналогично.

Итак рассмотрим эллипсоид $\mathcal{E}_- = \mathcal{E}(0, Q_-)$, $Q_- = Q_*^T Q_*$,

$$Q_* = \sum_{i=1}^n S_i Q_i^{1/2},$$

где S_i — некоторые унитарные матрицы. Распишем квадрат опорной функции этого эллипсоида:

$$\begin{aligned} \rho^2(l | \mathcal{E}_-) &= \langle l, Q_- l \rangle = \langle Q_* l, Q_* l \rangle = \sum_{i=1}^n \langle l, Q_i l \rangle + \sum_{i \neq j} \langle S_i Q_i^{1/2} l, S_j Q_j^{1/2} l \rangle \leq \\ &\leq \{ \text{Неравенство Коши–Буняковского} \} \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n \langle l, Q_i l \rangle + \sum_{i \neq j} \langle l, Q_i l \rangle^{1/2} \langle l, Q_j l \rangle^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^n \langle l, Q_i l \rangle^{1/2} \right)^2 = \rho^2 \left(l \left| \sum_{i=1}^n \mathcal{E}(q_i, Q_i) \right. \right). \end{aligned}$$

Таким образом, получили, что $\mathcal{E}_- \subseteq \sum_{i=1}^n \mathcal{E}(q_i, Q_i)$.

Заметим, что равенство в последней формуле при фиксированном направлении $l \neq 0$ достигается при

$$S_i Q_i^{1/2} l = \lambda_i S_1 Q_1^{1/2} l,$$

где λ_i — произвольные неотрицательные константы. Если положить $S_1 = I$, а λ_i выбирать, исходя из условий нормировки ($\|Q_i^{1/2}l\| = \|\lambda_i Q_1^{1/2}l\|$):

$$\lambda_i = \frac{\langle l, Q_i l \rangle^{1/2}}{\langle l, Q_1 l \rangle^{1/2}},$$

то получим утверждение теоремы. ■




Рис. 5: Эллипсоидальные аппроксимации для 10 направлений.




Рис. 6: Эллипсоидальные аппроксимации для 100 направлений.




Рис. 7: Эллипсоидальные аппроксимации для 50 направлений.

Список литературы

- [1] Kurzanski A. B., Varaiya P. *Dynamics and Control of Trajectory Tubes*. Birkhauser, 2014.