

## Machine Learning - HW #2

1) Decision regions induced by the following instances using Euclidean distance:

Let  $A = (4, 4)$  - pos

$B = (4, 6)$  - pos

$C = (6, 2)$  - neg

$$\text{Euclidean distance } AB \quad \frac{(4, 4)}{\cancel{2, 2}} \quad \frac{(4, 6)}{2} = \sqrt{(4-4)^2 + (4-6)^2} = \sqrt{0+4} = 2$$

$$d(A(4, 4)) \leq d(B(4, 6))$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x_1-4)^2 + (x_2-4)^2} \leq \sqrt{(x_1-4)^2 + (x_2-6)^2}$$

$$\Rightarrow x_1^2 - 8x_1 + 16 + x_2^2 - 8x_2 + 16 \leq x_1^2 - 8x_1 + 16 + x_2^2 - 12x_2 + 36$$

$$\Rightarrow -8x_2 + 12x_2 + 16 - 36 \leq 0$$

$$\Rightarrow 4x_2 - 20 \leq 0 \Rightarrow \boxed{x_2 - 5 \leq 0} \rightarrow \textcircled{1}$$

$$\text{Euclidean distance } BC \quad (4, 6) \quad (6, 2) = \sqrt{(6-4)^2 + (2-6)^2} = \sqrt{4+16} = 2\sqrt{5}$$

$$d(B(4, 6)) \leq d(C(6, 2))$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x_1-4)^2 + (x_2-6)^2} \leq \sqrt{(x_1-6)^2 + (x_2-2)^2}$$

$$\Rightarrow x_1^2 - 8x_1 + 16 + x_2^2 - 12x_2 + 36 \leq x_1^2 - 12x_1 + 36 + x_2^2 - 4x_2 + 4$$

$$\Rightarrow -8x_1 - 12x_2 + 52 \leq -12x_1 - 4x_2 + 40$$

$$\Rightarrow 4x_1 - 8x_2 + 12 \leq 0 \Rightarrow \boxed{x_1 - 2x_2 + 3 \leq 0} \rightarrow \textcircled{2}$$

$$\text{Euclidean distance } CA \quad (6, 2) \quad (4, 4) = \sqrt{(6-4)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$$

$$d(C(6, 2)) \leq d(A(4, 4))$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x_1-6)^2 + (x_2-2)^2} \leq \sqrt{(x_1-4)^2 + (x_2-4)^2}$$


$$\Rightarrow x_1^2 - 12x_1 + 36 + x_2^2 - 4x_2 + 4 \leq x_1^2 - 8x_1 + 16 + x_2^2 - 8x_2 + 16$$

$$\Rightarrow -12x_1 - 4x_2 + 40 \leq -8x_1 - 8x_2 + 32$$

$$\Rightarrow -4x_1 + 4x_2 + 8 \leq 0$$

$$\Rightarrow \boxed{-x_1 + x_2 + 2 \leq 0} \rightarrow \textcircled{3}$$

Decision boundaries obtained from eq ①, ② and ③:



2. Nearest Neighbours of  $x^{(q)} = (7, 10)$


given points :  $a(2, 4)$   $b(3, 12)$   $c(5, 10)$   $d(2, 8)$   $e(2, 4)$   $f(6, 3)$   $g(9, 1)$   
 $h(12, 5)$   $i(10, 10)$   $j(13, 12)$

OPERATION	DISTANCE	BEST DISTANCE	BEST NODE	PRIORITY QUEUE
		$\infty$		$\{f, 0\}$
Pop f	$5\sqrt{2}$	$5\sqrt{2}$	f	$(h, 0)$ $(c, 1)$
Pop h	$5\sqrt{2}$	$5\sqrt{2}$	f	$(i, 0)$ $(c, 1)$ $(g, 5)$
Pop i	3	3	i	$(c, 1)$ $(j, 3)$ $(g, 5)$
Pop c	2	2	c	$(b, 0)$ $(e, 0)$ $(j, 3)$ $(g, 5)$
Pop b	$2\sqrt{5}$	2	c	$(e, 0)$ $(j, 3)$ $(a, 4)$ $(g, 5)$
Pop e	$\sqrt{61}$	2	c	$(d, 0)$ $(j, 3)$ $(a, 4)$ $(g, 5)$
Pop d	$\sqrt{29}$	2	c	$(j, 3)$ $(a, 4)$ $(g, 5)$
Pop j				
Return c				

$\therefore$  Best Node = c

Best distance = 2

3. Neural network for logical function  $y = (x_1 \wedge x_2) \vee (x_3 \wedge x_4)$   
 By trial and error,



$$w_{EA} = 2$$

$$w_{EB} = 2$$


$$w_{FC} = 2$$

$$w_{FD} = 2$$

$$w_{GE} = 1.0$$

$$w_{GF} = 1.0$$

4.



Training Instance :  $x = [0, 1]$   $y = [1, 0]$

$$\text{Net I/p to C} = (0 \times 1) + (1 \times -0.5) + (1 \times -0.5) = -1$$

$$O_C = \frac{1}{1 + e^{-(-1)}} = \frac{1}{1 + e} = 0.2689$$

$$\text{Net I/p to D} = (1 \times 1) + (0 \times -0.5) + (1 \times -1) = 0$$

$$O_D = \frac{1}{1 + e^0} = 0.5$$

$$\text{Net I/p to E} = (1 \times 0) + (0.2689 \times -2) + (0.5 \times 1) = -0.5379 + 0.5 = -0.0379$$

$$O_E = \frac{1}{1 + e^{0.0379}} = 0.4905$$

$$\begin{aligned} \text{Net I/p to F} &= (1 \times -0.5) + (0.5 \times -2) + (0.2689 \times -2) = -0.5 + (-1) + (-0.5379) \\ &= -2.0378 \end{aligned}$$

$$O_F = \frac{1}{1 + e^{2.0378}} = 0.11529 \approx 0.1153$$

Error in Output Units :  $\delta_j = o_j(1 - o_j)(y_j - o_j)$

$$\delta_E = 0.4905 \times (1 - 0.4905) \times (1 - 0.4905) = 0.1273$$

$$\delta_F = 0.1153 \times (1 - 0.1153) \times (0 - 0.1153) = -0.0176$$



Weight updation for erroneous  $o_D$  units:  $\Delta w_{ji} = \eta \delta_j o_i$   
 $\eta = 0.1$

$$\Delta w_{FD} = \eta \delta_F o_D = 0.1 \times -0.1176 \times 0.5 = -0.000588$$

$$\therefore \text{New weight } w_{FD} = \text{old } w_{FD} + \Delta w_{FD} \\ = -2 + (-0.000588)$$

$$\therefore w_{FD} = -2.000588$$

Weight updation for hidden layers:  $\Delta w_{ji} = \eta \delta_j o_i$

Error in hidden units  $\delta_j = o_j (1 - o_j) \sum_k \delta_k w_{kj}$

$$\delta_D = o_D (1 - o_D) [\delta_E \times w_{ED} + \delta_F \times w_{FD}]$$

$$= 0.5 \times (1 - 0.5) \times [(0.1273 \times 1) + (-0.01176 \times -2)]$$

$$= 0.5 \times 0.5 \times (0.1273 + 0.02352) = 0.37105$$

$$\therefore \Delta w_{DA} = \eta \delta_D o_A = 0.1 \times 0.37105 \times 0 = 0$$

$$\therefore \text{New weight } w_{DA} = \text{old } w_{DA} + \Delta w_{DA} \\ = -0.5 + 0$$

$$\therefore w_{DA} = -0.5$$