1.1 정확한 환자 확인 및 의사소통			
규 정 번 호	1.1	제 정 일	
관련 인증기준	1.1 정확한 환자 확인 및 의사소통	최근 개정일	
담 당 부 서	진료부, 간호부, 약제과	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	1. 의료법 2.의료법 시행규칙		

▣ 목적 (Purpose)

발생할수 있는 환자확인 오류를 예방하고, 정확하게 의사소통 하는 것은 안전한 진료를 위해 매우 중요하다. 그 중 구두처방, 필요시처방, 혼동하기 쉬운 부정확한 처방 등은 절차를 두어 안전하게 관리한다.

▣ 용어의 정의 (Definition)

· 정확한 환자확인 : 환자확인이 필요한 시점에 개방형으로 환자이름과 병원등록번호 (또는 주민등록번호 상 생년월일)를 이용하여 환자의 고유정보를 정확하게 확인하는 절차를 말한다.

· 환자인식표 : 환자이름과 병원등록번호가 기록된 접수증 또는 환자인식밴드나, 사진·성명·주민등록번호 등 환자의 고유정보가 포함된 신분증이나 여권 등을 말한다.

· 처방 : 법적 권한을 가진 자가 병원 내·외에서 환자에게 행해지는 모든 의료행위들이 이루어질 수 있도록 하는 행위

· 구두 / 전화 처방 : 의사가 면대면 혹은 전화를 통해 지시하는 처방

· 필요시(PRN) 처방 : 정규처방 이외에 의사가 지시한 적용 사유가 발생할 경우 추가로 시행하도록 하는 필요시 처방.
PRN은 pro re nata의 줄임말로 라틴어를 근원으로 하며, 영어로 풀이하면 "as required, according to need"로서 '수시로, 필요한 때에' 라는 의미

· 혼동하기 쉬운 처방 : 알아볼 수 없는 글씨체, 명확하지 않은 의미, 코드나 이름이 유사한 의약품 등으로 수행 시 오류가 발생하기 쉬운 처방

▣ 정책 (Policy)

1. 정확한 환자 확인 및 의사소통에 대한 규정이 있다.
2. 환자를 정확하게 확인한다.
3. 구두처방을 수행한다.
4. 필요시처방(p.r.n)을 관리한다.
5. 필요시처방(p.r.n)을 안전하게 수행한다.
6. 혼동하기 쉬운 부정확한 처방 시 대처방안을 알고 수행한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 환자 확인

가. 환자 확인이 필요한 시점 및 수행자

1) 의약품 투여 전

가) 투약준비 시 투약 Work List의 환자명과 등록번호가 개별약포지의 환자명과 등록번호와 일치하는지 대조하여 확인한다.

나) 의약품을 투여를 수행하는 자는 투여전 환자 확인 방법에 따라 환자이름을 개방형 질문으로 확인한다.

다) 개별약포지의 환자명과 등록번호가 환자인식밴드의 환자명과 등록번호와 일치하는지 대조하여 확인한다.

2) 혈액제제 투여 전

가) 혈액제제를 투여 전 수행하는 자는 환자이름과 혈액형을 개방형 질문으로 확인한다.

나) 환자의 이름, 등록번호와 혈액팩에 부착된 혈액제제의 ABO 및 RhD혈액형을 두 명의 의료인의 소리 내어 비교하여 확인한다.

가) 혈액제제를 투여 전 수행하는 자는 환자이름과 등록번호 또는 생년월일을 이용하여 환자를 확인한다.

나) 혈액제제의 환자정보, 혈액형, 혈액번호, 유효기간 등을 2인의 의료인이 소리 내어 대조 확인한다. 환자가 의사표현이 어려운 경우에는 환자인식밴드와 의무기록, 혈액제제 정보를 대조한다.

3) 검사 시행 전(검체수집 포함)

가) 검사 시행 전 수행하는 자는 환자이름을 개방형 질문으로 확인한다.

나) 외래 환자는 진료 경유지의 환자명과 등록번호가 EMR과 일치하는지 대조하여 확인 후 라벨링하여 용기에 부착하고 검체를 채취 한다.

라) 입원환자는 환자인식밴드의 환자명과 등록번호가 검체용기에 라벨링된 환자명과 등록번호와 일치하는지 대조하여 확인한 후 검체를 채취 한다.

4) 진료 및 처치 전(시술 포함)

가) 진료 및 처치 전 수행하는 자는 환자이름을 개방형 질문으로 확인한다.

나) 진료 및 처치, 시술 전 환자이름과 등록번호가 EMR에 등록된 처방 및 시술/처치 리스트 등을 확인한 후 진료·처치·시술한다.

다) 한방시술/처치 시 의사처방(한방처치 모식도)의 환자명과 등록번호가 환자인식밴드의 환자명과 등록번호가 일치하는지 대조하여 확인한 후 시술/처치한다.

나. 환자 확인 방법

1) 환자 확인 과정에 개방형 질문(최소 한 가지 이상)으로 환자의 '이름 '을 확인하여 환자를 참여 시킨다.

2) 환자 확인 시 환자이름, 생년월일, 등록번호 등 최소한 두 가지 이상의 지표(indicator)를 사용하여 확인한다. 단, 환자의 병실호수나 위치를 알리는 지표는 환자 확인 지표로 사

용 하지 않는다.

가) 성함이 어떻게 되십니까?, 등록번호를 말씀해 주세요

나) 성함이 어떻게 되십니까?, 환자분 생년월일을 말씀해 주세요

3) 모든 상황과 장소에서, 환자의 고유정보를 이용하여 '일관된' 환자확인 방법을 적용한다.

4) 환자인식표에 있는 이름과 등록번호(혹은 주민등록상 생년월일)를 확인한다.

5) 동명이인의 경우 : 이름 뒤에 1, 2, 3 순으로 구분하여 혼동되지 않도록 하고 가능하면 같은 병실에 입원시키지 않는다.

6) 외국인 환자의 경우 : 처음 내원 시 환자이름과 생년월일이 외국인 등록카드 또는 여권과 일치하는지 확인하고 이후는 내국인과 동일한 방법으로 확인한다.

7) 보호자나 개인 간병인을 동반한 환자가 의식이 없거나 의사표현이 어려운 경우에도 보호자나 개인 간병인에게 환자 확인은 두가지 이상의 지표(이름, 생년월일, 등록번호 등)를 사용하며 개방형 질문을 통하여 환자의 성함을 확인하고 환자 인식밴드를 확인하여 환자확인을 실시한다.

8) 보호자나 개인 간병인을 동반하지 않으면서 환자의 의식이 없거나 의사표현이 어려운 경우에도 환자 확인은 두가지 이상의 지표(이름, 생년월일, 등록번호 등)를 확인하고 개방형 질문은 불가능 하므로 직원 2인이 동시에 환자의 이름을 확인하며 환자 인식밴드를 이용하여 환자확인을 실시한다.

9) 환자확인이 되기 전에는 어떠한 의료서비스도 제공하지 않아야 한다.

10) 환자인식밴드는 퇴원 전까지 착용될 수 있도록 관리한다.

상황	확인방법	최소 확인지표
일반 환자	개방형 질문	이름+등록번호 또는 이름+생년월일
의식저하 의사표현 어려움	보호자/간병인 확인 + 인신밴드 대조	
보호자 없음 응급상황	직원 2인 확인 + 인신밴드 대조	
외래환자	신분증/접수정보/EMR 대조	
검체채취 전	EMR/라벨/인식밴드 대조	
혈액제제 투여 전	2인 확인	

3. 환자인식밴드 관리

가. 환자인식밴드에는 환자이름, 등록번호, 성별, 나이, 생년월일의 정보가 기재된다.

나. 환자인식밴드 착용 및 제거

1) 환자입원 시 원무과 직원이 환자/보호자에게 개방형 질문을 통하여 환자이름과 등록번호, 주민등록상 생년월일 정보가 일치하는가를 확인하고, 환자인식밴드를 손목에 착용시킨다.

2) 환자의 손목에 착용하기 어려운 경우에는 발목에 착용시키고 발목에 착용하기 어려운 경우 환자가 입은 상의 등 부위에 환자인식밴드를 주머니 부위에 부착한다.

3) 환자인식밴드는 퇴원직전까지 착용 될 수 있도록 관리하고 퇴원하기 직전에 환자인식밴드를 개인정보가 노출되지 않도록 가위로 잘게 자른다.)

4) 환자가 사망한 경우에는 환자인식밴드를 제거하지 않고, 영안실로 이송한다.

다. 환자인식밴드의 재발급

잘못된 정보로 인한 환자인식밴드의 오류, 훼손, 분실 시 담당간호사는 즉시 원무과에 환자인식밴드의 재발급을 의뢰하여 환자/보호자의 확인을 거쳐 착용시킨다.

4. 구두(전화)처방의 절차

가. 구두 또는 전화처방은 응급상황 등과 같이 전산처방이 불가능한 제한된 상황에서만 수행한다.

1) 무균적 시술이 진행되는 경우

2) 심폐소생술과 같은 응급상황인 경우

3) 정전 또는 인터넷 장애 등 전산장애 시

4) 한의사 당직 시에도 응급상황 또는 전산처방이 즉시 불가능한 제한적 상황에 한하여 구두처방을 허용한다.

나. 구두처방 금지 의약품

1) 응급상황 외에는 일상적으로 사용하는 의약품만 구두처방이 가능하다.

2) 고위험약물(NaCl, KCL, Heparin 등), 혈액제제, 항생제, 마약류 등의 경우 응급상황에서만 허용한다.

3) 백신 등은 구두처방을 허용하지 않는다.

다. 구두처방 4단계 - 구두 또는 전화처방절차에 따라 정확하게 수행한다.

※ 정확한 환자확인 → 받아 적기 → 되읽어 확인하기 → 처방한 지시자가 정보의 정확성 확인하기

1단계	정확한 환자확인 (Identification)	환자이름 + 등록번호(혹은 생년월일) 등록번호 확인이 안 되는 경우 진단명으로 확인한다.
2단계	받아 적기 (Write-down)	처방을 받은 간호사는 처방 내용을 받아 적는다. (구두처방 기록지를 활용한다).
3단계	되읽어 확인하기 (Read-back)	구두처방을 받은 간호사는 받아 적은 처방 내용을 다시 처방한 의사에게 정확하게 읽어준다.
4단계	처방 지시자가 정보의 정확성 확인하기(Confirm)	처방한 지시자는 처방을 받은 간호사가 읽어 준 내용이 자신이 말한 처방의 내용과 일치하는지 확인한다.

1) 정확한 환자확인(Identification)

가) 구두 처방 시 환자이름과 등록번호로 확인한다.

나) 환자인색밴드가 발행되기 전, 환자인식밴드 훼손 또는 응급상황 등 환자의 의식이 없어 개방형 질문이 불가하여 환자의 생년월일이나 등록번호를 모르는 상황에서 의료진 간 의 정확한 환자확인을 위해 환자이름, 진단명, 환자상태 등으로 확인한다.

다) 현재 환자상태에 대하여 확인한다.

2) 받아적기(Write-down)

※ 간호사는 구두처방의 내용을 구두/전화처방 기록지에 정확하게 받아 적는다.

가) 환자정보 : 환자이름, 등록번호, 진단명 등

나) 처방내용

(1) 혼동하기 쉬운 약어나 기호를 사용하지 않아야 하며, 의약품명이나 검사명은 약자가 아닌 정식명칭을 사용하여 full name으로 기록한다.

(2) 의약품의 경우 의약품명, 용량과 단위(mg, g 등), 투여방법, 투여횟수, 투여간격 등을 정확하게 표현해야 한다.

(3) 처방일시를 24시간 단위로 기록한다.

(4) 처방을 한 지시자, 구두처방을 받은 간호사의 이름을 기록한다.

3) 되읽어 확인하기(Read-back)

가) 구두처방을 받은 사람은 받아 적은 처방내용을 처방지시자에게 다시 정확하게 읽어준다.

나) 숫자의 경우 하나씩 정확하게 읽고, 영어가 익숙하지 않거나 혼동하기 쉬운 의약품의 경우 철자를 하나씩 읽어주고 확인하며 의약품의 용량과 단위(예시 : mg, g, mEq, mMol)를 정확하게 표현한다.

4) 처방한 지시자가 정보의 정확성 확인하기(confirmation)

가) 처방을 낸 지시자는 처방을 받은 사람이 읽어 준 내용을 정확하게 듣고 자신이 말한 처방의 내용과 일치하는지 여부를 확인한다.

나) 심폐소생술 상황 등의 응급상황에서 구두처방을 받는 간호사가 받아적기(Write-down)를 할 수 없는 경우 구두처방 기록지에 수기작성 과정은 생략하고, 구두처방을 받은 즉시 복창(Repeat-back)하여 이를 확인(Confirmation)받고 수행한다.

5) 간호사는 간호기록지에 구두처방 수행내용을 기록한다.

6) 구두처방을 낸 의사는 구두처방 상황이 종료된 시점으로부터 24시간 이내(공휴일 제외)에 처방을 입력해야 한다. 단, 당직의사가 한의사여서 담당의사가 당직시간에 구두처방을 냈을 경우에 휴일이 종료된 날로부터 24시간 이내에 처방을 입력한다.

마. 구두처방 기록지 폐기

1) 구두처방 기록지는 구두처방한 의사가 구두처방을 기록처방으로 입력한 것을 확인한 후 확인한 간호사는 파쇄기에 폐기한다.

5. 필요시처방(P.R.N) 절차

가. 필요시처방 목록관리

1) 필요시처방 가능한 처벙의 종류(의약품 목록)의 선정은 병원운영위원회에서 심의 후 승인을 받는다.

2) 처방의 종류별 가능한 목록을 관리하기 위하여 점검 주기에 따라 병원운영위원회에서 심의 후 결정한다.

3) 의약품 중 전해질제제, 헤파린 주사제, 백신, 경구용 항응고제, 항생제 주사제, 면역억제제, 혈액제제 등은 필요시 처방을 허용하지 않는다.

4) 필요시 처방의 목록의 점검 주기는 정기적으로 매년 12월마다 병원운영위원회에서 목록을 점검 및 관리하며 목록의 변경이 필요한 경우 변경 신청하려는 자는 필요시 처방(PRN)약물 신청서를 작성하여 약사에게 제출하고 (의약품 단종에 의한 대체, 목록 추가 및 삭제 등) 비정기적으로 병원운영위원회 임시회의를 개최 하여 점검 및 관리한다.

나. 필요시처방의 원칙

1) 필요시처방이 허용된 의약품 목록에 한하여 처방할 수 있다.
2) 명확한 수행을 위한 실시 기준(사유)을 명시한다.
3) 필요시 처방(의약품)에 포함 되어야 할 내용으로 투여가 요구되는 환자의 상태(범위), 1회 용량과, 최소 투여 간격, 투여경로, 1일 최대 투여 횟수를 환자별로 처방한다.
4) 약물에 따라 투약 전 사전보고가 필요한 경우 비고란에 명시한다.

다. 필요시 처방의 수행

※ 필요시 처방은 절차에 따라 직원들이 정확하게 의사소통하고 수행한다.

1) 간호사는 환자의 증상을 판단한 후 각 환자의 처방에 명시된 실시기준(투여가 요구되는 환자의 상태(범위), 1회 용량과, 최소 투여 간격, 투여경로, 1일 최대 투여 횟수 등을 확인하여 보고 없이 수행한다.
2) 실시기준(사유)을 명시하지 않은 처방은 유효하지 않으며 부정확한 처방 확인절차에 따른다.

6. 혼동하기 쉬운 부정확한 처방 유형 및 대처방안

가. 부정확한 처방의 유형

1) 5가지 투약원칙(정확한 환자, 정확한 의약품명, 정확한 용량, 정확한 용법, 정확한 시간)중 한 가지라도 명확하지 않은 의약품 처방
2) 실시기준(사유)이 명시되지 않은 필요시 처방
3) 수기처방의 경우 알아 볼 수 없는 글씨체의 수기처방
4) 전자처방의 경우 의미가 명확하지 않은 처방
5) 유사코드, 유사발음, 유사외관, 유사 용량의 의약품 확인

나 부정확한 처방의 대처방안

※ 혼동하기 쉬운 부정확한 처방 관리 및 확인절차를 정확하게 이해하고 수행한다.

1) 처방 지시자에게 연락하여 확인한다.
2) 야간에는 당직의사에게 연락하여 확인한다.
3) 문의를 받은 의사는 처방한 내용을 명확히 하여 처방내용을 변경한다.
4) 필요한 경우 EMR처방을 수정하거나 재입력하며 간호사 또는 약사는 수정된 처방을 확인한 후에만 투약, 조제, 검사, 처치를 수행한다.
5) 확인되지 않은 처방은 실시하지 않으며 실시하지 못한 사유를 간호기록 또는 관련 기록지에 남긴다.
6) 약제과에서는 진료부나 간호부에서 쉽게 확인할 수 있도록 의약품의 유사코드, 유사발음, 유사외관, 유사 용량의 의약품의 사진을 제공한다.
   - 진료부 : 유사발음, 유사외관, 유사 용량, 유사코드의 의약품
   - 간호부 : 유사발음, 유사외관, 유사 용량의 의약품
7) 의약품의 보관장소 또는 보관용기, 자동포장기의 카세트 등에 색을 구분하여 유사발음(이름), 유사외관, 유사 용량 표시지를 부착한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 구두 / 전화처방 기록지
2. PRN 처방 목록
3. 유사발음 의약품 목록
4. 유사외관 의약품 목록
5. 용량주의 의약품 목록
6. 유사코드 의약품 목록
7. 필요시 처방(PRN)약물 신청서

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일					

구두 / 전화처방 기록지

등록번호 : _____ 이름 : _____ 병실 : _____
진 단 명 : _____
처방일시 : _____ 년 _____ 월 _____ 일 _____ 시 _____ 분(24시간 단위)
구두처방자 / 구두처방 받는자 : _____

구두처방 받아 적기(Write Down)					
No.	의약품명	1회 용량	투여경로	횟수	투여간격
1					
2					
3					
4					
5					
비고	의약품 이외 내용				
되읽어 확인하기(Read back)					
처방지시자의 확인 받기(Confirm)					
구두처방 상황 V표 ☐ 무균적 시술시 ☐ 응급상황 시 ☐ 한방의 당직 ☐ 전산 장애 시					
구두처방을 기록처방으로 낸 시간 : 년 월 일 시 분					

※ 간호사는 구두처방 시행 후 간호기록
※ 의사는 구두처방 내용을 24시간 이내에 처방입력

부록2. PRN 처방 목록

202 . . .

필요시 처방(p.r.n) 목록

1. 필요시처방(p.r.n) 은 허용목록 범위 내에서 처방한다.
2. 처방의사는 필요시처방(p.r.n)이 시행되어야 하는 상황을 정확히 알 수 있도록 실시기준(사유)을 환자별로 수치화 하여 기록하고 수치화하기 어려운 경우 구체적으로 기술하며, 1)1회 용량 및 사용법 2)투여경로 3)1일 허용횟수 4)투여간격 등을 명확히 서술하여 정확히 의사소통하도록 한다.

No	종류	약품명	성분/함량	분류	1회용량	1일 최대 투여	적응증
1	주사제 (IM)	트라놀주 (트라마돌염산염)	tramadol hydrochloride 50㎎/㎖	해열,진통, 소염제	1A	1회	통증호소시 (NRS:4점이상) (FPS:4점이상) (FLACC:4점이상)
2	주사제 (IV)	파세타주 1g (프로파세타목염산염)	propacetamol hydrochloride 1g	해열,진통, 소염제	1A+N/S100 (MIX)	1회	체온38도이상 시
3	경구제	쿠에타핀정 12.5mg	quetiapine fumarate12.5mg	정신신경용제	1T	1회	수면 못이룰 시
4	주사제 (IM)	명인할로페리돌 주사 5mg	haloperidol 5mg/1ml	정신신경용제	0.5A	1회	ACTING OUT 시 쿠에타핀 12.5mg투여 후 1시간 이상 수면 못 이룰 시
5	경구제	아세트아미노펜정 500mg	acetaminophen 500㎎	해열,진통, 소염제	1T	1회	체온37.5도이상 시
6	경구제	가스모프정	mosapride citrate dihydrate 5.29㎎	소화기관용	1T	1회	소화불량으로 인한 소화기증상 (속쓰림.구역.구토)
7	경구제	포타겔 현탁액 20ml	dioctahedral smectite 3g/20ml	정장제	1PACK	1회	설사 2회이상 시
8	좌약	둘코락스 좌약	bisacodyl 10㎎	하제,완장제	2PILL	1회	변비 3일이상 시
9	경구제	코디프로시럽 (20ml)	chlorpheniramine maleate 15㎎ dihydrocodeine tartrate 50㎎ dl-methylephedrine hydrochloride 131㎎ ammonium chloride 1000㎎	진해거담제	1PACK	1회	발작성 기침 시

부록3. 유사발음 의약품 목록

제형	약품명. Ⅰ	사 진.Ⅱ	약품명.Ⅲ	사 진.Ⅳ
경구제	리스페리돈정 1mg		리스펜정 0.5mg	
	푸로칸캡슐		푸로틴캡슐	
	디고신정		디곡신주	
	프리나정		플린다캡슐 150mg	

부록4. 유사외관 의약품 목록

제형	약품명.Ⅰ	약품명.Ⅱ	약품명.Ⅲ
경구제	디고신정	안티로이드정	
	앞: 뒤:	앞: 뒤:	
	도란사민캅셀	데카키논캅셀	
	앞: 뒤:	앞: 뒤:	
	쿠티아핀정100mg	하이페질 10mg	
	앞: 뒤:	앞: 뒤:	

제형	약품명.Ⅰ	약품명.Ⅱ	약품명.Ⅲ
주사제	마리트롤주	덱사메타손주	
	앞: 뒤:	앞: 뒤:	
	판비콤프주	암브록솔주	
	앞: 뒤:	앞: 뒤:	
	한올라니티딘염산염주	클로르페니라민염산염주	
	앞: 뒤:	앞: 뒤:	

부록5. 용량주의 의약품 목록

제형	성분명.Ⅰ	약품명.Ⅱ	사 진.Ⅲ
경구제	gabapentin	뉴로스캅셀 100mg	
		가바렉스캅셀 300mg	
	donepezil hydrochloride	하이페질정 5mg	
		하이페질정 10mg	
	carbidopa monohydrate + levodopa	퍼킨정 25-100mg	
		퍼킨정 25-250mg	
	quetiapine fumarate	쿠티아핀정 25mg	
		쿠티아핀정 100mg	
	propranolol HCl	인데놀정 10mg	
		인데놀정 40mg	
	ginkgo biloba leaf extract	진맥톤정 40mg	
		징코미란정 80mg	
	Risperidone	리스페리돈정 1mg	
		리스펜정 0.5mg	
	Ciprofloxacin	미래시프로플록사신정 250mg	
		씨프록탄정 500mg	
	Oxycodone hydrochloride	마약) 옥시콘틴서방정 10mg	
		마약) 아이알코돈정 5mg	

부록6. 유사코드 의약품 목록

유사 코드 의약품 목록

코드명	약품명	유사 코드명	유사 약품명
10%D/W5	씨제이10%포도당주사액 500ml	10%D/W10	대한포도당주사액(10%) 1000ml
		10%DW50	중외10%포도당주사액 500ml
5%D/S5	중외5%포도당생리식염액500ml	5%D/S10	중외5%포도당생리식염액1000ml
		5%D/W5	대한포도당주사액(5%) 500ml
		5%D/W10	대한포도당주사액(5%) 1000ml
ACYCL	국제아시클로버정	ACYCLO	국제아시클로버크림
ALGI	알기론주사액	ALPIU	알피움정
AMBRO	명문암브록솔주	AMBR	암브렉트정
ARICE10	아리셉트에비스정10mg	ARICE5	아리셉트에비스정5mg
ATIVA2	아티반주사(로라제팜)2mg	ATIVAN	아티반정0.5mg
HYRUA	히루안플러스주	HYALUD	히알루드롭점안액
ATROP	제일아트로핀황산염주사액	ATROV	아트로벤트흡입액유디비2ml
BERAC	베라클	BEROT	베로텍
BUSCO	부스코판당의정	BUSCOI	부스코판주사액
DESOW	데스오웬크림0.05%	DESWON	데스원로션0.05%
DIAZE	대원디아제팜정2mg	DIAZEP	삼진디아제팜주10mg
DIGO	디고신정	DIGOX	아주디곡신주사액
GLUCO	글루코바이정50mg	GLUCON	대한글루콘산칼슘주
GLUCOS	식염포도당정	GLUCO	글루코바이정50mg
INHIB	제일인히베이스정0.5mg	INHIB1	제일인히베이스정1.0mg
LASIX	라식스정	LASIXI	라식스주사
MADOP	마도파정	MADOPH	마도파에취비에스캅셀125
MEDIC	메디카세파클러캡슐250mg	MEDIS	메디락에스장용캅셀
N/S100	중외0.9%생리식염주사액100ml	N/S1000	중외엔에스주사액
		N/S20	대한생리식염주사액 20ml
		N/S500	중외0.9%생리식염주사액500ml
NEURA	뉴라세탐정	NEURO10	뉴로카바캡슐100mg
		NEURO30	뉴로카바캡슐300mg
PENIR	페니라민정2mg	PENIRA	페니라민주사
WATER	대한주사용수	WATERI	관류용멸균증류수 1000ml

부록7. 필요시 처방(PRN)약물 신청서

필요시 처방(PRN)약물 신청서

결재	약사	병원장

상 품 명	(영문)	(한글)	
성 분		함 량	
구 분	☐경구 ☐주사 ☐외용		
☐전문 ☐일반 ☐마약 ☐향정신성			
효능 · 효과			
필요시 처방 약물로 신청하는 사유			
신 청 일	년 월 일		
신청부서 :	신청인 (인)		