3.1.3 통증 관리			
규 정 번 호	3.1.3	제 정 일	
관 련 인증기준	3.1.3 통증관리	최근 개정일	
담 당 부 서	진료부, 간호부	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	1. 통증관련실무지침서 병원간호사회 2010		

▣ 목적 (Purpose)

통증평가와 통증관리를 위한 적절한 체계를 수립함으로써 환자가 겪는 통증이 신체적, 정신적으로 영향을 주어 치료과정에 부정적인 결과를 초래하지 않도록 예방한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 통증관리에 대한 규정이 있다.
2. 외래환자 통증 초기평가를 수행한다.
3. 입원환자 통증 초기평가를 수행한다.
4. 통증평가 결과에 따라 통증을 관리한다.
5. 입원환자 통증 재평가를 수행한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 통증평가 대상

가. 통증 초기평가

1) 외래환자 통증 초기평가

가) 외래 진료의사는 외래 초진환자를 대상으로 다음과 같은 경우 외래환자 통증 초기평가를 시행하고 통증 평가 기록지에 기록한다.

나) 외래 진료의사는 외래 환자가 지참한 소견서 및 진단서를 확인하여 통증을 유발하는 소견이 있거나 환자가 지참한 의약품에 통증 관련 의약품이 있을 경우 통증 사정도구를 사용하여 사정하며 그 외 환자는 통증호소를 할 경우 통증평가를 시행한다.

2) 입원환자 통증 초기평가

가) 병동 간호사는 담당 입원환자 전체를 대상으로 입원 24시간 이내에 통증 초기평가를 시행하고 통증 평가 기록지에 기록한다.

2. 통증 평가도구

※ 통증평가는 신뢰도와 타당도가 검증된 도구를 사용한다.

가. 의사소통이 가능한 경우

1) 숫자 상사 척도(NRS : Numeric Rating Scale)



통증없음 최악의 통증

가) 통증 없음과 극심한 통증을 잇는 0-10점 가로선에 환자가 현재의 통증상태를 표시하게 한다.

나) 왼쪽 끝에서부터 환자가 표시한 지점까지 길이를 숫자로 측정하여 통증을 평가한다.

다) 통증의 강도는 없음(0점), 경도(1-3점), 중등도(4-6점), 중증(7-10점)으로 구분한다.

나. 의사소통이 어려운 환자 : 얼굴통증 척도(FPS, FPRS : Face Pain Rating Scale)



가) 의사소통 장애가 있는 환자의 통증 평가도구로 사용(구음장애나 치매 등 말로 표현하기 어려울 때)

나) 환자로 하여금 자신에게 해당되는 통증의 강도를 손가락으로 짚게하여 점수를 기록한다.

다) 통증의 강도는 없음(0점), 경도(2점), 중등도(4-6점), 중증(7-10점)으로 구분한다.

다. 의사 소통이 불가능한 경우

1) 종류 : FLACC(Face-Legs-Activity-Cry-Consolability Scale)

2) 3세 미만의 소아나 의사소통이 불가능한 환자에게 사용한다.

3) 통증의 강도는 경도(1~3점), 중등도(4~6점), 중증(7~10점)으로 구분한다.

구분	0	1	2	점수
얼굴 (Face)	독특한 표정이 없거나 웃음	가끔 얼굴을 찡그림, 눈살을 찌푸림, 움추림, 무관심	자주, 지속되는 찌푸림, 이를 악물고 있음, 아래턱 떨림	점
다리 (Legs)	정상적 자세 또는 이완됨	불안해 보임, 안절부절 못함, 긴장함	발을 차거나 다리를 들어올림	점
활동 (Activity)	조용히 눕기, 정상적인 자세, 쉽게 움직임	몸부림침, 앞뒤로 이동함, 긴장	아치형으로 됨, 굳음 또는 경련	점
울음 (Cry)	울음 없음(깨거나 잠)	신음소리 또는 끙끙거리는 소리, 때때로 불평함	꾸준한 울음, 비명 또는 흐느낌, 잦은 불평	점
진정됨 (Consolability)	만족함, 이완됨	가끔씩 접촉으로 안정시킴, 안김 또는 대화중 주의 흐트러짐	만족하지 못함 또는 불편함	점
* 만약 환자가 “때때로 찡그리면서, 다리를 불안해하고, 활동은 정상적인 자세로 있으면서, 자주 불평하면서 울고, 가벼운 접촉으로 안정된다. → 1+1+0+2+1=5점으로 매긴다.				

출처 : Mrkel S. (1977). A behavioral scale for scoring postoperative pain in young children Pediatric Nursing.

4) 입원 시 모든 환자를 대상으로 간호사가 통증평가도구를 이용하여 통증을 평가한다.
5) 초기 평가 내용 : 통증의 유무, 위치, 강도, 양상, 빈도, 기간 등
6) 통증평가결과를 통증평가기록지에 기록한다.

3. 통증 초기평가는 입원 시 통증의 유무, 위치, 강도, 양상, 빈도, 기간 등을 평가한다.

4. 통증 중재 방법

※ 통증평가 결과에 따라 통증완화를 위한 중재를 시행한다.

가. 약물요법 : 처방에 의한 진통제를 투여하고 통증 후 재평가는 비정기적 재평가에 따라 중재 후 효과를 평가한다.

나. 비약물요법 : 이완요법, 냉온요법, 물리치료 등을 중재 후 익일(翌日) 효과를 평가한다.

5. 통증 재평가

※ 통증 재평가 도구는 초기평가와 같은 도구를 사용하여 통증평가기록지에 기록한다.
※ 통증이 없는 환자는 환자평가표 내 통증 유무 평가기록으로 갈음이 가능하다.

1) 정기적 재평가
가) 모든 환자는 매월 1일 간호사가 재 평가를 실시한다.
나) 마약성 진통제(경구, 주사, 패취제)를 정기적으로 투여하는 환자는 매일 1회 간호사가 재평가 한다.
다) 통증 조절을 목적으로 정기적인 주사 처치가 있는 경우는 매일 1회 Day 간호사가 재평가 한다.

2) 비정기적 재평가(입원 환자 상태 변화 시)
가) 환자 통증 호소시 통증평가를 실시 하고 통증 중재 시점은 NRS 4점, FPS 4점, FLACC4점 이상 시 통증 중재를 실시 한다.
나) 환자가 통증을 호소하여 간호중재를 실시 했을 때 약물 효과 및 통증평가를 위하여 경구 투약 1시간 이후, 주사제 투여시에는 투약 30분 후, 마약성 패치 부착 2시간 후 간호사가 재평가를 실시 한다.
다) 통증평가 종료시점은 2점 이하이다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 통증 평가도구(NRS, FPS)
2. 통증 평가도구 FLACC

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록 1. 통증 평가도구(NRS, FPS)

통증 정도 평가 기록지

1. 통증 유무 ☐유 ☐무 ☐측정불가

2. 통증 위치 ☐허리 ☐무릎 ☐복부 ☐전신 ☐기타

3. 통증 강도

1) NRS (Numeric Rating Scale) ☐선택

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
통증 없음					중간 통증					심한 통증
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

2) FPS (Faces Pain Scale) ☐선택

					
통증이 없음 0	조금 아프다 2	아프다 4	많이 아프다 6	매우 아프다 8	상상할 수 없는 가장 심한정도 아프다 10
○	○	○	○	○	○

☐단계표시

4. 통증 양상

☐욱신욱신하다 ☐쑤시다 ☐결리다 ☐쓰리다 ☐저리다 ☐타는듯하다
☐찌르는듯하다 ☐뻐근하다 ☐베인듯하다 ☐묵직하다 ☐따끔하다 ☐화끈거리다
☐표현못함 ☐기타

5. 통증 빈도 ☐간헐적 ☐지속적 ☐발작적 ☐기타

6. 통증 기간

7. 간호 중재

1) 피부자극법 ☐표피마사지 ☐지압/진동 ☐냉/온도법 ☐파스도포 ☐기타

2) 약물중재 ☐마약성 ☐비마약성 ☐보조진통제 ☐항우울제 ☐항경련제 ☐기타

- 약품

3) 기타

8. 환자 반응 ☐완화 ☐지속 ☐악화 ☐기타

작 성 자 : (인)

부록 2. 통증평가도구 FLACC

항 목	점 수	내 용	선 택
얼굴 (Face)	0	특별한 표정이 없거나 웃음	✓
	1	가끔 얼굴을 찡그림, 눈살을 찌푸림, 움츠림, 무관심함	✓
	2	자주 또는 지속적인 턱의 떨림, 이를 악물고 있음	✓
다리 (Legs)	0	정상 자세 또는 이완됨	✓
	1	불안함, 거북함, 긴장됨	✓
	2	발로 차거나 다리를 끌어올림	✓
활동 (Activity)	0	조용히 누워있거나 정상자세, 쉽게 움직임	✓
	1	꿈틀댐, 몸을 앞뒤로 뒤척거림, 긴장됨	✓
	2	몸을 구부리고 뻣뻣함, 또는 경련	✓
울음 (Cry)	0	울지 않음	✓
	1	끙끙댐, 흐느낌 또는 훌쩍댐	✓
	2	지속적인 울음, 소리침, 흐느낌, 잦은 불편감 호소	✓
마음의 안정도 (Consolability)	0	이완됨	✓
	1	가끔 안아주거나 접촉을 하여 안심시키는 것이 필요함. 관심을 다른 곳으로 돌리기 위해 대화가 필요함	✓
	2	안정되기 어려움	✓

출처 : Merkel S. (1997). A behavioral scale for scoring postoperative pain in young children. Pediatric Nursing, 23(3)

작 성 자 : (인)