3.1.5 욕창관리			
규 정 번 호	3.1.5	제 정 일	
관 련 인증기준	3.1.5 욕창관리	최근 개정일	
담 당 부 서	진료부, 간호부	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거			

▣ 목적 (Purpose)

욕창발생을 최소화하기 위해 욕창관리를 위한 적절한 체계를 수립하고 필요한 경우 욕창간호를 제공한다.

▣ 용어 정의 (Definition)

- 욕창 : 신체의 일정한 부위에 압력 혹은 마찰과 전단력이 결합한 압력이 지속적 또는 반복적으로 가해져, 모세혈관 순환장애로 인한 허혈성 조직괴사로 생기는 피부나 하부조직의 손상 상태 (NPUAT, 2007).
- 욕창 위험도 평가 : 타당성을 인정받은 욕창 위험도 평가도구를 사용하여 욕창위험요인을 예측하여 평가하는 것 : Braden scale
- 욕창 예방 활동 : 욕창발생 위험환자와 욕창환자를 대상으로 환자의 피부상태를 관찰하고 자세변경이나 필요 시 기타 예방중재를 시행하는 일련의 행위

▣ 정책 (Policy)

1. 욕창 예방관리에 대한 규정이 있다.
2. 욕창 위험 평가도구를 이용하여 환자 입원 시 초기평가를 수행한다.
3. 욕창 위험 평가에 따라 고위험환자에 대한 욕창 예방활동을 수행한다.
4. 욕창 위험 평가도구를 이용하여 정기적인 재평가를 수행한다.
5. 욕창이 발생한 환자에게 욕창 관리활동을 수행한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 욕창 위험도 평가

가. 평가 대상 : 모든 입원환자를 대상으로 욕창 위험 평가를 실시한다.

나. 평가 도구 : 욕창 위험 평가 도구는 신뢰도와 타당도가 입증된 도구을 사용하며 본원은 Braden Scale을 사용하여 평가한다.

다. 평가 주기

1) 초기평가 : 모든 입원환자를 대상으로 입원 24시간 이내 욕창 초기평가를 실시한다.

2) 정기적 재평가

- 모든 환자 : 매월 1일 Day 간호사가 시행한다.

3) 비정기적 재평가 : 전동 시 받는 부서, 급격하게 신체상태가 악화되었을 경우 실시 주기와 관계없이 환자상태의 변화에 따라 즉시 시행하는 재평가

2. 욕창 위험 분류 기준

분류	중증도	점수
욕창발생 고위험군	최고위험군	9점 이하
	고위험군	10~12점
욕창발생 위험군	중증도 위험군	13~14점
	저위험군	15~18점
비위험군		19점 이상

3. 평가결과에 다른 고위험환자의 욕창 예방 활동

가. 욕창 발생 고위험군(Braden scale : 12점 이하)에게 다음과 같이 욕창예방간호를 수행한다.







1) 손위생을 수행한다.
2) 매 2시간 마다 체위변경을 시행한다.
3) 피부 상태를 관찰하고 항상 청결하게 유지하며 실금 및 잦은 설사 환자는 주의를 요한다.
4) 실금이나 설사로 인하여 피부에 문제가 생길 거라고 예상되는 경우 또는 생긴 경우 필요시 상처 제품을 사용하여 피부를 보호할 수 있다.
5) 침상머리는 30도 이하로 유지하며, 완전 측위보다는 30도 측위를 한다.
6) 베개나 매트리스를 사용하여 발꿈치나 발의 뼈 돌출부에 가해지는 압력을 제거한다.
7) 홑이불의 주름, 각종 라인 및 물품에 의해 환자의 피부가 눌리지 않도록 한다.
8) 치료 상 금기사항이 아니면 충분한 수분을 섭취하도록 한다.
9) 필요시 치유에 필요한 영양공급을 위한 식이를 제공한다.
10) 건조한 피부에 보습제를 사용한다.
11) 욕창을 악화시키지 않는다면 휠체어 보행을 하도록 격려하고 압력을 고려하여 30분 이내로 하도록 한다.
12) 수행한 욕창 예방 활동에 대하여 전자의무기록(EMR)에 예방활동 Check list를 기록한다.

4. 욕창 발생 환자 욕창 관리활동

가. 욕창 분류 기준 : 욕창위치, 단계, 크기(cm)를 사정하여 기록한다.

1) 욕창위치 : 욕창이 생긴 환자의 신체부위를 기록한다.
2) 욕창단계(grade of stage) : 욕창의 침범정도 및 삼출물 등을 통하여 피부의 손상정도를 나눈다.
3) 욕창크기 : 가로, 세로의 정확한 크기를 'cm'로 기록하는 것으로, 그림으로 기록 가능하다.

욕창의 크기	측정 방법
	길이 : 제일 긴 쪽을 측정한다.(세로) 너비 : 제일 긴 쪽을 측정한다.(가로)

단계			증상	침범부위	피부색
		Stage I (Lightly Pigmen t-ed)	압력제거 후 피부 발적이 30분 이내에 정상 피부색으로 돌아오지 않는다.	눌러도 창백해지지 않는 홍반	
		Stage Ⅱ	수포, 경결이 생기며 괴사조직은 없다. 상처부위는 붉고 습하며 통증이 없다.	피부부분 소실 피하지방 노출	Red
		Stage Ⅲ	전층 피부손상상태로 피하층이 노출되나 근막, 근육, 또는 뼈는 노출되지 않는다. 동로와 잠식의 형성이 가능하다.	진피·피하조직까지 침범 Cavity, 분비물	Yellow
		Stage IV	근막, 근육, 뼈, 지지조직(건, 인대 등)이 노출되고 부육조직 또는 건조가피가 있을 수 있으며 동로와 잠식 형성 가능	피하조직·근육·건·뼈가지 침범	Black
		5번단계 불가능	전층 피부손상상태이나 부육 조직 또는 가피조직으로 상처기저부가 덮여 있음	조직의 손상 깊이를 알 수 없는 상태	Dark eschar
		6번 심부조직손상의심	피부손상이 없는 보라색 또는 적갈색의 부분적 피부변색 혹은 혈액이 찬 수포를 말한다.	심부조직의 손상의심 상태	Violet Reddish Brown

나. 욕창 간호 및 치료 등

1) 보호자에게 확인시키고 설명한다.
2) 욕창간호를 실시하고 기록한다.
3) 담당의사는 욕창부위를 평가하고 해당부서에 협의진료가 필요할 경우 이를 의뢰하며, 경과

기록지에 치료계획에 대해 기록한다.

4) 욕창이 발생한 원인을 제거하거나 감소시키는 적절한 처치를 한다.
5) 적절한 영양 상태를 유지하고 운동을 시킨다.
6) 담당의사의 지시에 따른 적절한 처치, 필요시 괴사조직제거, 세척, Dressing, 외과적 시술 필요시 협진의뢰를 요청한다.

5. 욕창발생 보고

가. 욕창이 발생한 경우 해당병동에서는 담당의사와 QPS전담자에게 발생 사실을 보고한다.

나. 간호사는 욕창발생보고서를 작성하여 QPS전담자에게 제출한다.

다. 욕창이 발생한 경우 월1회 욕창 사진 및 욕창의 크기, 부위, 단계 등을 간호기록에 작성한다.

라. 입원 전 발생하여 입원 시 확인한 욕창은 간호기록에만 남기고 욕창발생보고서는 제출하지 않는다.

▣ 부록 (Appendix)

1. Braden Scale(욕창사정도구)
2. 욕창예방활동 체크리스트
3. 체위변경 점검일지
4. 욕창발생보고서

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름	윤 성 일	서명	
승 인 일	2024년 04월 23일				

부록1. Braden Scale(욕창사정도구)

Braden Scale(욕창사정도구)

항 목	평 가	설 명	선 택
기동력 (Mobility)	1 = 완전히 못 움직임	직원의 도움없이 전혀 자세교환 못함	✓
	2 = 매우 제한됨	스스로 약간 가능하나 대부분 의지 (뒤집기, 앉기 가능)	✓
	3 = 약간 제한됨	스스로 체위변경 가능하나 원활하지 못해 간병인의 도움 필요	✓
	4 = 자유로움	스스로 모든 신체 위치변경 가능	✓
영양 (Nutrition)	1 = 매우 나쁨	제공된 음식 1/3 이하 섭취 몇 숟가락만 먹음 수액치료는 못 받음	✓
	2 = 부족한 섭취	제공된 음식 1/2 정도 섭취	✓
	3 = 적당한 섭취	제공된 음식 1/2 이상 섭취	✓
	4 = 좋음	제공된 음식 대부분 잘 섭취	✓
마찰과 찰과상 (Friction & shear)	1 = 문제있음	자주 침대나 의자에서 미끄러짐 구축, 강직 등으로 항상 마찰 부위 생김	✓
	2 = 잠정적 문제	약간의 미끄러짐이 우려됨	✓
	3 = 문제없음		✓
감각지각능력 (Sensory)	1 = 완전 못느낌	통증에도 반응 없음	✓
	2 = 매우 제한됨	통증에만 반응하고 다른 자극에 반응없음	✓
	3 = 약간 제한됨	반응을 보이나 말로 표현 못함	✓
	4 = 제한없음	항상 본인의 불편과 통증을 호소함	✓
습기 (Moisture)	1 = 항상 젖어있음	대, 소변 조절 못함	✓
	2 = 자주 젖어있음	자세 교환시마다 (2시간) 린넨 갈아야 함 대변이나 소변을 24시간에 적어도 한번 실금	✓
	3 = 약간 젖어있음	하루 한번이상 린넨 갈아야 함	✓
	4 = 거의 없음	정상적으로 린넨 교환	✓
활동 (Activity)	1 = bed ridden	계속 침대에 누워 있어야함	✓
	2 = chair 의존	보행능력 거의 없음	✓
	3 = 가끔 걸음	때론 걸으나 짧은 거리만 가능	✓
	4 = 걸어다님	적어도 하루 2번 정도는 산책가능	✓

작 성 자 : (인)

부록2. 욕창예방활동 체크리스트

욕창예방 활동 및 간호관리(년)

등록번호: 이름: 성별/나이: / 호실:

간호계획 및 실시																		
	D	E	N	D	E	N	D	E	N	D	E	N	D	E	N	D	E	N
2시간마다 체위변경/시트 주름 제거																		
머리 30도 측위 유지시 30도 이하 유지																		
공기침대 사용과 기능점검																		
환자 옮길 때 끌지 말고 들어서 옮김																		
도넛쿠션 사용하지 않도록 확인																		
피부상태 확인 정상적인 피부 마사지 시행																		
뼈 돌출 부위 눌리지 않도록 베개등으로 지지																		
균형 있는 음식 섭취 권장																		
실근 실변 설사시 즉시 청결 유지																		
피부 건조 상태 유지 젖은 침구 환의 즉시 교환																		
반창고 자극 마찰로 인한 찰과상 타박상이 생기지 않도록 주의																		
D 서 명																		
E 서 명																		
N 서 명																		

부록3 체위변경점검일지

욕창 고위험군 체위변경표

등록번호	0000001645	성명	강옥점	성별/연령	여 / 91세	병실	715호

자세	측위	앙와위	측위	앙와위	측위	앙와위	측위	앙와위	측위	앙와위	측위	앙와위
시간	08-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24	24-02	02-04	04-06	06-08
2026 년 07 월												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

NATURE 네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

부록4. 욕창발생보고서

욕창 발생 보고서

결재	담당의사	QPS

이 름:		진료과		병실	
등록번호:		입원일			
성별/나이: /		진단명			
보고일	년 월 일		보고자		
욕창발생일	년 월 일				
욕창 발생 구분	☐입원전 (자택/타원) ☐입원후				
욕창 발생 보고	☐주치의 ☐질향상과 환자안전위원회				
욕창 평가 원인	☐부동 ☐의식불명 ☐실변/실금 ☐감각장애 ☐혈액학적 불안정 ☐기타				
욕창 평가 점수 (Braden Scale)	☐초기사정 : 점(년 월 일) ☐욕창 발생전 사정: 점(년 월 일)				
욕창 사진	위치				
	크기	X X cm (길이x폭x깊이)	X X cm (길이x폭x깊이)	X X cm (길이x폭x깊이)	
	단계	Stage ☐1 ☐2 ☐3 ☐4	Stage ☐1 ☐2 ☐3 ☐4	Stage ☐1 ☐2 ☐3 ☐4	
	사진				
욕창단계	[피부평가 척도] -stage Ⅰ: 피부가 벗겨짐 없이 지속적으로 발적된 상태 (발적부위를 눌렀다 떼어도 색깔변화 없음) -stage Ⅱ: 붉게 된 부위에 수포, 구진, 딱지, 배출물, 표면보다 보이지 않는 부분이 넓음 (진피손상) -stage Ⅲ: 피하층과 근막 표면까지 침범된 피부손상 -stage Ⅳ: 근육과 뼈가 보이고 근육, 골, 건까지 포함하여 cavity가 형성된 상태				
욕창예방간호	☐ 2시간 마다 체위변경 및 마사지 ☐ 관절범위 운동 ☐ 보조기구: 기침대 (Air matt) ☐ 기타				

보고일 : 년 월 일

보고자 : 수간호사 :