4.4 투약 및 모니터링			
규 정 번 호	4.4	제 정 일	3주기 규정집 제정
관 련 인증기준	4.4 투약 및 모니터링	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	간호부, 약제과	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거	1. 주사제 안전사용 가이드라인 2. 보건복지부 유권해석 및 지침		

▣ 목적 (Purpose)

안전한 의약품 투여를 위해 직원교육, 투약설명, 의약품의 보관, 주의사항 및 부작용 발생 시 대처방안을 수립하여야 한다.

▣ 용어 정의 (Definition)

- 투약설명 : 환자의 의약품 치료에 필요한 의약품에 대하여 기본정보(의약품명, 용법, 용량, 효능 및 효과, 이상반응, 의약품 상호작용 등)를 제공하는 것
- 지참약 : 환자가 내원 시 외부에서 가져온 약 등

▣ 정책 (Policy)

1. 의약품 투여에 대한 규정이 있다.
2. 적격한 자가 의약품을 안전하게 투여한다.
3. 고위험의약품 투여 시 주의사항 및 부작용 발생 시 대처 방안을 알고 수행한다.
4. 적격한 자가 투약 설명을 수행한다.
5. 의약품 사용 후 안전하게 폐기한다.
6. 지참약을 관리한다.
7. 의약품 부작용 발생 시 보고한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 의약품 투여

가. 투여 수행자 : 의사, 간호사

1) 의약품 투여가 적격한 자는 안전한 의약품 투여를 위해 자격 및 면허에 따라 보수교육을 이수 하여야 한다.

나. 의약품 투여 시 필요한 정보 확인

1) 모든 투여는 의사의 처방에 따른다.
2) 투약 준비
   가) 의사의 '처방과 의약품 간', '의약품-환자 간' 환자정보 및 투약정보를 정확하게 확인한다.
      (1) 의사 처방이 기록된 처방전이나 투약리스트(투약 카드 포함)간에 의약품을 확인한다.
      (2) 의약품 포장지에 라벨링된 환자이름과 등록번호가 환자인식밴드의 환자이름과 등록번호가 일치하는지 대조하여 확인한다.
   나) 투약의 5 Right(정확한 환자, 정확한 의약품, 정확한 용량, 정확한 시간, 정확한 투여경로)를 정확하게

준수한다.

다) 투약하는 의약품에는 환자이름, 등록번호, 약품명, 투여경로, 용량, 투여시간이 포함된 라벨을 부착한다(경구약은 약포지가 라벨을 대신한다).

라) 의약품 투여 시 필요한 의료기기, 치료재료 등 주의사항을 확인한다.

마) 투여의약품의 침전물 유무, 변색여부, 부유물 유무 등 이상여부를 확인한다.

다. 투여 기록

1) 투여 시 확인한 정보(5 Right)등 의약품명, 투여용량, 투여경로, 투여시간등을 투여 전자의무기록(EMR/OCS)으로 기록한다.

2) 이상반응 발생 시 담당의에게 연락하고 조치사항을 기록한다.

2. 고위험의약품 투여 시 주의사항 및 부작용 발생시 대처 방안

가. 의약품 특성과 오류 예방을 줄이기 위하여 의약품 주입기(Regulator Dosi Flow 등) 사용 시유량조절기 등을 확인하여 지속적인 주입상태, 정확한 용량 투여를 확인하고 간호기록한다.

나. 고위험 의약품의 목록

1) 고농도 전해질

2) 인슐린 주사제

3) 헤파린 제제

다. 고위험 의약품 사용 시 주의사항

1) 희석이 필요한 의약품 일 경우 반드시 희석하여 투여한다.

2) 혈관 외 유출이 발생한다면 괴사를 야기할 수 있으므로 혈관의 개존성을 반드시 확인한다.

3) 고농도로 급속 투여 시 심정지, 정맥염, 국소 통증, 정맥 자극감을 유발할 수 있으므로 서서히 투여한다.

4) 희석한 용액이 혼탁한 경우에는 투여하지 않는다.

5) 투여 후 환자 상태를 관찰한다.

라. 고위험 의약품 부작용 발생 시 대처 방안

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">구 분</th><th colspan="3">주의관찰 및 부작용 발생 시 대처방법</th></tr>
<tr><th>부작용</th><th>주의관찰</th><th>대처방법</th></tr>
<tr><td rowspan="5">고농도 전해질</td><td rowspan="3">KCl</td><td>부정맥</td><td>호흡이상, 의식저하 여부</td><td rowspan="5">-즉시 주입중단
-의사보고
-응급처치</td></tr>
<tr><td>심정지</td><td>의식저하 여부</td></tr>
<tr><td>정맥염</td><td>주사부위 통증, 발적</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Nacl</td><td>심부전</td><td>호흡곤란</td></tr>
<tr><td>고나트륨혈증 쇼크</td><td>의식저하</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">인슐린</td><td rowspan="2">저혈당
(50mg/dl)</td><td rowspan="2">땀흘림, 불안, 손떨림, 구역질, 어지럼증, 두통, 기면상태, 어눌한 말투</td><td><의식이 있는 경우>
즉시 당을 먹인다.(예 : 과일주스, 요구르트 한 개 이상)</td></tr>
<tr><td><의식이 없는 경우>
고농도 포도당용액 IV</td></tr>
<tr><td colspan="2">헤파린</td><td>출혈</td><td>코피, 혈뇨, 혈변 등의 출혈, 소견</td><td>-즉시 주입중단
-의사보고
-응급처치</td></tr>
</table>

3. 투여 시 주의가 필요한 의약품 설명

가. 투여 설명이 필요한 의약품을 투여하는 입원환자 및 외래환자에게 투약 설명을 실시하고 외래환자는 약사가, 입원환자는 담당의사가 설명한다.

나. 투여 시 설명이 필요한 의약품의 목록은 약물관리위원회에서 매년 1회 심의 후 결정하고 병원 게시물 을 통하여 관련부서 간 공유한다.

다. 투여 시 설명이 필요한 의약품 : 항응고제, 항혈전제, 항암화학요법, 연역억제제, 인슐린제제, 흡입(천식) 치료제 중 원내 사용 약물에 한하여 의약품 설명(효능, 부작용, 용법, 주의사항 등)을 실시한다.

라. 적격한 자 : 업무와 관련된 충분한 교육을 받은 의사 및 약사

※ 투여 시 주의가 필요하여 설명이 필요한 의약품을 지정하여 복약지도를 실시하고
그 외 투약 설명은 간호사도 가능하며 그 외 투약 설명이 필요한 경우 설명이 필요한 의약품의 목록은 병원운영위원회에서 결정한다.

마. 설명 시점 : 의약품의 투약 시작 시 또는 필요 시

4. 의약품 폐기

가. 모든 의약품은 그 특성에 따라 안전하게 폐기하여야 한다.

나. 고위험 의약품 : 원칙적으로 사용하고 남은 약은 즉시 폐기하며 고농도 전해질, 인슐린, 헤파린은 [4.2 의약품 보관] 규정에 따라 보관 및 폐기한다.

다. 마약류 폐기는 관련법에 따른다.[마약류 관리에 관한 법률 제 12조 및 동법 시행규칙제 21조]

라. 사고 마약류 처리 일 경우 [마약류 관리에 관한 법률 제 12조 및 동법 시행규칙 제 23조] 에 따라 폐기한다.

1) 재해로 인한 상실(**喪**失)
2) 분실 또는 도난
3) 변질 / 부패 또는 파손

가) 위 항목에 해당 하는 사유가 발생 하였을 경우 약사 또는 마약류 관리 보조자는 그 사실을 지체 없이 약사에게 보고하고 약사는 병원장에게 보고 하여 관련법에 의하여 처리한다.

나) 사고마약류가 발생할 경우 사고발생을 안 날로부터 5일 이내에 보고서에 사고발생경위에 대하여 육하원칙에 맞게 상세히 기재하고 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 관할 보건소에 제출하여야 한다. 마약류 관리에 관한 법률 시행규칙 (별지. 제25호 서식)

마. 사용 중인 다용량제제는 보관방법에 준하여 안전하게 보관하고 사용이 종료될 경우 폐기한다.

바. 불량, 변질, 파손, 유효기간 경과등의 사유가 발생한 의약품은 불량 파손 보고서를 작성하여 약제과로 반납하고 약국에서는 절차에 따라 교환, 반품하거나 폐기한다.

사. 의약품 폐기로 인해 약제과로 반납하기 전 사용부서에서 일시적으로 보관할 경우 [폐기의약품]으로 라벨링(필요시 환자정보, 개봉일자, 폐기일자)하고 분리 보관한다.

아. 약제과로 폐기 의뢰된 의약품은 약사가 의약품 폐기대장에 기록하고 약국에 비치된 폐기 의약품 수거용기에 처리한다.

5. 입원 시 지참약 관리

가. 지참약이란 환자가 내원 시 외부에서 가져온 약 등을 의미 한다.

나. 지참약 확인 절차

1) 입원 시 상담직원 또는 의사는 환자 또는 보호자에게 투약 관련 정보를 확인하고 지참약있는 경우 관련

정보(처방전, 복약설명서 등)를 가지고 오도록 안내한다.

2) 해당 병동 간호사는 입원 시 지참약 소지여부를 확인한다.

3) 입원 시 지참약의 처방전이나 복약설명서 등 관련정보를 이용한 의약품식별 결과에 따라 허용여부를 결정한다.

4) 담당의는 입원 당일 지참약을 식별할 수 있는 관련정보가 없는 경우 병동 간호사에게 지참약 식별 의뢰를 지시한다.

5) 간호사는 담당의로부터 지참약 식별의뢰 지시가 있는 경우 약품식별의뢰서를 작성하여 의약품과 함께 약국에 의뢰한다.

6) 지참약 식별을 외뢰를 받은 약사는 의약품식별을 시행하여 회신한다.

가) 약사 부재로 인하여 지참약 식별이 불가능 한 경우 담당의는 지참약 복용의 필요 여부를 판단하고 의약품 조회 가능 홈페이지(www.druginfo.co.kr)에서 조회 후 지참약을 처방한다.

다. 지참약 처방 원칙

1) 환자가 입원 시 외부에서 가져온 의약품이 있는 경우 지참약의 식별결과와 환자의 상태 및 담당의사의 판단에 따라 지참약의 투여를 결정한다.

2) 환자의 자가 투여는 허용하지 않는다. 단, 비타민, 건강보조 식품 등이나 자가투여 방법 교육 등의 목적이 있는 경우 담당의사의 결정에 따라서 자가 투여를 허용할 수 있다.

3) 담당의사의 결정에 따라 환자가 가지고 있는 모든 약에 대해서 원내 투약을 허용하지 않을 수 있다.

4) 지참약을 재원 중 계속 복용할 필요가 있는지 또는 환자의 질병상태에 따라 지참약의 복용을 중단하거나 혹은 일부만 복용하는지 여부를 검토하여 결정된 사항을 환자나 보호자에게 알린다.

5) 지참약의 계속적인 복용이 필요한 경우 처방한다.

6) 지참약 복용이 완료되면 동일 의약품이 원내에 있는 경우 본원약 대체 여부를 결정하며, 가능한 원내의 약품으로 대체하며 원내 대체의약품의 조회가 필요한 경우 담당의사는 약사에게 유선으로 대체의약품에 대한 정보를 확인한다.

라. 지참약 정보 공유 절차

1) 담당의 : 지참약의 정확한 투여를 위해 담당의는 투약되는 지참약 내용을 EMR에 등록하여 처방하며 이때 의약품명, 용량, 투여경로, 용법(투여횟수)을 정확하게 기입하여 치료진간 정보 공유 한다

2) 약사 : 약사는 지참약 조회 의뢰가 있을 경우 지참약 식별 회신 내용을 기록지 기록하여 치료진간 정보 공유 한다. 지참약의 재포장이 필요한 경우 원내 의약품 조제 절차에 따라 재 포장 후 해당 병동으로 불출한다.

가) 재포장이 필요한 경우 : 5right가 일치 하지 않는 경우, 포장지가 손상된 경우
담당의의 지시하에 개별 약포지의 의약품 중 투여가 중지된 의약품이 있어 제외 할 경우 등

3) 간호사 : 간호사는 투약 후 투약시간, 투약자를 EMR(Acting)에 기록한다.

마. 지참약 보관 방법

1) 투약이 결정된 지참약은 환자가 임의로 복용하는 일이 없도록 환자 및 보호자로부터 회수하여 원내처방 의약품과 구분된 별도의 장소에 보관하여야 한다.

2) 지참약 보관 시 환자명과 등록번호를 기입한다.

3) 투약하지 않기로 결정된 지참약은 보호자에게 즉시 반환하여 돌려주거나 그러하지 못한 경우 다른 지참약과 분리하여 별도의 장소에 보관하며 퇴원 시 환자 및 보호자에게 충분한 안내를 제공한 후 반환한다.

4) 환자 및 보호자가 입원 시 지참약의 회수에 불응하는 경우 지참약 자가 보관의 위험성을 충분히 설명한

후 지속적으로 투약 및 보관 상황을 확인한다.

5) 마약류가 포함된 지참약은 지참마약의 오남용 및 분실 예방을 위하여 고정 된 보관장에 잠금장치하여 보관한다.

바. 환자 및 보호자 교육

1) 환자는 의료진에게 현재 복용중인 의약품의 존재여부를 고지하도록 한다.
2) 지참약의 복용여부는 담당의사의 결정에 따르도록 한다.
3) 의료진에게 보고하지 않은 의약품을 임의로 복용하지 않도록 한다.
4) 지참약 복용 안내문을 통하여 환자 및 보호자에게 지참약 복용금지에 대한 안내 및 교육을 시행한다.

6. 의약품 부작용 보고 절차

가. 원내 보고

1) 간호사는 의약품으로 인해 의심되는 환자의 반응이 발견되는 즉시 담당의사에게 알리고 환자안전 사고 보고서를 작성하여 QPS 전담자에게 제출한다.
2) 의사는 의약품 처방과 투여의약품을 확인하고 약사의 협조를 받아 관련의약품의 인과관계를 조사하여 QPS위원회 및 병원장에게 보고한다.
3) 담당의는 약사의 의견을 포함하여 약물이상 반응에 대해 최종 인과성을 평가하여 의약품 투여계획을 재수립한다.

나. 원외보고

1) 의약품 부작용 이 발생 했을 경우 약사법 제 68조의 8(부작용 등의 보고)에 의거하여 병원장은 온라인은 의약품안전나라(nedrug.mfds.go.kr)로 또는 오프라인은 지역의약품안전센터(삼성서울병원) 통해 보고한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 환자용 복약 안내문
2. 마약류 의약품 잔량 반납대장
3. 지참약 식별 의뢰서
4. 지참약 복용 안내문
5 의약품 사고 발생 의뢰·회신서

▣ 규정 개정일 [누적]


2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

승 인 책 임 자	병원장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록1. 환자용 복약 안내문

복약 설명 안내문

아스피린장용정100mg[한미]

환자이름		등록번호		나이/성별	
병실		☐ 입원 ☐ 퇴원 ☐ 외래			
설명일자	20 년 월 일		담당의사		
약품사진			약품명	아스피린장용정[한미]	
			350 성분명	Aspirin enteric costed 100mg	
효능·효과	항혈전, 혈소판 응집 억제제 (Antithrombotic, Antiplatelet Agent)				
용법·용량	경구제. 성인 1일 1회 100mg. 장용정이므로 씹거나 부수지 말고 통째로 복용.				
복용시 주의사항	1. 아스피린을 함유하는 제제는 위장관 출혈의 이상반응으로 인하여 공복에 투여하지 않는 것이 일반적이나 이 제제는 장용정이므로 충분한 물과 함께 식전에 복용할수 있다. 2. 출혈의 위험이 있으므로 수술을 하는 경우에는 담당의사에게 아스페린 제제를 복용하고 있음을 알리고 상담을 실시하여야 한다.				
부작용	1. 위장 장애: 속쓰림, 위염, 위궤양, 소화불량 등 2. 출혈 위험 증가: 잇몸, 출혈, 코피, 멍 등 3. 신장 및 간 기능 저하: 부종, 피로감, 황달 등 4. 과민반은: 피브발진, 두드러기, 호흡곤란 등				

설명대상자
이름 (서명)

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

네이처 요양병원
전화: 02-575-5114
주소: 서울특별시 강남구 세곡동 612번지

복약 설명 안내문

명인디스그렌캡슐150mg

환자이름		등록번호		나이/성별	
병실		☐ 입원 ☐ 퇴원 ☐ 외래			
설명일자	20 년 월 일		담당의사		
약품사진			약품명	명인디스그렌캡슐	
			성분명	Triflusal 150mg	
효능·효과	항혈전, 혈소판 응집 억제제 (Antithrombotics, Antiplatelet Agent)				
용법·용량	경구제. 성인 1일 300mg~900mg을 식사중 또는 식후에 분할 복용. 예방용량: 매일 또는 격일, 1일 300mg을 경구 투여한다 유지용량: 1일 600mg을 경구 투여한다				
복용시 주의사항	1. 경구용 혈당강하제의 작용을 증강시킬수 있으므로 병용 투여시에는 혈당강하제의 용량을 감량한다. 2. 항응고제 요법을 받고 있는 환자에게 이약을 투여하면 항응고제의 효력을 증가시킬수 있으므로 주의하여 투여한다.				
부작용	1. 위장장애: 속쓰림, 소화불량, 구역, 위통 2. 출혈: 코피, 멍, 결막출혈, 위장관 출혈 3. 신경계: 두통, 어지럼증 4. 과민반응: 발진, 알레르기 반응				

설명대상자

	이름 (서명)
네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL	네이처 요양병원 전화: 02-575-5114 주소: 서울특별시 강남구 세곡동 612번지

복약 설명 안내문


클로본스정75mg

환자이름		등록번호		나이/성별	
병실		☐ 입원 ☐ 퇴원 ☐ 외래			
설명일자	20 년 월 일		담당의사		
약품사진			약품명	트롬빅스정	
			성분명	Clopidogrel bisulfate 97.875mg (Clopidogrel 75mg)	
효능·효과	항혈전, 혈소판 응집억제제 (Antithrombotic, Antiplatelet Agent)				
용법·용량	경구제. 1일 1회 75mg 복용.				
복용시 주의사항	1. 출혈 위험이 있으므로 멍, 코피, 혈변 등이 나타나면 의료진과 상담한다. 2. 수술 또는 치과 시술 전에는 복용 중임을 반드시 알린다. 3. 임의로 복용을 중단하지 않는다. 4. 다른 항응고제 또는 NSAIDs와 병용 시 출혈 위험이 증가할 수 있다.				
부작용	1. 출혈: 멍, 코피, 위장관 출혈 2. 위장장애: 복통, 소화불량, 설사 3. 신경계: 두통, 어지럼증 4. 과민반응: 발진, 가려움증, 드물게 혈관부종				

설명대상자	
이름 (서명)	
네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL	네이처 요양병원 전화: 02-575-5114 주소: 서울특별시 강남구 세곡동 612번지

복약 설명 안내문

엘리하이정5mg

환자이름		등록번호		나이/성별	
병실		☐ 입원 ☐ 퇴원 ☐ 외래			
설명일자	20 년 월 일		담당의사		
약품사진			약품명	엘리하이정	
			성분명	Apixaban 5mg	
효능·효과	항응고제, 직접 Xa인자 억제제 (Anticoagulant, Direct Factor Xa Inhibitor)				
용법·용량	경구제. 성인 1일 2회 5mg 복용. 음식과 관계없이 복용 가능하다.				
복용시 주의사항	1. 출혈(멍, 코피, 혈변 등) 증상이 나타나면 즉시 의료진과 상담한다. 2. 임의로 복용을 중단하지 않고 절대로 2회분을 한꺼번에 복용해서는 안 됩니다. 3. 수술이나 치과 시술 전에는 복용 중임을 반드시 알린다. 4. 다른 항응고제, 항혈소판제 또는 NSAIDs와 병용 시 출혈 위험이 증가할 수 있다.				
부작용	다음과 같은 증상이 있을 때 바로 의료진에게 알립니다: - 이유를 모르는 출혈(코피, 잇몸출혈, 위장관 출혈) 지속될 경우 - 칫솔질할 때나 상처가 났을 때 출혈이 지속될 경우 - 분홍색이나 갈색 소변, 붉은색이나 검은색 대변을 볼 경우 - 기침에서 피가 나올 경우 - 갑작스럽게 쓰러지거나 머리에 손상이 되었을 때 - 두통, 어지러움 또는 숨쉬기 곤란함이 지속될 때 -발진, 가려움 등 과민반응				

설명대상자	
이름 (서명)	
네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL	네이처 요양병원 전화: 02-575-5114 주소: 서울특별시 강남구 세곡동 612번지

복약 설명 안내문

리록스반정10mg

환자이름		등록번호		나이/성별	
병실		☐ 입원 ☐ 퇴원 ☐ 외래			
설명일자	20 년 월 일		담당의사		
약품사진			약품명	리록스반정	
			성분명	Rivaroxaban Micronized 리바록사반(미세화) 10mg	
효능·효과	항응고제, 직접 Xa인자 억제제 (Anticoagulant, Direct Factor Xa Inhibitor)				
용법·용량	경구제. 성인 1일 1회 10mg 복용. 10mg은 식사와 관계없이 복용할 수 있으며, 15mg 및 20mg은 식사와 함께 투여한다.				
복용시 주의사항	1. 출혈(멍, 코피, 혈변 등) 증상이 나타나면 즉시 의료진과 상담한다. 2. 임의로 복용을 중단하지 않는다. 3. 수술이나 치과 시술 전에는 복용 중임을 반드시 알린다. 4. 다른 항응고제, 항혈소판제 또는 NSAIDs와 병용 시 출혈 위험이 증가할 수 있다.				
부작용	1. 출혈(코피, 잇몸출혈, 위장관 출혈) 2. 빈혈 3. 오심, 복통 4. 어지럼증, 발진 등 과민반응				

설명대상자	
이름 (서명)	
네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL	네이처 요양병원 전화: 02-575-5114 주소: 서울특별시 강남구 세곡동 612번지

복약 설명 안내문

사포레이트정100mg

환자이름		등록번호		나이/성별	
병실		☐ 입원 ☐ 퇴원 ☐ 외래			
설명일자	20 년 월 일		담당의사		
약품사진			약품명	사포레이트정	
			성분명	Sarpogrelate Hydrochloride 100mg	
효능·효과	항혈전, 혈소판 응집 억제제 (Antithrombotic, Antiplatelet Agent)				
용법·용량	경구제. 성인 1회 100mg을 1일 3회 식후 복용.				
복용시 주의사항	1. 식후에 복용한다. 2. 코피, 멍, 혈변 등 출혈 증상이 나타나면 의료진과 상담한다. 3. 수술 또는 치과 시술 전에는 복용 중임을 반드시 알린다. 4. 다른 항혈소판제 또는 항응고제와 병용 시 출혈 위험이 증가할 수 있다.				
부작용	1. 출혈(코피, 멍, 위장관 출혈) 2. 위장장애(복통, 소화불량, 오심) 3. 두통, 어지럼증				

	4. 발진, 가려움 등 과민반응

설명대상자	
이름 (서명)	
네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL	네이처 요양병원 전화: 02-575-5114 주소: 서울특별시 강남구 세곡동 612번지

복약 설명 안내문

실타졸정50mg

환자이름		등록번호		나이/성별	
병실		☐ 입원 ☐ 퇴원 ☐ 외래			
설명일자	20 년 월 일		담당의사		
약품사진			약품명	실타졸정	
			성분명	Cilostazol 50mg	
효능·효과	항혈전제, 혈소판 응집억제제 (Antithrombotic, Antiplatelet Agent)				
용법·용량	경구제. 성인 1회 100mg을 1일 2회 식전 30분 또는 식후 2시간에 복용한				
복용시 주의사항	1. 코피, 멍, 생리 과다 등 비정상적인 출혈이 지속되거나 출혈 경향이 나타나면 즉시 전문가와 상의하세요. 2. 음식물과 함께 복용 시 이상반응이 증가할 수 있으므로 주의하시고, 자몽주스와의 병용은 피하세요. 3. 숨참, 운동 시 호흡곤란, 폐부종 등 울혈성 심부전의 징후나 증상이 나타나면 즉시 전문가와 상의하세요. 4. 수술 또는 치과 시술 전에는 반드시 이 약을 복용하고 있음을 담당 의사에게 알리세요.				
부작용	1. 두통 2. 심계항진, 빈맥				

	3. 어지럼증, 위장장애 4. 출혈, 발진 등 과민반응

설명대상자	
이름 (서명)	
네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL	네이처 요양병원 전화: 02-575-5114 주소: 서울특별시 강남구 세곡동 612번지

복약 설명 안내문

와르파린나트륨정2mg(대화)

환자이름		등록번호		나이/성별	
병실		☐ 입원 ☐ 퇴원 ☐ 외래			
설명일자	20 년 월 일		담당의사		
약품사진			약품명	와르파린나트륨정(대화)	
			성분명	Warfarin sodium 2mg	
효능·효과	항응고제, 비타민 K 길항제 (Anticoagulant, Vitamin K Antagonist)				
용법·용량	경구제. 성인 1일 1회 복용하며, 초기용량은 1일 2~5mg, 유지용량은 1일 2~10mg.				
복용시 주의사항	1. 매일 일정한 시간에 투여하세요. 2. 수술 전 반드시 이 약의 복용사실을 담당의에게 알리세요. 3. 코피, 멍, 생리과다 등 비정상적인 출혈이 지속될 경우 전문가와 상의하세요. 4. 비타민 K가 많이 함유된 식품(시금치, 브로콜리, 케일 등)은 갑자기 많이 섭취하거나 제한하지 말고 일정하게 유지하세요. 5. 임산부 및 임신 가능성이 있는 여성은 투여하지 마세요.				
부작용	1. 출혈(코피, 잇몸출혈, 혈뇨, 혈변, 위장관 출혈) 2. 멍, 빈혈 3. 오심, 구토, 복통 4. 발진, 가려움, 드물게 피부괴사 및 간기능 이상				

설명대상자	
이름	(서명)

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

네이처 요양병원
전화: 02-575-5114
주소: 서울특별시 강남구 세곡동 612번지

복약 설명 안내문

릭시아나정30mg


환자이름		등록번호		나이/성별	
병실		☐ 입원 ☐ 퇴원 ☐ 외래			
설명일자	20 년 월 일		담당의사		
약품사진			약품명	릭시아나정	
			성분명	Edoxaban Tosylate Hydrate 40.41mg	
효능·효과	항응고제, 직접 Xa인자 억제제 (Anticoagulant, Direct Factor Xa Inhibitor)				
용법·용량	경구제. 성인 1일 1회 30mg을 복용하며, 음식과 관계없이 복용할 수 있다.				
복용시 주의사항	1. 출혈(코피, 멍, 혈뇨, 혈변 등)이 나타나면 즉시 전문가와 상의하세요. 2. 임의로 복용을 중단하지 말고, 수술 또는 치과 시술 전에는 반드시 담당 의사에게 알리세요. 3. 다른 항응고제, 항혈소판제 또는 NSAIDs와 병용 시 출혈 위험이 증가할 수 있습니다. 4. 복용을 잊은 경우 당일 즉시 복용하고, 다음 날부터 평소대로 복용하세요.				
부작용	1. 출혈(코피, 잇몸출혈, 위장관 출혈, 혈뇨) 2. 빈혈 3. 오심, 복통 4. 발진, 가려움증, 어지럼증				

설명대상자
이름 (서명)

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL	네이처 요양병원 전화: 02-575-5114 주소: 서울특별시 강남구 세곡동 612번지

복약 설명 안내문

프라닥사캡슐150mg

환자이름		등록번호		나이/성별	
병실		☐ 입원 ☐ 퇴원 ☐ 외래			
설명일자	20 년 월 일		담당의사		
약품사진			약품명	프라닥사캡슐 150mg	
			성분명	Dabigatran Etexilate Mesylate 172.95mg (Dabigatran Etexilate로서 150mg)	
효능·효과	항응고제, 직접 트롬빈 억제제 (Anticoagulant, Direct Thrombin Inhibitor)				
용법·용량	경구제. 체중 60kg 이하 : 1일 1회 30mg, 체중 60kg 초과 : 1일 1회 60mg.				
복용시 주의사항	1. 캡슐을 씹거나 열지 말고 반드시 통째로 복용하세요. 2. 출혈(코피, 멍, 혈뇨, 혈변 등)이 나타나면 즉시 전문가와 상의하세요. 3. 임의로 복용을 중단하지 말고, 수술 또는 치과 시술 전에는 반드시 담당 의사에게 알리세요. 4. 다른 항응고제, 항혈소판제 또는 NSAIDs와 병용 시 출혈 위험이 증가할 수 있습니다.				
부작용	1. 출혈(코피, 잇몸출혈, 혈뇨, 위장관 출혈) 2. 오심, 소화불량, 복통 3. 빈혈 4. 발진, 어지럼증				

설명대상자	
이름 (서명)	
네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL	네이처 요양병원 전화: 02-575-5114 주소: 서울특별시 강남구 세곡동 612번지

복약 설명 안내문

헤파린나트륨주1000IU/ml

환자이름		등록번호		나이/성별	
병실		☐ 입원 ☐ 퇴원 ☐ 외래			
설명일자	20 년 월 일		담당의사		
약품사진			약품명	헤파린나트륨주	
			성분명	Heparin Sodium 5000IU/5ml/V	
효능·효과	항응고제, 형액응고인자Xa 저해제 (Anticoagulant, Factor Xa Inhibitor)				
용법·용량	주사제. 정맥주사 또는 피하주사하며, 환자의 상태 및 적응증에 따라 용량을 조절한다.				
복용시 주의사항	1. 출혈(코피, 잇몸출혈, 혈뇨, 혈변 등)이 나타나면 즉시 전문가와 상의하세요. 2. 혈소판 수치와 응고검사(aPTT)를 정기적으로 확인해야 합니다. 3. 다른 항응고제, 항혈소판제 또는 NSAIDs와 병용 시 출혈 위험이 증가할 수 있습니다. 4. 수술 또는 치과 시술 전에는 반드시 이 약을 투여받고 있음을 담당 의사에게 알리세요.				
부작용	1. 출혈 2. 혈소판감소증(HIT) 3. 주사 부위 통증 및 혈종 4. 과민반응(발진, 가려움, 드물게 아나필락시스)				

설명대상자	
이름	(서명)

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

네이처 요양병원
전화: 02-575-5114
주소: 서울특별시 강남구 세곡동 612번지

복약 설명 안내문

인슐린주사제

환자이름		등록번호		나이/성별	
병실				☐ 입원 ☐ 퇴원 ☐ 외래	
설명 일자	20 년 월 일		담당의사		

인슐린 복약 목적과 효능:

1) 인슐린은 혈당을 체내 세포로 이동시켜 에너지원으로 사용할 수 있도록 하는 필수 호르몬입니다. 인슐린의 분비가 감소하거나 여러 원인으로 인해 정상적으로 작용하지 않으면, 섭취한 포도당이 에너지로 이용되지 못하고 혈액 속에 남아 혈당이 높아지는 당뇨병이 발생합니다. 이때 인슐린제제를 투여하면 혈당을 정상에 가깝게 유지하여 당뇨병을 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

2) 인슐린제제는 종류에 따라 투여 시기, 약효가 나타나는 시간, 약효가 지속되는 시간이 서로 다르므로, 처방받은 용법과 용량에 따라 정확한 시간에 투여하는 것이 중요합니다.

종류	주사시간	효과가 나타나는 시간
초속효성	식사15분전~식사 직전	주사 후 10~15분
속효성	식전 30분	주사 후 약 30분
중간형	식전 30분 또는 일정한 시간	주사 후 1~2시간 후
지속형	매일 같은 시간에 1회	주사 후 1~2시간 이내 효과 나타나며 24시간 지속

2. 인슐린 투여방법 및 용량

1) 저혈당증

증상: 떨림, 식은땀, 현기증, 공복감, 두통, 흥분, 불안감, 가슴 두근거림, 피로감

저혈당 증상이 나타나면 조기에 발견하고 적절히 대처하는 것이 중요합니다. 사탕 3~4개, 시럽이나 꿀 2숟가락, 과일주스 또는 사이다 반 컵(또는 반 캔), 요구르트 1병 등을 섭취하십시오.

15분 정도 휴식을 취하며 증상의 호전을 확인한 후, 증상이 사라지면 가벼운 식사를 하십시오. 증상이 지속되거나 의식이 흐려지는 경우에는 즉시 응급실을 방문하십시오.

2) 체중 증가

인슐린 치료 시작 후 1년 이내에 일반적으로 2~3kg 정도 체중이 증가할 수 있습니다.

규칙적인 식사와 운동을 함께 실천하는 것이 중요합니다.

3) 주사 부위 변화 및 통증

같은 부위에 반복하여 주사하지 말고, 주사 부위를 번갈아 가며 사용하십시오.

냉장 보관한 인슐린은 바로 주사하지 말고 실온에 잠시 두었다가 투여하십시오.

4) 인슐린 알레르기 반응

대부분 주사 부위에 국소적으로 나타나며, 투여 후 2주 이내에 발생하여 2개월 이내에 자연적으로 호전되는 경우가 많습니다.

증상이 심하거나 전신 알레르기 증상이 나타나면 즉시 의료진과 상담하십시오.

5) 혈당 관리

혈당 수치를 꾸준히 기록하면 혈당 조절 상태를 확인하고 치료 계획을 세우는 데 도움이 됩니다.

6) 보관 방법

사용하지 않은 인슐린은 2~8℃에서 냉장 보관하며, 제품에 표시된 유효기간까지 사용할 수 있습니다. 냉동되지 않도록 주의하십시오.

사용 중인 인슐린은 28℃이하의 실온 또는 냉장 상태에서 보관하며, 개봉 후 1개월 이내에 사용하십시오.

*** 추가적인 복약 상담이 필요하신 경우 담당 간호사에게 신청하시기 바랍니다.**

설명대상자

이름 (서명)

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

네이처 요양병원
전화: 02-575-5114
주소: 서울특별시 강남구 세곡동 612번지

복약 설명 안내문

명문펜타닐패취12μg/h

환자이름		등록번호		나이/성별	
병실		☐ 입원 ☐ 퇴원 ☐ 외래			
설명일자	20 년 월 일		담당의사		
약품사진			약품명	명문펜타닐패취	
			성분명	Fentanyl 2.1mg	
효능·효과	마약성 진통제 (Opioid Analgesic)				
용법·용량	경피흡수제. 가슴이나 팔에 부착, 1매 3일간 사용				
복용시 주의사항	1. 졸음, 어지럼증이 나타날 수 있으므로 운전이나 위험한 기계 조작은 피하세요. 2. 이 약은 두통, 오심, 구토, 무력증, 착란, 현기증, 졸음을 유발 할 수 있으며 통증이 가시지 않거나, 변비, 호흡억제의 증상이 나타나면 의사, 약사에게 알립니다. 3. 자몽, 자몽쥬스, 술, 중추신경 억제제의 복용을 피하도록 합니다. 4. 호흡곤란, 심한 졸림 또는 의식 저하가 나타나면 즉시 패치를 제거하고 응급실을 방문하세요.				
부작용	호흡곤란, 15분 이상 지속되는 심한 가슴의 통증, 심한 구토, 심한 가려움증이 나타나면 의사에게 즉시 연락하십시오.				

설명대상자

	이름 (서명)
네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL	네이처 요양병원 전화: 02-575-5114 주소: 서울특별시 강남구 세곡동 612번지

복약 설명 안내문

아노로 62.5 엘립타

환자이름		등록번호		나이/성별	
병실		☐ 입원 ☐ 퇴원 ☐ 외래			
설명일자	20 년 월 일		담당의사		
약품사진			약품명	아노로 엘립타 62.5/25μg	
			성분명	Umeclidinium 62.5μg / Vilanterol 25μg	
효능·효과	기관지확장제 (Bronchodilator, LAMA/LABA)				
용법·용량	흡입제. 성인 1일 1회, 매일 같은 시간에 1회 흡입한다. 1일 1회를 초과하여 사용하지 않는다.				
복용시 주의사항	1. 이 약은 COPD의 유지치료제이며, 급성 호흡곤란 발작 시에는 사용하지 마세요. 2. 매일 같은 시간에 규칙적으로 흡입하고, 사용 후에는 흡입기를 닫아 보관하세요. 3. 흡입 후 심한 두근거림, 호흡곤란 또는 알레르기 반응이 나타나면 즉시 의료진과 상담하세요. 4. 다른 LABA 또는 항콜린성 흡입제와 중복 사용하지 않도록 주의하세요.				
부작용	1. 구강건조, 인후 자극 2. 두통, 어지럼증 3. 심계항진, 빈맥 4. 기침, 비인두염, 요로감염				

설명대상자	
이름	(서명)
네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL	네이처 요양병원 전화: 02-575-5114 주소: 서울특별시 강남구 세곡동 612번지

부록2. 잔여 마약류 반납대장

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

잔여 마약류 반납 대장

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

처방일자	환자명	병동명	등록번호	약품명	처방량	반납량	반납일자	서명		비고
								간호사	약사	

부록3. 지참약 식별 의뢰서

지참약 식별 의뢰서

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

등록번호		의뢰일시	20 년 월 일
환자이름		주치의/진료과	
성별/나이		병실	

약품 식별 의뢰 회신 내역			
약품명	동일 약품 원내보유 유무	대체 가능 약품 보유 유무	비고

년 월 일

작성자: (인)

네이처 요양병원

부록4. 지참약 복용 안내문

지참약 복용 안내문

(　　) 님께서는 현재 복용하고 있는 의약품이 있습니까?

약 이름을 알고 계시거나, 의약품을 소지하고 계시다면 간호인력에게 말씀해 주시기 바랍니다.

지참약 확인

▶현재 복용중인 의약품을 의료진에게 알려주시는 것은 치료에 반드시 필요합니다.

▶만약 복용하고 있는 의약품을 의료진에게 알리지 않고 복용할 경우 예상지 못한 부작용이 생기거나, 기대하는 의약품의 효과가 발현되지 않을 수도 있습니다.

▶따라서 소지하신 의약품을 임의로 복용해서는 안 됩니다.

지참약 제출 및 복용

▶소지하신 의약품은 간호인력에게 제출하여 주시기 바랍니다.

▶해당 의약품은 담당의사가 입원 중에 계속 복용해야 할지, 중단해야 할지를 결정하게 되고, 계속 복용해야 하는 약이라면 담당 간호인력이 복용시간에 맞추어 환자분께 드릴 것 입니다.

환자분에게 좀 더 안전하고 효과적인 치료를 수행하기 위한 것이오니,

다소 불편하시더라도 협조 부탁드립니다.

부록5. 의약품 부작용 발생 보고서

의약품 부작용 발생 보고서

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

환자 정보	등록번호		성명		성별/나이	
	병명				체중	

	구분	의약품명	투여방법 (경로,용량,횟수)	투여 기간	투여목적
의약품 정보	의심되는 의약품			부터 까지	
				부터 까지	

부작용	발현일	20 년 월 일	발현 형태	투약시간 즉시/ 시간/ 일 후 발현
	부작용 발현내용			
	검사소견	(혈액, 소변, 영상, 기능 검사 등)		
	경과 및 조치	1. 약물 부작용에 대한 조치( ) ① 투여 중지 ② 약물 용량을 줄임 ③계속 투여 2. 환자의 경과(해당되는 사항을 모두 적어 주세요) ① 처치 없이 자연 회복 ② 부작용 치료 후 회복 ③ ( )일간 입원 후 회복 ④ 입원기간이 ( )일 연장 ⑤ 회복 후 장애 발생(장애 발생 내용:) ⑥ 신생아: 선천성 ⑦ 생명이 위험 했음 ⑧ 사망(일자) 3. 의심되는 약물 재투여 시 현상( ) ① 재투여하지 않음 ② 재투여 시 유사증상 재발현 ③ 재투여 시 유사 증상 발현 안 됨		

과거에도 유사한 부작용이 있었는지 여부
☐아니오 ☐예 (발현 현상:)

보고 부서		보고자	
보고 방법: 약국(내선) 921번			