1.2 낙상 예방활동			
규 정 번 호	1.2	제 정 일	3주기 규정집 제정
관련 인증기준	1.2 낙상 예방활동	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	간호부, 재활치료실, 검사실	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거	1. 의료법 시행규칙, 2. 통계법		

▣ 목적 (Purpose)

의료기관은 낙상으로 인한 환자의 상해를 줄이기 위해 환자의 특성, 시설 및 환경 등을 고려한 낙상예방을 위한 규정을 개발하여 적용하여야 한다.

▣ 용어의 정의 (Definition)

낙상 : 본인의 의사와 상관없이 신체가 조절되지 않아 갑자기 바닥이나 낮은 곳으로 비의도적으로 이동하는 것(Gibson,1990)

▣ 정책 (Policy)

1. 낙상 예방에 대한 규정이 있다.
2. 낙상 위험 평가도구를 이용하여 환자 입원 시 초기평가를 수행한다.
3. 낙상 위험 평가결과에 따라 고위험환자에 대한 낙상 예방활동을 수행한다.
4. 낙상 위험 평가도구를 이용하여 재평가를 수행한다.
5. 낙상 발생 가능한 장소 또는 부서에서 낙상 예방활동을 수행한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 낙상 위험 평가

가. 낙상 위험 평가대상 및 평가 도구

1) 입원 환자를 대상으로 신뢰도와 타당도가 입증된 낙상위험 평가도구(Morse Fall Scale)를 사용하여 낙상 위험도를 평가한다.

2. 낙상 위험도 평가 시기

가. 낙상 위험도 입원 시 초기 평가

1) 낙상 위험도 입원 시 초기평가는 입원 24시간 이내에 초기 평가 시행

나. 낙상 위험도 재평가

1) 정기적인 재평가 : 월 1회 (매월 1일 Day 간호사) 시행
2) 입원 중 환자 상태 변화 시
3) 전동 시 : 인계 받은 병동에서 해당 근무조가 재평가
4) 환자 상태 변화 시 : 간성 혼수, 알코올성 섬망, 발작 등이 일어났을 때 해당 근무조가 재평가
5) 낙상과 관련된 의약품 투여 후 : 마약, 진정제, 수면제, 이뇨제 등 초기투여 후 재평가(인공도뇨관 대상

자 및 와상환자)

6) 낙상발생, 갑작스런 보행 장애, 혼미, 의식변화 또는 인지 저하 등이 일어났을 때 해당 근무조가 재평가

	대상	평가시점
초기평가	입원환자	입원 후 24시간 이내
정기적 재평가	입원환자	월 1회(매월 1일 Day 간호사)
비정기적 재평가	전동 환자	전동 받은 부서의 해당 근무조
	낙상 사고 환자	낙상 사고 발생 시 해당 근무조
	상태변화 환자 (간성혼수, 알코올 섬망, Seizure)	상태변화 시 해당 근무조
	낙상과 관련된 의약품 투여 후 (마약, 진정제, 수면제, 이뇨제 등)	낙상과 관련된 의약품 초기 투여 후

3. Morse Fall Scale낙상 위험도 평가 결과에 따른 낙상위험도 분류 기준

가. 고위험군 : 51 ~ 125점

나. 저위험군 : 25 ~ 50점

다. 정상 : 0 ~ 24점

4. 평가결과에 따른 고위험환자의 낙상예방 활동

가. 낙상 위험환자에 대한 직원 간 정보 공유

1) 낙상위험도 평가결과에 따라 해당 환자가 낙상고위험 환자임을 관련 직원이 알 수 있도록 한다.

가) 낙상고위험군 환자인식밴드에 '낙상고'로 표시된 빨간색 스티커를 부착한다.

나) 낙상고위험군 환자의 침상이름표에 낙상주의 표시지를 부착한다.

다) 낙상 고위험군으로 평가된 환자는 전자의무기록(EMR)의 낙상란에 '고'로 표시된다.

라) 환자의 낙상위험요인에 맞는 낙상예방 중재활동을 수행하고 낙상예방활동 Check List에 기록한다.

2) 직원은 낙상고위험군의 낙상예방활동지침에 대한 교육을 받고 이를 준수한다.

3) 간병사 및 보호자가 자리를 비울 때 직원(간호사,간호조무사)에게 알리도록 한다.

4) 환자이동 시 항상 보호자가 지지하도록 교육하고 보호자가 없는 경우 직원이 환자이동을지지한다.

나. 낙상 예방법에 대한 교육(환자 및 보호자)

1) 낙상고위험군 환자 및 보호자에게 낙상의 위험성을 알리고 환자/보호자용 낙상예방안내문교육한 후 자료를 제공한다.

2) 침상안정 시 낙상예방 수칙

가) 응급호출 시스템(간호사 호출장치, 화장실 비상벨 등) : 도움이 필요할 때 직원을 부를 수 있도록 호출장치 사용법 설명

나) 자주 사용하는 물건은 가까운 곳에 두기

다) 침상에서 내려올 때는 천천히 일어나 걸터앉은 후 침상난간이나 기구 등을 잡고 천천히 내려오기
라) 침대 위에서 일어서지 않기
마) 침상난간은 항상 올려두고 침상난간 사이로 내려오지 않기
바) 침대바퀴는 항상 고정하여 움직이지 않도록 하기 등

3) 일상생활 시 낙상예방 수칙
가) 잘 맞는 신발을 착용하기
나) 보행이 불편한 환자는 이동할 때 혼자 다니지 않고 직원 또는 보호자와 동행하기
다) 복도, 계단, 경사로 이용 시 안전바 잡고 걷기
라) 안전바 및 보행보조 기구 사용방법과 바른 자세 등

4) 화장실, 목욕탕 이용 시 낙상예방 수칙
가) 잠들기 전에 화장실 다녀오기
나) 화장실 갈 때(특히 자다가 깨어서 화장실 갈 때) 혼자 움직이지 말고 반드시 직원 및 보호자의 도움을 받아 침대에서 내려오기
다) 바닥의 물기를 주의하여 미끄러지거나 부딪히지 않도록 주의하기
라) 도움이 필요할 때 호출장치 사용하기
마) 혼자 목욕하지 않기(필요한 물건은 미리 준비하여 환자를 혼자 두고 나오지 않기)
바) 변기에 앉거나 일어날 때 꼭 안전바 사용하기 등

5) 낙상사고의 위험성이 있거나 낙상 발생 시 바로 보고하도록 한다.

다. 낙상 예방법에 대한 교육(직원)

※ 환자접점 부서장(병동, 방사선실, 재활치료실, 원무과 등)은 낙상발생이 모든 장소나 상황에 따른 낙상예방 지침을 만들어 관련 직원교육을 실시하고 직원은 이를 준수한다.

1) 간호단위의 낙상예방 지침
가) 입원생활안내 시 환자 및 보호자 교육을 통해 낙상 가능성과 위험성, 예방방법을 교육한다.
나) 환자에게 투여되는 의약품에 대한 정확한 지식(약리작용, 부작용, 합병증 등)을 알고
다) 부작용이 심한 경우 담당의사와 상의하여 조정하도록 한다.
라) 활력증상을 주의 깊게 관찰하여 체위성 저혈압에 유의한다.
(1) 특히 어지러운 증상을 호소할 때는 누워 있다가 갑자기 일어나지 않도록 교육한다.
마) 치료나 처치, 주사, 침상 정리 등을 시행한 후에는 반드시 침상난간을 올려준다.
바) 병실 바닥이나 복도는 보행 시 미끄러질 수 있는 물질이 없도록 순회하여 점검한다.

2) 휠체어를 이용한 환자이동 시 낙상예방 지침
가) 승하차시 발판이 다리에 걸리지 않도록 접고 잠금장치를 확인하여 뒤로 밀리지 않도록 주의한다.
나) 휠체어를 이용한 이동 시 직원은 환자의 갑작스러운 움직임에 대비한다.
다) 경사로를 내려갈 때에는 환자의 몸이 앞으로 쏠리거나 떨어지는 것을 예방하기 위해 휠체어의 방향을 전환하여 이동한다.
라) 휠체어 바퀴에 손가락이나 담요 옷자락이 끼지 않도록 주의한다.
마) 이동시 요철에 주의한다.

3) Stretcher를 이용한 환자이동 시 낙상예방 지침
가) 환자가 Stretcher에 승하차하는 경우 반드시 잠금장치를 고정하여 뒤로 밀리지 않도록 한다.
나) 환자가 Stretcher에 타고 있는 경우 반드시 사이드레일을 올리고 이동한다.
다) 환자를 태우고 이동하는 경우 팔이나 다리가 Stretcher 바깥으로 나오지 않도록 주의한다.

라) 비교적 좁은 공간(병실문, 엘리베이터)을 통과하는 경우 시설에 부딪히지 않도록 주의한다.

4) 침상이동 시 낙상예방 지침

가) 침상을 이용한 이동 시에는 바퀴의 잠금장치를 해제상태에서 이동하며 상황 종료 시 반드시 잠금장치를 고정시킨다.

나) 이동 시에는 침상난간을 올리고 팔이나 다리가 침상 바깥으로 나오지 않도록 주의한다.

다) 비교적 좁은 공간(병실문, 엘리베이터)을 통과하는 경우 시설에 부딪히지 않도록 주의한다.

5) 앰뷸런스를 이용한 환자 이동 시 낙상예방 지침

가) 앰뷸런스 전용 이동 카에 환자가 승하차하는 경우 반드시 잠금장치를 고정하여 뒤로 밀리지 않도록 한다.

나) 전용 이동 카는 침상이 좁고 높으므로 환자가 전용 이동 카에 승차한 경우 팔이나 다리가 침상 바깥으로 나오지 않도록 주의하여 안전벨트를 착용시키고 반드시 사이드레일을 올린다.

다) 이동 시 요철을 주의하고 벽이나 승강기에 부딪히지 않도록 주의한다.

라) 비교적 좁은 공간(병실문, 엘리베이터)을 통과하는 경우 시설에 부딪히지 않도록 주의한다.

마) 앰뷸런스에서 하차하는 경우 반드시 바퀴가 바닥에 착지한 것을 확인하고 다음단계를 진행한다.

라. 환경 및 시설 관리

1) 환경관리

가) 원내 시설물 중 위험요소를 제거하고 수시로 점검하여 관리한다.

나) 침상, 화장실, 샤워실에는 환자의 손에 가까운 위치에 호출장치를 부착한다.

다) 환자가 이용할 수 있는 모든 경로의 바닥은 턱이 없어야 하고, 미끄럼방지 장판이나 미끄럼방지 타일을 사용하며 필요시 미끄럼방지 매트를 깔거나 미끄럼방지 테이프를 부착한다.

라) 환자가 걸려 넘어질 수 있는 주변 환경을 정리하고 병실 및 복도, 화장실 등의 조명은 활동시간에는 밝게 하고, 야간에는 어둡지 않도록 한다.

2) 시설관리

가) 낙상위험이 높은 장소(특히 화장실, 샤워실)에 낙상주의 표지판을 부착한다.

나) 휠체어, 이동침대, 스탠드형 체중계 등에 낙상주의 표지판을 부착한다.

다) 복도, 계단, 경사로에는 안전바를 설치하고 낙상주의, 추락주의 등의 표지판을 부착한다.

라) 병실이나 복도, 화장실, 샤워실 등의 바닥에 물기나 미끄러운 용액이 없도록 한다.

마) 환자가 이동하는 통로에 불필요한 물건이 나와 있지 않도록 매월 1회 정기적으로 원내 환경위험 요소를 제거한 후 낙상 예방 시설 환경 점검표를 작성한다.

5. 낙상발생이 가능한 장소 또는 부서에서 낙상 예방활동 (외래, 검사실, 치료실 등)

1) 환자의 이송을 포함한 이동 경로 및 외래, 검사실, 치료실 등의 낙상 발생 가능 장소 또는 부서에서 낙상예방 활동을 시행하며 낙상예방활동을 실시 후 낙상예방 활동 Check List에 기록한다.

2) 다음의 환자를 낙상 고위험군으로 간주하고 주의 깊게 관찰한다.

가) 보조기구를 사용하거나 보호자의 도움을 받는 등 보행 장애 및 시력장애 환자

나) 특수한 처치나 검진을 위해 처치대 또는 진찰대에 누워있거나 오르내리는 허약한 환자

다) 휠체어나 침대로 이동하는 환자

라) 환자인식밴드에 낙상고위험군 스티커가 부착되어있는 환자

▣ 부록 (Appendix)

1. 낙상 위험도 평가 기록지 (Morse Fall Scale)
2. Morse Fall Scale 산정기준
3. 낙상 고위험군 환자 낙상예방 안내문
4. 낙상시설 환경관리일지
5. 낙상예방활동지침
6. 환자안전(낙상)사고 보고서
7. 방사선실 낙상 예방 안내문
8. 재활치료센터 낙상 예방 안내문
9. 외래 낙상 예방 안내문
10. 낙상예방활동체크리스트 (영상검사실)
11. 낙상예방활동체크리스트 (외래)
12. 낙상예방활동체크리스트 (원무)
13. 낙상예방활동체크리스트 (재활치료실)
14. 낙상예방활동체크리스트 (고위험군)

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일					

부록1. 낙상 위험도 평가 기록지 (Morse Fall Scale)

낙상 위험도 평가 기록지 (Morse Fall Scale)

차 트 번 호		성 명		성 별 / 나 이	
입 원 병 실		작 성 일 자			

구분	척도	점수	선택
1. 과거 낙상경험	있음	25	
	없음	0	
2. 이차진단 (부진단) 확정된 질병 2가지 이상	있음	15	
	없음	0	
3. 보행보조	가구를 잡고 보행	30	
	목발 / 지팡이 / 보행기 사용	15	
	보조기 사용안함 / 침상안정 / 휠체어 / 간호사 도와줌	0	
4. 정맥수액요법 / Heparin Lock	있음	20	
	없음	0	
5. 걸음걸이 / 이동	장애가 있음	20	
	허약함	10	
	정상 / 침상안정 / 부동	0	
6. 의식 / 정신상태	자신의 기능수준을 과대평가 하거나 잊어버림	15	
	자신의 기능수준에 대해 잘 알고 있음	0	
총점			

작성자 : (인)

부록2. Morse Fall Scale 산정기준

Morse Fall Scale 산정기준

구분	산정내용		산정기준
1. 낙상경험	있음	25	• **25점** : 최근 3개월 이내에 낙상 경험이 있는 경우
	없음	0	
2. 이차진단	있음	15	• **15점** : 주된 진단명(primary active diagnosis)외에 추가적인 진단명(active diagnosis)이 있는 경우 예) 당뇨를 가진 환자가 호흡곤란을 주소로 입원했다면 호흡곤란과 관련된 진단명이 primary active diagnosis가 되고 당뇨는 2차적 진단명이 된다.
	없음	0	
3. 활동 보조기구	가구를 짚거나 잡고 이동	30	• **30점** : 보행 시 보조기구가 필요한 상태인데도 보조기구를 사용하지 않고 침대 식판 등의 가구(furniture)등을 잡고 이동하거나, 침상 안정하라는 권유를 따르지 않는 경우. 결국, 보행이 불안정하면서 병원 직원의 권유를 따르지 않는 환자
	목발, 지팡이, 보행기 사용	15	
	보조기 사용안함	0	
4. 정맥요법 헤파린 록	있음	20	• **20점** : 헤파린 lock이나 생리식염수 lock 유치자, Foley catheter, 몸에 부착하는 모니터장치(EKG monitoring 등)포함
	없음	0	
5. 걸음걸이	장애있음	20	• 의자에서 일어나기 힘든 정도, 땅을 보며 걷기, 스스로 걷지 못하고 가구 등을 잡아야 걸을 수 있고, 종종 걸음이나 발을 질질 끄는 걸음걸이
	허약함	10	• 구부정하나 균형을 잃지 않고 머리를 들 수 있고, 걸을 때 가구를 이용한다면 단지 가이드용으로만 짚는 정도(가벼운 터치)이며, 종종 걸음으로 발을 질질 끄는 걸음걸이
	정상, 부동, 침상안정	0	• 머리를 세우고, 양손을 앞뒤로 흔들며, 머뭇거리지 않고 걷는 경우, 혹은 아예 걸음 걸을 일이 없는 와상환자
6. 의식 정신상태	자신의 기능수준을 과대평가 하거나 잊어버림	15	• **15점** : 환자가 자신의 능력에 대한 과대평가나 한계를 망각할 때 예) '환자 분은 화장실에 혼자 가실 수 있습니까? 아니면 도움이 필요합니까?'라는 질문에 대한 환자의 대답이 의사의 기록이나 처방, 카덱스(kardex)의 내용과 일치하지 않거나 비현실적인 경우
	자신의 기능 수준을 잘 알고 있음	0	
0 ~ 24점 : 낙상 위험성이 거의 없음 25 ~ 50점 : 낙상 위험성이 낮음(저위험군) 51 ~ 125점 : 낙상 위험성이 높음(고위험군)			

부록3. 낙상 고위험군 환자 낙상예방 안내문

낙상 고위험군 환자 낙상 예방 안내문

등록번호		환자성명	
성별 / 나이		병실	

1. 낙상이란?
   서 있거나 앉아있거나 누워있는 상태에서 바닥이나 낮은 곳으로 떨어지는 것을 의미합니다.

2. 낙상예방 수칙
   가. 침상에 있는 동안은 안전을 위하여 침상의 난간은 항상 올려주십시오.
   나. 어지러운 증상이 있을 때에는 침상에서 일어나지 마십시오.
   다. 침상 위에서 일어서거나 서서 환자복을 갈아입으면 위험하오니 삼가 주시기 바랍니다.
   라. 침대에서 내려오거나 이동 시는 혼자 이동하지 마시고 응급 호출기를 사용하여 간호사의 도움을 받으십시오.
   마. 취침 전 소변을 보십시오.
   야간에 화장실을 가는 경우 반드시 직원(간호사, 간병사)과 이동해 주십시오.
   바. 밤에 화장실을 가는 경우 낙상이 많이 발생하고 있습니다.
   (호출벨을 이용하여 간호사나 간병사를 부르십시오.)
   사. 환자에게 필요한 물건은 손이 닿는 곳에 가까이 두어서 물건을 잡으려고 하다 넘어지지 않도록 하시기 바랍니다.
   아. 슬리퍼나 신발은 바닥이 미끄럽지 않은 것을 사용 하십시오.
   자. 바닥의 물기, 통로의 장애물, 정맥주사의 수액줄 등으로 인해 낙상이 발생할 수 있으니 주의하십시오.
   차. 휠체어 사용 시 항상 잠금장치를 사용하여 고정하여 주십시오.

3. 낙상발생 시
   가. 발생 즉시 직원에게 알려 주십시오.
   나. 무리하게 혼자 움직이려고 하지 마십시오.

※ 상기 낙상예방에 대해 충분한 설명을 듣고 그 내용을 이해하였습니다.

년 월 일

환자 또는 보호자 : (서명)

담 당 자 : (서명)

네이처요양병원 NATURE HOSPITAL

환자 및 보호자(간병인)용 낙상예방 안내문 (1)

◉ **낙상사고의 가장 심각한 위험요인은 환자가 혼자서 이동할 때입니다.**

환자가 움직일때는 항상 간병 보호자의 도움을 받도록 합니다.

특히, 입원 전 낙상 경험이 있는 분은 간호사실에 꼭 알려주시기 바랍니다.

주의사항	
침상	▷ 침상안정 중 양측 침상난간은 항상 올립니다. ▷ 침상 난간 사이로 내려오지 않습니다. ▷ 환자에게 필요한 물건은 침상 가까이에 둡니다. (물건을 잡으려다 균형을 잃지 않도록 합니다.) ▷ 침대위에 서서 옷을 갈아입거나 위험한 행동은 하지 않습니다. ▷ 침상에서 내려올 때는 천천히 보호자 쪽으로 내려오시고 꼭 보호자의 도움을 받도록 합니다. (환자를 일으킨 후 1분 정도 안정 후 침대에서 내려오도록 합니다.)
이동	▷ 병실 또는 복도에서 미끄럽지 않고 크기가 잘 맞는 신발을 신도록 합니다. (슬리퍼 금지) ▷ 운동, 보행, 화장실 이용 시 혼자서 움직이지 않으며 보호자를 기다려 함께 동행 하도록 합니다. ▷ 이동형 수액걸이는 바퀴로 인해 미끄러질 수 있으니 이동보조 기구로사용하지 않습니다. ▷ 환자를 휠체어로 옮길 때에는 반드시 잠금장치를 잠가 미끄러지지 않도록 하며 경사로를 내려올 때는 방향을 전환하여 안전에 유의하도록 합니다. (휠체어 사용법은 미리 숙지하여 주십시오.)
화장실	▷ 화장실을 갈 때 꼭 간병보호자와 동행하며 혼자 있지 않도록 합니다.
외출/ 외박	▷ 외출, 외박 시에도 안전사고 주의 부탁드리며, 낙상이나 안전사고가 있었던 경우 간호사에게 꼭 알립니다.
취침	▷ 수면 전 배뇨나 배변을 위해 간병 보호자와 함께 화장실을 다녀옵니다. ▷ 보행이 어렵거나 힘든 환자는 이동 변기를 사용해야 합니다.

다음과 같은 분들은 특히 주의하시기 바랍니다.

1) 침상이름표에 낙상고위험군에 0표시가 되어있는 분
2) 수면제, 진정제, 이뇨제 등의 약물을 복용하시는 분
3) 낙상경험, 보행 장애, 혼미, 어지러움이 있는 분
4) 전신 쇠약, 시력 장애, 배설장애, 골다공증이 있으신 분

환자 및 보호자(간병인)용 낙상예방 안내문 (2)

◐ **낙상사고의 상해가 가장 심각한 경우는 환자가 혼자서 이동할 때입니다.**
환자가 혼자서 절대로 움직이지 않도록 보호자의 주의 당부 부탁드립니다.

침상에서

▶ 침상안정 중에는 양쪽 난간을 올립니다.
▶ 침상 난간 사이로 내려오지 않습니다.
▶ 침대 위에서 일어서지 않습니다.
▶ 자주 사용하는 물건은 침상 가까이에 둡니다.
(물건을 잡으려다 균형을 잃지 않도록 합니다)
▶ 침대위에 서서 옷을 갈아입거나 위험한 행동은
하지 않습니다.
▶ 침상에서 내려올 때는 천천히 일어나 앉은 후
침상 난간이나 가구 등을 잡고 천천히 내려옵니다.
▶ 침상 바퀴는 항상 고정해 움직이지 않도록 합니다.



응급호출 시스템

▶병실에서 도움이 필요할 땐 침상머리 밑의 간호사
호출장치를 누릅니다.
▶화장실에서 도움이 필요할 땐 안내 문구에 따라
간호사 호출장치를 눌러 도움을 받도록 합니다.

이동 시

▶ 병실 또는 복도에서 미끄럽지 않고 크기가 잘 맞는 신발을 신도록 합니다.
▶ 복도, 계단, 경사로에서는 안전바를 잡고 걷도록 합니다.
▶ 이동할 때 혼자 다니지 말고 보호자와 동행 합니다.
▶ 이동형 수액걸이는 미끄러질 수 있으니 이동보조 기구로 사용하지 않습니다.

화장실 / 목욕탕 이용 시

▶ 잠들기 전에 화장실을 다녀오도록 합니다.
▶ 화장실로 이동할 때는 혼자 움직이지 말고 반드시 보호자의 도움을 받아 이동합니다.
▶ 혼자 목욕하는 것은 자제합시다.
▶ 변기에 앉거나 일어날 땐 옆에 안전바를 사용합니다.

안전바 사용 시

▶ 사용 전 각 부위의 이상 유무를 확인 하세요.
▶ 이동시나 일어날 때, 화장실 이용, 몸의 균형유지 시 사용합니다.
▶ 강한 물리적 압력 등이 가해지지 않도록 합니다. (운동기구로는 사용 절대 불가)

외출 / 외박

▶ 외출, 외박 시 안전사고에 유의하며, 낙상이나 안전사고가 있었던 경우 간호사에게 꼭 알립니다.

Stretcher car를 이용한 환자 이동시

▶ 환자를 승하차 할 경우 반드시 잠금장치를 고정하여 밀리지 않게 합니다.
▶ 환자를 태웠을 경우 반드시 사이드레일을 올리고 안전벨트를 착용 후 이동합니다.
▶ 이동시 팔이나 다리가 **Stretcher** 바깥으로 나오지 않도록 주의합니다.
▶ 병실 문이나 엘리베이터 등 좁은 공간을 통과할 경우 부딪히지 않도록 조심합니다.

워커 사용법

▶ 보행워커의 가운데 부분에 있는 버튼을 누르고 접으면 편하게 접힙니다.
▶ 아래 버튼부분을 눌러 길이 조절도 가능 합니다.



워커 보행법

첫째, 편안한 팔 길이로 전방에 보행기를 움직입니다.
둘째, 불편한쪽 다리로 워커 안쪽에서 가볍게 발을 디딥니다.
셋째, 손에 체중을 지탱한 다음 건강한 발을 들어 올려 보행기 안쪽으로 몸을 옮깁니다.



지팡이 보행방법

1. 건강한 손으로 지팡이를 사용하도록 합니다.
2. 발 앞 15cm, 옆 15cm 지점에 지팡이 끝에 둡니다.
3. 마비쪽 다리를 앞으로 옮깁니다.
4. 건강한 다리를 앞으로 옮깁니다.
5. 같은 방식으로 보행합니다. 방향 전환을 할 때에는 불편한 쪽을 지팡이 쪽으로 내밀고 건강한 다리에 체중을 실어 원을 그리듯 천천히 반원을 그리며 방향을 바꿉니다.

◉ 계단 내려갈 때, 평지 이동 시
: 지팡이 -> 마비 다리 -> 건강한 다리

◉ 계단 오를 때
: 지팡이 -> 건강한 다리 -> 마비 다리

<지팡이 이용 보행 돕기>

◉ 옆에 보조 : 간병보조자는 지팡이를 쥐지 않은 옆쪽(불편한 쪽)에 위치하여 겨드랑이에 손을 넣어 대상자가 넘어지지 않도록 잡고 대상자와 호흡을 맞춰 보행합니다.

◉ 뒤에 보조 : 뒤 쪽에 위치하여 한손으로 대상자 허리를 지지하고, 다른 손은 어깨를 지지하며 호흡을 맞춰 보행합니다.

지팡이 결정 방법

▶ 지팡이를 한걸음 앞에 놓았을 때 팔꿈치가 30도 구부러지는 정도

▶ 지팡이 손잡이가 둔부 높이

▶ 평소 신발 신고 똑바로 섰을 때 손목 높이



휠체어 사용

휠체어 고정레버 사용법

▶ 휠체어를 고정시킬 때는 레버를 바퀴 쪽으로 당깁니다.
▶ 이동할 때에는 레버를 바깥쪽으로 밀어 고정 장치를 풀도록 합니다.
▶ 휠체어를 타고 내릴 때는 반드시 브레이크를 채웁니다.



휠체어 이용 시 바른 자세

▶ 무릎과 고관절의 각이 바르게 있어야 합니다.
▶ 엉덩이는 좌석 뒤쪽, 중앙에 위치하도록 바른 자세를 취합니다.
▶ 주행 중이나 정지 중 바닥에 떨어진 물건을 집으려 하지 않습니다.



휠체어 이동시 경사로 이용법

▶ 경사로를 내려올 때는 휠체어는 방향을 전환 하여 내려옵니다.
▶ 휠체어로 이동을 할 때 발이 발판에 올려져 있는지 확인 합니다.
▶ 발판을 디딤대로 사용하지 않습니다.



부록4. 낙상시설 환경관리일지

◉ 낙 상 예 방 을 위 한 시 설 및 환 경 점 검 표 ◉

▶ 부 서 단 위: 병동 ▶ 점 검 연 도: 20 년

	점 검 항 목	점 검 일 (매월 마지막주 금요일)											
		1월/	2월/	3월/	4월/	5월/	6월/	7월/	8월/	9월/	10월/	11월/	12월/
1	호출벨 점검(작동여부)												
2	침대 부속물 점검 (side rail 작동여부, 바퀴 잠금장치 작동유무)												
3	고위험 환자 확인 (낙상주의 표지판 부착)												
4	stretcher car 부속물 점검 (side rail 작동여부, 바퀴 잠금장치 작동유무)												
5	휠체어 부속물 점검 (손잡이, 등받이, 바퀴잠금장치 작동여부)												
6	보행 보조기구 부속물 점검 (팔걸이, 고무패킹)												
7	조명 확인(병실 야간등, 침대 독서등)												
8	침상 주변 정리 여부 확인 (부속기구, 전기 코드나 환자의 부착물 등)												
9	화장실과 샤워실 점검 (조명, 미끄러질 위험이 있는 물질 즉시 처리)												
10	병실 바닥 확인 (물 등 미끄러질 위험이 있는 물질 즉시 처리)												
11	복도 및 계단 안전바 점검												
점 검 자 확 인	간호부												
	관리과												

부록5. 낙상예방활동지침

낙상예방활동지침

구분		예방 지침
환 경		1. 주변을 정리 정돈한다.
		2. 바닥에 미끄러운 용액이나 물기가 없게 한다. 바닥에 미끄럼 방지 판을 적용한다.
		3. 화장실 바닥이 미끄럽지 않도록 건조 상태를 유지한다.
		4. 침대 바퀴를 고정시킨다. 이동침대도 환자를 다른 침대나 휠체어로 옮길 때는 바퀴를 고정 시킨다.
		5. 휠체어를 고정 시킨다.
		6. 조명을 적절한 밝기로 유지한다.
		7. 필요한 물품을 환자의 팔이 닿는 곳에 둔다.
		8. 화장실과 침대 옆에 응급 호출 장치를 설치하고 사용법을 설명한다.
		9. 계단과 복도에 안전 바를 설치한다.
사람	환 자	1. 미끄럽지 않고 잘 맞는 운동화나 실내화를 착용한다.
		2. 적당한 환의 착용으로 바지가 끌리지 않도록 한다.
		3. 빠른 걸음으로 걷지 않도록 한다.
		4. 수면 전에 화장실을 다녀오도록 한다.
	간 병 사 (보호자)	1. 화장실 이용 시 항상 동행하고 관찰한다.
		2. 병실을 비우지 않도록 하며 환자가 혼자 있게 되는 경우 반드시 안전을 점검하고 지속적으로 관찰 한다
		3. 환자를 휠체어나 침상으로 이동시 적정한 인력을 활용하여 안전하게 이동한다.
		4. 침상난간 사용법을 교육하고 환자가 혼자 침상에 누워있을 시 침대 난간을 양쪽 모두 항상 올리도록 한다.
		5. 침상난간 사이로 내려오지 않도록 관리, 관찰한다.
		6. 휠체어와 보행기구 사용법에 대해 교육한다.
질환	배뇨장애	필요시 이동식변기를 사용한다.
	기립성 저혈압	자세 변경 시 10초 이상에 걸쳐 천천히 단계적으로 시행하도록 교육한다.
	기동성 장애	1. 보행 보조 기구 사용 시 보조 기구의 안전을 점검한다.
		2. 이동시 도움을 받도록 교육한다.
	시력	1. 충분한 조명을 확보한다.
		2. 시력 문제에 대한 적절한 치료를 받도록 한다.
약물		1. 낙상을 일으킬 수 있는 약물을 사정한다. (마약, 진정제, 수면제, 이뇨제 등)
		2. 최소한의 약물을 고려한다.
고 위험 군에 따른 중재		1. 고위험 환자임을 알 수 있는 <낙상주의> 스티커를 이름표, 환자인식밴드에 부착한다.
		2. 환자, 보호자, 간병사에게 낙상의 위험을 알리고 교육한다.
		3. 보호자에게 낙상 사정 결과를 설명하고 낙상의 위험을 알린다.
		4. 정기적으로 1달에 한번 낙상 점수를 평가한다.
		5. 낙상 사정 결과를 기재하고 근무자간에 공유한다.
		6. 낙상 중재에 관한 기록을 정확히 남긴다.
		7. 침대와 휠체어 바퀴는 관리과에서 주기적으로 점검한다.

부록6. 환자안전사건 보고서

환자안전사건 보고서

결재	부서장	QPS전담자	병원장

발 생 일 시	____년 ____월 ____일 ____시			보 고 일	____년 ____월 ____일 ____시		
등록번호/이름	____ / ____		성별/나이	____ / ____		해당병동	____
보 고 부 서	□병동 □외래 □검사/특수부서 □약제부 □기타 ____			보고자(작성자)	____		
관련 직원(중복선택가능)	□의사 □약사 □간호사 □의료기사 □기타 ____						
발 생 장 소	□병실 □화장실 □복도 □계단 □재활치료실 □기타(____)						
오류 구분	□낙상 □투약 □기타						
오류등급 분류 (오류 발생 후 환자의 상태에 'V'표시)	□	0	사건/사고가 일어날 뻔 했으나 우연한 또는 시의 적절한 중재를 통해 발생이 안됨			근접오류	
	□	1	사건/사고가 발생했으나 환자에게 해가 없음				
	□	2	사건/사고의 발생으로인한 치료 또는 중재를 필요로함			위해사건	
	□	3	입원 기간이 연장되거나 퇴원 시 장애를 일으키는 사건/사고				
	□	4	주요기능의 영구적 손실을 가져오거나 사망을 초해함			적신호사건	
오류 유형(중복 선택 가능)							
낙상	의식상태	□명료(alert) □졸음(drowsy) □혼미(stupor) □반혼수(semicoma) □혼수(coma)					
	활동상태	□독립적 □부분적인 도움(보조기구 사용) □항상 도움 필요 □침상 안정 상태					
	환자위험 요인 (중복 선택 가능)	□흉분 □어지러움 □전신쇠약 □마비 □시력장애 □체위성저혈압 □평형장애 □보행장애 □수면장애 □낙상 과거력 (1년 이내) □기타					
	낙상유발 위험약물	낙상 발생 24시간 이내 투여된 □항우울제 □항불안제 □항정신치료제 □ 최면진정제 □이뇨제 □기타					
	낙상유형	□ 침대 사용 시 □ 의료 장비 사용 시 □ 기립/보행 시 □ 유모차 사용 시 □ 의자 사용 시 □ 기타 ____					
	낙상 위험요인	□ 침대바퀴 고정 안함 □ 보조 난간 내려짐 □ 바닥의 물기 □ 발에 맞지 않는 신발 □ 주변물건에 걸려 넘어짐 □ 기타(____)					
투약 오류	투약전 발견	□ 의사처방 오류 □ 약사조제/불출오류 □ 기타(____)					
	투약 후 발견	□ 다른 환자 □ 다른 약품 □ 다른 시간 □ 다른 경로 □ 다른 용량 □ 약물 부작용 □ 투약하지 않아야 할 상황에서의 투약 □ 기타(____)					
기타 오류	□ 검사관련: □ 과정 오류 □ 결과 오류 □ 검사 지연 □ 자살 및 자해(시도) □ 진료 재료 오염/불량 □ 화상 □ 시술 관련 □ 의료장비 및 기구관련 □ 기타(____)						

활력징후 (낙상의 경우 낙상점수포함)	
신체 손상정도	
사고발생 후 치료내용	
사건경위	언제: 어디서: 무엇을: 어떻게: 왜: 했나:
문제원인 및 개선방안	

방사선실 낙상 예방 안내문

- 도움이 필요할 때에 방사선실 직원 및 병원 직원에게 도움을 요청합니다.
- 신발은 꼭 맞는 것을 사용합니다.
- 화장실 또는 복도 이동시 항상 안전바를 잡고 이동합니다.
- 보행이 불편하신 분은 이동 시 반드시 보조 기구를 사용하도록 합시다
- 휠체어 사용 시 앉고 내릴 때는 반드시 고정 장치를 확인한 후 사용합니다.
- 시각•청각이 불편하신 분은 안경이나 보청기 착용 후 이동합니다.
- 이동용 침대를 사용하는 경우 침상난간을 꼭 올리도록 합니다.
- 이동용 침대에서 일어서지 않습니다
- 이동용 워커를 사용하시는 분은 키 높이에 맞는 것을 사용 하도록 합니다.
- 방사선실 침대에서 일어서지 않도록 합니다.
- 방사선실 침대에는 침상난간이 없으므로 몸이 불편하신 분은 혼자 움직이는 데 주의하시고, 직원의 도움을 받습니다.

재활치료센터 낙상 예방 안내문

- 침대에서 일어서지 않도록 합니다.
- 신발은 꼭 맞는 것을 사용합니다.
- 화장실 또는 복도 이동시 항상 안전바를 잡고 이동합니다.
- 보행이 불편하신 분은 이동시 반드시 보조 기구를 사용하도록 합니다.
- 휠체어 사용시 앉고 내릴 때는 반드시 고정 장치를 확인한 후 사용합니다..
- 시각•청각이 불편하신 분은 안경이나 보청기 착용 후 이동합니다.
- 운동 중 도움이 필요한 경우 병원 내의 직원에게 도움을 받습니다.
- 바닥에 물기가 있으면 즉시 직원에게 알려 미끄러지지 않도록 주의합니다.

외래 낙상 예방 안내문

- 도움이 필요할 때에 병원 내 직원에게 언제든지 도움을 청합니다.
- 신발은 꼭 맞는 것을 사용합니다.
- 화장실 또는 복도 이동시 항상 안전바를 잡고 이동합니다.
- 보행이 불편하신 분은 이동시 반드시 보조 기구를 사용하도록 합니다.
- 휠체어 사용 시 앉고 내릴 때는 반드시 고정 장치를 확인한 후 사용합니다.
- 시각•청각이 불편하신 분은 안경이나 보청기 착용 후 이동합니다.
- 이동용 침대를 사용하는 경우 침상난간을 꼭 올리도록 합니다.
- 이동용 침대에서 일어나지 않습니다.
- 이동용 워커를 사용하시는 분은 키 높이에 맞는 것을 사용하도록 합니다.

부록10. 낙상예방활동체크리스트 (영상검사실)

20 년 월 영상검사실 낙상 예방활동 체크리스트																															
점검항목		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	낙상예방 지침 게시물 점검 (내용, 부착위치 및 상태)																															
2	낙상주의 표시판 확인 (게시물,스티커 부착)																															
3	X-ray 촬영대 부속물 점검 (도움발판, 바퀴잠금장치 작동여부)																															
4	촬영대 주변 정리확인 (부속기구, 전기코드)																															
5	바닥 점검(복도포함) (물기제거, 미끄러짐 요소 제거)																															
6	조명확인																															
7	낙상 고위험 환자 확인 (전산공유, 환자인식 팔찌)																															
점검자 확인																																
조치 및 개선 필요 사항																																

부록11. 낙상예방활동체크리스트 (외래)

20 년 월 외래 낙상 예방활동 체크리스트																															
점검항목		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	낙상예방 지침 게시물 점검 (내용, 부착위치 및 상태)																															
2	낙상주의 표시판 확인 (게시물,스티커 부착)																															
3	침대 부속물 점검 (SIDE RAIL 작동여부, 바퀴잠금장치 작동여부)																															
4	침대 주변 정리확인 (부속기구, 전기코드)																															
5	바닥 점검(복도포함) (물기제거, 미끄러짐 요소 제거)																															
6	조명확인																															
7	낙상 고위험 환자 확인 (전산공유, 환자인식 팔찌)																															
점검자 확인																																
조치 및 개선 필요 사항																																

부록12. 낙상예방활동체크리스트 (원무)

20 년 월 원무과 낙상 예방활동 체크리스트																															
점검항목		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	낙상예방 지침 게시물 점검 (내용, 부착위치 및 상태)																															
2	낙상주의 표시판 확인 (게시물,스티커 부착)																															
3	주변 정리확인 (부속기구, 전기코드)																															
4	바닥 점검(복도포함) (물기제거, 미끄러짐 요소 제거)																															
5	조명확인																															
6	콜벨위치 확인 및 작동상태 확인																															
점검자 확인																																
조치 및 개선 필요 사항																																

부록13. 낙상예방활동체크리스트 (재활치료실)

20 년 월 재활치료실 낙상 예방활동 체크리스트																															
점검항목		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	낙상예방 지침 게시물 점검 (내용, 부착위치 및 상태)																															
2	낙상주의 표시판 확인 (게시물,스티커 부착)																															
3	침대 부속물 점검 (SIDE RAIL 작동여부)																															
4	주변 정리확인 (부속기구, 전기코드)																															
5	바닥 점검(복도포함) (물기제거, 미끄러짐 요소 제거)																															
6	조명확인																															
7	콜벨위치 확인 및 작동상태 확인																															
점검자 확인																																
조치 및 개선 필요 사항																																

부록14. 낙상예방활동기록지 (고위험군)

낙상 예방 활동기록지 (년)

성 명		등록번호		성별/나이	/	병 실	

낙상 발생 위험도 결과 : 고 위험군( ), 저 위험군( )

작 성 일																							
작 성 시 간		D	E	N	D	E	N	D	E	N	D	E	N	D	E	N	D	E	N	D	E	N
침상난간 상태확인	환자의 침상난간 올려져있음																					
응 급 호 출 기	응급호출기는 제 위치에 있음																					
낙상예방 교 육 및 이 해 도 평 가	환자의 신발은 제 위치에 있음																					
	이동시에는 반드시 미끄럽지 않은 신발을 착용하도록 함																					
	밤에는 야간 조명을 켜도록 함																					
	자주 사용하는 물건은 환자 가까이 두도록 함																					
이 동 시 보조기구 적 용	환자 이동 시 부축 및 보조기구 적용함																					
	이동침대 이용 시 보조난간 올림																					
	휠체어 사용 시 잠금장치 확인하고 이동하도록 함																					
	보조기구 사용 시 낙상에 대해 주의시킴																					
낙상예방 기본중재	낙상주의 표지판을 부착함																					
	낙상 고위험 팔찌 착용함																					
	침상주변 확인 (바닥물기/장애물제거/ 침대고정)																					
D 서 명																						
E 서 명																						
N 서 명																						