
(a) Longitudinal Variance $\lambda_1(\tau)$
$\langle\lambda_1\rangle$ (Tangent Variance)
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
Variant 1 (Frozen Scale)
Variant 2 (Cooling-Compensated)
Variant 3 (Log-Temperature)
Reference (Per-Slice Z-score)
Bjorken $\propto \tau^{-2/3}$
1
2
3
τ [fm/c]
(b) Transverse Variance $\lambda_2(\tau)$
$\langle\lambda_2\rangle$ (Transverse Variance)
$10^{-5.0}$
$10^{-7.5}$
$10^{-10.0}$
Variant 1 (Frozen Scale)
Variant 2 (Cooling-Compensated)
Variant 3 (Log-Temperature)
Reference (Per-Slice Z-score)
1
2
3
τ [fm/c]
(c) Eigenvalue Ratio λ_2/λ_1
$\langle\lambda_2/\lambda_1\rangle$ (Spectral Ratio)
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
Variant 1 (Frozen Scale)
Variant 2 (Cooling-Compensated)
Variant 3 (Log-Temperature)
Reference (Per-Slice Z-score)
1
2
3
τ [fm/c]