







czy jak zrobie to dla wiekszej ilości punktów z czego wynika to że mam mniej niż wymiar 2? jeśli tych punktów na brzegu jest coraz mniej to powinienem dostać 2? - tak myślę


algotmiczny sposób na wykazanie to co widać
gatką oczną 2-> 1 wymiar

kontrolowanie błędów





1. zmienić kolory heatmap(:blue, coś tam, coś tam coś tam, :crimson, :red)

Diagonalization of C_t yields the local variance spectrum $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_D \geq 0$. The effective number of active geometric directions is given by the Participation Ratio:




$$d_{PR}(x_i) = \frac{(\text{Tr}(C_t))^2}{\text{Tr}(C_t^2)} = \frac{(\sum_{k=1}^D \lambda_k)^2}{\sum_{k=1}^D \lambda_k^2}. \quad (8)$$




1. punkt w środku, brać wymiar punktu tego ?



$A(\tau)$ $T(\tau_{\text{avg}})$



$\tau = \text{jakis}$




zrobić histogramy dla takich samych tau co jest na grid

$K = 2d$

statement, zmiana troche zmienia ale nie wiele

pomijamy te $w = \tau T$



(b) Dimensionless (pr)