

Criterios diagnósticos — TAG y Pánico

DSM-5 (APA, 2013) y CIE-11 (OMS, 2019) — consulta rápida

TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA (TAG)

Ansiedad y preocupación excesivas, presentes la mayoría de los días durante al menos 6 meses, sobre diversos eventos o actividades. Difícil de controlar.

Requiere al menos 3 de estos 6 síntomas (1 en niños):

- Inquietud o sensación de estar “al límite”.
- Fatigabilidad fácil.
- Dificultad para concentrarse o “quedarse en blanco”.
- Irritabilidad.
- Tensión muscular.
- Alteración del sueño (dificultad para conciliar o sueño no reparador).

TRASTORNO DE PÁNICO

Crisis de pánico inesperadas y recurrentes, seguidas de al menos 1 mes de preocupación persistente por nuevas crisis o sus consecuencias, o de cambio conductual significativo (evitación) relacionado.

Una crisis de pánico incluye 4 o más de estos síntomas, de inicio súbito:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Palpitaciones o taquicardia | • Mareo o inestabilidad |
| • Sudoración | • Escalofríos o sofocos |
| • Temblor o sacudidas | • Parestesias (hormigueo/entumecimiento) |
| • Sensación de ahogo o falta de aire | • Desrealización o despersonalización |
| • Sensación de atragantarse | • Miedo a perder el control o “volverse loco” |
| • Dolor o malestar en el pecho | • Miedo a morir |
| • Náuseas o malestar abdominal | |

■ Clave clínica

El pánico es una crisis aguda (minutos); el TAG es una preocupación sostenida (meses). Pueden coexistir. Ambos cuadros requieren descartar causa médica (tiroides, cardiopatía) y consumo de sustancias antes de confirmar diagnóstico.