

Guía clínica: Trastorno de Ansiedad Generalizada

El TAG se caracteriza por preocupación excesiva, difícil de controlar, sobre múltiples áreas de la vida. Esta guía orienta la evaluación, conceptualización e intervención.

1. Criterios clínicos centrales (DSM-5)

- Ansiedad y preocupación excesiva sobre múltiples eventos o actividades, la mayoría de los días durante al menos 6 meses.
- Dificultad para controlar la preocupación.
- Al menos 3 de los siguientes: inquietud, fatiga fácil, dificultad de concentración, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño.
- Malestar significativo o deterioro del funcionamiento.
- No atribuible a sustancias ni a otro trastorno.

2. Presentación clínica frecuente

Síntomas cognitivos	Síntomas somáticos
• Preocupación constante sobre distintos temas.	• Tensión muscular, contracturas.
• Catastrofismo y anticipación de lo peor.	• Fatiga crónica.
• Dificultad para tolerar la incertidumbre.	• Alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener).
• Pensamiento rumiativo difícil de interrumpir.	• Síntomas gastrointestinales, cefaleas.

3. Factores de mantenimiento

- Intolerancia a la incertidumbre: la preocupación como intento de 'prepararse para lo peor'.
- Creencias positivas sobre la preocupación ('preocuparme me ayuda a estar listo/a').
- Evitación cognitiva: la preocupación abstracta aleja imágenes emocionales más amenazantes.
- Conductas de reaseguro que refuerzan el ciclo ansioso.

4. Enfoques y técnicas recomendadas

TCC clásica	Reestructuración cognitiva, registro de preocupaciones, experimentos conductuales.
Modelo de intolerancia a la incertidumbre	Trabajar la relación del paciente con la incertidumbre. Exposición a situaciones inciertas.
ACT	Defusión cognitiva, aceptación de la incertidumbre, clarificación de valores.

Mindfulness / MBSR	Observación de pensamientos sin engancharse. Reducción de la reactividad.
Relajación	Relajación muscular progresiva, respiración diafragmática como herramientas de regulación.

5. Objetivos terapéuticos

- Reducir la frecuencia e intensidad de las preocupaciones.
- Aumentar la tolerancia a la incertidumbre.
- Desarrollar estrategias de regulación emocional.
- Mejorar el funcionamiento cotidiano y la calidad de vida.
- Identificar y modificar creencias disfuncionales sobre la preocupación.

Notas clínicas

Formulación del caso / hipótesis de mantenimiento:
Objetivos consensuados con el/la paciente: